

Medicine



12  
12  
cl  
16









BERNARDI SIEGFRIED ALBINI

*Anatomes & Chirurgiae in Academia Batava  
quae Leidae est Professoris*

H I S T O R I A  
MUSCULORUM  
H O M I N I S .



LEIDAE BATAVORUM,  
Apud THEODORUM HAAK & HENRICUM MULHOVIUM.

• MDCCXXXIV.



N<sup>o</sup> 369<sup>u</sup>  
Vol. C9a.65—  
1598—



HISTORIAE  
MUSCULORUM  
HOMINIS

LIBER PRIMUS

*In quo de Musculis in genere agitur.*

PROOEMIUM.



Quae digna memoratu de musculis hominis comperire certioribus observationibus potui, ea vobis, Anatomes Amatores & Cultores, in his digesta libris offero. Ad quam rem accuratius tractandam, etsi satis me ejus dignitas stimulaverit, potissimum tamen studio prospiciendi illis, qui operam mihi dabant, primum impulsus sum. Nam cum eis epitomen quandam, quae summas musculorum complecteretur, viderem conducturam, institui aliquam conficere, eamque paullo accuratiorem, & non ex Myographis colligendam, sed ex ipsis describendam hominum corporibus: in qua concinnanda dum occupatus fui, crevit paulatim aliquot annorum cura in pleniorē, absolutioremque

## HISTORIAE MUSCULORUM

banc historiam. Eamque potius, quam epitomen ejus, emitto, quoniam & norma aliqua esse poterit illis, qui me audiunt, & simul eam Anatomices partem multo magis illustrare. Quod vero post tot eximios earundem rerum, quos magnifacio, Scriptores hanc nica emittere sustinuerim, id maxime fuit causae, quod nihil & de anatomica musculorum descriptione, & de usibus eorum contineant, nisi quod notaverim observatione saepe iterata. Talia enim ferri non modo solent, sed etiam expeti, quoniam cognosci fabrica corporis nostri observationibus tantummodo potest, iisque vel confirmantur quae antea scripta sunt, vel, si possint, emendantur, augenturque. Scire autem interest, an recte observatum sit. Quapropter non dubito, quin majorem illi, qui Scriptorum pondere judicant, huic historiae fidem adjecturi sint, ubi cum scriptis graviorum Anatomicorum congruit, eorum roborata auctoritate; quam ubi discrepat ab iis, quorum magnitudo officere ei poterit. His, cum veri & falsi earum rerum nota ex hominum corporibus solummodo habeatur, quomodo fidem faciam, plane non video: vellem eos saltem testes ac spectatores habuisse, quot corporum compositionem hujus historiae, quantum in me esset, perficiendae gratia retexerim, & quam scrupulose omnia in iis exploraverim, quamque lente probaverim, dubitans semper, & mihi ipse dissidens. Quantum vero consecutus sum, intelligere poterunt, qui cum ipsis rebus diligenter conferre, quae scripsi, dignabuntur. Quod si quid in pertractando interdum offenderim, (fieri enim illud in tanta earum rerum copia, quantacumque adhibita sit cura, potuisse, nemo, puto, qui aliquantulum in iis intelligit, mirabitur) eo non obruentur, spero, illa, si quae sint, quae laudanda sunt: & quam justa sit venia, vel ex hoc apparet, quod etiam clari, atque omni laude digni homines, quanquam sum-

summe in eodem genere elaboraverint, sugere tamen nequiverint offensionis reprehensionem. Caeterum, modo ad juvanda studia vestra, Auditores ornatissimi, satis idonea proderim; non male me posuisse operam existimabo; maloque desiderii vestris; hos libros nunc proferendo, occurrere, quam spe magis perficiendi premere eos diutius: quos si etiam tardius, quam voluissetis, absolverim, & rerum prope incredibili magnitudini ac difficultati, & aliis, quae suscepi vobis tradere, meisque occupationibus adscribite. Auctorem nullum ulla in re, praeterquam in his musculorum, quae retinui, nominibus, secutus sum: neque ullius in ipsa descriptione feci mentionem, quoniam neque aliunde quam ex ipsis hominum corporibus, auctoritatem quaerere ei volo, neque tantum mihi est otii, quantum in Scriptoribus expendendis esset consumendum. Totum vero opus in quatuor libros distribui commodissime posse putavi. In primo egi de musculis in genere, in secundo de situ eorum, in tertio singulorum historiam complexus sum, in quarto descripsi eos in classes. Omniaque in his plaue & breviter exponere studui, atque ita disponere, ut afferret hunc ordo. In hoc autem libro, qui est de musculis in genere, dicendum habui, quid musculus sit, quae fabrica eorum, quomodo fabrica illa investiganda sit, quis sit usus partium musculi, quomodo se partibus aliis affigant, quae distinctio eorum, quot numero habeamus & quos, quae ratio nominum eorum, quomodo illi differant inter se, quae actio eorum, quomodo in certas quasdam classes distribui possint, quae sint varietates eorum, quae denique ratio quaerendi eos in corpore mortui. Quomodo vero reliqua instituti in sequentibus libris exequi conatus sum, ex praecemiis, quae ipsis addidi, cognosci poterit.

C A.

## 6 HISTORIAE MUSCULORUM

## CAPUT PRIMUM.

*Quid Musculi sint , & quae fabrica eorum.*

**P**ars magna corporis nostri constat ex musculis , qui motus animalis instrumenta sunt. Motum vero animale cum dicimus , qui ex contractione quadam partium animalis vivi naturaliter cietur. Earumque partium homini , de quo his libris agimus , duo genera sunt : unum est , quod fibras vocamus : alterum quod musculos. Superioris generis partes fila quaedam tenuia sunt ; eademque mollia , sequacisque lentitiae , & quoad sensibus possunt à nobis cognosci , simplicia , inter seque in aliis atque aliis partibus diversa ; eaque vel partibus quibusdam intexta sunt , vel alia aliis diversimode adjacentia , innexaque , in membranarum speciem disposita , vel collecta in musculos , partesque musculosas. Musculi autem sunt caro mollis , rubraque , & ex multis partibus , sed imprimis ex fibris , quae musculosae appellantur , constructa : inque universum vel chordarum dici possunt similes quodammodo esse , vel fasciarum. Ac plerique eorum in longitudinem porrecti , ab alia parte corporis , cui à principio affixi , ad aliam pertinent , eique sine suo inhaerent. Pauci quidam , quos sphincteres dicunt , nec principium habere videntur , nec finem ; sed quasi orbiculata aut ovata specie circumducti ostiis quibusdam. Sunt alii toti carnei , id est , molles , rariores , rubri. Aliis praeter carnem pars quaedam alia , cui tendineae nomen , pariter è fibris maxime constans ; sed durior & densior , & cum insigni splendore albicans. Horum alii in principio nil nisi tendo

do sunt, alii in fine, alii utrimque, quidam in medio longitudinis suae. Plerique in principio & in fine tendinosi. Quidam & in medio tendineas portiones carni suae immixtas habent, adjectasve. Omnes ex fibris, ut dictum est, constant; membranulis deinde inter fibras illas intercedentibus, in quibus plerumque pingue haeret; nervis praeterea, arteriisque & venis, quique in his continentur, humoribus: accedit membrana quaedam, qua obducti. Praecipuae autem in his partibus fibrae sunt: musculos enim ipsae proprie faciunt, qui reliquas earum tantummodo causa accipere. Quare oportet ut eas primum consideremus. Ex earum igitur genere sunt, de quibus supra diximus, aliae carnae, quae carnem musculi, aliae tendineae, quae tendinem faciunt: illae molliores succique pleniores, & rubicundae: hae longe duriores & sicciore, albicantes, splendentes. Tendineae carnis continuatae, sic ut ab ipsis ex carnea natura sua in tendineam abeuntibus, produci videantur, eademque fibra hic carnea sit, ibi tendinea. Eadem tenuiores carnis illis à quibus oriuntur, raritate carnea in tendineam densitatem quasi compacta. Minima autem tendinum ex carne initia, in qua primum carnae quaedam fibrae se in tendineas simplices vertunt. His deinde se inter se jungentibus, portiones tendineae insigniores, rursusque ex harum conjunctione, fibrarumque accessione, insigniores insignioresque oriuntur, donec conspicuum tendinis principium effectum sit, qui quamdiu deinde carni inhaeret, continua portionum similium adjectione crescit. Eodemque modo ex tendinibus caro fit. Nec aliter portiones tendineae,

## 8 HISTORIAE MUSCULORUM

dineae, quae carni adjectae, aut immixtae, ex carne oriuntur, crescunt, decrescunt, in carnem abeunt. Ut vero ipsi muscoli, ita etiam in universum fibrae eorum incedunt. In illis igitur, qui in distincta extrema desinunt, se per longitudinem eorum porrigunt: in sphincteribus ad figurae eorum similitudinem incurvae sunt. Quamquam tamen, si accuratius velimus decursum earum expendere, multis modis deflectant, creberrimeque se subducant, aliaeque se aliis flexuose immisceant, rursusque aliae emergant, multae etiam cum vicinis ita jungantur, ut difficile dictu sit, utrum confluant in unum, an tantummodo arctissime cohaereant. Verum in tendine aliae juxta alias rectius decurrere solent. Sunt muscoli, quorum quaedam fibrae à reliquis multum abluunt, ut videre est in Diaphragmate. Omnes sic inter se connexae, ut carnae in plerisque musculis carnem efficiant, quae cum omnibus partibus suis continuata esse videatur, revera tamen in fasciculos parvos, sed arte compactos, & qui rursus ex minoribus constent, distincta sit: in quibusdam manifestius interruptam, & quasi diffusam in longitudinem, tanquam si essent plures muscoli minores. Minorum quoque aliquot fibrarum fasciculi sunt, quae prima specie simplices apparent fibrae. Fasciculi in aliis laxius cohaerent, in aliis strictius. Tendo plerisque cohaerens, aliquibus ex parte per longitudinem intercisis. Et fibrae tendineae longe strictius connexae inter se, quam carnae. Quod connectit, materies quaedam singularis est, albicans, subtilis, rara, obsequiosa, facillime diducenda; lubrica; quae per omnem musculus perpetuo tractu



tractu pertinet, membranam cellulofam vocant. Eaque cum propius examinatur, ex fibris, membranulisque constareprehenditur, iisque subtilissimis, simplicibus, flexilibus, & facillime quidem sequentibus quocumque ducas, confertis praeterea, mirificeque contextis, sic ut media inter sese relinquant, efficiantque spatiola, è quorum aliis in alia transitus pateat. Omnibus haec interjecta fibris, ac pertinaciter adnexa, ambit eas omni ex parte, & à vicinis distinguit, cum iisque connectit. Ubi autem fibrae laxius cohaerent, ut in carne musculi, ibi & multa intercedit, maxime in laxioribus, & qua caro in fasciculos distincta; atque eo copiosior, quanto majora inter fasciculos intervalla: ubi strictius, ut in tendinea parte, parca. Est & subtilior, ubi parca: densior, magisque membranae similis, ubi multa. Neque solum in musculis continetur, sed ex iis etiam ubique emergens, complectitur eos membranae, quam inter eorum partes recensuimus, specie, inter seque, & cum vicinis partibus connectit, pariterque ibi, atque in ipsis musculis, perpetua est, illi praeterea membranae, qua cutis ex interiore parte obducta, quaeque ejusdem naturae est, diciturque panniculus adiposus, passim continuata, ubicumque non obstant musculorum vaginae tendineae. Illa autem parte crassior est, & densior, quam qua fibris musculorum intexta est, eoque crassior, quo spatia tum inter ipsos musculos, tum inter eosdem vicinasque partes majora: insignis plerumque circa tendines. Ubi densior, ibi & è membranis insignioribus composita, cellulas satis magnas efficientibus,

B

bus, in quibus quamplurimae esse solent minores, interstinctae membranulis subtilioribus: omnesque contextu fibrarum subtiliore refertae, quem rursus interstinguunt fibrae ejus crassiores. Atque haec materies in illis hominibus, quorum corpus macie torridum est, subtilior apparet, quoniam fere tota collapsa, & tantummodo quasi madefacta humore quodam, eoque tenui, suboleoso, leni, lubricante. In obesis pingui farta est, distentaque, inprimis ubi multa, & à vicinarum partium pressione liberior; & inaequaliter quidem distenta, ad ipsius obesitatis rationem. In his itaque fibras, fasciculosque à se invicem diducit, ac musculos facit torosiores: musculos quoque alios ab aliis, & à partibus finitimis magis disjungit, impletque spatia intermedia. Et quandoque adeo distenditur, ut reliqua musculorum quasi suffocet. In tendinibus autem multo pingui non completur, haud dubie propter subtilitatem suam, compressioremque tendinum compactionem, ac fibrarum tendinearum duritiem, ob quam pingui tam facile non cedunt. Nunc arteriae musculorum quemadmodum se habeant, deinceps explicandum est. Quamplurimae, eaeque non admodum magnae, sanguiferae tamen, ad membranam cellulosam, qua illa musculos ambit, accedunt, & partim se mox in musculos immergunt, partim antequam immergant, per membranam mododictam quaquaversum decurrunt, in ramos minores minoresque se diffundentes, qui mirabili se varietate flectunt, passimque coeunt in unum. Ubi se in ipsos musculos immerferunt, inter fibras eorum per eandem membranam pergunt pro-

cede.

cedere. Procedunt autem sensim ramosiores, sic ut rami rursus in ramos abeant, eosque subtiliores & angustiores: omnemque musculum creberrimae pervadunt, flexu multiplici, creberrimeque conjunctae. Ramulis denique innumerabilibus, & iis in perangustam subtilitatem tenuatis, ut aegerrime cerni conspicillis optimis queant, ad omnes fibras pertinent, per easque discurrunt: postremoque, ubi jam plane evanescent, se in ipsas fibras videntur demittere. Multae etiam jam in membrana cellulosa videntur evanescere, antequam fibras attingant. Omnibusque membrana illa, quoad per eam incedunt, undique adnexa. Communia haec quidem carni tendinique: sed tendineis fibris se longe pauciores, nec nisi parvae arteriolae immiscent, quae & rarius circum eas textum efficiunt. Adde quod innumerae exiles arteriolae per ipsas arteriarum, itemque venarum & nervorum membranas distribuuntur, quemadmodum toto corpore fieri videmus. Par fere venarum ratio est, quae arterias in genere comitantur. Inter eas etiam quas vocant lymphaticas. Jam vero humores utraque haec vasa continent, sed diversos inter se, nec eosdem omnibus ramis suis. Arteriosos arteriae, venae venosos: utraque sanguinem majoribus ramis suis, minoribus autem exiliores, id est, quorum partes maximae tam parvae sunt, ut penetrare in eas possint. Multae enim sunt, in quas pars rubra sanguinis penetrare nequit, multae in quas neque serum, multae in quas tantum potest humor longe exilior. In venis lymphaticis lympa continetur. Ex quibus praeterea intelligi potest, arterias & venas una

cum humoribus suis, non exiguam musculorum partem constituere. Aliquid denique nervi conferunt, qui unumquemque musculus adeunt: alios vero ramis paucioribus, alios pluribus: alios pro magnitudine eorum insignioribus, alios exilioribus. Frequentissime autem ad carneam partem accedunt, rarius ad tendineam. Seseque ad vasorum exemplum inter fibras insinuant, ac dein ramis suis membranam cellulosa, quae ipsis quoque undique adhaeret, pererrant. Pariter enim se in subtiliores subtilioresque ramorum serie dividunt, sed minus tamen ramosi sunt, minusque flexuosi, & jam cito evanescent subtilitate non percipienda oculis. Haec constant, hi certi fines, extra quos egredi non libet. Quare quoniam satis de his dixisse videmur, ad modum, quo investigari possint, transimus, quem quia supra dicta illustraturus est, & confirmaturus, adjiciemus.

## CAPUT II.

*Quomodo fabrica musculorum investiganda sit.*

**P**rincipio recentes muscoli sanissimi corporis diligenter examinandi sunt, ex quibus & habitus partium omnium, & natura, & compositio, & magnitudo formae sine depravationis suspitione cognoscantur. Primum autem macilenti examinandi, quoniam pingue obscurat omnia, praesertim membranam cellulosa. Deinde etiam obesi, ut quae ipsius pinguis natura sit, intelligatur, & quomodo illud contineatur membrana mododicta: quo simul fibrae ex parte melius apparebunt,

bunt ; quoniam aliae ab aliis disjunctae pingui. Post remota membrana ambiente , fibrae à se invicem subtiliter diducendae , paullatimque quoad fieri potest , separandae : sic enim tum fibrae , tum connectentes membranulae , modusque quo connectunt , cerni clarius poterunt. Ad quod utile quoque est musculum in aquam demersum tamdiu macerare , donec fibrarum coagmen-  
tatio levi aquae agitatione partim laxari incipiat , partim dissolvi : cui rei macilenti maxime idonei sunt. Quamquam hoc modo multum etiam immutetur illarum partium , cohaesionisque earum naturalis conditio : nam praeterquam quod omnia dissolvantur , fibrae quoque , & materies cellulosa aquam imbibunt , eaque emollitae turgescunt , prope ut in leucophlegmaticis , & aqua intercute laborantibus ; fibrae praeterea carneae dimisso rubore suo pallescunt. Est contrarius huic ad eadem investiganda modus leviter siccare musculum , similiter partim aliquid demonstrans , partim etiam mutans. Oportet autem & macilentum & pinguem exsiccare , ac deinde ab iis pertenues lamellas acutissimo cultro abscindere , alias ex transverso musculi , alias secundum longitudinem ejus , easque optimo conspicio considerare , alias quidem leviter prius distracta cohaesione earum , alias postquam humectatione in naturalem statum quantum potest restitutae fuerint : mirumque est , quam eleganter tunc appareant fibrae cum interveniente ambienteque materie cellulosa , aut pingui. Sed cum eadem siccando depraventur , convenit à recenti musculo similes lamellas abscindere , ( quamquam difficile factu sit ) atque eas cum exsiccatis illis

comparare; tumque ex exsiccatis sumere quae obscura in recentibus, ex his, quae mutata in illis. Convenit quoque ad cognoscendum fibrarum decursum & crassitudinem, structuramque membranae cellulosae inter eas intercedentis, musculus aquae incoquere dum obdurescat, posteaque discerpere, & diversimode discindere. Hoc autem oportebit attendere, fibras cum elixantur pallescere, indurari, & plane comprimi; sic & indurari, ac comprimi materiem cellulosam; reliqua muscoli prorsus immutari. Materiem cellulosam facile diduci posse, & ex fibris membranulisque spatiola formantibus constare discimus, si macerrimi muscoli fibras leniter distrahimus. Clarius autem, cum eam inflamus: tunc enim implet eam aër, distenditque membranulas ac fibras ejus, ut in obesio pingue; cum vero ipse pellucens sit, non obstat, quominus eas commode examinare possimus. Aliquando in musculos incidimus emphysemate quodam laborantes, in quibus idem perspicue apparebat, cellulis illis materie aëri simili praeter naturam turgentibus. Nunquam vero structura ejus apparet elegantior, quam cum eam aëre primum distendimus, ac dein exsiccamus; quo tamen multum immutatur natura ejus: neque facile est efficere, nisi in pene & scroto; quae pars membranae cellulosae cum in reliquis similis sit illi musculorum, vix potest dubitari, quin eadem utriusque structura sit. Vasa majora accurata dissectione indagamus: facilius autem, pulchriusque, cum impleta materie quadam idonea. Minorum tanta est tenuitas, ut fugiant aciem, nisi artificiose imple-

pleta fuerint. Implenda materie, quae & subtilis sit, ac facile libereque fluat, ut in minima usque, dum infunditur, penetrare possit, & tamen prae nimia subtilitate è vasis facile non manet sudoris instar, ac sic offuscet vicina: & eadem postea concreseat & obdurescat, continuaque cohaereat, quo vasa aequabiliter distendat, neque cedat, si tractentur, aut si vulnerentur, effluat: & simul coloris saturi sit, ut vasa minora, cum in ea penetravit, cadant in conspectum. Infundenda vi-illa, quae requiritur, ut omnia maxima & minima pervadat, impleat, distendat, sustineat, neque tamen disrumpat. Post impletionem progressus vasorum, fibras leniter & subtiliter diducendo & separando, investigandus est. Ad minimorum autem investigationem fibrae etiam maceratione, ut supra diximus, à se invicem dissolvi possunt, aut spiritu vini fortissimo indurari, ut separari queant commodius. Neutiquam vero exsiccandus musculus, ac deinde vasa ejus impleta conspicio lustranda, quamquam tunc pulchrius se in conspectum dare videantur. Dum enim siccatur musculus, omnia quam maxime contrahuntur, & quasi compinguntur in unum, ut vasorum decursus finisque recte cognosci nequeant: praeterquam quod exsiccatu incauto facile imponat, quia vasa & plura ad rationem fibrarum, & confertiora exhibet, quam verè sunt: nam fibrae longe exiliores siccando fiunt, quam vasa, quae sustinet materies qua facta sunt; quo fit ut exilescentes simul & coalescentes fibrae vasa, quibus interserta sunt, arctius in unum cogant, & plane suffocent. Impletionem autem non modo

do efficimus , ut vasorum progressum ad majorem , quam credi posset , subtilitatem usque persequi , sed ut ordines etiam eorum , quoad humorum , quos recipere possunt , exilitatem , quadam assequi possimus similitudine. Siquidem praeter rubra vasa (rubro enim colore materiem , qua vasa implemus , tingere inprimis solemus ) alia subtiliora detegimus , quae rubra parte , utpote quae nimis crassa , exclusa , solam receperint albicantem : & praeter haec etiam subtiliora , quae tantummodo ipsius albicantis pars subtilior ingressa sit. Arterias , quia nullibi impeditae , facilius implemus. Venas , ob valvulas earum , vix possumus , nisi in arterias materies adigatur , donec in venas penetret : tunc vero difficile venas ab arteriis distinguere. Itaque in corde , quod musculosum est , suaeque fabrica musculorum simile , venarum repletio instituenda , ubi facile succedit. Ad hoc in strangulatorum musculis illis , qui supra locum strangulationis sunt , venae pulcherrime conspicuae , quia sanguine turgidae. Sanguinem , caeterosque humores multum conferre ad plenitudinem musculi , illo experimento scitur , quo tamdiu tepida in arterias ejus , ut è venis effluat , adigitur , ipseque simul extrinsecus manibus leniter & alterne comprimitur , laxaturque , donec humores inquilini eloti esse appareant : eo enim multum extenuatur. Sed eadem quoque opera fibrae materiesque cellulosa immutantur , ut cum macerantur aqua. Utinam vero alius quam nuda sectione , nervos persequendi modus suppeteret , qui cum non multum per musculum progressi sunt , studium investigantis omne subtilitate



litate sua adhuc eludunt. Pergimus ad usum partium musculi.

## CAPUT III.

*De usu partium Musculi.*

**E**a fibrarum carnearum natura est, ut se contrahere, brevioresque facere possint, rursusque remittere. Proprium autem earum officium contractio est: nam cum se remittunt, cessant agere. Fibrae tendineae se vix quicquam contrahunt, sed sunt tanquam chordulae robustiores, quas fibrae carnae trahunt, tenduntque. Eas vero fabricata natura est, primum ubi musculus vel ab initio, vel in fine firmiter affigendus est partibus durioribus, ad quod duritiae suae, & robore aptiores sunt, quam carnae. Itaque videmus plerosque musculos, quae ossibus, vel cartilaginibus, vel duris membranis affixi sunt, tendineos esse, aut tendinosos. Immo fibrae horum pleraeque quae in initio aut in fine carnae esse videntur, propius examinatae, tendineae inveniuntur. Cumque ut procedit aetas, ita vim musculi majorem exserere, ob idque tenacius qua oriuntur, quaque se inserunt, adhaerere necesse habeant; ita quoque ab utroque extremo fiunt magis tendinosi. Ob eandem causam eadem ipsis extrema in robustioribus magis esse solent tendinosa. Ubi deinde ab una parte ad aliam deducendi sunt, sic ut vel in principio, vel in fine, vel in medio magnum spatium non impleant, & tamen praecuracilitate imbecilles non sint, ibi in tendinem

C

mutan-

mutantur, quæ carnea parte gracilior, tenuiorve, sed exilitatem suam abunde compensat robore: ut sit in Bicipitis brachij capite longiore, Extensore communi digitorum manus, Biventre maxillæ, cæterisque eorundem generum. Similiter ubi se circum ossa inflectunt; iisque frequenter atterunt, quod facile non ferret mollitudo carnis; ut in Peroneis, Tibiali postico: adde quod tendo circum ossa facilius & melius flectatur, ac volvatur, quam caro. Quibus etiam partim de causis Obliquus superior oculi, quæ circum cartilaginem annuli sui revolvitur; alique, quæ circum ligamenta quædam, tendinei facti sunt. Passim præterea dum à vicinis partibus premuntur, atterunturque, evadunt magis magisque tendinosi: pressione enim & attritu fibræ solidantur, ac compinguntur. Tales & evadunt progrediente ætate, quæ partes firmæ omnes occalescunt. Et in plerisque plures una ex dictis causis, in multis omnes simul concurrunt. Membranulæ cellulosæ fibras, vasa, nervos inter se connectunt; & conjungunt in unum. In carne autem ita, ut simul singulæ illæ partes solæ, quantum requiritur, mobiles sint, mutuaque manente cohaesione sitam possint mutare suam: quod imprimis ad facilem fibrarum carnearum tum contractionem, tum relaxationem, necessarium est. Propterea subtiles sunt, lentæ, obsequiosæ, lubricæ, pingui plerumque refertæ. Nam quia subtiles, fibris impedimento non sunt; quia lentæ, facile non dissolvuntur; quia obsequiosæ, & ex humore quodam lubricante, aut ex pingui lubricæ sunt, facillime cedunt, (nisi pingue nimis increascit, quo

quo opprimuntur & impediuntur illa, quibus circum-  
 fufum) lubricantque fibras, ad faciliorem earum mobi-  
 litatem, & ne quid ab attritu, dum fe movent, dam-  
 ni patiantur. Intendine, ut ille robuftior fit, omnia  
 longe ftrictius compingunt, ubi iccirco parcae, & pin-  
 gui vix diftentae. Quod partibus, muscoli hae mem-  
 branae praeflant, id toti praeflat ipsis continuata, ejus-  
 demque naturae, membrana externa. Cum vicinis enim  
 partibus obfequiofa cum laxitate, facilemque conce-  
 dente mobilitatem, connectit, ac vafa quae ad eum  
 accedunt, nervosque continet, & fufinet. Per ner-  
 vos à cerebro, ejusque cauda fpinali medulla, acces-  
 dere videtur cauffa proxima contractionis fibrarum,  
 quae qualis fit, & longum efferet hic inquirere, & ni-  
 mium nos ab evidentibus rebus abduceret ad latentis-  
 fimas, quas, cum nihil quicquam ad eas investigan-  
 das adhuc valuerit anatome, hic non attingemus. Ad-  
 ducimur autem ad credendum per nervos eam acces-  
 dere, quoniam nulla amplius fe contrahendi vis mus-  
 culis fupereft, cum modo nervi ad eos pertinentes  
 plane impediuntur; five comprimantur, five vinculo  
 constringantur, five difcindantur, five alio quocum-  
 que modo depraventur: eademque ipsis redditur, si-  
 mulatque in integrum iidem nervi refituuntur. Et  
 quidem à cerebro accedere, primo quoniam cum  
 nervi quibus diximus modis impediuntur, nihil inde  
 detrimento patiuntur musculi, qui ab iis ipsis ner-  
 vis ramos accipiunt inter ortum eorum à cerebro, lo-  
 cumque impeditum: dein quoniam medulla fpinali a-  
 licubi depravata, clauda, compressa, aut contufa, apt

discissa, illi muscoli contrahere se nequeunt, quorum nervi ab ea infra locum impeditum oriuntur; possunt autem, quorum oriuntur supra eundem: denique quoniam si cerebrum proprie dictum iisdem modis impeditur, omnes muscoli, quibus caeteroquin imperare possumus, praeter respirationis spontaneae, vim se contrahendi amittunt; cerebello autem impedito, omnes etiam qui se sponte sua, id est, nullo coactu voluntatis nostrae movent. Quamquam quia vis illa arterias musculorum similiter impediendo, pari quoque modo tollitur, redditurque expediendo eas, arteriis illa aequae ac nervis suppeditari videatur. Sed saepe mecum cogitavi, anne illud, quod arteriis suppeditatur, non tam vi sua efficiat, ut fibrae se contrahant, quam quod aptas eas reddat, ut cieri vi nervorum possint; sive anne magis sit causa sine qua contractio non fit, quam quae eam ipsa efficiat, eoque tantum nomine tam necessario requiratur: quemadmodum visio fieri non potest, si aut cornea, aut lens crystallina opaca sit; & nemo tamen, qui aliquid in his intelligit, nisi cum retinam imagines rerum pulsant, res illas videre nos putat. Etsi autem aequae videri possit arteriarum officium esse, quam nervorum, efficere ut fibrae musculorum se contrahant, potius tamen nervorum esse, vel ex eo, ut reliqua, quae afferri possent, mittam, satis manifestum esse videtur, quod plerisque musculis ita imperemus, ut ad nutum nostrum contrahant se, relaxentque. Nam quoniam nemini, qui ad haec attendit, dubium esse potest, quin animi sedes imprimis in cerebro sit; & quoniam  
nervi

nervi à cerebro , & à spinali medulla cerebri propagine , in musculos omnes ducuntur ; satis intelligitur , vim illam imperante animo à cerebro per nervos ad fibras musculorum deferri posse : quod quomodo per arterias fieret , ex iis , quae de functionibus hominis cognita habemus , non ita assequimur. Neque multum ex eo effici posse videtur , quod animale vivo inciso , cum movere se jam cessaverit , musculi pedis aquae in arteriam cruralem impulsione se rursus contrahere visi sint : ea enim tantummodo irritantur fibrae , illo prope modo , quo aqua per venam cavam in cor languens immissa , illud excitat. Cujus autem rei gratia arterias musculis datas esse diceremus ? ejusdem , cujus reliquis corporis nostri partibus , nempe humorum ad vitam , nutritionemque sufficiendorum. Quod si quis admittere velit , is non mirabitur ad agendum ineptos eos reddi , ubi reliquis omnibus illaesis , solae arteriae eorum comprimuntur , ligantur , discinduntur : rursusque aptos , ubi eadem restituantur in integrum. His enim vita eorum , quae certe ut ad agendum apti sint , requiritur , vel multum imminueretur , vel plane extingueretur , vel redderetur. Sufficiat autem haec aestimanda proposuisse earum rerum intelligentibus. De venis non est dubium , quin humores evehant. Praeterea existimamus ex arteriis modo excerni lubricum subtilemque humorem , modo pingue membranae cellulosae : excreta recipi in venas. Itaque expulsionem veterum , & deductionem novorum , continuo renovari. Non ferret enim natura eorum , corruptioni ex sese obnoxia , ut quae semel in membranam cel-



lulosam effusa, in ea permanerent. Videmus quibque passim homines macilentissimos pinguescere magis magisque, rursusque deinde extabescere, id est, crescere pingue, & consumi, ideoque necesse esse, ut & asseratur, & evehatur, quorum illud arteriarum proprium est, hoc venarum. Ad quod confirmandum illud accedit, quod arteriae & venae non modo per membranulas illas cellulosas decurrunt, sed multae etiam minimae, in iis evanescent. Quia & si paullo fortius, cum artificiose tum arterias tum venas macilenti muscoli replemus, impellimus materiem, qua eas implemus, in spatiola à pingui ceteroque occupata effundi eam videmus: ubi tamen dubium est, utrum ex naturalibus viis effluat, an novas sibi parat. Haec sunt, quae ad rem nostram de usu partium musculi pertinere videbantur: non enim historiam physiologicam scribere suscepimus, sed anatomicam.

## C A P U T I V.

*Quibus partibus corporis nostri, & quomodo se iis Musculi affigant.*

**Q**uoniam musculi omnes, praeter unum Sphincterem ani internum, se partibus quibusdam affigunt, eaque res ad constructionem eorum quodammodo pertinere videtur, hic de ea communiter docebimus. Affigunt se vel ossi, vel tendini, vel carni cuidam, vel parti aliae molliori. Quatuor autem sunt modi, quibus affigunt: primus est, cum se ossi affigunt, aut cartilagini: secundus, cum iisdem, sed

sed interventu periosteï ; aut perichondrii : tertius , cum membranae , aut tendini : quartus , cum carni cuidam , aut parti molliori . Primum enim multi ad ipsa ossa pertingunt , iisque se quasi inserunt , fibras partim ad ea adnectentes , partim in ea insigentes ; eaque insertio tenacissima est , & fere tantummodo propria tendinum robustorum , ut Gluteorum , Deltoïdum , Pectoralium , Flexorum digitorum : nisi quis malit dicere , cum periosteo eos ita in unum conjungi , & hoc cum osse , ut os ipsum attingere videantur . Sic & quidam se cartilaginibus in valentibus & annosis inserunt , sed minus pertinaciter . Qui sine tendineo exiliore & imbecilliore , aut tendinoso , aut quasi toto carneo ad ossa vel cartilagine adhaerere videntur ; fere soli se periosteo aut perichondrio innectunt , eoque tam pertinax non est cohaerentia . Hi tamen , quia proprie ad membranas illas non pertinent , sed ad ipsa ossa , cartilagineve , his adnexi esse dicuntur , & revera sunt , verum connectente periosteo , vel perichondrio : quibus etiam se implicare dici possent , & cum illis ad ossa , cartilagineve pertinere . Membranis tendineo sine se implicant , extenuatique fibras suas ipsis immiscunt , ad postremum continuant ; ut scleroticæ Recti oculi . Eodem prope modo Lumbricales ab initio continuati tendinibus , à quibus abscedunt . Carneis partibus , ut linguae , carneas fibras immiscunt magis magisque , donec in iis quasi evanescant . Sic & alii in partibus mollibus paulatim evanescunt ; ut Azygus in uvula . Ad postremos modos duos referri possunt illi , quibus qui alii aliis inseri

feri improprie dicuntur, inter se coeunt, seseque continuant: ad tertium, quo Obliqui externi abdominis; ad quartum, quo Mylohyoidei in junioribus.

## C A P U T V.

*De distinctione Musculorum.*

**P**roximum est, ut agamus de distinctione musculorum. Multi à vicinis omni ex parte distincti sunt, alii autem non. Omni ex parte distinctos dicimus, qui nec fibris carneis, neque tendineis ullibi cohaerent cum aliis, quamquam membrana cellulosa conjuncti sint. Qui vero aliqua parte cohaerent, etsi revera prorsus distincti non sint, à nobis tamen, quo melius tradi, accipique possint, distinguuntur. Qua de re cum parum conveniat inter optimos Anatomicos, alii-que aliter atque alii dividant, necesse est, ut nobismetipsis quemadmodum distinguendum sit, praescribamus. Quoniam vero partitiones illas musculorum facimus, ut ad cognitionem eorum faciliore & commodiore via perveniamus; sequitur, ad facilitatem illam totam earum rationem accommodandam esse. Pro-ut igitur haec postulat, carnem quandam musculosam vel in plures uno dividemus certo modo cohaerentes, vel unum esse dicemus partes habentem diversas. Ut enim difficile, nimis multis ex partibus constantem intelligere, ita supervacua, molestaque est minuta illa praeter necessitatem partitio, cum re ipsa nihil interfit, utrum unum quendam multas dicamus habere partes, an ex unius illius partibus multos faciamus, inter



inter se tamen connexos. Quocirca multi qui musc-  
 lorum inventionem sibi magnopere placent, nihil prae-  
 ter verborum novitatem inferunt, quam quia magis  
 quam par est, auget musculorum numerum, eoque  
 doctrinam impedit, laudare non possumus: multi con-  
 tra, quod satis non distinguant, historiam tradunt  
 implicatam. Oportet autem, si partes vel nimis mul-  
 tae, vel admodum variae & diversae cohaereant inter  
 se, vel solummodo parva parte cohaereant, plures  
 uno ex iis efficere: si paucae, simplicissime, aut si  
 quae magnam partem conjunctae sint, tantummodo  
 unum; quamquam etiam judicio quodam ad bene di-  
 stinguendum opus sit. Has secuti regulas, Complexum  
 veterum in tres distinximus, Biventrem cervicis, Tra-  
 chelomastoideum, Complexum: similiterque Tricipi-  
 tem femoris in Adductores tres, longum, brevem,  
 magnum. At contra tantummodo tres ex septem hisce  
 fecimus, Pterygopharyngeo, Mylopharyngeo, Glos-  
 sopharyngeo, Chondropharyngeo, Ceratopharyngeo,  
 Thyreopharyngeo, Cricopharyngeo, in quos pharyn-  
 gis constrictores divisere recentiores Anatomici: ex  
 Pterygopharyngeo, Mylopharyngeo, Glossopharyngeo,  
 Constrictorem superiorem; ex Chondropharyngeo &  
 Ceratopharyngeo, medium; ex Thyreopharyngeo &  
 Cricopharyngeo, inferiorem. Sed his exemplis pro-  
 positis, nolumus in hac re commorari diutius, quae ex  
 tertio libro facile cognoscetur. Necessae autem erit se-  
 quenti capite musculos hominis omnes summam re-  
 censere.

*Quot homo Musculos habeat , & quos.*

**V**ir foeminaque eosdem musculos habent , exceptis paucis quibusdam ad genitalia pertinentibus. Eorum plerique gemini sunt , pauci singulares & unigenae. Singulares omnes communes sunt , in geminis discrepantia. Omnium numerus haud facile iniri potest , quoniam non idem omnibus hominibus. Quare sibi per se quisque , cui volupe , summam , ut faciundum putabit , colligat. Communes gemini sunt ,

<i>Abductores breves pollicum manuum.</i>	<i>Antitragici.</i>
<i>Abductores digitorum auricularium.</i>	<i>Arytaenoides obliqui.</i>
<i>Abductores digitorum minimorum pedum.</i>	<i>Attolentes auricularum.</i>
<i>Abductores indicum.</i>	<i>Basiloglossi.</i>
<i>Abductores longi pollicum manuum.</i>	<i>Bicipites brachiorum.</i>
<i>Abductores pollicum pedum.</i>	<i>Bicipites crurum.</i>
<i>Adductores breves femorum.</i>	<i>Biventre cervicis.</i>
<i>Adductores longi femorum.</i>	<i>Biventre maxillae.</i>
<i>Adductores magni femorum.</i>	<i>Brachiales interni.</i>
<i>Adductores ossium metacarpi digitorum auricularium.</i>	<i>Buccinatores.</i>
<i>Adductores pollicum manuum.</i>	<i>Ceratoglossi.</i>
<i>Adductores pollicum pedum.</i>	<i>Cervicales descendentes.</i>
<i>Anconei.</i>	<i>Chondroglossi.</i>
<i>Anteriores auricularum.</i>	<i>Circumflexi palati molli.</i>
	<i>Cleidomastoidei.</i>
	<i>Coccygei.</i>
	<i>Complexi.</i>
	<i>Compressores narium.</i>
	<i>Constrictores inferiores pha-</i>
	<i>ryu-</i>

ryngis.  
 Constrictores isthmi faucium.  
 Constrictores medii pharyngis.  
 Constrictores superiores pharyngis.  
 Coracobrachiales.  
 Coracohyoidei.  
 Corrugatores superciliarum.  
 Cricoarytaenoidei laterales.  
 Cricoarytaenoidei postici.  
 Cricothyreoidei.  
 Crurales.  
 Cucullares.  
 Curvatores coccygis.  
 Deltoides.  
 Depressores alarum nasi.  
 Depressores angulorum oris.  
 Depressores labii inferioris.  
 Extensores breves digitorum pedum.  
 Extensores communes digitorum manuum.  
 Extensores longi digitorum pedum.  
 Extensores majores pollicum manuum.  
 Extensores minores pollicum manuum.  
 Extensores proprii digitorum auricularium.

Extensores proprii pollicum pedum.  
 Externi malleorum.  
 Flexores breves digitorum minorum pedum.  
 Flexores breves digitorum pedum.  
 Flexores breves pollicum manuum.  
 Flexores breves pollicum pedum.  
 Flexores longi digitorum pedum.  
 Flexores longi pollicum manuum.  
 Flexores longi pollicum pedum.  
 Flexores parvi digitorum auricularium.  
 Gemelli.  
 Gemini inferiores.  
 Gemini superiores.  
 Genioglossi.  
 Geniophyoidei.  
 Glutei magni.  
 Glutei medii.  
 Glutei minores.  
 Graciles.  
 Hyothhyreoidei.  
 Iliaci interni.  
 Indicatores.

*Infraspinati.*

*Intercostales externi primi, secundi, tertii, quarti, quinti, sexti, septimi, octavi, noni, decimi, undecimi.*

*Intercostales interni primi, secundi, tertii, quarti, quinti, sexti, septimi, octavi, noni, decimi, undecimi.*

*Interossei posteriores indicum, digitorum mediorum, annularium.*

*Interossei primi pedum digitorum minorum primorum, secundorum, tertiorum, quattorum.*

*Interossei priores indicum, digitorum mediorum, annularium, auricularium.*

*Interossei secundi pedum digitorum minorum primorum, secundorum, tertiorum.*

*Interspinales colli vertebrae primae & secundae, secundae & tertiae, tertiae & quartae, quartae & quintae, quintae & sextae.*

*Interspinales dorsi aliquot inferiorum vertebrarum.*

*Interspinales lumborum.*

*Intertransversarii dorsi aliquot.*

*Intertransversarii lumborum vertebrae primae & secundae, secundae & tertiae, tertiae & quartae, quartae & quintae, quintae & primae dorsi.*

*Intertransversarii posteriores colli vertebrae primae & secundae, secundae & tertiae, tertiae & quartae, quartae & quintae, quintae & sextae, sextae & septimae.*

*Intertransversarii priores colli vertebrae primae & secundae, secundae & tertiae, tertiae & quartae, quartae & quintae, quintae & sextae, sextae & septimae.*

*Latissimi colli.*

*Latissimi dorsi.*

*Laxatores tympanorum.*

*Levatores angulorum oris.*

*Levatores ani.*

*Levatores breviores costarum primarum, secundarum, tertiarum, quartarum, quinta-*

*tarum, sextarum, septimarum, octavarum, nonarum, decimarum, undecimarum, duodecimarum.*

*Levatores labii superioris.*

*Levatores labii superioris alarumque nasi.*

*Levatores longiores costarum aliquot inferiorum.*

*Levatores menti.*

*Levatores palati molliis.*

*Levatores palpebrarum superiorum.*

*Levatores scapularum.*

*Linguales.*

*Longi colli.*

*Longissimi dorsi.*

*Lumbricales indicum, digitorum mediorum, annularium, auricularium.*

*Lumbricales pedum digitorum minorum primorum, secundorum, tertiorum, quartorum.*

*Majores helicum.*

*Masseteres.*

*Minores helicum.*

*Multifidi spinæ.*

*Mylohyoidei.*

*Nasales labii superioris.*

*Obliqui externi abdominis.*

*Obliqui inferiores capitis.*

*Obliqui inferiores oculorum.*

*Obliqui interni abdominis.*

*Obliqui superiores capitis.*

*Obliqui superiores oculorum.*

*Obturatores externi.*

*Obturatores interni.*

*Opponentes pollicum manuum.*

*Orbiculares palpebrarum.*

*Palatopharyngei.*

*Palmares breves.*

*Palmares longi.*

*Pectinei.*

*Pectorales.*

*Peronei breves.*

*Peronei longi.*

*Peronei tertii.*

*Plantares.*

*Poplitei.*

*Profundi.*

*Pronatores quadrati.*

*Pronatores teretes.*

*Psoæ magni.*

*Psoæ parvi.*

*Pterygoidei externi.*

*Pterygoidei interni.*

*Pyramidales.*

*Pyrisiformes.*

*Quadrati femorum.*

D 3

Qua-

*Quadrati lumborum.*  
*Radiales externi breviores.*  
*Radiales externi longiores.*  
*Radiales interni.*  
*Recti abdominis.*  
*Recti abductores oculorum.*  
*Recti adductores oculorum.*  
*Recti attollentes oculorum.*  
*Recti crurum.*  
*Recti depressores oculorum.*  
*Recti interni majores capitis.*  
*Recti interni minores capitis.*  
*Recti laterales capitis.*  
*Recti postici majores capitis.*  
*Recti postici minores capitis.*  
*Retrahentes auricularum superiores, medii, inferiores.*  
*Rhomboidei majores.*  
*Rhomboidei minores.*  
*Sacro-lumbales.*  
*Salpingopharyngei.*  
*Sartorii.*  
*Scaleni laterales.*  
*Scaleni medii.*  
*Scaleni minimi.*  
*Scaleni postici.*  
*Scaleni priores.*  
*Semimembranosi.*  
*Semispinales dorso.*

*Semitendinosi.*  
*Serrati antici.*  
*Serrati magni.*  
*Serrati postici inferiores.*  
*Serrati postici superiores.*  
*Solei.*  
*Spinales cervicis.*  
*Spinales dorso.*  
*Splenii capitis.*  
*Splenii colli.*  
*Stapedii.*  
*Sternohyoidei.*  
*Sternomastoidei.*  
*Sternothyreoidei.*  
*Styloglossi.*  
*Stylohyoidei.*  
*Stylohyoidei alteri.*  
*Stylopharyngei.*  
*Subclavii.*  
*Sublimes.*  
*Subscapulares.*  
*Supinatores breves.*  
*Supinatores longi.*  
*Supraspinati.*  
*Temporales.*  
*Tensores tympanorum.*  
*Tensores vaginarum femoris.*  
*Teretes majores.*  
*Teretes minores.*  
*Thyreoparytaenoides.*

<i>Tibiales antici.</i>	<i>Transversi perinaei alteri.</i>
<i>Tibiales postici.</i>	<i>Triangulares sterni.</i>
<i>Trachelomastoides.</i>	<i>Tricipites brachiorum.</i>
<i>Tragici.</i>	<i>Vassi externi.</i>
<i>Transversales cervicis.</i>	<i>Vassi interni.</i>
<i>Transversi abdominis.</i>	<i>Ulnares externi.</i>
<i>Transversi auricularum.</i>	<i>Ulnares interni.</i>
<i>Transversi pedum.</i>	<i>Zygomatici majores.</i>
<i>Transversi perinaei.</i>	<i>Zygomatici minores.</i>
Singulares sunt,	
<i>Arytaenoides transversus.</i>	<i>Orbicularis oris.</i>
<i>Azygus uvulae.</i>	<i>Sphincter ani externus.</i>
<i>Diaphragma.</i>	<i>Sphincter ani internus.</i>
<i>Epitraneus.</i>	
Viri proprii gemini sunt,	
<i>Acceleratores.</i>	<i>Cremasteres.</i>
<i>Compressores prostatae.</i>	<i>Erectores penis.</i>
Foeminae proprii gemini,	
<i>Constrictores cunni.</i>	<i>Erectores clitoridis.</i>

In hunc vero numerum retulimus non modo eos, qui in omni homine reperiuntur, sed etiam eos, qui quibusdam, eosque qui multis desunt, ut Arytaenoides obliquos, Chondroglossos, Curvatores coccygis, Flexores parvos digitorum auricularum, Psoas parvos, Retrahentes inferiores auricularum, Scalenos laterales, Scalenos minimos, Stylohyoideos alteros, Zygomaticos minores, Transversos perinaei: eosque qui quandoque cum aliis prorsus conjuncti, ut Biventre cervicis, Peroneos tertios, Scalenos laterales, Splenius colli. Omisimus rariora naturae ludentis exempla. Si quis

## 12 HISTORIAE MUSCULORUM

quis autem miretur, quid causae sit, cur neque Cor, neque Sphincterem vesicae, similesque partes aut carneas, aut ex fibris compositas, inter eos aliorum ad exemplum numeraverimus: is sciat, Cor à nobis ob singularem & à musculis tantopere discrepantem figuram, & conformationem, non musculum, sed partem musculosam dici; Sphincterem vero vesicae, aliosque ejus generis è fibris constantes contextus, quia partim in musculos proprie collecti non sunt, partim ex fibris albicantibus, non autem carneis constant; in musculorum numero non videri reponendos, nisi & musculosum stomachi & vesicae urinariae, & è fibris contextum ventriculi & intestinorum involucrum, aliasque plurimas fibras, quae multis partibus intextae sunt, musculos appellare, eoque verorum musculorum historiam turbare velimus. At quosdam tamen, qui aut veri muscoli sunt, aut certe ipsis quam simillimi, retinendos existimavimus; ut Attollentes auricularum, Tragicos, Antitragicos, aliosque similes.

### C A P U T V I I.

#### *De nominibus Musculorum.*

**N**unc erit congruens expedire rationem nominum, quibus musculos designavimus. In his Anatomicos, qui ante nos scripsere, fere sumus secuti. Cum vero plerique muscoli non idem nomen apud omnes habeant, illa elegimus, quae & usu inprimis recepta, & cuique maxime visa sunt convenire. Nova paucis imposuimus, nec nisi vel ipsi novi sint, vel consuetis  
sine



sine magna difficultate appellari nequeant. Aliis itaque datum nomen est ab usu, quem praestant: aliis à situ: aliis à parte in qua siti: aliis à figura: aliis ab origine & insertione, aut parte ad quam pertinent: aliis à sola origine: ab insertione sola aliis: rursusque aliis à sola parte ad quam pertinent: aliis à numero ventrium, capitum, caudarum: aliis à decursu ab una parte ad aliam: aliis à quadam magnitudinis ratione: aliis à singulari quadam proprietate: uni ex eo quod singularis sit.

Jam ab usu dicti sunt *Abductores*, *Acceleratores*, *Adductores*, *Attollentes*, *Compressores*, *Constrictores*, *Corrugatores*, *Curvatores*, *Depressores*, *Erectores*, *Extensores*, *Flexores*, *Indicatores*, *Laxatores*, *Levatores*, *Masseteres*, id est, mandentes, *Opponentes*, *Pronatores*, *Retrahentes*, *Sphincteres*, id est, constringentes, *Supinatores*, *Tensores*. Huc referimus, quos ab usu quodam appellaverunt, quanquam eum praecipue non praestent, *Cremasteres*, id est, suspensum tenentes: *Diaphragma*, quod discernat: *Sartorios*, quod iis sartores utantur.

A situ dicuntur, *Anteriores*, *Externi*, *Profundi*, *Subtines*.

A parte in qua siti sunt, *Anconei*, id est, in cubito siti, *Antitragici*, *Brachiales*, *Buccinatores*, *Cervicales*, *Crurales*, *Epicranii*, quod super cranium est, *Glutei*, id est, in natibus, *Iliaci*, *Infraspinati*, *Intercostales*, *Interossei*, *Interspinales*, *Intertransversarii*, *Linguales*, *Pectinei*, *Pectorales*, *Poplitei*, *Psoae*, quod in lumbis siti, *Radiales*, *Subclavii*, *Subscapulares*, *Supraspinati*, *Temporales*, *Tragici*, *Ulnares*.

E

A

A figura appellantur, *Cucullares*, *Deltoides*, id est,  $\Delta$  similes, *Lunbricales*, *Orbiculares*, *Pyramidales*, *Pyri-formes*, *Quadrati*, *Rhomboidei*, *Scaleni*, *Serrati*, *Solei*, *Splenii*, *Teretes*, *Triangulares*.

Ab origine & insertione, quae fere graeca compo-sita sunt, *Arytaenoidei*, *Basioglossi*, *Ceratoglossi*, *Chon-droglossi*, *Cleidhnaστοίδει*, *Coracobrachiales*, *Coracohyoidei*, *Cricoarytaenoidei*, *Cricothyreoidei*, *Genioglossi*, *Geniohyoi-dei*, *Hyothyreoidei*, *Mylohyoidei*, *Sternohyoidei*, *Sternomastοίδει*, *Sternothyreoidei*, *Styloglossi*, *Stylohyoidei*, *Thy-reoarytaenoidei*, *Trachelomastοίδει*.

Ab origine & parte ad quam pertinent, *Palatopharyngei*, *Salpingopharyngei*, *Stylopharyngei*.

Ab origine sola dicuntur, *Nasales*, *Peronei*, *Pterygoidei*, *Sacrocolumnales*, *Tibiales*, *Zygomatici*.

A sola insertione, *Semispinales*, *Spinales*, *Transversales*.

A parte ad quam pertinent, *Coccygei*, *Palmares*, *Plantares*, *Stapedii*.

A numero ventrium, capitum, caudarum, *Bicipites*, *Biventre*s, *Multifidi*, *Tricipites*.

A decursu ab una parte ad aliam, *Circumflexi*, *Obliqui*, *Recti*, *Transversi*.

A quadam magnitudinis ratione, *Graciles*, *Latissimi*, *Longi*, *Longissimi*, *Majores*, *Minores*, *Vasti*.

A singulari quadam proprietate, *Complexi*, à structura implicata: *Gemelli*, quod ventres duos similes inter se habeant: *Gemini*, quod geminorum instat similes sint inter se: *Obturatores*, quod coxarum foramina obturent: *Semimembranosi*, quod dimidia parte sui mem-

membrana sint: *Semitendinosi*, quod dimidia parte tendo.

Ex eo quod singularis est, *Azygos* dictus.

Nonnulli unum idemque nomen habent, & distinguuntur cognominibus, sumtis à situ, magnitudine, figura, decursu, numero, usu. Unde à situ vocantur, *Antici*, *Externi*, *Inferiores*, *Interni*, *Laterales*, *Medii*, *Posteriores*, *Postici*, *Priores*. A magnitudine, *Breves*, *Breviores*, *Longi*, *Longiores*, *Magni*, *Majores*, *Medii*, *Minimi*, *Minores*, *Parvi*. A figura, *Quadrati*, *Terebrantes*. A decursu, *Descendentes*, *Obliqui*, *Transversi*. A numero, *Alteri*, *Primi*, *Secundi*, *Tertii*, *Quarti*, *Quinti*, *Sexti*, *Septimi*, *Octavi*, *Noni*, *Decimi*, *Undecimi*. Ab usu, *Abductores*, *Adductores*, *Attollentes*, *Depressores*. Aut distinguuntur adjectione partis, ad quam pertinent; ut *Rectus abdominis*, *capitis*, *cruuris*: vel partis, in qua siti; ut *Biceps brachii*, *Biventer cervicis*, *Latissimus colli*, *Latissimus dorsi*. Aut & dicuntur *Proprii* partis alicujus, vel *Communes* pluribus.

Hic vero non miremur esse quemquam, qui multa ex his nominibus reprehendat: nos enim ipsi alia quidem eorum probamus, alia non data vellemus. Probamus illa quae conveniunt naturae musculorum, quibus imposita sunt, quaeque simul non habent multum difficultatis: reliqua omnia justam reprehensionem effugere nequeunt. Nam cum nomina sint breves rerum notae, quibus res illae significantur, utile est, ut quam maxime ex ipsa natura rerum, quibus tribuntur, petantur, & quasi fluant, subjectamque sibi habeant ipsius rei notionem, ut qui nomen audiat, bonam simul naturae rei partem assequatur. Eamque

ad legem nomina musculorum formare non modo utile est, sed omnino necessarium, tum quia tam magno numero sunt, multique eorum satis similes inter se, tum quia res sunt, quae non collocatae in usu quotidiano. Sed tamen necesse est, ut dilucida sint, & facilia, ne labore opus sit ad ea intelligenda retinendaque, utque iisdem sine magna difficultate uti possimus. Expungenda igitur quae sine bona ratione data, quae difficilia intellectu, quae nimis longa, & quae quovis modo impedimentum asferre possunt: remorantur enim tyrones, & ab Anatomes studio deterrent, atque ipsis, etiam provectioribus, antequam usu & exercitatione se confirmaverint, molestiam exhibent. Quare si quid hac in re valeremus, musculi nomina, & ea quoad fieri posset facilia, ex praecipuis, maximeque obviis proprietatibus suis invenirent, ut cuique maxime conveniens esset. Et praecipue quidem ex actione, quia propter eam natura ipsos praesertim fabricata est, eandemque prae caeteris cognitam habere studemus: unde tam commode utimur appellationibus *Extensorum*, *Flexorum*, *Attollentium*, *Deprimentium*, *Pronatorum*, *Supinatorum*, *Corrugatorum*, *Constrictorum*, similibusque, addita parte ad quam pertinent. Nec obstat, quod multi eorum non unam, sed plures partes, & diversimode quidem moveant: appellantur enim ab illa actione, quam praesertim, & communiter exercent, illiusque partis esse dicuntur, cujus maxime proprii sunt; quemadmodum ex eo quod extendat digitos, nomen commodissimum *Extensor* digitorum manus traxit, etsi carpum quoque flectere videri posset: neque enim

enim requiritur ut nomen omnem rei naturam exprimat; sed ut nota sit, cum ratione data, quae praecipuam in genere significet. Bona itidem sunt, quae dat figura, aut magnitudo, si quae sit singularis, quia haec fere ut visa, animis se nostris imprimunt; ut *Deltoidis*, *Cucullaris*, *Quadrati*, *Serrati*, *Orbicularis*, *Latissimi*, *Longissimi*, *Vasti*. Ob eandem causam ferri quoque possunt, quae notabilem quandam proprietatem indicant; qualia sunt *Biventris*, *Bicipitis*, *Semitendinosi*, *Diaphragmatis*: itemque quae decursum, ut *Recti*, *Obliqui*, *Transversi*. Possunt & à parte ad quam pertinent, appellari, ut *Stapedius*, *Coccygeus*, *Palmaris*. Nec multum habent difficultatis quae à situ ducta, ut *Anterioris*, *Sublimis*, *Profundi*: aut à parte in qua siti, ut *Pectoralis*, *Subscapularis*, *Iliaci*, *Brachialis*, *Interspinalis*: nisi quod dubium de his aliquando esse possit, utrum situm significant, an partem ad quam pertineant; ut de *Brachiali*, *Latissimo dorsi*, *Radiali*, *Ulnari*. Et licet Iliacus ossi ilium non totus incumbat, quia tamen maximam partem, *Iliacus* bene vocatur, ut paullo ante dictum est de iis, qui ab actione nominati: quod & ad similes reliquos pertinet. Ab origine & insertionem, parteve ad quam pertinent, raro nomina duceremus, nec fere, nisi nequiremus aliunde commodius. Non enim certe tam facilem, ac credi posset, semper habent rationem. Fatemur, quod cum exprimant partem, unde oriatur musculus, eamque ad quam desinat, tacite simul decursum, situm, actionem indicent illi, cui partes illae non sint incognitae; coque plures principes proprietates simul exhibeant:

& tamen non dubitamus asserere, quod pleraque bona esse nequeant, quia difficilia. Primum enim fere graeca esse debent, quoniam hic sermo facilior ad duplicanda verba. Graeca autem, tametsi facillima illis, à quibus intelliguntur, ob hoc tamen plerisque, & maxime tyronibus obscura, quod haec lingua non ita in usu est apud omnes; quo fit; ut à paucis facile capiantur. Deinde fere longiora sunt, quia composita; eaque de causa ab illis etiam, quibus intellectu facilia, cum labore adhibentur. Quare cum illos, qui pharyngem constringunt, in pauciores, ut res ipsa poscebat, redegerim, nominaque danda eis fuerint, periclitari ausus sum, si quid gratiae apud Anatomes Cultores, Scrutatoresque functionum hominis consequi possem, appellando musculos illos *Constrictores*. Quanquam tamen illius generis duplicata nomina haud ita mala sint, ubi graeca, è quibus composita, usitata sunt ac trita; ut musculorum laryngis, ossis hyoïdis, atque etiam ipsius pharyngis, similiumque: immo haec & elegantiae multum habeant, & praeter solam longitudinem, etiam facilitatis. Sed fortasse praestaret, tales, sicubi aliter fieri nequeat, à sola origine denominare, adjecta parte cuius sint, ut quosdam maxillae inferioris *Pterygoideos* nuncupamus: haec certe nomina sua se simplicitate, & brevitate magis commendant. Caeterum idem pluribus nomen raro imposeremus, aut si id necesse esset, aptis eos, & fere ex iisdem, à quibus nomina ducenda diximus, pro re nata delectis cognominibus distingueremus. Nihil vero magis vitandum, quam ne nomina à male intel-

tellectis proprietatibus imponantur ; quemadmodum *Interosseos* vocavere , etiam inter ossa non sitos ; *Plantares* , ad plantas tamen non pertinentes ; *Coracohyoides* a processibus coracoideis , ut putarunt , & ut nomen vult , non oriundos. Quae cum ita sint , quidni igitur repurgamus nomina , & si licuit aliis nova inferre , cur non liceret nobis , praesertim cum ratione , & quadam commodi spe novaturis ? Sed veremur , ne quantum forsitan apud tyrones , & qui integri ad haec accederent , gratiae inituri essemus , tantum incurteremus in odium & offensionem eorum , qui usitata adhibere jam assueverunt. Praeterquam quod nolimus novandum esse , nisi illud necessitas flagitet , quo facilius Scriptores , qui utuntur nominibus receptis , intelligantur : ob quam rem quaedam vix tolerabilia retinere maluimus , quam inaudita , etiamsi fortasse meliora futura , eorum loco inducere.

C A P U T VIII.

*De diversitate Musculorum.*

**H**is expositis , sequitur , ut musculos paullo propius consideremus , & summatim indicemus diversitatem eorum. Quamquam hoc supervacuum videri possit , quoniam ex singulorum historia , cui tertium librum tribuimus , satis superque intelligi possit. Quocirca nihil hic dicemus de magnitudine eorum , de carnea tendineaque parte , similibusque , quibus tantopere differunt inter se. Sed tamen necessario faciendum est , ut de illis dissimilitudinibus agamus , quarum

rum cognitio ad intelligendam rationem actionis eorum omnino requiritur. Cumque duo musculorum genera sint, unum eorum, quibus Sphincterum nomen; alterum oblongorum, id est, distincta extrema habentium, de hoc primo docebimus. Ejus generis alii simplices sunt, alii compositi. Simples dicimus, quibus utrumque extremum simplex est, ut Brachiali interno, Supinatori longo, Sternomastoideo. Compositos, quibus vel alterutrum manifeste distinctum in duo, plurave, ut Bicipiti cruris, Serrato magno, Extensori digitorum manus; vel utrumque, ut Spinali colli, Semispinali dorsi, Multifido spinæ: hi enim tanquam ex pluribus uno constant, eorumque singulae portiones, in quas distincti, pro simplicibus haberi possunt, in communem ipsis partem quandam conjunctis. Haec prima oblongorum differentia.

Alteram ponimus in numero partium, ad quas extremis suis pertinent. Alii enim uni ab utraque parte parti affixi, ut Sternomastoideus: alii uni ab altera, ab altera pluribus, ut Serratus magnus, & Pectoralis: alii ab utraque pluribus una, ut Spinalis colli, Obliqui abdominis: alii ab altera diversis ejusdem partis partibus, ut Biceps brachii diversis scapulae partibus.

Sequitur diversitas, quae est ex certa amplitudine extremorum, qua sic differunt, ut alii utrimque satis angusti sint, alii lati, alii ex angustis latefiant, aut se ex latis contrahant in angustum: quorum exempla praebere possunt, Rhomboideus minor, qui utrimque angustus; Rhomboideus major, utrimque latus; Constrictor medius pharyngis, latefciens; Latissimus dorsi, sen-



senfim angustior. Aliqui cum primum angustiores facti, rursus deinde lateſcunt, ut Biventer cervicis, Palmaris longus.

Magna & in decursu, id est, modo quo se ab una parte porrigunt ad aliam, diversitas, quae ad haec genera referri potest, quod alii recti incedant, alii se inflectant, alii qui extensis membris recti sunt, flexis iisdem, ipsi quoque inflectantur. In rectorum numero sunt Masseter, Pterygoidei, Geniohyoideus, Subclavius, Obliqui capitis. Qui se inflectunt, differunt, quod alii in ipso flexu retineantur, vel ab aponeurosi quam ipsi dant, ut Biventreſ maxillae inferioris, vel à membrana quadam, cui adhaerent, ut Coracohyoidei: alii flectant se circum partes quasdam. Atque hi qui se circum partes quasdam flectunt, rursus differunt inter se, eo quod alii membranam, è qua cavum vel canalis quidam est, ambiant, complectanturque, ut Obliqui & Transversi abdominis, Buccinatores, Constrictores pharyngis, Acceleratores, Levatores ani: alii se flectant circum ossa, alii se parte quadam sui ad os inflectant, vel ad cartilaginem, vel ad ligamentum, vel ad ligamenti similem membranam, vel ad aliam quandam partem durioſam, vel ad musculum alium: sic Serratus magnus se circum costas flectit; tendo Tibialis postici se ad malleolum internum inflectit, Obliqui superioris oculi ad cartilaginem ossi frontis alligatam, Tibialis antici ad ligamentum quod in priori parte confinii cruris pedisque extremi, Tensoris tympani ad aponeurosem qua obductus semicanalis osseus, in quo hic musculus maiore parte sui continetur; Levator pal-

F                      pebrae

pebrae superioris ad globum oculi, Stylopharyngeus ad Constrictorem medium pharyngis. Adde quod multi etiam eorum, qui aliis adjacent, ab illorum tumore attollantur, & ob id ductu curvo incedant. Notandum vero, quod quae tendines se ad ossa inflectunt, ibi ne defleant ab iis, ligamenti obducta sint, quibus coërcentur, non impedita simul libera eorum mobilitate. Tercii generis sunt Flexores digitorum manus, qui manu in rectum porrecta, recti sunt: eadem introrsum curvata, tendinibus suis ad ligamentum carpi interius inflectuntur; extrorsum autem, ad radium extremum, ossaque carpi: quod simili modo fit in multis.

Videmus porro, quae alia rursus diversitatis ratio est, alios ab una parte ad proximam à priori distinctam pertinere, alios unam pluresve praeterire priusquam desinant, quosdam etiam ad eam ipsam partem, à qua incipiunt, desinere: quemadmodum ab uno osse ad alterum proximum decurrit Brachialis internus, unum os praeterit Biceps brachii, plura Sublimis flexor digitorum manus, à cartilagine auriculae Transversus ejus incipit, & ad eandem desinit.

Dici denique possunt differre inter se ratione duritiei, vel mollitudinis, itemque mobilitatis partium ad quas pertinent. Aliae enim ad quas pertinent, durae sunt, ossa scilicet aut cartilaginee duriores, ut laryngis, aut membranae durae, ut scleroticae: aliae molliores, nempe cartilaginee molliores, ut auricularum, aut tendines, aut membranae obsequiosae, ut capitum penis & clitoridis, aut partes aliae, ut lingua, palatum molle, os, pharynx. Et plerique quidem solis  
offi-

ossibus affixi, pauci solis cartilaginibus durioribus, ut Cricothyreoideus. Alii ab una parte ossi vel uno, vel pluribus: ab altera vel cartilagini duriori, ut Hyothyreoideus; Sternothyreoideus; vel molliori, ut Retrahentes auriculæ; vel membranæ duræ, ut omnes globi oculi; vel obsequiosæ, ut Erectores penis & clitoridis; vel tendini, ut Lumbricales; vel aliae parti molliori, ut omnes linguæ. Sunt qui inter cartilaginem & membranam quandam intercedant, ut Attollens auriculam: alii, qui inter cartilagine & partem mollem, ut Constrictor pharyngis inferior. Sunt qui utrimque mollibus inhaereant, ut Constrictores isthmi faucium. Quidam ab altera parte & ad duram & ad molliorem, vel ad earum plures pertinent; quorum exempla præbent, Sternothyreoidei, Pectorales, Latissimi colli, Pterygoidei externi, Stylopharyngei. Ratione mobilitatis partium, alii intercedunt inter partes quarum altera ad alterius rationem prorsus fixa est, altera mobilis, ut Levatores & Depressores labiorum, Recti oculi, Levatores ani: alii ab utraque parte adhaerent mobilibus, ut Serratus magnus, Hyothyreoideus, Cricothyreoideus, & plerique. In posteriorum numero etiam habendi sunt, qui ab utraque parte uni eidemque flexibili cartilagini affixi, ut Transversi auricularum: nam ob cartilaginum flexibilitatem, partes earum illæ, quibus hi muscoli affixi, immobiles sunt. Reperiuntur; qui parte quadam sui intercedant inter partes, quarum utraque altera alteram versus nullo modo mobilis, ut Coccygei, quorum pars ossi sacro affixa. Inflexi præterea differunt ratione mobilitatis par-

tiſ illius , quam ambiunt , vel ad quam ſe inſectunt : earum enim partium aliae durae ſunt aut renitentes , aliae molles aut cedentes , ut apparet ex ſupradictis. Haec de oblongis.

Sphincteres , praeter ani internum , non modo oſtium aliquod ambiunt , ſed etiam quibuſdam ſui portionibus adnexi ſunt partibus aliis.

Tum Sphincteres , tum aliqui ex oblongis , ut Latiffimi colli , cutem interveniente panniculo adiposo veſtiunt , & cum ea pertinaciter conglutinati ſunt : aliqui tantum ex parte , ut Sphincter ani internus , Attollens labium ſuperius , alique. Reliqui laxius connexi cum partibus quas contingunt. Nunc opportunum erit , de actione muſculorum diſſerere.

## C A P U T IX.

### *De actione Muſculorum.*

**U**na eademque omnium actio eſt contractio , qua ſe faciunt breviores , aut conantur facere , eoque aut movent partes , aut tenent , aut ſi neque movere queant , neque tenere , annituntur tamen. Quo vero movent modo , eodem tenent , aut nituntur movere , tenereve : ſed quoniam quando movent , actio apparet maniſteſtius , potius qua ratione moveant , quam qua teneant , tradere ſolemus. Cumque diverſis moveant modis , de ſingulis generibus ſingulatim hic dicendum eſt , quo melius intelligatur ratio actionum , quas eis in tertio libro adſcribemus. Cauſſa autem efficiens diſcrepantiam , eſt aut in muſculis ipsis , aut in

in partibus ad quas pertinent, quasque praetereunt, aut in musculorum quadam cum partibus vicinis conjunctione. Quae in musculis est, ad quatuor potest referri, ad figuram eorum, ad decursum, ad modum contractionis, & ad contractionis intensiorem, viriumque, quas adhibent, magnitudinem. Quae in partibus ad quas pertinent, quasve praetereunt, ad tres, ad duritiem vel mollitudinem earum, ad stabilitatem vel mobilitatem, & ad situm. Ad duas quae in conjunctione musculorum cum partibus vicinis, ad laxam, & ad strictiorem.

Per figuram intelligimus solummodo illam, qua in genere maxime differunt, & vel rotundi sunt, vel oblongi. Rotundi, id est Sphincteres, se contrahunt per ambitum suum, constringuntque quae ambiunt ostia. Oblongi extrema sua propius ad se invicem adducunt, ac sic trahunt partes illas, quibus extrema illa affixa sunt.

Per decursum intelligimus modum, quo musculi oblongi se ab una parte porrigunt ad aliam, & is vel rectus est, vel inflexus, ut superiori capite annotavimus. Recti partes recte trahunt ad se mutuo. Inflexi non modo trahunt partes, sed se etiam, ni quid obsteret, reddunt rectiores, donec prorsus recti sint. Premunt itaque partem illam, circum quam se inflectunt, & si pars illa mollis mobilisve sit, ut cedere illis possit, reprimunt eam, moventque, maxime si partes illae, quibus extremis suis affixi sunt, stabiliores sint; contra si eadem mobiliore: sic cava quae è membrana facta sunt, canalesque, arctantur ab iis muscu-

lis , à quibus ambiuntur. Qui vero se flectunt circum partem resistentem , ab ea , qua se flectunt , sustinentur , eaque de causa partes illas , inter quas intercedunt , ad sustentaculum illud attrahunt quamdiu illud sustinet , haud aliter atque in fune , per anulum aut circum trochleae rotulam ducto videre est : qua de causa oculi Obliquus superior globum trahit ad anulum , per quem tendinem suum trajicit , non autem ad locum unde principio suo procedit. Ex his praeterea perspicuum est , qua ratione illi agant , qui à membranaceis nexibus in ipso flexu suo retinentur : fiunt enim rectiores , quantum sinunt retinacula illa , partesque , quibus affixi , trahunt eum locum versus , ubi retinentur , si retineantur ne recti fiant. Si vero partes ad quas retinentur , mobiliores sint , eas , dum rectiores ipsi fiunt , attrahunt.

Quem vocavimus modum contractionis , is triplex esse potest : primus , cum se totus musculus aequabiliter contrahit : secundus , cum se tantum parte quadam : tertius , cum inaequaliter partibus diversis. Cum se totus aequabiliter contrahit , partes inter quas intercedit , aequabiliter ad se mutuo attrahit. Cum tantum parte quadam , tum pars illa agit tanquam musculus singularis , & partes tantum illas trahit ad se mutuo , inter quas intercedit. Sic & cum inaequaliter partibus diversis , singulae illae partes agunt tanquam tot distincti muscoli. His tamen posterioribus modis duobus tantum locus esse potest in illis musculis , qui vel ex latis admodum angusti fiant , & quidem ad finem usque , vel contra ex angustis lati , vel  
ab

ab initio ad finem usque satis lati sint : multi autem se ex latis admodum angustant , ut Pectoralis , qui & sua superiore parte attollit humerum , deprimit inferiore , media recte adducit ad pectus. Qui vero ab utraque parte angusti sunt , etsi se toti non contrahant , tamen eandem partem versus trahunt , ac si toti agerent , perexigua differentia , ut res ipsa docet. Qui in medio angustiores , ut Biventer cervicis , recte medium illud angustius versus trahunt. Et haec quidem de rectis , quae & ad inflexos certo modo pertinent. Nam si toti se aequabiliter contrahant , partem quam movent , aequabiliter trahunt ad totum sustentaculum suum , ut Obturator internus femur ad ischii finem , à quo in flexu suo sustinetur. Si modo parte quadam , aut inaequabiliter , partes illae sunt tanquam distincti muscoli , qui trahunt ad illam partem , à qua sustinentur , vel retinentur. Si vero à principio , ad finem usque satis angusti sint , ut Obliquus superior oculi , & tantum parte quadam sui agant , partem movendam aliter ad sustentaculum non adducunt , quam si omni se ex parte contraherent : sic & qui à parte sustinente ad finem usque angusti sunt , quanquam latum principium habeant , ut Obturator internus , ejusque aliqua tantum se contrahant parte : tam exigua enim differentia est , ut in censum non veniat. Manifestum autem est , illos qui partem mollem ambiunt , illam tantum ejus partem premere , quam pars eorum , quae agit , ambit.

Omnes possunt se vel laxius , vel intensius contrahere , & vires vel parvas adhibere , vel majores , majores-

joresque , pro robore quo quisque valet. Itaque magis minusve movere partes possunt , premereve , aut conari movere , premereve. Quidam autem longe quid aliud praestant , cum se fortius contrahunt , aut contrahere pergunt , quam cum debilius , aut cum incipiunt agere : sic Biceps brachii manum , si prona sit , primum vertit in supinum , dein flectit cubitum.

Dictum est de discrepantia actionis , quae consistit in ipsis musculis. Sequitur illa quae in partibus ad quas pertinent , & quas praetercunt. Duras muscoli simpliciter loco movent : mollium eodem tempore mutant figuram , ut qui ad labia pertinent , & ad linguam.

Stabiles , & prorsus vi eorum resistentes , conantur quidem loco movere , sed nequeunt : mobiles movent ad rationem mobilitatis earum. Qui igitur à fixa deducuntur ad mobilem , ut Sternohyoideus , solam movent mobilem. Qui à mobili ad mobilem , ut Arytaenoideus transversus , uno tempore movent utramque : & si utraque aequè mobilis sit , utramque aequè movent insigniter : sin altera earum stabilior sit altera , ut plerumque obtinet , illa quae mobilior , trahenti musculo facilius obsequitur , moveturque insignius quam altera , & quanto illa mobilior , tanto insignius. Quod & ad illos pertinet , qui se aut circum partem quandam flectunt , aut ad eam inflectunt , aut in ipso flexu suo retinentur. Si enim partes à quibus sustententur , retinenturve , stabiles sint , movere eas nequeunt , sed tantum mobiles quibus inserti : sin contra mobiles sint , eas etiam movent. Hoc & ad Sphincteres



Ceteros illos pertinet, qui & mollia ossa ambiunt, &  
 quadam portione sui sunt parti cuidam stabiliori affixi:  
 eam contrahunt ossa, & simul partem stabiliorem ver-  
 sus trahunt, atque hanc etiam, si satis mobilis sit,  
 dimovent. Ex quibus praeterea sequitur, quod si mute-  
 tur naturalis partium stabilitas, mobilitasve, prorsus  
 etiam immutari debeat consueta actio musculorum,  
 qui earum partium sunt. Si enim pars quaedam, vel vi  
 aliorum musculorum, vel quacunque alia, magis quam  
 quando sibi commissa est, in contrariam partem, ac  
 musculus eam trahit, firmetur, minus ad eam dimo-  
 vendam ille valet musculus; & quanto magis firma-  
 tur, eo minus. Et si pars earum, ad quas musculus  
 quidam pertinens est, ratione alterius stabilior, eodem  
 modo firmetur, ut ad rationem mobilioris plane fixa sit,  
 non movebit musculus ille stabiliorem: si sola firme-  
 tur mobilior, non hanc, sed stabiliorem movebit,  
 modo sat roboris habeat. Sic Hyothyreoideus, qui  
 & os hyoïdes & cartilaginem thyreoïdeam movere po-  
 test, firmata thyreoïdea, tantum movebit hyoïdes, hoc  
 autem firmato, thyreoïdeam. Sic Biventer maxillae,  
 eam, quia mobilior capite, deprimit: eadem autem  
 ad superiorem admota, & fulcro firmo innixa, laxif-  
 que adductoribus ejus, capiteque libero, capitis par-  
 tem eam, quae est pone articulos maxillae, depri-  
 mit, surgente eo ipso priore, atque adeo maxilla su-  
 periore ab inferiore recedente in superiora. Unde ra-  
 tio stabilitatis vel mobilitatis partium, qualis ea est,  
 quo tempore musculus agit, habenda est. Quod si  
 multae partes mobiles, & vi musculi superabiles, in-

ter principium finemque ejus continuatione quadam interjectae sint, omnes ad rationem mobilitatis earum movere potest; nihil enim obstat: sic Profundus non modo tertium ordinem digitorum, cui insertus, movere potest, sed etiam secundum, primumque; & carpum. Si vero quaedam earum quantum satis est firmentur, solas quae supersunt movebit mobiles: quemadmodum idem Profundus, firmato carpo, tantummodo movet digitos. Certa quoque partium mobilitas consideranda. Quae enim tantummodo cum mobilibus partibus connexae sunt, ut os hyoïdes; musculo ut trahit, ita fere obsequuntur; ita certe, ut permittunt partes neſtentes. Ossium & cartilagineum; quae commissuras habent, mobilitas earum commissurarum conditione definitur: aliter enim quam illae fiunt, moveri à musculis nequeunt. Ex quo Pronator teres radius convertit, quanquam eum ad principium suum, id est, ad humerum trahat. Qui eidem utrimque cartilagini adnexi, eam ad rationem flexibilitatis ejus inflectunt. Quid vero praestat Coccygeus, quae ab ischio ad ossis sacri inferiorem partem recta pertinet? haud dubie illa pars ossis sacri antea ab eo distincta, mobilisque fuit.

Ad situm partium attendendum est, quoniam plerarumque alius atque alius esse potest, atque is rationem; qua movere eas possunt muscoli, saepe multum immutat; quemadmodum Biceps brachii cum manus prona est, vertit eam in supinum, cum supina, flectit cubitum.

Superest ut dicamus de musculorum quadam cum aliis

par-

partibus conjunctione. Qui laxè conjuncti cum partibus vicinis, eas, cum agunt, nonnihil dimovent. Haec autem proprie actio eorum non dicenda: nam cum partes vicinas contingant, & debeant cum iis cohaerere, ne toti laxi sint; non potest fieri, quin eas quodammodo dimoveant. Sed qui cum cute pertinacius conjuncti, eam movent, & plerumque corrugant.

Hic, verò, notandum, quod cum multi sint compositi, id est, plura uno capita, aut extrema habeant, singula separatim tanquam distinctos musculos considerata esse: nam ex perspecta horum singulorum actione, facile erit rationem actionis totius musculi intelligere. Atque haec sunt, quae cum actio musculi alicujus quaeritur, accuratissime considerata sunt. Et cum aliqua, vel multa eorum in uno eodemque, & diversimode quidem, concurrere possint, oportet attendere, quae & qualia ex iis habeat, vel habere possit.

Juvat etiam eandem actionem in corpore mortui expendere, in eoque eam quoad fieri potest imitari, trahendo musculos modo principium eorum versus, modo finem. Est autem cavendum, ne figura eorum, aut insertio tum principii tum extremi, aut decursus, aut cohaesio multum depraventur: si enim depraventur, veram haec experimenta actionem non exhibent. Est etiam necesse, ut simul partes eo modo disponantur, quae in vivo dispositae sunt, aut disponi naturaliter queunt, eademque ipsis, quantum fieri potest, reddatur mobilitas.

Quorundam ex iis, qui statim sub tegumentis com-

munibus nostri corporis siti sunt, actio in vivis considerari potest, & plenissime, atque certissime cognosci. Interiorum omnium, quoniam profundius siti, reconditque, nullo modo potest. Plerorumque etiam exteriorum non ita perfecte, quamvis facile examinari possint: est enim difficillimum efficere, ut soli agant, & ut ne ab aliis eodem tempore agentibus turbetur actio eorum. Quid vero quisque efficere valeat, à nobis in separata cujusque historia tradetur.

Hactenus de singulorum actione egimus. Cum vero duo aliqui aut pariter, aut alter post alterum, aut alterne trahunt partem aliquam, & vi quidem aut aequali, aut inaequali, aut modo majore, modo minore, magnas actionum producant varietates. Cum plures, dici facile non potest, quam multifariam tum firment partes, tum moveant. Longe autem plures majoresque varietates, & quas multo minus assequimur, si multas partes aut eodem simul tempore, aut alias post alias, iisdem modis musculi firment, moveantve: & plures etiam, si simul vires quaedam externae concurrant, juvantes, renitentes, mutantes. Quis ergo perspicere possit, & si perspicere daretur, quis exprimeret verbis rationem, qua tot tamque diversis modis membra, aliasque multas corporis nostri partes, omnemque sceletum ad arbitrium nostrum vi musculorum movemus, firmamus, & tanquam habenis regimus, & moderamur! quae quo studiosius contemplamur, & quo cognoscimus penitus, eo magis suspicimus & admiramur.

## CAPUT X.

*Musculos omnes ad certas quasdam partes proprie pertinere ;  
& de Classibus eorum.*

**E**t si plerique muscoli ad plures una partes pertinere videantur, tantummodo tamen ad certas quasdam earum movendas nobis à natura dati sunt. Ad quod intelligendum, in oblongis spectandae partim sunt partes quibus se affigunt, partim illae, quae inter easdem partes continuatione quadam intercedunt, partim etiam illae, quae cum illis, quas proprie movent, connexae.

Ex partibus quibus se affigunt, in simplicibus altera plerumque est fundamentum musculi, in quo fixus est; altera autem, pars ab eodem movenda: unde & recte prior fixa vocatur, posterior mobilis; diciturque ab illa oriri, ab eademque ad hanc procedere, huic inferi. Non dubium autem, quin ad partem movendam, non ad fixam pertineat. Ex quo facile intelligitur, cujus partis facti causa putandi sint, qui à quodam plane firmo fundamento ad mobilem partem procedunt: certe partis mobilis. In illis autem, qui utrimque adhaerent mobilibus, pars illa quae ad alterius rationem stabilior, fundamentum musculi est. Licet enim hi movere possint utramque, & ni quid impediat, moveant; perspicuum tamen est, mobilioris gratia formatos eos esse. Quia enim non potest natura omnes à partibus plane firmis deducere, multos deducit à firmioribus, quam sunt illae, quas movere debent. Quocirca, ut hi melius suo fungantur officio,

G 3

quo

quo agunt tempore , partem stabiliorem , si nimis per se mobilis sit , ne vacillet , aut obsequatur , aliis firmamus musculis. Si vero pars per se mobilior adeo firmetur , ut stabiliore reddatur stabilior , musculo fundamenti loco est , qui tunc movet natura stabiliorem. Itaque eo tempore , facta quasi permutatione principii , decursus , finis , ad eam partem pertinere dicendus est , à qua caeteroquin oriri. Sed quoniam communiter , & cum actionem ejus nihil perturbat , movet natura mobiliorem , huic merito adjudicatur. Qui inter partes , quarum eadem est mobilitas , intercedunt , ad utramque pertinent : qui inter fixas , ad neutram earum. Quid vero de Lumbricalibus manus dicendum , qui ab altera parte tendinibus Profundi continuati , ab altera ad digitos pertinent , quosque nemo tendinum illorum movendorum causa comparatos judicabit , quanquam illi digitis possent videri mobiliores ? Certe cum Profundo , cujus proprie partes sunt , commune ipsis firmamentum cubitus est. Compositorum eadem ac simplicium ratio : multi autem eorum pluribus partibus parati sunt.

Cum vero spectamus partes mobiles , quas quidam musculi praetereunt , antequam se inferant , certum quidem est , omnes eos movere posse , si quantum ad id requiritur , contrahere se valeant : sed simul quoque certum est , non semper esse officium eorum , movere omnes. Nam praecipue movent illam , cui inserti , si intermediae alios habeant sibi proprios. Exemplo sit Sartorius , inter cujus principium finemque duo inter se commissa ossa , quae movere potest , inter-

interjecta sunt, femoris & tibiae; & potius tamen tibiam movet, ad quam definit, cum femur aliis musculis satis instructum, ejus opera non indigeat: eoque inter tibiae motores numerandus est. Neque enim hujus generis muscoli intermedias partes praetereunt, ut eas moveant: sed fere longius à parte movenda incipiunt, quia propius eam vel oriri commodè nequeunt, vel locum idoneum invenire. Itaque bene agere non solent, nisi eodem tempore à suis musculis partes intermediae retineantur, & regantur; ut in Extensore digitorum manus, itemque in Flexoribus videre est, quibus cum digitos extendimus, flectimusque, carpum, quem caeteroqui flecterent, obfirmamus. Tunc autem musculus ad intermediam quoque partem pertinet, cum illa non habet alium, qui eam, quo ille, modo moveat, & cum simul nobis illius modi usus opus est: quemadmodum Flexor brevis, Adductorque pollicis manus aequè parati sunt ad metacarpum pollicis in posteriora flectendum, quam ad flectendum os pollicis primi ordinis, quia nullus est alius, qui pollicis metacarpum in partem posteriorem ita flectat. Quidam etiam potius ad intermediam pertinent, quod de plerisque eorum, qui membranis cavis, canalibusque circumjècti sunt, manifestum est. Quidam tantummodo ad intermediam, ut qui uni eidemque cartilagini flexibili utraque parte sui affixi: nam de his quoque manifestum est, non partibus illis, quibus affixi, sed quae inter eas intercedit media, quam inflectunt, adscribendos eos esse.

Qui, quod tertio loco spectandum esse diximus,  
partes

partes quasdam movere possunt , eo quod partes illae connexae sunt cum illis , quas proprie movent , veluti Sternothyreoidei os hyoïdes , quod cartilagini thyreoïdeae alligatum , aut Brachiales interni manus extremas , quae cubitis affixae : illi ad eas partes , quas proprie movent , pertinent. Aliter tamen haec res se habet in aliis non paucis , ut in Pronatoribus , Supinatoribusque , qui quanquam radio affixi , eumque proprie movent , tamen ad manum in pronum aut in supinum vertendam à natura constituti sunt : cum enim radium manus tantummodo gratia circum ulnam convertere possimus , hoc satis declarat , musculos convertentes non radii esse , sed manus.

Haecenus de oblongis. Quod vero attinet ad Sphincteres , nihil est evidentius , quam quod proprii sint ostiorum quae ambiunt , partiumque quas vestiunt. Caeterum naturae scopus in omnibus musculis diligenter considerandus est , quo perspecto facile est iudicare , cuius quisque partis , & an unius , an plurium dicendus sit. Cum igitur omnes certis quibusdam partibus tributi sint , atque una eademque pars plures habere soleat , in tot classes distribui possunt , quot sunt partes musculis propriis instructae , quod in quarto libro praestabimus.

## C A P U T X I.

### *De varietate Musculorum.*

**Q**uantae autem eorundem musculorum in aliis atque aliis hominibus dissimilitudines sunt ! ne qui-



quidem duobus unis hominibus similes toti totis. Primum eae propemodum in iis existunt varietates, quae in conformatione lineamentorum, & circumcaesura membrorum, ut qui in universum iidem sint, propius tamen examinati, in nullo sint omnibus rebus tales, quales sunt in alio. Deinde multo etiam majores. Nam frequenter multum abluunt figura sua, nec semper eidem prorsus parti affixi sunt. Quidam qui in aliis disjuncti sunt, in aliis cohaerent inter se. Quibusdam eorum quibus plura uno capita aut extrema, non idem perpetuo eorum numerus, nec eadem alterius ad alterius rationem magnitudo. Quidam quandoque non repperiuntur: quidam repperiuntur in paucis. Fit ut nunquam antea visi occurrant. Fit & ut aliis desit aliquid, quibusdam abundet. Magnae pro varia aetate varietates. In infantibus, ut caetera mittamus, minus tendinosi sunt, ut multi etiam qua parte in adultis tendinei, aut tendinosi, in infantibus sint toti carnei. Multum eos immutat vitae genus, multum compressio, ut calceorum, multum attritus, quo fit ut caro tendinosa fiat, tendinesque fiant duriores, & qua se parte maxime atterunt, crassiores, & quasi ossei. Et quis singula recenseat! Quaedam ex praecipuis, quae videre nobis adhuc licuit, in tertio libro annotabimus. Nil ultra nobis sumimus.

## CAPUT XII.

*De administratione Musculorum.*

**P**ostremo praecipiemus de ratione musculos in corpore mortui quaerendi, quam vocant Admini-  
H
stra-

strationem eorum. Hic primum tradendum, quae-  
nam corpora ad id apta sint; deinde quomodo mus-  
culos in iis quaerere, & eruere oporteat. Ut nullo  
modo depravati cognoscantur, adhibenda corpora re-  
centia, integerrimaeque sanissimorum hominum: ut  
perfectissimi, eorum qui & in flore aetatis constituti,  
& bene conformati. Nimia obesitas impedimento est,  
& quia occultat musculos, facit ut difficiliter inveniri  
possint. Nullum si fuerit pingue, neque tam torosi  
apparent, neque se tam bene sustinent. Aptissima au-  
tem emaciata corpora ad investigandum modum quo  
oriuntur, quoque desinunt. Quoniam vero natura  
musculis frequenter ludit, oportet eos considerare in  
multis corporibus. Non convenit ea multum tractare  
antequam opus aggrediaris, longe minus dum in eo  
versaris: eo enim & situs musculorum facillime muta-  
tur, & figura depravatur, praesertim si corpora fue-  
rint macilentiora. Ob quam causam corpus, mem-  
braeque ejus, priusquam incidere incipias, situ maxi-  
me conveniente dispones. Incisa deinde cute, & pru-  
denter detracta, muscoli ab omni pingui, omnibus-  
que ad eos non pertinentibus liberandi, donec per-  
spicue appareant. Sed magna adhibenda cura est, ne  
quid eis detrimenti adferatur. Et primum spectandi  
primi sub cute, & hi primum qua parte cuti subja-  
cent: post separandi, quo omni ex parte considera-  
ri possint. His deinde dextere remotis, sequentes  
eodem modo perquirendi: rursusque post hos sequen-  
tes, ut sequuntur, & ut situs eorum commodissime  
permittit. Ortus insertionisque modo accurate cognos-  
cen-

cendo conducit, musculos ex transverso discindere, & à vicinis omni ex parte separare tum ad originem, tum ad insertionem usque. Quae autem optima, & facillima quemque musculum investigandi ratio sit, longum est dicere, nec admodum necessarium. Qui enim situm eorum & conformationem, quae sequentibus libris trademus, perspecta habent, rationem inquirendi optimam diligentia & exercitatione consequentur: inprimis adjuvante periti Magistri institutione & exemplo, quae praeter praecepta maximo momento sunt ad aliquid faciendum. Hoc tamen addendum esse putamus, quod si quis omnes in uno eodemque corpore persequi velit, sic ut neque uni ulli multum detrimenti inferre necesse sit, neque corruptio corporis impediatur, ab *Abdomine* incipiendum, & dein eo regionum, in quibus muscoli siti, & quas proximus liber definiet, ordine progrediendum, quo eas nunc recensebimus: quae circa *Funem spermaticum & Testem*, media inter *Thoracem Abdomenque*, *Lumborum & Coxarum pars prior*, *Pectus*, *Dorsum cum Lumborum posteriori parte & Cervice*, *Thoracis latus*, *Spatia intercostalia*, quae sub *Pectore*, *Collum*, *Caput*, circa *Auriculam*, *Facies*, *Mala cum latere Caput*, quae sub *Mala*, *Colli sceleti latus parsque prior*, *Natis*, *Femur*, quae circa *Perinaeum viri*, vel *Genitalis muliebris ambitus*, quae circum *Anum*, *Scapula cum parte Humeri superiore*, *Humcrus*, *Oculi cavum*, *Cubitus*, *Manus*, *Crus*, *dorsum Pedis extremi Digitorumque pedis*, *Planta & Digitorum pedis pars inferior*, *Auricula*, *Auris interna*. In unaquaque autem regione ipsi muscoli eo ordine quaerendi, quo sitos eos esse, eodem proximo

libro docebimus. Hanc potissimum, aut certe non multum ab ea diversam viam, ni quid forte intercedat, tenendam esse, usu, tractandoque cognovimus.



# HISTORIAE MUSCULORUM HOMINIS

LIBER SECUNDUS

*De Situ Musculorum.*

PROOEMIUM.

**D**e Musculis in genere satis diximus : nunc res ipsa monet , ut singulorum historiam inchoemus , in qua & describere eos oportebit , & quid efficere valeant docere , & cujusmodi ratione dispositi sint exponere. Ut vero plerique inter se juncti , & alii aliis quasi continuati , ita etiam situs omnium ordo perpetua oratione comprehendendus est , ab eoque , ne is ubique interrumpetur , ipsa cujusque descriptio , ususque commemoratio separanda. Hoc autem libro summam trademus situs rationem , quam singulorum expositioni quasi gradum quendam atque aditum ad eam , praemitemus. Est quidem necesse musculos ipsos ad situm eorum bene capiendum cognitos habere ; sed quoniam multi erimus in describendis musculis , de situ vero eorum tantummodo summam agendum esse arbitrati sumus , huic primas tribuimus , ut simul illa , quae de situ eorum dicenda videbuntur , & hac compendiarie quadam descriptione ipsi etiam ante quodammodo cognosci possint. Res autem haec

*impedita est, & si modo dici possit, difficilis dictu. Tanta enim est musculorum multitudo, tamque varia eorum figura, tam dispar toto corpore positio, tanta implicatio; ut vix satis appareat; unde incipiendum, quo progrediendum, ubi desinendum. Cumque uniuscujusque situm scorsim nullo negotio tradere possimus, omnium ordine quodam perspicuo difficillime possumus. Quam etiam ob rem praesagit animus, parum in legendis his nostris commentariis profecturos, qui simul oculos ipsis musculis, quorum dispositionem legent, vel certe accuratioribus eorum imaginibus non adicient. Itaque opus hoc ea spe aggredimur, fore ut illos qui musculorum situm in ipso corpore hominis expendere volent, sit adiuturum, iisdemque deinde facile renovaturum semel perspecti memoriam, praesertim si simul adhibeant praestantes & ad hoc idoneas icones. Atque ad hos usus totam rationem descriptionis, quam nunc incipimus, accommodabimus: in qua & icones, si quae bonae eorum quae describuntur, exsint, ubique, quo adhiberi facile possint, laudabimus.*

## C A P U T I

*De situ Musculorum in genere.*

**M**usculorum certa quaedam dispositio est, miraque, praeter paucorum quorundam, toto corpore pertinens implicatio. Sed neque situs eorum uni eidemque homini omni ex parte semper constans, iidemque est, neque implicatio. Cum situs mutatur, mutatur quoque implicationis ratio. Situm autem ipsi aliquantum cum figura sua mutant tum contractione sua, tum relaxatione: quod & res ipsa loquitur fieri debe-

debere, & in illis manifestum est, qui statim post tegumenta communia corporis collocati, in vivo homine considerari à nobis possunt. Idemque pro varia partium corporis positione non mediocriter diversus est. Sic Serrati antici priorem partem totam Pectoralis integrit, cum brachium pendet: hoc vero cum attollitur, ita quoque Pectoralis sursum trahitur<sup>a</sup>, ut ad postremum Serratus ille denudetur<sup>b</sup> ab inferiori parte. Bicipitis brachii capita se à superiore parte contingunt, cum brachii interior pars trunco corporis obversa: eadem contra in priora conversa parte, disjuncta sunt<sup>c</sup>, quia caput longius in sinu humeri retentum, ipsa hujus, quam diximus, conversione abducitur ab altero, quod affixum processui coracoideo, humerum non sequitur. Hanc vero omnium mutabilitatem in tanta ejus non modo in diversis differentia, sed etiam in singulis varietate persequi infinitum esset, & neque satis expediri, neque accipi posset. Quocirca tantummodo laxorum suscipimus situm describere, eumque qualis est, cum status quidam certus est à nobis compositus. Quod si effecerimus, erit regula, ad quam illi se dirigant, qui quomodo ab ea recedatur, quaerere operae suae pretium existimabunt. Statum illum eligimus, qui naturalis, qui simplex, qui simul definitus sit, hoc est, erectum, libere pendentibus brachiis, sic ut volae femoribus obversae sint, digitique recti: caeterum facie, collo, pectore, ventre, pedumque priore parte in eandem omnibus partem aequaliter

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxx. B dextr.

<sup>b</sup> Ibid. C,

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxi. 23. 24.

liter directis, ac reliquis etiam partibus omnibus, quae ad musculos ullo modo pertinent, situm habentibus rectum & naturalem. Et incipiemus ab exteriorum commemoratione, indeque ad interiores, ut alii post alios collocati sunt, pergemus: nec enim alius ordo tum ad inveniendos eos, tum ad situm eorum capiendum, ac memoria comprehendendum accommodatior videtur. Et ne nimium longi simus, & intellectu difficiliore, non memorabimus, quae quisque omni ex parte contingat; sed breviter, summamque aperiemus, qui in quaque parte corporis, & quo alii post alios ordine inveniantur. Si quis autem plura requirat, is accuratorem singulorum descriptionem, quam sequenti libro complexuri sumus, simul adhibeat. Quo vero melius quod suscepimus exequamur, corpus hominis ante in certas à musculis occupatas regiones distinguemus: dein qui in quaque regione, dein quo illi sint collocati ordine dicemus.

## C A P U T I I.

*Corporis in regiones diviso.*

**H**ic primo notandum quamnam sexus differentiam afferat. Notissima res est, corpus viri foeminaeque in universum similia esse, sexu autem maxime dissimilia. Itaque eadem etiam utrique regiones, praeter genitalium. Corpus autem viri universum in quadraginta & octo, foeminae in quadraginta sex dividitur regiones, in quibus quadraginta quinque utrique communes sunt, virilis propriae tres, foeminini una.

Ea-



Earum aliae geminae sunt, discretæque, id est, dextræ, & sinistræ: aliae singulares ac mediae, quæ tamen dextram sui partem similem habent sinistræ.

Geminae utrique sexui communes sunt, quæ circum Auriculas, Auriculas, Aures internæ, cava Oculorum, Malæ cum lateribus Calvæ, quæ sub Malis, latera Thoracis, Spatia intercostalia, Scapulae cum superiore parte Humerorum, Humeri, Cubiti, Manus, Nates, Femora, Crura, Dorsa pedum extremorum digitorumque pedum, Plantæ & digitorum pedum partes inferiores.

Viri autem propriæ, quæ circa Funes spermaticos ac Testes.

Singulares communes sunt, Calva, Facies, Collum, Colli sceleti latera parsque prior, Pectus, quæ sub Pectore est, Abdomen, mediâ inter Thoracem Abdomenque, Lumborum & Coxarum pars prior, Dorsum cum Lumborum posteriore parte & Cervice, quæ circum Anum.

Viri propria singularis una est, quæ circa Perinaeum viri.

Fœminæ, Genitalis ambitus.

In geminis iisdem muscoli, iique in utraque earum singuli, situque similes. In singularibus plerisque gemini muscoli: in aliis partim gemini, partim singulares: in aliis tantum singulares. Et geminorum quidem alter in dextra singularium regionum parte, alter in sinistra, utrique eodem modo siti: singulares in medio, sui que altero dimidio in dextra parte, altero in sinistra. In iisdem autem viri, fœminæque regionibus iisdem muscoli, eademque ratione collocati, præterquam circum anum, ubi præter communes vir ha-

bet Compressores prostaticae, & ubi quoque Levatores cum Sphinctere externo, ut figura, ita situ, ob genitalium vicinitatem aliquantum diversi. Sed in genitalibus magna eorum differentia est, in quibus tamen etiam respondentes sibi invicem. Atque ut totum corpus simplicissimo quodam ordine peragremus, eum harum regionum ordinem tenebimus, quo fere aliae post alias à vertice ad extremas manus, pedesque usque sequuntur, & secundum quem musculi simul in uno eodemque corpore quaeri satis commode possunt, sine notabili alicujus damno. Is autem hic est: *Calva*, quae circa *Auriculas*, *Facies*, *Malae cum lateribus Calvae*, *cava Oculorum*, *Auriculae*, *Aures internae*, *Collum*, quae sub *Malis*, *Pectus*, *latera Thoracis*, *Abdomen*, quae circa *Funes spermaticos ac Testes*, *media inter Thoracem Abdomenque*, quae sub *Pectore*, *Lumborum & Coxarum pars prior*, quae circa *Perinaeum viri*, (aut *Genitalis muliebris ambitus*) quae circum *Anum*, *Dorsum cum Lumborum posteriore parte & Cervice*, *Spatia intercostalia*, *Colli sceleti latera parsque prior*, *Scapulae cum superiore Humerorum parte*, *Humeri*, *Cubiti*, *Manus*, *Nates*, *Femora*, *Crura*, *Dorsa pedum extremorum digitorumque pedum*, *Plantae & digitorum pedum partes inferiores*. Et quoniam geminarum altera alteri similis est, earum tantummodo unam deinceps, quoties de gemina dicetur, nominabimus.

## CAPUT III.

*Musculorum in singulis regionibus enumeratio.*

**M**usculi in his regionibus, in *Calva* Epicranii <sup>a</sup>. Circa *Auriculam*, Attollens auriculæ <sup>b</sup>, Anterior ejusdem <sup>c</sup>, Retrahentes tres <sup>d</sup>, superior, medius, inferior.

In *Facie*, Orbiculares palpebrarum <sup>e</sup>, Corrugatores superciliarum <sup>f</sup>, Compressores narium <sup>g</sup>, Levatores labii superioris alarumque nasi <sup>h</sup>, Levatores labii superioris <sup>i</sup>, Zygomatici minores <sup>k</sup>, Levatores angulorum oris <sup>l</sup>, Zygomatici majores <sup>m</sup>, Depressores angulorum oris <sup>n</sup>, Depressores labii inferioris <sup>o</sup>, Nasales labii superioris <sup>p</sup>, Buccinatores <sup>q</sup>, Orbicularis oris <sup>r</sup>, Depressores alarum nasi <sup>s</sup>, Levatores menti <sup>t</sup>.

I 2. In

- a Partes ejus quæ *Occipitales*, Eustach. Tab. xxxix. A.A. Quæ *Frontales*, Eustach. Tab. xxxii. a. a. & Tab. xli. Fig. 1. E. E.  
b Eustach. Tab. xxxii. m. & Tab. xli. Fig. 1. A.  
c Santorin. Tab. iii. Fig. 4. d.  
d Valsalv. Tab. 1. Fig. 3. C. C. C.  
e Eustach. Tab. xxxii. bb. utriusque lateris, & Tab. xli. Fig. 1. FF. utr. lat.  
f Santorin. Tab. 1. I.  
g Santorin. Tab. 1. a. dext. & aa. sin.  
h Eustach. Tab. xxxii. d. & Tab. xli. Fig. 1. H.  
i Eustach. Tab. xxxii. c. utr. lat. & Tab. xli. Fig. 1. IK. dextr.  
k Eustach. Tab. xli. Fig. 1. L. Santorin. Tab. 1. Q.  
l Eustach. Tab. xxxii. f. utr. lat. & Tab. xli. Fig. 1. M. & Fig. 3. E.  
m Eustach. Tab. xxxii. g. utr. lat. & Tab. xli. Fig. 1. N. dextr.  
n Eustach. Tab. xxxii. k. utr. lat. & Tab. xli. Fig. 1. P. utr. lat.  
o Eustach. Tab. xli. Fig. 1. Q. utr. lat.  
p Santorin. Tab. 1. i. i.  
q Eustach. Tab. xli. Fig. 1. O. & Fig. 3. D.  
r Eustach. Tab. xli. Fig. 1. R. R.  
s Cowper. Myot. ref. ann. 1694. Fig. 3. D.  
t Santorin. Tab. 1. q. r. & Cowper. Myot. ann. 1694. Fig. 4. F. & ann. 1724. Tab. xxxi. 26. 26.  
u Eustach.

•In *Mala & latere Calvae*, *Masseter* <sup>u</sup>, *Temporalis* <sup>v</sup>.

In *cavo Oculi*, *Levator palpebrae superioris* <sup>x</sup>, *Obliquus superior oculi* <sup>y</sup>, *Rectus attollens oculi* <sup>z</sup>, *Rectus abductor oculi* <sup>a</sup>, *Rectus adductor oculi* <sup>b</sup>, *Rectus depressor oculi* <sup>c</sup>, *Obliquus inferior* <sup>d</sup>.

In *Auricula*, *Tragicus* <sup>e</sup>, *Antitragicus* <sup>f</sup>, *Major helicus* <sup>g</sup>, *Minor helicus* <sup>h</sup>, *Transversus Auriculae* <sup>i</sup>.

In *Aure interna*, *Externus mallei* <sup>k</sup>, *Laxator tympani* <sup>l</sup>, *Tensor tympani* <sup>m</sup>, *Stapedius* <sup>n</sup>.

In *Collo*, *Latissimi colli* <sup>o</sup>, *Sternomastoidei* <sup>p</sup>, *Cleidomastoidei* <sup>q</sup>, *Coracohyoidei* <sup>r</sup>, *Sternohyoidei* <sup>s</sup>, *Sternothyroidei* <sup>t</sup>, *Hyothyroidei* <sup>u</sup>, *Biventre maxillae* <sup>v</sup>, *Stry-*

u Eustach. Tab. xxxii. q. & Tab. xli. Fig. 1. D.

w Eustach. Tab. xxxii. 11. & Tab. xli. Fig. 1. B. & Fig. 3. A.

x Eustach. Tab. xxxix. Fig. 2. G.

y Eustach. Tab. xxxix. Fig. 2. E. & Fig. 4. D.

z Eustach. Tab. xxxix. Fig. 2. H. & Fig. 3. F.

a Eustach. Tab. xxxix. Fig. 2. I.

b Eustach. Tab. xxxix. Fig. 2. D.

c Eustach. Tab. xxxix. Fig. 5. E.

d Eustach. Tab. xxxix. Fig. 5. D.

e Valsalv. Tab. 1. Fig. 4. B. & Santorin. Tab. 111. Fig. 4. f.

f Valsalv. Tab. 1. Fig. 4. D. & Santorin. Tab. 111. Fig. 4. g.

g Santorin. Tab. 111. Fig. 4. b.

h Santorin. Tab. 111. Fig. 4. c.

i Valsalv. Tab. 1. Fig. 3. D. D.

k Du Verney Pl. vi. Fig. 5. C. D.

l Valsalv. Tab. 111. Fig. 5. H.

m Du Verney Pl. vi. Fig. 5. E. F.

& Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. xxvi. Fig. 2. 42.

n Du Verney Pl. v. Fig. 8. B. & Pl. viii. Fig. 1. c.

o Eustach. Tab. xxx. u. utr. lat.

p Eustach. Tab. xxxii. z. & Tab. xxviii. y. utr. lat.

q Eustach. Tab. xxxii. A. utr. lat.

r Eustach. Tab. xxxii. w. w. utr. lat. & Tab. xxxiii. Z. utr. lat. & Tab. xli. Fig. 5. ll.

f Eustach. Tab. xxxii. x. utr. lat. & Tab. xxxiii. c. & Tab. xli. Fig. 5. m.

t Eustach. Tab. xxxii. y. utr. lat. & Tab. xxxiii. b. dext. & b. b. sin. & Tab. xli. Fig. 5. n. n. dext. & n. sin.

u Eustach. Tab. xxxiii. R. & Tab. xli. Fig. 5. o.

w Eustach. Tab. xxxiii. r. r. sin. & r. dext.

x Eu-

Stylohyoidei <sup>a</sup>, Stylohyoidei alteri <sup>b</sup>, Styloglossi <sup>c</sup>, Stylopharyngei <sup>d</sup>, Mylohyoidei <sup>e</sup>, Geniohyoidei <sup>f</sup>, Ceratoglossi <sup>g</sup>, Basiglossi <sup>h</sup>, Chondroglossi, Genioglossi <sup>i</sup>, Linguales <sup>j</sup>, Constrictores pharyngis inferiores <sup>k</sup>, Constrictores pharyngis medii <sup>l</sup>, Constrictores pharyngis superiores <sup>m</sup>, Salpingopharyngei <sup>n</sup>, Palatopharyngei <sup>o</sup>, Constrictores isthmi faucium <sup>p</sup>, Levatores palati mollii <sup>q</sup>, Circumflexi palati <sup>r</sup>, Azygus uvulae <sup>s</sup>, Cricothyreoidei <sup>t</sup>, Cricoaerytaenoidei postici <sup>u</sup>, Arytaenoidei obliqui <sup>v</sup>, Arytaenoideus transversus <sup>w</sup>, Cricoaerytaenoidei laterales <sup>x</sup>, Thyreoarytaenoidei <sup>y</sup>.

## I 3

## Sub

- x Eustach. Tab. xxxiii. f. utr. lat. & Tab. xli. Fig. f. i.  
y Eustach. Tab. xli. Fig. ii. K.  
z Eustach. Tab. xxxiii. M. & Tab. xli. Fig. 8. H.  
a Eustach. Tab. xxxiii. P. & Tab. xli. Fig. 8. F. & Tab. xlii. Fig. 4. G. utr. lat. & Fig. 6. O. utr. lat.  
b Eustach. Tab. xxxiii. H. & Tab. xxxv. k. k. utr. lat. & Tab. xli. Fig. 5. a.  
c Eustach. Tab. xxxiii. I. & Tab. xli. Fig. 5. b. & Fig. 8. M.  
d Eustach. Tab. xxxiii. M. & Tab. xli. Fig. 8. I.  
e Eustach. Tab. xxxiii. L. & Tab. xli. Fig. 8. K.  
f Eustach. Tab. xxxiii. K. & Tab. xli. Fig. 11. A. & B. & Fig. 8. L.  
g An Eustach. Tab. xli. Fig. 11. C?  
h Eustach. Tab. xli. Fig. 8. R. & Tab. xlii. Fig. 4. K.  
i Eustach. Tab. xli. Fig. 8. Q. & Fig. 11. L. & Tab. xlii. Fig. 4. L. utr. lat.  
k Eustach. Tab. xlii. Fig. 4. H. utr. lat.  
l Eustach. Tab. xlii. Fig. 6. I.  
m Eustach. Tab. xlii. Fig. 6. M. N. utr. lat.  
n Valsalv. Tab. v. Fig. 1. C. utr. lat.  
o Eustach. Tab. xlii. Fig. 4. F. utr. lat. & Fig. 6. FF. sin. & F. dext. & Valsalv. Tab. iv. n. dext.  
p Eustach. Tab. xli. Fig. 13. O. & Tab. xlii. Fig. 4. DE. utr. lat. & Fig. 6. DE. utr. lat. & Valsalv. Tab. iv. m. utr. lat.  
q Heister. Comp. Tab. viii. Fig. 38. k.  
r Eustach. Tab. xli. Fig. 8. V. dext. & VV. sin. & Fig. 11. S. utr. lat.  
s Eustach. Tab. xlii. Fig. 2. K. utr. lat.  
t Eustach. Tab. xlii. Fig. 2. G. & HH.  
u Eustach. Tab. xlii. Fig. 2. FF. FF.  
v Eustach. Tab. xlii. Fig. 1. L.  
w Eustach. Tab. xlii. Fig. 1. K.  
x Eustach. Tab. xlii. Fig. 1. K.  
y Eu-

*Sub Mala* , Pterygoïdeus internus <sup>1</sup> , Pterygoïdeus externus <sup>2</sup> .

*In Pectore* , Pectorales <sup>a</sup> , Serrati antici <sup>b</sup> , Subclavii <sup>c</sup> .

*In latere Thoracis* , Serratus magnus <sup>d</sup> .

*In Abdomine* , Obliqui externi abdominis <sup>e</sup> , Obliqui interni abdominis <sup>f</sup> , Transversi abdominis <sup>g</sup> , Recti abdominis <sup>h</sup> , Pyramidales <sup>i</sup> .

*Circa Furem spermaticum ac Testem* , Cremaster <sup>k</sup> .

*Inter Abdomen Thoracemque* ; Diaphragma <sup>l</sup> .

*Sub Pectore* , Triangularis sterni <sup>m</sup> .

*In Lumborum & Coxarum parte priore* , Psoae parvi <sup>n</sup> ; Psoae magni <sup>o</sup> , Iliaci interni <sup>p</sup> , Quadrati lumborum <sup>q</sup> .

*Circa Perinaeum viri* , Acceleratores <sup>r</sup> , Erectores penis <sup>s</sup> .

*In Genitalis muliebris ambitu* , Constrictores cunni <sup>t</sup> , Erectores

y Eustach. Tab. xli. Fig. 13. r. & Tab. xxix. F.

z Eustach. Tab. xli. Fig. 13. Δ. utr. lat.

ā Eustach. Tab. xxxiii. K. & Tab. xxviii. F. utr. lat.

b Eustach. Tab. xxxiii. I.

c Eustach. Tab. xxxiii. G.

d Eustach. Tab. xxx.D. & Tab. xxxii. M. utr. lat. & Tab. xxxvi. f. & Tab. xxxiii. m.

e Eustach. Tab. xxxii. T. & Tab. xxviii. IK. utr. lat. & Tab. xxix. W. utr. lat.

f Eustach. Tab. xxxiii. R. & Tab. xxix. V. utr. lat. & Tab. xxxvi. i.

g Eustach. Tab. xxxiii. q. utr. lat. & Tab. xxxvii. o. utr. lat.

h Eustach. Tab. xxxiii. n.

i Eustach. Tab. xxxiii. u.

k Eustach. Tab. xxxii. r. utr. lat. & Tab. xxxiii. wx. utr. lat.

l Vesal. de H. C. F. Lib. ii. Tab. vii. Δ.

m Vesal. de H. C. F. Lib. ii. Tab. viii. β. & Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. xxxiii. Fig. 1. 77. utr. lat.

n Eustach. Tab. xxxviii. q.

o Eustach. Tab. xxxviii. r r s. sin.

p Eustach. Tab. xxxviii. u. utr. lat.

q Eustach. Tab. xxxviii. p. utr. lat. & Tab. xxxix. Fig. 1. n. utr. lat.

r Vesal. de H. C. F. Lib. ii. Tab. Cap. xlix. Fig. 1. H. I.

s Vesal. de H. C. F. Lib. ii. Tab. Cap. xlix. Fig. 1. K. L.

t Eustach. Tab. xiv. Fig. 1. M. M. & Santorini. Tab. 11. Fig. 1. G.

u. Eu-

Erectores clitoridis <sup>u</sup>.

*Circum Anum*, Sphincter ani externus <sup>w</sup>, Transversi perinaei <sup>x</sup>, Transversi perinaei alteri <sup>y</sup>, Levatores ani <sup>z</sup>, Coccygei <sup>a</sup>, Curvatores coccygis, Sphincter ani internus <sup>b</sup>. In viro etiam Compressores prostaticae <sup>c</sup>.

In *Dorso cum Lumborum posteriore parte & Cervice*, Cucullares <sup>d</sup>, Latissimi dorsi <sup>e</sup>, Rhomboidei majores <sup>f</sup>, Rhomboidei minores <sup>g</sup>, Serrati postici superiores <sup>h</sup>, Serrati postici inferiores <sup>i</sup>, Levatores scapularum <sup>k</sup>, Splenii capitis <sup>l</sup>, Splenii colli <sup>m</sup>, Biventre cervicis <sup>n</sup>, Complexi <sup>o</sup>, Trachelomastoidei <sup>p</sup>, Transversales cervicis <sup>q</sup>, Cervicales descendentes, Sacrolumbales <sup>r</sup> cum Longissimis dorsi <sup>s</sup>, Spinales dorsi <sup>t</sup>, Semispinales dorsi, Spinales cervicis <sup>u</sup>, Interspinales cervicis <sup>w</sup>, Recti postici majores capitis

<sup>u</sup> Eustach. Tab. xiv. Fig. 1. N. N.  
<sup>w</sup> In viro, Eustach. Tab. xxix. c. & Tab. xxxvi. r. In foemina, Eustach. T. xiv. Fig. 1. K.

<sup>x</sup> In viro, Cowper. Myot. ann. 1724. Tab. xix. g. utr. lat. & Santorin. Tab. 111. Fig. 5. I. I. In foemina, Santorin. Tab. 11. Fig. 1. g. g.

<sup>y</sup> In viro, Santorin. Tab. 111. Fig. 5. H. H. In foemina, Santorin. Tab. 11. Fig. 1. F.

<sup>z</sup> Eustach. Tab. xxix. d. utr. lat. & Tab. xxxvi. q. utr. lat. & Tab. xxxvii. r. utr. lat.

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvi. f.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. x. Fig. 2.

<sup>c</sup> Santorin. Tab. 111. Fig. 5. V.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxix. P. & Tab. xxxi. M. utr. lat. & Tab. xxxii. E. utr. lat.

<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxix. R. utr. lat. & Tab. xxxii. L. utr. lat.

<sup>f</sup> Eustach. Tab. xxix. O. dextr.

<sup>g</sup> Eustach. Tab. xxix. N.

<sup>h</sup> Eustach. Tab. xxix. M. & Tab. xxxvi. c.

<sup>i</sup> Eustach. Tab. xxxvi. g. h.

<sup>k</sup> Eustach. Tab. xxix. L. & Tab. xxxvi. d.

<sup>l</sup> Eustach. Tab. xxix. I. dextr. & Tab. xxxvi. c.

<sup>m</sup> Eustach. Tab. xxxvii. c.

<sup>n</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 13. ABCD.

<sup>o</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 13. GG.

<sup>p</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 13. EF. & Eustach. Tab. xxxvii. b. utr. lat.

<sup>q</sup> Eustach. Tab. xxxvii. d.

<sup>r</sup> Eustach. Tab. xxxvi. 17.

<sup>s</sup> Eustach. Tab. xxxvi. 18.

<sup>t</sup> Eustach. Tab. xxxvii. l. utr. lat.

<sup>u</sup> Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. f.

<sup>w</sup> Cowper. Myot. ann. 1694. Fig. 8. L. L. L. & ann. 1724. Tab. xlii. Fig. 1. 100.

x. Eu-

capitis <sup>x</sup>, Recti postici minores capitis <sup>y</sup>, Obliqui inferiores capitis <sup>z</sup>, Obliqui superiores capitis <sup>a</sup>, Multifidi spinae <sup>b</sup>, Interspinales lumborum, Interspinales dorsi, Intertransversarii lumborum, Intertransversarii dorsi, Levatores costarum breviores <sup>c</sup>, Levatores costarum longiores <sup>d</sup>.

In *Spatiis intercostalibus*, Intercostales externi <sup>e</sup>, Intercostales interni <sup>f</sup>.

In *Colli skeleti lateribus parteque priore*, Scaleni priores <sup>g</sup>, Scaleni minimi, Scaleni laterales, Scaleni medii <sup>h</sup>, Scaleni postici <sup>i</sup>, Recti interni majores capitis <sup>k</sup>, Longi colli <sup>l</sup>, Recti interni minores capitis <sup>m</sup>, Recti laterales capitis <sup>n</sup>, Intertransversarii colli priores <sup>o</sup>, Intertransversarii colli posteriores <sup>p</sup>.

In *Scapula & Humeri superiore parte*, Deltoïdes <sup>q</sup>, Supraspinatus <sup>r</sup>, Infraspinatus <sup>s</sup>, Teres minor <sup>t</sup>, Teres major,

x Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. b.

y Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. a.

z Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. d.

a Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. c.

b Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. m m. utr. lat. In cervicibus, Cowper. Myot. ann. 1694. Fig. 8. K.

c Verheyen. Tab. xxxv. Fig. 1. e. e.

d Verheyen. Tab. xxxv. Fig. 1. f. f.

e Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. l. d. &c. utr. lat. & Tab. xxxiii. l. &c. utr. lat.

f Eustach. Tab. xxxviii. l. l. &c. utr. lat. & Tab. xxxiii. h. i. &c. utr. lat.

g Eustach. Tab. xxxviii. i. & Tab. xxxiii. a. utr. lat.

h Eustach. Tab. xxxviii. g. utr. lat. & Tab. xxxix. Fig. 1. c. & Tab. xxxvii. f. utr. lat.

i Eustach. Tab. xxxvii. e.

k Eustach. Tab. xxxviii. c. & Tab. xli. Fig. 13. n. & Fig. 8. a. & Tab. xxxiii. T.

l Eustach. Tab. xxxviii. d. & c. f. & Tab. xli. Fig. 13. z. utr. lat.

m Eustach. Tab. xxxviii. b. utr. lat. & Tab. xli. Fig. 13. s. utr. lat.

n Eustach. Tab. xxxviii. a. utr. lat. & Tab. xli. Fig. 13. A. utr. lat.

o Cowper. Myot. ann. 1724. Tab. xlii. Fig. 1. *Intertransversarii colli*: ubi priores à posterioribus non distincti.

p Eustach. Tab. xxxii. 22. & Tab. xxix. 6.

q Eustach. Tab. xxix. 8.

r Eustach. Tab. xxix. 12. utr. lat.

s Eustach. Tab. xxxix. 13. utr. lat.

t Eustach.



major <sup>t</sup>, Subscapularis <sup>u</sup>.

In *Humero*, Biceps brachii <sup>w</sup>, Coracobrachialis <sup>x</sup>, Brachialis internus <sup>y</sup>, Triceps brachii <sup>z</sup>.

In *Cubito*, Supinator longus <sup>a</sup>, Radialis externus longior <sup>b</sup>, Radialis externus brevior <sup>c</sup>, Extensor communis digitorum manus <sup>d</sup>, Extensor proprius digiti minimi manus <sup>e</sup>, Ulnaris externus <sup>f</sup>, Anconeus <sup>g</sup>, Supinator brevis <sup>b</sup>, Abductor longus pollicis manus <sup>i</sup>, Extensor minor pollicis manus <sup>k</sup>, Extensor major pollicis manus <sup>l</sup>, Indicator <sup>m</sup>, Ulnaris internus <sup>n</sup>, Palmaris longus <sup>o</sup>, Radialis internus <sup>p</sup>, Pronator teres <sup>q</sup>, Sublimis <sup>r</sup>, Profundus <sup>r</sup>, Flexor longus pollicis manus <sup>t</sup>, Pronator quadratus <sup>u</sup>.

## K

## In

z Eustach. Tab. xxix. 15. & Tab. xxxvi. V. & Tab. xxxviii. F.

u Eustach. Tab. xxxiii. 33. utr. lat. & Tab. xxxviii. E.

w Eustach. Tab. xxxii. 23. 24. 25. utr. lat.

x Eustach. Tab. xxxii. 21. 21. & Tab. xxxiii. 36. utr. lat.

y Eustach. Tab. xxxii. 28. 28. utr. lat. & Tab. xxxviii. G.

z Eustach. Tab. xxix. 16. 17. 18. utr. lat. & Tab. xxxii. 26. 27. utr. lat.

a Eustach. Tab. xxxii. 30. utr. lat.

b Eustach. Tab. xxix. 31. 31. 31. & Tab. xxxiii. 52. 61.

c Eustach. Tab. xxix. 30. 30. 30. & Tab. xxxiii. 53. 62.

d Eustach. Tab. xxix. 28.

e Eustach. Tab. xxix. 27.

f Eustach. Tab. xxix. 26.

g Eustach. Tab. xxxvii. G.

h Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. w. dext. & ww. sin. & Tab. xxxviii. I.

i Eustach. Tab. xxix. 32. dext. & 33. 24. sin. & Tab. xxxiii. 59.

k Eustach. Tab. xxix. 35. utr. lat. & Tab. xxxiii. 60.

l Eustach. Tab. xxix. 36. utr. lat.

m Eustach. Tab. xxix. 37. dext.

n Eustach. Tab. xxxii. 34. & Tab. xxix. 25. utr. lat.

o Eustach. Tab. xxxii. 33.

p Eustach. Tab. xxxii. 32.

q Eustach. Tab. xxxii. 29. sin.

r Eustach. Tab. xxxii. 35. & Tab. xxxiii. 53.

s Eustach. Tab. xxxii. 36. & Tab. xxxiii. 54. utr. lat. & Tab. xxxviii. L.

t Eustach. Tab. xxxiii. 55. & Tab. xxxviii. K. sin.

u Eustach. Tab. xxxviii. V.

w Eu-

In *Manu*, Lumbricales <sup>w</sup>, Abductor brevis pollicis manus <sup>x</sup>, Opponens pollicis manus <sup>y</sup>, Flexor brevis pollicis manus <sup>z</sup>, Adductor pollicis manus <sup>a</sup>, Palmaris brevis <sup>b</sup>, Abductor digiti minimi manus <sup>c</sup>, Flexor parvus digiti minimi manus <sup>d</sup>, Adductor metacarpi digiti minimi <sup>e</sup>, Interossei manus <sup>f</sup>, Abductor indicis <sup>g</sup>.

In *Nate*, Gluteus magnus <sup>h</sup>, Gluteus medius <sup>i</sup>, Gluteus minor <sup>k</sup>, Pyriformis <sup>l</sup>, Geminorum superior <sup>m</sup>, Geminorum inferior <sup>n</sup>, Obturator internus <sup>o</sup>, Quadratus femoris <sup>p</sup>.

In *Femore*, Biceps cruris <sup>q</sup>, Semitendinosus <sup>r</sup>, Semimembranosus <sup>s</sup>, Tensor vaginae femoris <sup>t</sup>, Rectus cruris

<sup>w</sup> Eustach. Tab. xxxii. 51. 52. 53. 54. & Tab. xxxviii. M. N. O. P.

<sup>x</sup> Eustach. Tab. xxxii. 43. utr. lat.

<sup>y</sup> Eustach. Tab. xxxii. 42. utr. lat. & Tab. xxxiii. 69.

<sup>z</sup> Eustach. Tab. xxxviii. ΠΣ.

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxii. 45. & Tab. xxxviii. 5.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxii. 49. utr. lat.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxiii. 72. Casſer. Tab. ap. Spigel. Lib. 1v. Tab. 25. Fig. 2. B. inferior in manu.

<sup>d</sup> Casſer. Tab. ap. Spigel. Lib. 1v. Tab. 25. Fig. 2. B. extra situm, & Cowper. Myot. ann. 1724. Tab. 1.1. M. superior extra situm.

<sup>e</sup> An Eustach. Tab. xxxviii. Q? Casſer. Tab. ap. Spigel. Lib. 1v. Tab. 25. Fig. 2. B. superior in manu: & Cowper. Myot. ann. 1724. Tab. 1.1. M. in manu.

<sup>f</sup> *Interni*, Eustach. Tab. xxxviii. A. & Z. X. & Tab. xxxix. Fig. 1. x. y. B.

*D. Externi*, Eustach. Tab. xxxviii. Δ. Γ. Υ. & Tab. xxxix. Fig. 1. z. A. C.

<sup>g</sup> Eustach. Tab. xxxiii. 64. & Tab. xxxvi. Γ.

<sup>h</sup> Eustach. Tab. xxix. X.

<sup>i</sup> Eustach. Tab. xxix. Υ.

<sup>k</sup> Eustach. Tab. xxxvi. u.

<sup>l</sup> Eustach. Tab. xxix. g. & Tab. xxxvi. m.

<sup>m</sup> Eustach. Tab. xxix. h. & Tab. xxxvii. s. utr. lat.

<sup>n</sup> Eustach. Tab. xxix. k. & Tab. xxxvii. t. utr. lat.

<sup>o</sup> Eustach. Tab. xxix. i. & Tab. xxxvii. w.

<sup>p</sup> Eustach. Tab. xxix. l.

<sup>q</sup> Eustach. Tab. xxix. r. utr. lat.

<sup>r</sup> Eustach. Tab. xxix. q. utr. lat.

<sup>s</sup> Eustach. Tab. xxix. p. utr. lat. & Tab. xxxvi. D.

<sup>t</sup> Eustach. Tab. xxxii. X. & Tab. xxx. M.

u Eustach.

ris <sup>u</sup>, Sartorius <sup>w</sup>, Vastus externus <sup>x</sup>, Vastus internus <sup>y</sup>, Cruralis <sup>z</sup>, Pectineus <sup>a</sup>, Adductor longus femoris <sup>b</sup>, Gracilis <sup>c</sup>, Adductor brevis femoris <sup>d</sup>, Obturator externus <sup>e</sup>, Adductor magnus femoris <sup>f</sup>.

In *Crura*, Gemellus <sup>g</sup>, Plantaris <sup>h</sup>, Soleus <sup>i</sup>, Popliteus <sup>k</sup>, Flexor longus digitorum pedis <sup>l</sup>, Flexor longus pollicis pedis <sup>m</sup>, Tibialis posticus <sup>n</sup>, Peroneus longus <sup>o</sup>, Peroneus brevis <sup>p</sup>, Extensor longus digitorum pedis <sup>q</sup>, Peroneus tertius <sup>r</sup>, Tibialis anticus <sup>s</sup>, Extensor proprius pollicis pedis <sup>t</sup>.

In *Pedis extremi digitorumque ejus dorso*, Extensor brevis digitorum pedis <sup>u</sup>.

K 2

In

u Eustach. Tab. xxxii. 7. utr. lat.

w Eustach. Tab. xxxii. 2.

x Eustach. Tab. xxxii. 2. utr. lat. & Tab. xxxiii. 7. & Tab. xxxvi. F.

y Eustach. Tab. xxxii. 6. utr. lat. & Tab. xxxiii. 2. & Tab. xxxvi. E.

z Eustach. Tab. xxxiii. 6. utr. lat. & Tab. xxxvi. x.

a Eustach. Tab. xxxii. 4. utr. lat. & Tab. xxxiii. 4. utr. lat.

b Eustach. Tab. xxxii. 6. utr. lat. & Tab. xxxiii. 2. utr. lat.

c Eustach. Tab. xxxii. 2. & Tab. xxx. o.

d Eustach. Tab. xxxviii. y.

e Eustach. Tab. xxxviii. x. utr. lat.

f Eustach. Tab. xxxii. A. & Tab. xxxiii. 2. utr. lat. & Tab. xxxviii. zA. utr. lat. & Tab. xxxvi. w.

g Eustach. Tab. xxx. A. & 2.

h Eustach. Tab. xxix. 7.

i Eustach. Tab. xxix. 2. dext.

& 2. sin.

k Eustach. Tab. xxix. A. & Tab. xxxvi. y.

l Eustach. Tab. xxix. s. & Tab. xxxvi. L. & Tab. xxxii. 11.

m Eustach. Tab. xxix. 1. & Tab. xxxvi. K. & Tab. xxxii. 13.

n Eustach. Tab. xxxvii. x. & Tab. xxxii. 12.

o Eustach. Tab. xxix. 2. utr. lat. & Tab. xxxii. 7.

p Eustach. Tab. xxxi. 22. utr. lat. & Tab. xxxviii. y. & Tab. xxxii. 8.

q Eustach. Tab. xxix. 6. & Tab. xxxii. 5. dext.

r Eustach. Tab. xxix. 7. sin. & Tab. xxxii. 9.

s Eustach. Tab. xxxii. 4. & Tab. xxxviii. 2. utr. lat.

t Eustach. Tab. xxxii. 10. dext. & Tab. xxxii. 12.

u Eustach. Tab. xxxii. 18.

w Vesal.

In *Planta & digitorum pedis parte inferiore*, Flexor brevis digitorum pedis <sup>w</sup>, Abductor pollicis pedis <sup>x</sup>, Abductor minimi pedis <sup>y</sup>, Lumbricales pedis <sup>z</sup>, Flexor brevis pollicis pedis <sup>a</sup>, Adductor pollicis pedis <sup>b</sup>, Transversus pedis <sup>c</sup>, Flexor brevis minimi pedis <sup>d</sup>, Interossei pedis <sup>e</sup>.

Haec musculorum in singulis regionibus summa est. In quibus plerique eorum majore parte sui collocati, aut ad eas doctrinae causa relati: quidam etiam in vicinas diversimode excurrunt, ut in exquisitiore situs eorum per easdem regiones descriptione nunc dicetur. In ea autem, quoniam dextra sinistris, ut dictum est, respondent, geminorum tantummodo alteros, id est, qui vel in altera regionum geminarum, vel in singularium altero latere siti sunt, considerabimus. Quare cum in singularibus regionibus geminorum quorumque tantummodo unum commemorabimus, de altero earum

w Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 14. 6.

x Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 13. e. & Eustach. Tab. xxxiii. 15.

y Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 13. e. & Eustach. Tab. xxix. 3. utr. lat.

z Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 14. p. &c.

a Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. 1v. Tab. xliii. Fig. 1. D. E. & Cowper. Myot. ann. 1724. Tab. Lxv. Fig. 2. 180.

b Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. 1v. Tab. xliii. Fig. 1. C. & Cow-

per. Myot. ann. 1724. Tab. Lxv. Fig. 2. 11. & Tab. Lxvi. Fig. 2. 10. in planta.

c Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. 1v. Tab. xliii. Fig. 1. I. K. L. & Cowper. Myot. ann. 1724. Tab. Lxiv. 189.

d Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. 1v. Tab. xliii. Fig. 3. H. inferior: & an Cowper. Myot. ann. 1724. Tab. Lxv. Fig. 2. 190?

e Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. 1v. Tab. xliii. Fig. 1. H. H. H. & Tab. xxxix. Fig. 3. I. I. I. I. pollicis proxima: & Cowper. Myot. ann. 1724. Tab. Lxvi. Fig. 1. 191.

a Par-

rum regionum latere , cui alterum respondeat , intelligendi erimus.

## CAPUT IV.

*De situ musculi , qui in Calore.*

**H**ic , quem *Epicranium* <sup>a</sup> dicimus , maximam partem sub tegumentis communibus corporis situs , & tantum juxta auriculas testus Attollentibus auriculas , & earundem Anterioribus ; atque in superciliis , canthisque oculorum , exiguis portionibus subit Orbiculares palpebrarum.

## CAPUT V.

*De situ eorum , qui circa Auriculam.*

**S**ub iisdem tegumentis capiti à superiore parte auriculæ adjacet *Attollens auriculam* <sup>a</sup> : à priori *Anterior* <sup>b</sup> , à posteriore *Retrabentes* <sup>c</sup> ejusdem , eorumque *medius* mox infra *superiorem* , infraque medium *inferior* : & aliquando medio in fine subjeñti duo reliqui.

## CAPUT VI.

*De situ musculorum , qui in Facie.*

**S**ic & sub iisdem , supercilium totamque oram foraminis oculi palpebrasque *Orbicularis palpebrarum* <sup>a</sup> ambit.

K 3

<sup>a</sup> Partes ejus quæ dicuntur *Occipitales* , Eustach. Tab. XXI. A. A. quæ *Frontales* , Eustach. Tab. XLI. Fig. 1. E. E.  
<sup>a</sup> Eustach. Tab. XLI. Fig. 1. A.

<sup>b</sup> Santorin. Tab. III. Fig. 4. d.  
<sup>c</sup> Valsalv. Tab. 1. Fig. 3. C. C.  
<sup>a</sup> Eustach. Tab. XLI. Fig. 1. F. F. dext.  
<sup>b</sup> Cow-

ambit. Sub quo, & partim etiam sub Epicranio, supercilio osseo incumbit *Corrugator supercilii* <sup>b</sup>.

Alae nasi sub iisdem tegumentis *Compressor naris* <sup>c</sup> adiectus, cujus partem integit <sup>d</sup> *Levator labii superioris* alaeque nasi. Ab ejus latere se secundum nasum, qua is primo de gena surgit, ad os demittit *Levator labii superioris alaeque nasi* <sup>e</sup>, Et ab ejus latere per genam, *Levator labii superioris* <sup>f</sup>, *Zygomaticus minor* <sup>g</sup>, *Levator anguli oris* <sup>h</sup>, *Zygomaticus major* <sup>i</sup>, alius juxta alium. Omnes etiam hi tegumentis subjecti. Sed *Levator labii superioris alaeque nasi* <sup>k</sup>, itemque *Levator labii superioris* <sup>l</sup>, & *Zygomaticus minor* <sup>m</sup>, (quandoque & *Zygomaticus major*) etiam Orbiculari palpebrarum suis subjecti capitibus. *Levator anguli oris* Zygomatico minori <sup>n</sup>, & Levatori labii superioris <sup>o</sup>, suo similiter principio; sine autem, Zygomatico majori <sup>p</sup>. Et *Zygomatici majoris* portio juxta oris angulum subit Levatori Depressorique anguli, qua illi sese continuant.

A latere menti labiique inferioris, pariter sub tegumentis, in fine autem parte quadam sub Latissimo

b Cowper. Myot. ann. 1724. Tab.

xxv. Fig. 5. b. & Santorin. Tab.

1. I.

c Santorin. Tab. 1. a. a. sin. & a. dext.

d Santorin. Tab. 1. aa. sin. testus T.

e Eustach. Tab. xli. Fig. 1. H.

f Eustach. Tab. xli. Fig. 1. IK. dext.

g Eustach. Tab. xli. Fig. 1. L. & Santorin. Tab. 1. Q.

h Eustach. Tab. xli. Fig. 1. M. &

Fig. 3. E.

i Eustach. Tab. xli. Fig. 1. N.

k Santorin. Tab. 1. S. testus Orbiculari palp.

l Eustach. Tab. xli. Fig. 1. IK. dext. testus F. F.

m Santorin. Tab. 1. Q. testus Orbiculari palp.

n Eustach. Tab. xli. Fig. 1. M. testus L.

o Eustach. Tab. xxxii. f. testus c.

p Santorin. Tab. 1. O. testus P. q Eu.

mo colli, *Depressor anguli oris* <sup>q</sup>. Cui ab initio subjectus <sup>r</sup> *Depressor labii inferioris* <sup>r</sup>, caeterum in mento & labio inferiore, ubi dexter & sinister se ex parte decussant. In labio autem tectus portione Zygomatici majoris, quae excurrit per labium illud.

Infra septum nasi & in labio superiore, *Nasalis labii superioris* <sup>u</sup>, in labio sub extremis Levatoris alae nasi labiique superioris <sup>w</sup>, Levatoris labii superioris, Zygomatici minoris, caetero nudus, id est, sub tegumentis.

In bucca *Buccinator* <sup>x</sup>, sub pingui buccae, nisi quod ab initio post Masseterem delitescat <sup>y</sup>, dein post Zygomaticum majorem <sup>z</sup>, & in fine etiam subjectus sit Latissimo colli, Zygomatico minori, Levatori <sup>a</sup>, Depressorique anguli oris <sup>b</sup>.

Circum os *Orbicularis oris* <sup>c</sup>, qui in labio superiore majorem partem nudus, ex parte contactus Levatoribus labii superioris alarumque nasi <sup>d</sup>, Levatoribus labii superioris, Zygomaticis minoribus: in labio inferiore, sub Depressoribus ejus, tantum qua rubrum labium illud, nudus.

Mox infra nasum *Depressor alae nasi* <sup>e</sup>, primum magnam

q Eustach. Tab. xli. Fig. 1. P. dext.

r Eustach. Tab. xli. Fig. 1. Q. dext. tectus P. dext.

s Eustach. Tab. xli. Fig. 1. Q.

t Eustach. Tab. xli. Fig. 1. Q. Q.

u Santorin. Tab. 1. 1.

w Santorin. Tab. 1. 1. tectus g.

x Eustach. Tab. xli. Fig. 1. O. & Fig. 3. D.

y Eustach. Tab. xli. Fig. 1. O. tectus D.

z Eustach. Tab. xli. Fig. 1. O. tectus N.

a Eustach. Tab. xli. Fig. 3. D. tectus E.

b Eustach. Tab. xli. Fig. 1. O. tectus P. dext.

c Eustach. Tab. xli. Fig. 1. RR.

d Santorin. Tab. 1. K. tectus g.

e Cowper. Myot. ann. 1694. Fig. 3. D.

## 80 HISTORIAE MUSCULORUM

nam partem sub Orbiculari oris & Nasali labii superioris, dein sub Levatore labii superioris alaeque nasi, itemque Levatore labii superioris.

Ad mentum denique *Levator menti* <sup>f</sup>, sub Deprefore labii inferioris : nudus autem in mento.

### C A P U T VII.

*De situ eorum , qui in Mala , & in latere Calvae.*

**M**asseter <sup>a</sup> in mala , statim ante auris introitum , partim nudus , partim sub glandula parotide <sup>b</sup>, portioneque Zygomatici majoris <sup>c</sup>, aliquando & Latifissimi colli <sup>d</sup>.

A latere calvae post Epicranium , dein post Zygoma <sup>e</sup> & Masseterem <sup>f</sup>, *Temporalis* <sup>g</sup>.

### C A P U T VIII.

*De situ musculorum , qui in cavo Oculi.*

**A**postica hujus parte se secundum nervum opticum , globumque oculi , porrigunt in priorem, *Levator palpebrae superioris*, *Obliquus superior*, *Recti* quatuor. Superior *Levator* <sup>a</sup>, qui extremum suum per palpebram superiorem dilatat sub Orbiculari palpebrarum. Jux-

f Santorin. Tab. 1. q. & Cowper. Myot. ann. 1724. Tab. xxxi. 26.

& ann. 1694. Fig. 4. F. in utr. lat.

a Eustach. Tab. xli. Fig. 1. D.

b Santorin. Tab. 1. M. rectus 2.

c Eustach. Tab. xxvi. 1. l. rectus k.

d Santorin. Tab. 1. M. rectus n.

e Eustach. Tab. xli. Fig. 1. B. rectus C.

f Eustach. Tab. xli. Fig. 1. B. rectus D.

g Eustach. Tab. xli. Fig. 1. B. & Fig. 3. A.

a Eustach. Tab. xxxix. Fig. 2. G. b Eu-



Juxta Levatorem ab interiore parte *Obliquus superior*<sup>b</sup>,  
cujus tendo recurrit supra globum<sup>c</sup>, & ad postremum  
Levatori palpebrae<sup>d</sup>; & Recto attollenti<sup>e</sup> subit. Sub  
Levatore *Rectus attollens*<sup>f</sup>, cujus majorem partem Le-  
vator tegit<sup>g</sup>: partem autem, quae exteriora spectat,  
non<sup>h</sup>. Ab exteriori parte *Rectus abductor*<sup>i</sup>. Ab interi-  
ore mox infra Obliquum superiorem (cui etiam prin-  
cipio suo ex parte subjacet<sup>k</sup>) *Rectus adductor*<sup>l</sup>. Ab in-  
feriore *Rectus depressor*<sup>m</sup>. In fundi foraminis oculi prio-  
ri parte, sub extrema parte Recti depressoris<sup>n</sup>,  
quasi ex transverso jacet *Obliquus inferior*<sup>o</sup>, suo extre-  
mo inter Rectum abductorem globumque oculi ince-  
dens<sup>p</sup>.

## CAPUT IX.

*De situ eorum, qui in Auricula.*

**T**ragicus<sup>a</sup> in parte exteriori tragi. In eadem anti-  
tragi, *Antitragicus*<sup>b</sup>. In eadem helicis, qua il-  
la

b Eustach. Tab. xxxix. Fig. 2. E.  
& Fig. 4. D.

c Eustach. Tab. xxxix. Fig. 4. D. d.

d Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. E. j.  
rectus G.

e Eustach. Tab. xxxix. Fig. 3. D. j.  
rectus F.

f Eustach. Tab. xxxix. Fig. 2. H.  
& Fig. 3. F.

g Eustach. Tab. xxxix. Fig. 2. H.  
rectus G.

h Eustach. Tab. xxxix. Fig. 2. H.

i Eustach. Tab. xxxix. Fig. 2. H.

k Eustach. Tab. xxxix. Fig. 2i  
D. a. rectus E. a.

l Eustach. Tab. xxxix. Fig. 2. DD.

m Eustach. Tab. xxxix. Fig. 5. EE.

n Eustach. Tab. xxxix. Fig. 5. D.  
sub EE.

o Eustach. Tab. xxxix. Fig. 5. D.

p Eustach. Tab. xxxix. Fig. 5. ex-  
tremum D. rectum C.

a Valsalv. Tab. i. Fig. 4. B. & San-  
torin. Tab. iiii. Fig. 4. f.

b Valsalv. Tab. i. Fig. 4. D. & San-  
torin. Tab. iiii. Fig. 4. g.

c, San-

## 8a HISTORIAE MUSCULORUM

la cum capite cohaeret, *Major belicis* <sup>c</sup>. A cujus posteriore parte *Minor ejusdem* <sup>d</sup>. *Transversus* <sup>e</sup> ab ea parte, qua caput auricula spectat. Hi omnes solis tegumentis superintecti.

### C A P U T X.

*De situ musculorum, qui in Aure interna.*

**E**xternus mallei <sup>a</sup> statim sub cranio decurrit, quae ex eo nascitur capsulae articulum maxillae inferioris continentis pars posterior: sed extremo tendine per sinum extremi meatus auditorii se fert in tympanum. *Laxator tympani* <sup>b</sup> ad finem meatus auditorii, a superiore parte. *Tensor* <sup>c</sup> prope totus in tympano reconditus. In eodem *Stapedius* <sup>d</sup>.

### C A P U T XI.

*De situ musculorum, qui in Collo.*

**I**n collo sub tegumentis communibus *Latissimus colli* <sup>a</sup>, suo principio ex superiore parte pectoris, & ex humero veniens, sine conscendens malam, & ad angulum oris pertinens: quibusdam etiam ex ipsa mala veniens parte quadam <sup>b</sup>. A pectoris summo usque ad pro-

<sup>c</sup> Santorin. Tab. III. Fig. 4. b.

<sup>d</sup> Santorin. Tab. III. Fig. 4. c.

<sup>e</sup> Valsalv. Tab. I. Fig. 3. DD.

<sup>a</sup> Du Verney Pl. VI. Fig. 5. C D.

<sup>b</sup> Valsalv. Tab. III. Fig. 5. H.

<sup>c</sup> Du Verney Pl. VI. Fig. 5. EF.

& Cowper. Myot. ann. 1724.

Tab. XXVI. Fig. 2. 42.

<sup>d</sup> Du Verney Pl. V. Fig. 8. B. &

Pl. VIII. Fig. 1. c.

<sup>a</sup> Eustach. Tab. XXX. u. lin.

<sup>b</sup> Santorin. Tab. I. n.

processum mammillarem, *Sternomastoïdeus* <sup>c</sup>, & *Cleidomastoïdeus* <sup>d</sup>: uterque magnam partem sub Latissimo colli <sup>e</sup>. Ille autem primus, qui & suo principio, suaeque superiore parte <sup>f</sup> nudus. Ab ejus externo latere, juxta pectus, principium *Cleidomastoïdei* <sup>d</sup>, cujus reliquum Sternomastoïdeo subjectum <sup>e</sup>.

Infra os hyoïdes, à latere *Coracohyoïdeus* <sup>h</sup>, medius subjectus Sternomastoïdeo <sup>i</sup>, & Cleidomastoïdeo <sup>k</sup>: ab horum parte utraque, id est, tum juxta os hyoïdes <sup>l</sup>, tum juxta claviculam <sup>m</sup>, soli Latissimo colli: quin & principio suo longius veniens, primum inter Supraspinatum & Serratum magnum, dein sub Cucullari. A priori parte quasi è thorace adscendit *Sternohyoïdeus* <sup>n</sup>, qui nudus, nisi quod principium ejus delitescat post os pectoris <sup>o</sup> & claviculam <sup>p</sup>, ac Sternomastoïdetum <sup>q</sup>; & quod margo, qui respicit colli latus, Latissimo

L 2

colli

c Eustach. Tab. xxviii. y. dext. & sin.

d Eustach. Tab. xxviii. z. dext. & sin. & Tab. xxxii. A. dext.

e *Sternomastoïdeus*, Eustach. Tab. xxx. s. rectus u.

f Eustach. Tab. xxx. s.

g Eustach. Tab. xxviii. z. dext. rectus y. dext. sic & in sinist. latere.

h Eustach. Tab. xxviii. u u. dext. & sin. & Tab. xxxii. w w. dext. & Tab. xxxiii. Z. dext. & sin. & Tab. xli. Fig. 5. ll.

i Eustach. Tab. xxviii. u u. dext. rectus y. dext. sic & in sin. lat.

k Eustach. Tab. xxviii. u u. dext. rectus z. dextr. sic & in sin. lat. & Tab. xxxii. w w. dext. rectus A. dextr.

l Eustach. Tab. xxviii. u superi in utroque lat.

m Eustach. Tab. xxviii. u. inf. in utroq. lat.

n Eustach. Tab. xxviii. w. dext. & sin. & Tab. xxxii. x. dext. & Tab. xxxiii. c f. & Tab. xli. Fig. 5. m.

o Eustach. Tab. xxxiii. c. rectus g.

p Eustach. Tab. xxxiii. c. rectus d.

q Eustach. Tab. xxviii. w. rectus y. in utr. lat.

f Eu-

colli obiectus sit. Post hunc <sup>r</sup> *Sternothyreoideus* <sup>c</sup>, similiter de thorace, sed quia latior quam *Sternohyoideus*, post eum: in medio autem collo juxta os pectoris nudus est <sup>t</sup>: ab altero latere sequitur infra post *Cleidomastoideum*, tum post *Coracohyoideum* <sup>u</sup>, ab hujus denique latere utroque post *Latissimum colli*. Post superiorem partem *Sternohyoidei* <sup>w</sup>, & *Coracohyoidei* <sup>x</sup>, *Hyothyreoideus* <sup>y</sup>, qui à latere <sup>z</sup> *Coracohyoidei* similiter post *Latissimum colli*.

Inter maxillam & os hyoïdes primo *Biventer maxillae* <sup>a</sup>, à processu mammillari usque ad imum mentum, magnam partem sub *Latissimo*, ab initio pone glandulam parotidem <sup>b</sup>, finemque *Cleidomastoidei*, *Splenii capitis*, *Trachelomastoidei*, aliquando & *Sternomastoidei*, in fine nudus, tendine suo post glandulam submaxillarem. Juxta hunc *Stylohyoideus* <sup>c</sup>, supra primum quidem ventrem ejus, tendinemque <sup>d</sup>, antequam cum tendo ille perforet, post infra tendinem illum <sup>e</sup>; & cum

- <sup>r</sup> Eustach. Tab. xxviii. x. testus w. in utroq. lat. & Tab. xxxi. y. testus x. in dext. lat. & Tab. xxxiii. b b. sin. testus c. & Tab. xli. Fig. 5. n n. dext. testus m.  
<sup>s</sup> Eustach. Tab. xxviii. x. in utr. lat. & Tab. xxxii. y dext. & Tab. xxxiii. b c. dext. & b b. sin. & Tab. xli. Fig. 5. n n. dext. & n. sin.  
<sup>t</sup> Eustach. Tab. xxviii. x. dext. & sin.  
<sup>u</sup> Eustach. Tab. xxxiii. b b. sin. testus Z. sin. & Tab. xli. Fig. 5. n n. dext. testus ll.

- <sup>w</sup> Eustach. Tab. xxxiii. S. testus c.  
<sup>x</sup> Eustach. Tab. xxxiii. S. testus Z.  
<sup>y</sup> Eustach. Tab. xxxiii. S. & Tab. xli. Fig. 5. o.  
<sup>z</sup> Eustach. Tab. xxxiii. S.  
<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxviii. pp. & Tab. xxxiii. G.  
<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxi.  
<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxviii. r. & Tab. xxxv. l. sin. & Tab. xli. Fig. 5. i.  
<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxv. l. sin.  
<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxxv. l. sin.

f En.

cum non perforatur, qua perforari solet parte, post eum decurrit <sup>f</sup>: hujus quoque partem & parotis tegit, & submaxillaris, praetereaue qua infra Biventrem decurrit, Latissimus colli. Et cum *Stylohyoideus alter* <sup>g</sup> adest, is primo supra praecedentem, post pone eum, & pone Ceratoglossum, & Constrictoris medii pharyngis partem <sup>h</sup>, quae oritur ab ossiculo graniformi hyoidis, incedit. Supra Stylohyoideum <sup>i</sup>, etiam alterum <sup>k</sup>, sed profundius, similiter ex parte post parotidem & submaxillarem <sup>l</sup>, *Styloglossus* <sup>m</sup> primo decurrit, dein pone Mylohyoideum <sup>n</sup>, postremo sub lingua. Horum & *Stylopharyngeus* <sup>o</sup> à principio comes, fere jacens pone Styloglossum, Stylohyoideum, Biventrem maxillae, nudus inter Styloglossum & Stylohyoideum: sed infra Styloglossum descendit secundum latus pharyngis <sup>p</sup>. Post Biventris ventrem secundum <sup>q</sup> *Mylohyoideus* <sup>r</sup>, à quo tamen ab utroque latere nudus est <sup>s</sup>, ab altero ejus latere rectus Latissimo colli, ab altero glandula

L 3 sub-

f Eustach. Tab. xxxv. 11. dext. rectus m n. dextr.

g Eustach. Tab. xli. Fig. 11. K.

h Eustach. Tab. xli. Fig. 11. K. rectus L.

i Eustach. Tab. xli. Fig. 5. d. dext. supra i.

k Eustach. Tab. xli. Fig. 11. F. supra K.

l Eustach. Tab. xli. Fig. 5. d. rectus c.

m Eustach. Tab. xxxiii. M. & Tab. xli. Fig. 5. d. in utroq. lat. & Fig. 8. H. & Fig. 11. F.

n Eustach. Tab. xli. Fig. 5. d.

dext. rectus a.

o Eustach. Tab. xxxiii. P. & Tab. xli. Fig. 8. F. & Fig. 11. I. & Tab. xlii. Fig. 4. G. dext. & sin. & Fig. 6. O. dext. & sin.

p Eustach. Tab. xlii. Fig. 6. O. str. lat.

q Eustach. Tab. xxxiii. H. rectus G. & Tab. xxxv. k k. rectus n. in utroq. lat.

r Eustach. Tab. xxxiii. H. & Tab. xxxv. k k. in utroq. lat. & Tab. xli. Fig. 5. a.

s Eustach. Tab. xxxv. k k. in utroq. lat.

t Eustach.

submaxillari fere ex toto. Supra Mylohyoideum <sup>t</sup> *Geniohyoideus* <sup>u</sup>, à mento ad hyoïdes : hujus autem finis cum latior solito est, basemque hyoïdis fere usque ad cornu tenet, ea parte subjectus extremo Stylohyoideo, & aponeurosi, qua Biventer alligatus hyoïdi. Post hos omnes sequuntur *Ceratoglossus*, *Basioglossus*, *Chondroglossus*, *Genioglossus*. Et *Ceratoglossus* <sup>v</sup> à latere post Stylohyoideum, Biventrem maxillae, Styloglossum <sup>1</sup>: ab his praeterea liber infra Stylohyoideum, deinde inter eum & Styloglossum ac Mylohyoideum : partem ejus glandula submaxillaris contegit. A Ceratoglossi parte priore *Basioglossus* <sup>1</sup>, qui post Stylohyoideum, Biventrem, Mylohyoideum, Styloglossum <sup>2</sup>: juxta hyoïdes autem nudus inter Mylohyoideum, Biventrem maxillae, Stylohyoideum : nudus & à latere Mylohyoidei supra Biventris tendinem, nudus & infra tendinem illum & Stylohyoideum. Adde quod pars ejus glandula submaxillari integatur, & extremo Geniohyoidei, si illud latius sit. Post Basioglossum, postque Genioglossi fasciculum, qui per latus pharyngis incedit, *Chondroglossus*. Post Mylohyoideum, Geniohyoideum <sup>a</sup>, glandulam sublingualem, Basioglossum <sup>b</sup>, Ceratoglossum, *Genioglossus* <sup>c</sup>. Inter eum & Ceratoglossum

t Eustach. Tab. xli. Fig. 8. M. testus N.

u Eustach. Tab. xxxiii. I. & Tab. xli. Fig. 7. b. & Fig. 8. M.

w Eustach. Tab. xxxiii. N. & Tab. xli. Fig. 8. I.

x Eustach. Tab. xxxiii. N. testus M. & Tab. xli. Fig. 8. I. testus H.

y Eustach. Tab. xxxiii. L. & Tab.

xli. Fig. 8. K.

z Eustach. Tab. xxxiii. L. testus M.

& Tab. xli. Fig. 8. K. testus H.

a Eustach. Tab. xxxiii. K. pone I. & Tab. xli. Fig. 8. L. pone M.

b Eustach. Tab. xxxiii. K. testus L. & Tab. xli. Fig. 8. L. testus K.

c Eustach. Tab. xxxiii. K. & Tab.

xli. Fig. 8. L. & Fig. 11. A. & B.

d An

sum cum Basioglossò , per inferiora. linguae porrectus *Lingualis* <sup>d</sup> , in linguae apice nudus.

Sequentes circum pharyngem siti sunt. Eorum primi *Constrictores pharyngis* , *inferior* , *medius* , *superior* , ambiunt eum , quæ latus , quæque vertebrae colli spectat , alius supra alium. Inferiorem itaque partem *Inferior* <sup>e</sup> , cujus principium partim subiectum glandulae thyreoideae <sup>f</sup> , partim Sternothyreoideo , & Hyorhyneoideo , caeterum & à latere , & à posteriore parte liber. *Medius* <sup>g</sup> mediam , qui ab initio subjacet Cera-roglossò <sup>h</sup> & Basioglossò , dein à latere partim post Stylohyoideum & Biventrem sequitur , partim nudus est , sui autem extremi inferiore parte Constrictori inferiori subit <sup>i</sup>. Superiorem partem *Superior* <sup>k</sup> : is vero à latere post Stylopharyngei principium , postque Styloglossum sequitur , à posteriori parte sine suo subjacet Constrictori medio <sup>l</sup>. Sub ambientibus hisce <sup>m</sup> , partim à latere , partim à posteriori parte pharyngis descendit *Salpingopharyngeus* <sup>n</sup> , & ab ejus latere externo *Palatopharyngeus* <sup>o</sup> : à latere sub iisdem Constrictoribus <sup>p</sup> , praeter-

ter-

d An Eustach. Tab. xli. Fig. 11. C?

e Eustach. Tab. xli. Fig. 8. R. & Tab. xlii. Fig. 4. K.

f Eustach. Tab. xli. Fig. 8. R. testus X.

g Eustach. Tab. xli. Fig. 8. Q. & Fig. 11. L. & Tab. xlii. Fig. 4. I. dext. & sin.

h Eustach. Tab. xli. Fig. 8. Q. testus I.

i Eustach. Tab. xlii. Fig. 4. I. sin. testus K.

k Eustach. Tab. xlii. Fig. 4. H.

dext. & sin.

l Eustach. Tab. xlii. Fig. 4. H. testus I. in utr. lat.

m *Palatopharyngeus* , sub medio , Eustach. Tab. xli. Fig. 11. P. testus L. & Tab. xlii. Fig. 4. L. testus I. dext.

n Eustach. Tab. xlii. Fig. 6. L.

o Eustach. Tab. xlii. Fig. 6. M N. in utroq. lat.

p Submedio , Eustach. Tab. xli. Fig. 11. P. testus L. & Tab. xlii. Fig. 4. L. testus I. dext.

q Eu-

terquam sub superiore, *Stylopharyngei* pars inferior <sup>q</sup>. Sed *Salpingopharyngeus* suo praeterea principio supra Constrictorem superiorem nudus est. Et *Palatopharyngeus* ex palato molli venit <sup>r</sup>, ab coque deinde per latus descendit, Constrictorem superiorem subiturus. Denique ante Palatopharyngeum & tonsillam, inter linguam & molle palatum, *Constrictor isthmi faucium* <sup>r</sup>, qui & per palatum molle excurrit. Hic, & qui proxime sequuntur, etsi proprie in collo non siti, huc tamen commodissime referuntur.

Jam *Levator palati molli* <sup>t</sup> supra Constrictorem pharyngis superiorem <sup>v</sup> sub capite <sup>w</sup> decurrit, inque hoc itinere inter Salpingopharyngeum & Palatopharyngeum incedit medius <sup>z</sup>. A cuius externo latere, juxta internam partem Pterygoidei interni, *Circumflexus palati* <sup>y</sup>. Hujus, & *Levatoris* finis se per palatum molle explicant, ut mox dicetur.

In ipso palato molli, qua illud os spectat, primus *Constrictoris isthmi faucium* finis. <sup>z</sup> Supra hunc, principium *Palatopharyngei*, quod latius, coque tantum ex parte obtet-

q Eustach. Tab. XLII. Fig. 6. O P. sinist. & O Q. dext.

r Valsalv. Tab. v. Fig. 2. supra H. in utr. lat. & Tab. vi. 2. 2.

s Decurrit per marginem L. Bidloo Anat. Tab. XIII. Fig. 1.

t Eustach. Tab. XLII. Fig. 4. F. in utroq. lat. & Fig. 6. F F. in fin. lat. & F. in dext. & Valsalv. Tab. iv. n. dext.

u Eustach. Tab. XLII Fig. 4. F. su-

pra H. in utroq. lat.

w Valsalv. Tab. iv. n. dext.

x Eustach. Tab. XLII. Fig. 6. F F. dext. inter M N. dextr. & L.

y Eustach. Tab. XLII. Fig. 13. 6. & Tab. XLII. Fig. 4. & 6. DE. in utroq. lat. & Valsalv. Tab. iv. m. in utr. lat. -

z Cowper. Myot. ann. 1721. Tab. XXIX. Fig. 1. finis 53. supra H. in utr. lat.

a Eu-



obtectum. Supra hoc, *Levatoris palati molis* extremum<sup>a</sup>, & *Circumflexi*<sup>b</sup>. Pars etiam *Palatopharyngei* supra extremum *Levatoris*. Supremus omnium *Azygus uvulae*<sup>c</sup>, etiam per uvulam deductus.

Qui supersunt, in larynge siti. *Cricothyreoideus*<sup>d</sup> à priori parte in lmo, sub *Sternohyoideo*, *Sternothyreoideo*, *Constrictore pharyngis inferiore*, glandula *thyreoidea*. Cartilagini *cricoideae* à posteriore parte adjacet *Cricoaerytaenoideus posticus*<sup>e</sup>. Supra eum *Arytaenoideus obliquus*<sup>f</sup>, quorum sinistrum dexter medium contegere solet<sup>g</sup>: & post hos<sup>h</sup> *Arytaenoideus transversus*<sup>k</sup>, magnam partem ab eis liber<sup>k</sup>. Hi vero posteriores omnes membrana pharyngis velati, praeter longitudinem mediam *Arytaenoidei obliqui sinistri*, quam decussat dexter; praeterque *Transversus* partem, cui obliqui adjecti. *Cricoaerytaenoideus lateralis*<sup>l</sup>, & *Thyreoarytaenoideus*<sup>m</sup>, sub lateribus *thyreoideae* haerent: ille autem ab hujus parte posteriore & eadem inferiore.

## M

## C A-

a Eustach. Tab. XLII. Fig. 6. extremum F. F. in lat. sin. & F. in dext. & Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XXVIII. Fig. 2. extremum 54. inter K: & H. in utr. lat.

b Valsalv. Tab. IV. m. ultra l. in utr. lat.

c Heister. Comp. an. Tab. VIII. Fig. 78. k.

d Eustach. Tab. XLII. Fig. 8. V. dext. & VV. sin. & Fig. 11. S. in utroq. lat.

e Eustach. Tab. XLII. Fig. 8. V. dext.

& VV. sin. tectus X.

f Eustach. Tab. XLII. Fig. 2. K. in utroq. lat. & Fig. 1. N.

g Eustach. Tab. XLII. Fig. 2. G. & HH. & Fig. 1. H. & II.

h Eustach. Tab. XLII. Fig. 2. HH. tectus G.

i Eustach. Tab. XLII. Fig. 2. FFFF. tectus HH. G.

k Eustach. Tab. XLII. Fig. 2. FFFF. & Fig. 1. GGG.

l Eustach. Tab. XLII. Fig. 1. L.

m Eustach. Tab. XLII. Fig. 1. K.

## CAPUT XII.

De situ eorum, qui sub Mala.

**P**ost erectum maxillae latus *Pterygoidei* delitescunt. Primus à parte facium *internus*<sup>a</sup>. Post ejus partem superiorem *externus*<sup>b</sup>, cujus extremum ab eo nudum<sup>d</sup>. *Uterque* ab exteriori parte Temporalem contingit, *externus* etiam Masseterem, de quibus supra dictum.

## CAPUT XIII.

De situ musculorum, qui in Pectore.

**P**ectoralis<sup>a</sup> in pectore, mox infra collum, primus post tegumenta communia, nisi quod à superiori parte veletur colli Latissimo<sup>b</sup>: sed & à pectore secundum axillam pertinet ad brachium, juxta quod subjacet Deltoïdi. Post Pectoralem *Serratus anticus*<sup>c</sup>, itemque *Subclavius*<sup>d</sup>, supra Serratum, mox infra claviculam. Utrumque autem juxta humerum Deltoïdes tegit. *Subclavius* etiam à Pectorali & Deltoïde, in intervallo eorum, nudus, postque solum Latissimum colli.

C.A.

a Eustach. Tab. xli. Fig. 13. r. &amp;

Tab. xxx. F.

b Eustach. Tab. xli. Fig. 13. A.

dext. rectus r.

c Eustach. Tab. xli. Fig. 13. A. in

utroq. lat.

d Eustach. Tab. xli. Fig. 13. A.

dext.

a Eustach. Tab. xxviii. F. in utroq.

lat. &amp; Tab. xxx. B. in utr. lat.

b Eustach. Tab. xxx. B. rectus u.

in utr. lat.

c Eustach. Tab. xxxii. I.

d Eustach. Tab. xxxii. G.

a Eue

## CAPUT XIV.

*De situ ejus, qui in latere Thoracis.*

**S**erratus magnus <sup>a</sup> ad latus thoracis sceleti applicatus, priore parte sua partim situs pone Serratum anticum <sup>b</sup> & Subclavium <sup>c</sup>, partim tum inter hos <sup>d</sup>, tum infra anticum, pone Pectoralem <sup>e</sup>, partim post tegumenta communia sola <sup>f</sup>, infra Pectoralem. Inde magnam partem per latus retrorsum it <sup>g</sup>, supra quidem in humero post Latissimum colli, Cucullarem, Coracohyoideum, Levatorem scapulae, dein post Subscapularem, ipsamque adeo scapulam <sup>h</sup>: infra autem post Latissimum dorsi <sup>i</sup>.

## CAPUT XV.

*De situ musculorum in Abdomine.*

**P**rimus in abdomine est *Obliquus externus* <sup>a</sup>, quod quia molle, una cum parte tum priore, tum laterali inferioris thoracis partis ab uno latere amplectitur. Caput ejus, quod à costa quinta procedit, Pectorali ex

M 2

parte

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxviii. G. in utr. lat. & Tab. xxxii. MM. dext. & Tab. xxxiii. m. & Tab. xxxvi. f.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxii. MM. dext. testus I.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxii. MM. dext. testus O.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxii. M. dext. super.

<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxviii. G. testus F.

in utr. lat.

<sup>f</sup> Eustach. Tab. xxviii. G. in utr. lat. g. Eustach. Tab. xxxvi. f.

<sup>h</sup> Eustach. Tab. xxviii. G. testus H. in utr. lat. & Tab. xxx. D. testus E. & Tab. xxxi. V. testus S.

<sup>i</sup> Eustach. Tab. xxviii. IK. in utroque lat. & Tab. xxx. FF. dext. & Tab. xxix. W. in utr. lat. & Tab. xxxi. W.

<sup>b</sup> Eu-

parte obductum <sup>b</sup> : sequentia tria Serrato magno : illaque ejus pars , quae est inter costas inferiores & os ilium , aliquando dorsi Latissimo <sup>c</sup>. Angulosa capita sua pectinatum inserit similibus Serrati magni <sup>d</sup> & Latissimi dorsi <sup>e</sup> : illius quidem superiora tria , quatuorve , cum novem habet : quartum angulo , quem facit caput Serrati quod à costa octava , cum capite Latissimi quod à nona : quatuor quae supersunt , Latissimi principiis à costis , & ab osse ilium ; & cum Latissimus à costa duodecima non oritur , caput Obliqui septimum se inserit capiti ejus quod à costa undecima , illique quod à spina ilium : imum quodammodo etiam duobus inferioribus extremis Serrati postici inferioris. Externo *internus* <sup>f</sup> subjacet <sup>g</sup> : sed tendinum ejus principium , itemque partis carneae initium , subjacent Latissimo dorsi <sup>h</sup> ; in quibusdam etiam inter Obliquum externum , Latissimum dorsi , spinamque ilium , quae caeteroqui Latissimo tegitur , solis tectus tegumentis : <sup>i</sup>. Interno *Transversus* <sup>k</sup> , qui & Serrato postico inferiori sui principii superiori parte , in lumbis : margini thoracis , quae à costis oritur : quae à sexta , etiam post  
Dia-

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxv. A. tectus y. & Tab. xxviii. IK. tectus F. in utr. lat.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxx. FF. dext. tectus E. & Tab. xxxi. W. tectus S.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxiii. I. insertus G. in utr. lat. & Tab. xxx. F. insert. D. & Tab. xxxi. W. insert. V.

<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxxi. W. insert. T. T. T.

<sup>f</sup> Eustach. Tab. xxxii. R. & Tab.

xxix. V. in utroque latere : & Tab. xxxvi. i.

<sup>g</sup> Eustach. Tab. xxix. V. tectus W. in utr. lat.

<sup>h</sup> Eustach. Tab. xxix. V. tectus R. in utr. lat.

<sup>i</sup> Eustach. Tab. xxix. V. in utroque lat.

<sup>k</sup> Eustach. Tab. xxxiii. q. in utr. lat. & Tab. xxxvii. o. in utr. lat. & Tab. xxxviii. o. in utr. lat.

1 Eu.

Diaphragma capite illo delitescens. *Rectus*<sup>1</sup> per longitudinem abdominis secundum lineam albam porrectus, primum sub communi Obliquorum & Transversi aponeurosi, dein sub illa Obliquorum<sup>m</sup>, juxta pubem sub Pyramidali<sup>n</sup>: ex parte thoracem conscendit sub aponeurosi Obliqui externi, & aliquando etiam finem suum Pectoralis initio subjicit. In pube, supraque eam, *Pyramidalis*<sup>o</sup> situs, post aponeurosem Obliquorum & Transversi.

## CAPUT XVI.

*De situ ejus, qui circa Funem spermaticum & Testem.*

**C**remaster<sup>a</sup> sub solis se explicat integumentis inguinis & scroti. Sed caput ejus longius<sup>b</sup> à principio post Obliquum externum delitescit<sup>c</sup>, dein pariter cum brevior<sup>d</sup> nudum<sup>e</sup>.

## CAPUT XVII.

*De situ musculi, qui inter Abdomen Thoracemque.*

**D**iaphragma<sup>a</sup> thoracem ab abdomine determinat. Principiis suis adjacet priori lumborum parti<sup>b</sup>.

M 3

C A-

1 Eustach. Tab. xxxiii. Q. & Tab. xxxiii. n.

m Sub illa *Obliqui interni*, Eustach. Tab. xxxiii. Q. testus R-β.

n Eustach. Tab. xxxiii. n. testus u.

o Eustach. Tab. xxxiii. u.

a Eustach. Tab. xxviii. O. in utr. lat. & Tab. xxxiii. r. dext. & Tab. xxxiii. w x. in utroq. lat.

b Eustach. Tab. xxviii. O. in utroq. lat. & Tab. xxxiii. r. dext. & Tab.

xxxiii. x. in utr. lat.

c Eustach. Tab. xxviii. O. testus IK. in utr. lat.

d Eustach. Tab. xxxiii. w. in utr. lat.

e Eustach. Tab. xxviii. O. in utr. lat.

a Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 7. Δ.

b Ibid.

a Vesal.

## CAPUT XVIII.

*De situ ejus, qui est sub Pectore.*

**H**ic, id est, *Triangularis sterni*<sup>a</sup>, in Thoracis crate post costarum verarum additamenta cartilaginea, ipsarumque illarum costarum extrema.

## CAPUT XIX.

*De situ musculorum, qui in Lumborum & Coxarum parte priore.*

**I**bi lumborum sceletilateri adjectus *Psoas parvus*<sup>a</sup>, cum *magno*<sup>b</sup>: & ille quidem huic incumbit, mediumque, caetero nudum, per longitudinem usque ad ischion tegit<sup>c</sup>. *Utriusque* primum initium sub Diaphragmate<sup>d</sup>. *Magnus* & ex parte testus Diaphragmatis capite secundi paris. Idem à lumbis ad inguen, ulteriusque<sup>e</sup> ad femur pertinens est. In interna ilium amplitudine sedet *Iliacus internus*<sup>f</sup>, cujus pars os sacrum spectans subjacet *Psoae magno*<sup>g</sup>, cum quo & ad femur, sed ab externo ejus latere, descendit<sup>h</sup>: suntque *ambo* in inguine nudi: *Iliacus* juxta femur subiectus

<sup>a</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 8. β. & Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxxiiii. Fig. 1. 77. in utr. lat.

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxviii. q.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxviii. rrs. sin.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxviii. q. tegens rrs. sin.

<sup>d</sup> *Magni*, Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 7. t. testus Δ.

<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxviii. Q. in utr.

lat. & Tab. xxxiii. Z. dext. & Tab. xxxiii. Θ. in utr. lat. & Tab. xxxviii. rrs. αβ. sin.

<sup>f</sup> Eustach. Tab. xxxviii. u. in utr. lat.

<sup>g</sup> Eustach. Tab. xxxviii. u. sin. testus rrs. sin.

<sup>h</sup> Eustach. Tab. xxxiii. Δ. in utr. lat. & Tab. xxxviii. u. in utr. lat.

jectus Sartorio Rectoque, *Psoas* Iliaco ex parte. In lumbis autem ab externo latere *Psoae* magni, partimque post eum <sup>i</sup> haeret *Quadratus lumborum* <sup>k</sup>: sed extremus finis ejus sub Diaphragmate <sup>l</sup>. Post *Psoam* magnum & *Quadratum lumborum*, postremi eorum, qui in lumborum parte posteriore: post utrumque *Intertransversarii lumborum*: post *Quadratum* praeterea caput commune *Sacrolumbalis* & *Longissimi dorsi*, interveniente tamen principio tendineo *Transversi abdominis* <sup>m</sup> cum communi principio *Serrati postici inferioris* & *Obliqui interni abdominis*.

## C A P U T X X.

*De situ eorum, qui circa Perinaeum viri.*

**I**n perinaeo viri *Accelerator* <sup>a</sup>, ex parte testis *Sphincter* externo ani, Ab *Acceleratoris* latere *Erector penis* <sup>b</sup>.

## C A P U T X X I.

*De situ eorum, qui in Genitalis muliebris ambitu.*

**C**onstrictor cunni <sup>a</sup> mox sub tegumentis. A cujus latere *Erector clitoridis* <sup>b</sup>.

## C A-

<sup>i</sup> Eustach. Tab. xxxviii. p. fin. testis rra. fin.

<sup>k</sup> Eustach. Tab. xxxviii. p. in utr. lat. & Tab. xxxix. Fig. 1. n. in utr. lat.

<sup>l</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. xi. Tab. 7. u. sub Δ.

<sup>m</sup> Eustach. Tab. xxxviii. a. post p. in utr. lat.

<sup>a</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. xi. Tab. Cap. xlix. Fig. 1. H. 1.

<sup>b</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. xi. Tab. Cap. xlix. Fig. 1. K. L.

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xiv. Fig. 1. M. in utr. lat.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xiv. Fig. 1. N. in utr. lat.

## CAPUT XXII.

De situ eorum, qui circa Anum.

**S**phinctere externo<sup>a</sup>, folis contecto tegumentis, anus circumdatus sub cute, à coccyge in perinaeum. Ab Ischii tubere in perinaeum porrectus *Transversus perinaei*<sup>b</sup>, in fine subjectus Sphincteri externo. Inter hunc Transversum, Erectoremque penis, & Levatoris ani partem quae venit ex angulo, facto ex conjunctione capitis penis cum corpore spongioso urethrae, nudus *Transversus perinaei alter*<sup>c</sup>, qui & ex parte supra Levatoris partem mododictam<sup>d</sup>, mucronemque priorem Sphincteris externi: in foemina<sup>e</sup> nudus inter Transversum perinaei & Erectorem clitoridis. Ad anum ex pelvi venit *Levator ani*<sup>f</sup>, qui magnam partem nudus, ex parte supra Transversos perinaei<sup>g</sup>, Erectoremque penis, (aut clitoridis) in fine Sphinctere externo extrinsecus contectus<sup>h</sup>, à latere adjacet Obturatori interno. Supra ejus finem partim Gluteo magno, partim ligamenti ab ischio ad sacrum deductis, aliquando & Obru-

a In viro, Eustach. Tab. xxxix. c.

& Tab. xxxvi. r. In foemina, Eustach. Tab. xiv. Fig. 1. K.

b In viro, Cowper Myotom. ann. 1724. Tab. xix. p. in utr. lat. & Santorin. Tab. 111. Fig. 5. I. in utr. lat. In foemina, Santorin. Tab. 11. Fig. 1. g. in utr. lat.

c Santorin. Tab. 111. Fig. 5. H. in utr. lat.

d Santorin. Tab. 111. Fig. 5. H. dext. supra F.

e Santorin. Tab. 11. Fig. 1. F.

f Eustach. Tab. xxxix. d. in utroque latere: & Tab. xxxvi. q. in utroque latere: & Tab. xxxvii. r. in utroque lat.

g In viro, Santorin. Tab. 111. Fig. 5. GK. supra H. I. In foemina, Santorin. Tab. 11. Fig. 1. HM. supra g. F.

h Eustach. Tab. xxxvi. q. tectus r. in utr. lat. & Tab. xxxvii. r. tectus p. in utr. lat.

i Eus



Obturator interno, qua ille se flectit, itemque Pyri-formi, subjectus *Coccygeus*<sup>i</sup>. A priori parte coccygis, extremique ossis sacri, *Curvator Coccygis*. Rectum ipsum, mox supra anum, *Sphincter ani internus*<sup>k</sup> proxime ambit. In viro ultra priorem partem Levatoris ani *Compressor prostatae*<sup>l</sup>.

## CAPUT XXIII.

*De situ musculorum, qui in Dorso cum Lumborum posteriore parte & Cervice.*

In dorso & cervice est *Cucullaris*<sup>a</sup>, qui etiam super humerum se in priora flectit<sup>b</sup>, ubi parte quadam *Latissimo colli* subjacet<sup>c</sup>, caeterum nudus.

In lumbo & dorso, *Latissimus dorsi*<sup>d</sup>, & ipse maximam partem nudus, & tantum qua incipit, à superiore parte intectus *Cucullari*<sup>e</sup>. Ultra dorsum autem ad brachium secundum axillae posteriorem partem decurrit, ibi se ex parte subjiciens *Tereti majori*<sup>f</sup>.

Post *Cucullarem* juxta scapulam *Rhomboïdeus major*<sup>g</sup> sequitur, *minorque*<sup>h</sup>, qui mox supra majorem, eumque ex parte tegit. *Majoris* autem pars inferior juxta scapulam inter *Cucullarem* & *Latissimum*, sub solis

N in-

i Eustach. Tab. xxxvi. s.

k Eustach. Tab. x. Fig. 2.

l Santorin. Tab. 111. Fig. 5. V.

a Eustach. Tab. xxix. P. & Tab. xxxi. M. in utr. lat.

b Eustach. Tab. xxviii. C. in utr. lat.

c Eustach. Tab. xxx. t. tectus u. in utr. lat.

d Eustach. Tab. xxix. R. in utr. lat. & Tab. xxxi. S. in utr. lat. & Tab. xxx. E. & Tab. xxviii. H. in utr. lat.

e Eustach. Tab. xxix. R. sin. tectus P.

f Eustach. Tab. xxx. E. tectus x.

g Eustach. Tab. xxix. O. dext.

h Eustach. Tab. xxix. N.

i Eu-

integumentis<sup>i</sup>: ima etiam sub Latissimo<sup>k</sup>. Sub utroque Rhomboideo<sup>l</sup> *Serratus posticus superior*<sup>m</sup>: pars tamen ejus à superiore parte minoris eminet<sup>n</sup>, contingens Cucullarem: pars extrema Serrato magno subiecta, ipsique adeo scapulae<sup>o</sup>: pars, quae juxta superiora scapulae, Levatori scapulae<sup>p</sup>.

In lumbo autem sub Latissimo, *Serratus posticus inferior*<sup>q</sup>. Sed lamellarum tendinearum, quibus incipit, interna latet sub communi principio Longissimi dorsi & Sacrolumbalis.

In cervice deinde, à latere *Levator scapulae*<sup>r</sup>, inferiore parte sui situs post Cucullarem<sup>r</sup>, media post sola tegumenta communia<sup>r</sup>, superiore post Sternomastoïdeum<sup>u</sup> & Cleidomastoïdeum. Dein post Cucullarem<sup>w</sup> & Serratum posticum superiorem<sup>x</sup>, *Splenius capitis*<sup>y</sup>, qua se inferit, se sub Sternomastoïdeo condens<sup>z</sup>, & priusquam ad insertionem venerit, nudus<sup>a</sup>. Mox infra

i Eustach. Tab. xxix. O. sin. & Tab. xxxvi. Q. in lat. utr.

k Eustach. Tab. xxix. O. sin. tectus R. sin. & Tab. xxxi. Q. tectus S. in utr. lat.

l Sub minore, Eustach. Tab. xxix. M. tectus N.

m Eustach. Tab. xxix. M. & Tab. xxxvi. c.

n Eustach. Tab. xxix. M.

o Eustach. Tab. xxxvi. c. tectus scapula.

p Eustach. Tab. xxix. M. tectus L. & Tab. xxxvi. c. tectus d.

q Eustach. Tab. xxxvi. gh.

r Eustach. Tab. xxxi. L. in utr. lat. & Tab. xxix. L. & Tab. xxxvi.

d. & Tab. xxxiii. X.

s Eustach. Tab. xxxi. L. tectus M. in utr. lat.

t Eustach. Tab. xxxi. L. in utr. lat.

u Eustach. Tab. xxxi. L. tectus H. in utr. lat.

w Eustach. Tab. xxix. I. sin. tectus P. & Tab. xxxi. L. tectus M. in utr. lat.

x Eustach. Tab. xxix. I. dext. tectus M.

y Eustach. Tab. xxix. I. in utr. lat. & Tab. xxxi. L. in utr. lat. & Tab. xxxvi. c.

z Eustach. Tab. xxxi. I. tectus H. in utr. lat.

a Eustach. Tab. xxxi. I. in utr. lat. b Eu-

fra eum *Splenius colli* <sup>b</sup>, qui pariter Cucullari & Serrato postico superiori, sineque suo Sternomastoïdeo subiectus, & ante finem nudus; praeterca autem qua incipit, Rhomboïdeo majore tegitur; qua desinit, Levatore scapulae. Post Splenios *Biventer cervicis* <sup>c</sup>, praeterquam in nucha, & ab inferiore parte: in nucha enim statim post Cucullarem & Sternomastoïdeum, saepe etiam ex parte post sola tegumenta, inter Cucullarem, Splenium capitis, Sternomastoïdeum: ab inferiore parte post Serratum posticum superiorem, Transversalem cervicis, Longissimum dorsi, aliquando & post Rhomboïdeum majorem. Biventri huic <sup>d</sup>, & ab ejus externo latere Spleniis, supra Cucullari & Sternomastoïdeo, infra Transversali cervicis <sup>e</sup>, *Complexus* <sup>f</sup> subjacet: verum quandoque qua parte Cucullari solet subjacere, nudus est. Huic ab externo latere adiectus *Trachelomastoïdeus* <sup>g</sup>, huic *Transversalis cervicis* <sup>h</sup>, huic *Cervicalis descendens*. Inter quos *Trachelomastoïdeus* Splenio capitis & colli <sup>i</sup> subjacet, atque etiam Transversali, sua inferiore parte <sup>k</sup>, dein portioni Longissimi ad caput pertingenti, dein Levatori scapulae inter extrema Splenii colli & capitis. *Transversalis* ab infe-

N 2

riore

b Eustach. Tab. xxxvii. c.

c Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 13. ABCD.

d Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 13. GG. subiectus ABCD.

e Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 13. GG. subiectus H.

f Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 13. GG.

g Eustach. Tab. xxxvii. b. in utr. lat. &amp; Tab. xxxix. Fig. 1. h. &amp; Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 13. EF.

h Eustach. Tab. xxxvii. d.

i Eustach. Tab. xxxvii. b. sin. tectus c.

k Eustach. Tab. xxxvii. b. dext. tectus d.

1 Eu-

riore parte Serrato postico superiori, tum Longissimo, tum Splenio colli, Cucullari, Levatori scapulae. *Cervicalis* sua inferiore parte Sacrolumbali, inter quem Longissimumque emergit: cum emerfit; Serrato postico superiori, Cucullari, Levatori scapulae.

Jam post Latissimum dorsi<sup>l</sup>, Serratique postici inferioris & Obliqui interni abdominis lamellam, earum, quibus incipiunt, exteriorem, ac post Cucullarem, Rhomboideum majorem<sup>m</sup>, Serratum posticum superiorem, per lumbum dorsumque secundum spinam adscendunt *Sacrolumbalis*<sup>n</sup> & *Longissimus dorsi*<sup>o</sup>. Pars autem *Sacrolumbalis* inter Latissimum, Cucullarem, & Rhomboideum, nuda. Et *Longissimus* per longitudinem ex parte sub Sacrolumbali<sup>p</sup>: illa quoque ejusdem pars, quae ad Trachelomastoideum accedit, ulterius a dorso per collum inter Complexum & Transversalem cervicis incedit, juxta caput sub Spleniis. *Spinalis dorsi*<sup>q</sup>, proximus spinis, sub Serrato postico inferiore, Latissimo dorsi, Cucullari, Splenio colli<sup>r</sup>, aliquando & Rhomboideo majore.

*Semispinalis dorsi* in dorso sub Longissimo, Spinali dorsi, Cucullari, Rhomboideo majore, Splenio utroque. Continuoque supra eum *Spinalis cervicis*<sup>s</sup>, sub Com-

l Eustach. Tab. xxix. Q. testus

R. dextr.

m Eustach. Tab. xxix. Q. testus

O. dextr.

n Eustach. Tab. xxxvi. l y.

o Eustach. Tab. xxxvi. l d. & Tab.

xxxvii. k h.

p Eustach. Tab. xxxvi. l d. testus

l y.

q Eustach. Tab. xxxvii. l. in utroq.

lat.

r Eustach. Tab. xxxvii. l. sin. testus

c.

s Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. f.

t Cow-

Complexo, Biventre cervicis, Spleniis. Inter spintas vertebrarum colli *Interspinales cervicis*<sup>t</sup>, inferiores quidem tres post Splenium capitis, eorundemque secundus & tertius ex parte post Biventrem cervicis, sequentes post Biventrem illum, & quandoque etiam superiores duo post Spinalem cervicis. Supra Interspinales Spinalemque, post Complexum, *Rectus posticus major capitis*<sup>u</sup>, cujus extremum post Obliquum superiorem<sup>w</sup>: itemque minor<sup>x</sup>, partim post eundem Complexum, partim post Rectum majorem<sup>y</sup>. A majoris externo latere infra situs *Obliquus inferior capitis*<sup>z</sup>, supraque cum superior<sup>a</sup>: uterque post Splenium capitis, Sternomastoideum, Trachelomastoideum, Complexum.

Ab osse sacro per spinac longitudinem ad atlantem usque jacet *Multifidus spinæ*<sup>b</sup>. Hic in lumbo sequitur post commune principium Longissimi dorsi & Sacrolumbalis, in inferiore dorsi parte post Longissimum, dein post Spinalem dorsi, Semispinalem ejusdem, Spinalem cervicis<sup>c</sup>, & supra hunc ab externo latere post Complexum. Ab ejus latere in lumbis, & in dorsi parte inferiore, *Interspinales lumborum & dorsi*. Ab ejusdem externo latere, in lumbis *Intertransversarii lumborum*, post commune principium Sacrolumbalis &

N 3

Lon-

t Cowper. Myot. ann. 1694. Fig. viii. L. L. & ann. 1724. Tab. xlii. Fig. 1. 100.

u Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. b.

w Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. b. testus c.

x Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. a.

y Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. a.

testus b.

z Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. d.

a Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. c.

b Eustach. Tab. xxxvii. m. m. & Tab. xxxix. Fig. 1. m. m. in utr. lat.

c Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. m.

m. dext. testus f.

d Ver-

Longissimi : in dorso *Intertransversarii dorfi*, post Longissimum. Et ab horum externo latere, *Levatores breviores<sup>d</sup> costarum*, omnes post Multifidum & Sacrolumbalem : omnes, praeter *primum*, post Intertransversarios dorfi : *decem inferiores* insuper post Longissimum dorfi : *primum* post Scalenum posticum, à latere rectus medio : *secundus* post Cervicalem descendentem, & Transversalem cervicis : *tertius* post eosdem, & Complexum, Spinalemque colli : *quartus* & *quintus* post Cervicalem descendentem, Transversalem cervicis, Spinalem colli. Rursusque ab externo horum Levatorum latere, *Levatores longiores costarum<sup>e</sup>*, post Longissimum dorfi & Sacrolumbalem.

## C A P U T XXIV.

*De situ eorum, qui in spatiis Intercoastalibus.*

**I**ntercoastales haec spatia tenent. *Externi<sup>a</sup>* ab exteriori parte. Statimque post eos *Interni<sup>c</sup>*, quam non toti : liberi enim ab ipsis superiores in pectore sunt *d*, inferiores inter costarum priores partes *d*.

## C A P U T XXV.

*De situ eorum, qui ad Collum sceleti à latere, & à priore parte inhaerent.*

**A** latere Scaleni. A priore parte *Rectus internus major capitis*, *Longus colli*, *Rectus internus minor capitis*,

<sup>d</sup> Verheyen. Tab. xxxv. Fig. 1. c. e.

<sup>e</sup> Verheyen. Tab. xxxv. Fig. 1. f. f.

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiii. l. l. &c. in utr. lat. & Tab. xxxvii. g. g. &c. in utr. lat. & Tab. xxxix. Fig. 1. l. l. &c. in utr. lat.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxiii. h. h. &c. in utr. lat.

&c. in utr. lat.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxiii. h. h. &c. & i. &c. in utr. lat. & Tab. xxxviii. l. l. &c. & m. n. &c. in utr. lat.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxiii. h. h. &c. & i. in utr. lat.

<sup>a</sup> Eu-

*pitis, Rectus lateralis capitis.* Inter processus transversos *Intertransversarii utriusque.*

Primus à latere *Scalenus prior*<sup>a</sup>, sequens infra post clavikulam<sup>b</sup>, dein post Coracohyoïdeum<sup>c</sup>, Cleidomastoïdeum, Sternomastoïdeum, interque haec ab externo latere post Latissimum colli, in fine testus Recto interno majore capitis<sup>d</sup>, Longique colli portione, quae inserta processui transverso vertebrae colli secundae à dorso. Post priorem *minimus* totus delitescit. *Lateralis* partim post priorem, partim non, id est, à latere ejus, ubi infra subjectus Serrato magno, caeterum iisdem atque prior, praeterquam Longo colli. Post priorem<sup>e</sup>, minimum, lateralem, *medius*<sup>f</sup>: sed à latere quoque liber ab eis, subjectusque claviculae<sup>g</sup>, Coracohyoïdeo<sup>h</sup>, Cleidomastoïdeo, Sternomastoïdeo<sup>i</sup>, Latissimo colli, quandoque & Cucullari. Post lateralem, postque medium<sup>k</sup>, *posticus*<sup>l</sup>, à quibus pariter quæ latus spectat, liber, quam partem ejus partim Cucullaris integit, partim Levator scapulae, partim Serratus magnus, & Coracohyoïdeus, aliquando

a Eustach. Tab. xxxiii. a. a. dext. & a. sin. & Tab. xxxviii. i.

b Eustach. Tab. xxxiii. a. a. dext. testus d. dext. & a. sin. testus d. sin.

c Eustach. Tab. xxxiii. a. sin. testus Z. sin.

d Eustach. Tab. xxxviii. i. testus c.

e Eustach. Tab. xxxviii. g. sin. testus i.

f Eustach. Tab. xxviii. A. in utr. lat. & Tab. xxxii. CC. sin. & Tab. xxxiii. Y. in utr. lat. & Tab.

xxxviii. g. in utr. lat. & Tab. xxxvii. f. dext. & Tab. xxxix. Fig. 1. c.

g Eustach. Tab. xxxiii. Y. dext. testus d. dext.

h Eustach. Tab. xxxiii. Y. testus Z. in utr. lat.

i Eustach. Tab. xxviii. A. sin. testus y. & Tab. xxxii. C. sin. testus z. sin.

k Eustach. Tab. xxxvii. e. à parte posteriore f. dextr.

l Eustach. Tab. xxxvii. c. & Tab. xxxix. Fig. 1. k.

m Post

do & Latissimus colli. Post lateralem, medium, posticum, illi in quibus ante desimus: nempe post hos omnes Levator scapulae <sup>m</sup>, post lateralem & posticum etiam Cervicalis descendens, post medium Levator costae primae & Transversalis cervicis <sup>n</sup>, post posticum duo supremi tendines Sacrolumbalis. Sed notandum, quod cum laterali ludere natura soleat, ludat & aliquantum situ ejus, & cum deest, post priorem<sup>o</sup> minimumque, (& cum hic quoque deest, post solum priorem) dein à latere prioris, post Serratum magnum, claviculam <sup>p</sup>, Coracohyoideum <sup>q</sup>, Cleidomastoïdeum, Sternomastoïdeum <sup>r</sup>, Latissimumque colli, medium sequi: post hunc *posticum* <sup>t</sup>.

A priori parte per collum ad caput usque porrectus *Rectus internus major capitis* <sup>t</sup>, post pharyngem delitescens <sup>u</sup>, itemque post Sternomastoïdeum <sup>w</sup>, Stylohyoïdeum <sup>x</sup>, Biventrem maxillae <sup>y</sup>, Stylopharyngeum <sup>z</sup>, Styloglossum: supra Styloglossum à latere pharyngis nudus; nudus <sup>a</sup> & inter pharyngem, Sternomastoïdeum, &

<sup>m</sup> Post *medium*, Eustach. Tab. xxxiii. X. post Y. sin.

<sup>n</sup> Eustach. Tab. xxxvii. d. à posteriore parte f. dextr.

<sup>o</sup> Eustach. Tab. xxxviii. g. sin. post i.

<sup>p</sup> Eustach. Tab. xxxiii. Y. dext. post d. dext.

<sup>q</sup> Eustach. Tab. xxxiii. Y. post. Z. in utr. lat.

<sup>r</sup> Eustach. Tab. xxviii. A. post. y. sin. & Tab. xxxii. C. sin. post z.

<sup>s</sup> Eustach. Tab. xxxvii. c. à posteriore parte f. dextr.

<sup>t</sup> Eustach. Tab. xxviii. t. in utr. lat.

& Tab. xxxii. t. & Tab. xxxiii. T. & Tab. xxxviii. c. & Tab. xli. Fig. 8. a. & Fig. 1. i. n.

<sup>u</sup> Eustach. Tab. xxxiii. T. testus O.

<sup>w</sup> Eustach. Tab. xxviii. t. post y. in utr. lat. & Tab. xxxii. t. post z.

<sup>x</sup> Eustach. Tab. xxxii. t. post. f.

<sup>y</sup> Eustach. Tab. xxviii. t. dext. post p. & Tab. xxxii. t. post r. dext.

<sup>z</sup> Eustach. Tab. xxxiii. T. post P. & Tab. xli. Fig. 8. a. post F.

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxviii. t. dext. & Tab. xxxii. t.

b Eu-



& cum Stylohyoideo Biventrem maxillae. Et post Rectum illum <sup>b</sup>, verum tantummodo usque ad atlantem, longius autem, & quasi è thorace veniens, *Longus colli* <sup>c</sup>: cujus pars inferior <sup>d</sup>, eaque qua sui parem spectat <sup>d</sup>, non testis Recto illo, sequens post asperam arteriam, glandulam thyreoideam, laryngem, pharyngem. Post eundem Rectum <sup>e</sup> & *Rectus internus minor capitis* <sup>f</sup> situs, supra Longum, similiter quoque ex parte non testis majore, sed ab externo latere <sup>g</sup>. Atque à minoris latere haeret *Rectus lateralis capitis* <sup>h</sup>, ima parte sui post Biventrem maxillae inferioris, dein & post Stylohyoidei & Stylopharyngei principium, caetero nudus. Post eum sequuntur Obliqui capitis, de quibus supra.

Intimi postremique omnium sunt *Intertransversarii colli* <sup>i</sup>, tum *priores*, tum *posteriores*: utrique delitescentes post bene multa illa musculorum capita, extremaque, quae affixa processibus transversis colli vertebrarum.

O

C A:

b Eustach. Tab. xxxviii. d. testis c. & Tab. xli. Fig. 13. S. sin. testis II.

c Eustach. Tab. xxxviii. c. f. dext. & d. sin. & Tab. xli. Fig. 13. S. in utr. lat.

d Eustach. Tab. xxxviii. d. & Tab. xli. Fig. 13. S. sin.

e Eustach. Tab. xxxviii. b. sin. testis c. & Tab. xli. Fig. 13. S. sin. testis II.

f Eustach. Tab. xxxviii. b. in utr.

lat. & Tab. xli. Fig. 13. S. in utr. lat.

g Eustach. Tab. xxxviii. b. sin. & Tab. xli. Fig. 13. S. sin.

h Eustach. Tab. xxxviii. a. in utr. lat. & Tab. xli. Fig. 13. A. in utr. lat.

i Cowper. Myot. ann. 1724. Tab. xlii. Fig. 1. *Intertransversales colli*: ubi non distinxit priores à posterioribus.

## CAPUT XXVI.

*De situ eorum, qui in Scapula & superiore parte Humeri.*

**S**uperiori parti brachii extrinsecus sub tegumentis *Deltoïdes*<sup>a</sup> incumbit, ex parte velatus *Latissimo colli*<sup>b</sup>.

Deinde in dorso scapulae, supra ejus spinam *Supraspinatus*<sup>c</sup>, qui Cucullari obductus, praeterquam in fine, ubi sub conjunctione scapulae & claviculae in summo humero<sup>d</sup>, & sub *Deltoïde*. Infra spinam *Infraspinatus*<sup>e</sup>, & infra hunc *Teres minor*<sup>f</sup>: ambo ex parte sub tegumentis<sup>g</sup>, dein juxta humerum *Deltoïde* intecti<sup>h</sup>, juxta scapulae angulum inferiorem *Terete* majore<sup>i</sup>, ubi & *Infraspinatus* sub *Latissimo* dorsi<sup>k</sup>, extremo etiam suo superiorem scapulae processum aliquantum subeuns<sup>l</sup>. Infra *Teretem* minorem *major*<sup>m</sup>, qui quanquam nisi prin-

a Eustach. Tab. xxviii. F. in utr. lat. & Tab. xxx. u. in utr. lat. & Tab. xxix. 6. & Tab. xxxi. u. in utr. lat.

b Eustach. Tab. xxx. u. tectus u.  
c Eustach. Tab. xxix. 8. & Tab. xxxvii. A. in utr. lat. & Tab. xxxviii. D.

d Sub superiore processu scapulae, Eustach. Tab. xxix. 8. & Tab. xxxvii. A. in utr. lat.

e Eustach. Tab. xxix. 12. in utr. lat. & Tab. xxxi. N. in utr. lat. & Tab. xxxvii. B. in utr. lat. & Tab. xxxix. Fig. 1. u.

f Eustach. Tab. xxix. 13. in utr. lat. & Tab. xxxi. O. in utr. lat. & Tab. xxxvii. C. in utr. lat.

g Eustach. Tab. xxix. 12. 13. sin.

h *Infraspinatus*, Eustach. Tab. xxix. 12. sin. tectus 6.

*Teres minor*, Eustach. Tab. xxix. 13. sin. tectus 6.

i *Infraspinatus*, Eustach. Tab. xxxviii. B. sin. tectus D.

*Teres minor*, Eustach. Tab. xxxvii. C. sin. tectus D.

k Eustach. Tab. xxix. 12. sin. tectus. R. sin.

l Eustach. Tab. xxix. 12. dext. sub 10. & Tab. xxxvii. B. in utr. lat.

m Eustach. Tab. xxix. 15. & Tab. xxxi. P. in utr. lat. & Tab. xxxvi. V. & Tab. xxxvii. D. & Tab. xxxiii. 34. in utr. lat. & Tab. xxxviii. F.

n Eu-

principio suo in scapula non situs, hic tamen doctrinae causa adscribendus. Principium ejus Latissimo dorsi tectum<sup>n</sup>, extremum decurrit pone caput longum Tricipitis brachii<sup>o</sup>; medius majorem partem liber est<sup>p</sup>, & tantum à superiore parte tectus Terete minore<sup>q</sup>. Post extremum Teretis majoris, illud Latissimi dorsi<sup>r</sup>, ut supra diximus: post utriusque extremum Coracobrachialis<sup>t</sup> cum capite brevior Bicipitis brachii, & Pectoralis<sup>u</sup>.

In interiore parte scapulae *Subscapularis*<sup>v</sup>, quem ultra priorem marginem scapulae tegit Teres major<sup>w</sup>, in fine Deltoïdes & Coracobrachialis<sup>x</sup>.

## CAPUT XXVII.

*De situ muscutorum, qui in Humero.*

**P**er humeri longitudinem ab interiore parte se primum post Pectoralem<sup>a</sup> & Deltoïdem, dein sub tegumentis communibus<sup>b</sup>, demittit Biceps brachii<sup>c</sup>, suo tendine inter Supinatorem longum & Pronatorem teretem<sup>d</sup> ad radii principium descendens: ad haec primi

O 2

mi

n Eustach. Tab. xxix. 15. tectus R. dext.

o Eustach. Tab. xxix. 15. tectus 16. dext.

p Eustach. Tab. xxxi. P. in. utr. lat.

q Eustach. Tab. xxix. 15. tectus 13. dext.

r Eustach. Tab. xxx. E. post x.

s Eustach. Tab. xxx. f. post x. & E.

t Eustach. Tab. xxx. B. post x & E.

u Eustach. Tab. xxxiii. 33. in utr. lat. & Tab. xxxviii. E.

w Eustach. Tab. xxxiii. 33. tectus 34. in utr. lat. & Tab. xxxviii. E. tectus F.

x Eustach. Tab. xxxiii. 33. tectus 36. in lat. finist.

a Eustach. Tab. xxviii. 24. tectus F. in utr. brach.

b Eustach. Tab. xxviii. 24. in utr. brach.

c Eustach. Tab. xxviii. 24. in utr. brach. & Tab. xxx. r. in utr. brach.

d Eustach. Tab. xxx. tendo r. inter 1. & 2. in brach. fin.

e Eu-

mi capitis sui principio decurrit per capsam, qua humeri cum scapula articulus continetur. Sub capite ejus brevior<sup>e</sup>, & ab altero hujus latere, sub Deltoide & Pectorali; ab altero, supra sub Pectorali<sup>e</sup>, infra sub tegumentis<sup>s</sup>, situs *Coracobrachialis*<sup>b</sup>. Post cujus partem superiorem Subscapularis extremum<sup>i</sup>, Latissimique dorsi<sup>k</sup>, & Teretis majoris<sup>l</sup>. In inferiore parte ossis humeri, inque principio cubiti, post Bicipitem<sup>m</sup> sequitur *Brachialis internus*<sup>n</sup>, insuper & in humero, & in cubito ab utroque Bicipitis latere sub solis tegumentis<sup>o</sup>; in imo etiam brachio subjectus Supinatori longo<sup>p</sup> à parte priore, Pronatori tereti<sup>q</sup> & Sublimi<sup>r</sup> à posteriore.

Sed ab exteriore humeri parte unus *Triceps brachii*<sup>t</sup>, statim post tegumenta<sup>t</sup>, praeterquam ab initio, si-

qui-

e Eustach. Tab. xxxii. 21. 21. testus 24. dext.

f Eustach. Tab. xxx.  $\psi$ . testus B. dext.

g Eustach. Tab. xxx.  $\psi$ .

h Eustach. Tab. xxxii. 21. 21. & Tab. xxxiii. 36. in utr. brach.

i Eustach. Tab. xxxiii. 33. post 36. in lat. sin.

k Eustach. Tab. xxx. E. post  $\psi$ .

l Eustach. Tab. xxx.  $\chi$ . post  $\psi$ .

m Eustach. Tab. xxviii. 25. 25. testus 24. in dext. brach.

n Eustach. Tab. xxviii. 25. 25. dext. & 25. sin. & Tab. xxx. A.

A. sin. & Tab. xxxiii. 40. 40. in utr. brach. & Tab. xxxviii. G.

& Tab. xxi. 19. & Tab. xxxi. f. in utr. brach. & Tab. xxxvii.

E E.

o Eustach. Tab. xxviii. 25. 25. dext. & Tab. xxx. AA. in sin. brach.

p Eustach. Tab. xxviii. 25. 25. testus 30. in dext. brach.

q Eustach. Tab. xxviii. 25. 25. testus 31. in dext. brach.

r Eustach. Tab. xxxiii. 40. 40. dext. testus 53.

s Eustach. Tab. xxi. 16. 17. 18. in br. utr. & Tab. xxxi.  $\alpha\alpha$ .

in utr. br. & Tab. xxviii. 22. 23. & 26. & Tab. xxx.  $\Delta\theta$ . in

utr. br. & Tab. xxxiii. 38. 39. 44. sin. & 44. dext.

t Eustach. Tab. xxi. 16. 17. 18. sin. & Tab. xxviii. 22. 23. &

Tab. xxxi.  $\alpha\alpha$ . in utr. brach.

u Eu-

quidem capiti ejus longo <sup>u</sup> brevique <sup>w</sup> Deltoïdes incumbit, longo etiam Teres minor <sup>x</sup>. Jam post ejus breve caput sequitur Deltoïdis extremum <sup>y</sup>, Brachialis internus <sup>z</sup>, Supinatoris longi principium <sup>a</sup>: post longi principium, Teretis majoris pars <sup>b</sup>: post tertium caput <sup>c</sup>, dictum Brachialis externus, Coracobrachialis <sup>d</sup>, & Brachialis internus <sup>e</sup>.

## CAPUT XXVIII.

*De situ musculorum, qui in Cubito.*

**M**usculi, qui cubitum tenent, tali modo dispositi, ut difficile sit ordinem, quo tradantur, invenire. Optimum esse ducimus, qui ab interna eademque priore parte cubiti incipiens, inde per exteriorem retrorsum procedens primos commemoret, posteaque subjectos his. Rursusque deinde primos, à posteriore per interiorem redeundo: tumque qui post hos sequuntur, ut alii aliis subjacent.

Ergo per longitudinem cubiti sub tegumentis porrecti, ab interna & eadem priore parte *Supinator longus*

O 3

<sup>u</sup> Eustach. Tab. xxix. 16. sin. testus 6.

<sup>w</sup> Eustach. Tab. xxix. 17. sin. testus 6.

<sup>x</sup> Eustach. Tab. xxix. 16. dext. testus 13. dext.

<sup>y</sup> Eustach. Tab. xxix. extremum 6. post 17. sin.

<sup>z</sup> Eustach. Tab. xxix. 19. post 17. sin.

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxix. 20. post 17.

sin.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxix. 15. post 16. dext.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxvi. W. & Tab. xxviii. 23. & Tab. xxxiii. 44. in utr. brach.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxiii. 44. testus 36. in utr. brach.

<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxxiii. 44. testus 40. in utr. br. & Tab. xxviii. 23. testus 25. dext.

a Eustach.

*gus*<sup>a</sup>, cujus principium à priore humeri parte procedit, tendo extremus sub tendinibus Abductoris longi pollicis<sup>b</sup>, & Extensoris minoris tendit ad insertionem suam. Ab eo *Radialis externus longior*<sup>c</sup>, infra eum ab humero suo descendens principio, eidemque. & ventre<sup>d</sup>, & tendinis initio partim subiectus, partim ab externo latere nudus. Ab hoc *Radialis externus brevior*<sup>e</sup>, qui ei, ut ille ipse Supinatori longo, subjacet<sup>f</sup>, & ab externo ejus latere nudus est; ab interno autem subiectus Supinatori modo dicto. Circum utriusque tendinem, alioquin nudos, se in inferiore parte cubiti flexunt, Abductor longus pollicis<sup>g</sup>, Extensor minor ejusdem<sup>h</sup>, majorque<sup>i</sup>: circum tendinis *brevioris* extremum, tendo Indicatoris<sup>k</sup>. Deinde ultra Radialem brevior *Extensor communis digitorum manus*<sup>l</sup>, nudus. Is vero suis tendinibus à cubito per dorsum manus, digitorumque, pariter sub tegumentis, excurrit<sup>m</sup>. Ultra hunc, tendine suo similiter per dorsum manus<sup>n</sup>, &

a Eustach. Tab. xxviii. 30. in brach. utr. & Tab. xxxiii. 30. in brach. dext. & Tab. xxix. 20. & Tab. xxxi. 4. in utr. brach.

b Eustach. Tab. xxviii. 30. dext. testis 35. & 36.

c Eustach. Tab. xxviii. 29. in utr. brach. & Tab. xxix. 31. & Tab. xxxiii. 52. dext. & 52. 61. sin.

d Eustach. Tab. xxviii. 29. testis 30. in utr. brach.

e Eustach. Tab. xxix. 30. & Tab. xxxiii. 58. 62.

f Eustach. Tab. xxix. 30. testis 31.

g Eustach. Tab. xxix. 30. & 31. testis 32. 33. 34. dext. & Tab. xxxiii. 52. & 58. testis 59.

h Eustach. Tab. xxix. 30. & 31. testis 35. dext. & Tab. xxxiii. 61. & 62. testis 60.

i Eustach. Tab. xxix. 30. & 31. testis 36. dext.

k Eustach. Tab. xxix. 30. testis 37.

l Eustach. Tab. xxviii. 40. 45. & c. & Tab. xxix. 28. & Tab. xxxi. 44. & c. dext.

m Eustach. Tab. xxviii. 53. 54. & Tab. xxix. 27. & Tab. xxxi. 44. in utr. brach.

n Eu-

& digiti minimi <sup>m</sup> descendens, totusque nudus, *Extensor proprius digiti minimi manus* <sup>m</sup>. Ultra hunc *Ulnaris externus* <sup>n</sup>, & ipse nudus. Ultraque hujus superiorem partem, mox infra humerum, *Anconeus* <sup>o</sup>, primorum ab hac parte postremus: partem autem ejus *Ulnaris externus* integit, partem tendo *Tricipitis brachii*. Sequuntur interiores.

Partim sub *Anconeo*, partimque sub *Ulnari externo*, & *Extensore minimi*, communique, ac *Radiali externo utroque* <sup>p</sup>, & *Supinatore longo*, *Supinator brevis* <sup>q</sup>, qui ultra *Supinatorem* longum in interiore cubiti parte, inter *Supinatorem* illum & *Pronatorem teretem*, nudus. Infra quem *Abductor longus pollicis manus* <sup>r</sup>: & infra hunc *Extensor minor pollicis manus* <sup>s</sup>. Hi se per priorē cubiti partem <sup>t</sup> ad radicem pollicis flectunt, *Extensor* etiam per dorsum pollicis pergit <sup>u</sup>: *Abductor*, qua incipit, delitescit post *Supinatorem brevem*, & *Radiale externum breviorē*: *idem* una cum

n Eustach. Tab. xxviii. 46. 46. & Tab. xxix. 26. & Tab. xxxi. e e. in utr. brach.

o Eustach. Tab. xxxvii. G.

p Sub utroque in unum conjunctis, Eustach. Tab. xxxviii. K. rectus I. Sub breviorē, Eustach. Tab. xxxviii. I. rectus H.

q Eustach. Tab. xxxvii. K. & Tab. xxxix. Fig. 1. w. dext. & w w. sin. & Tab. xxxviii. I.

r Eustach. Tab. xxviii. 47. 48. & Tab. xxix. 22. 33. 34. dext. & 33. 34. sin. & Tab. xxxiii. 59. & Tab.

xxxii. 24. in utr. brach.

s Eustach. Tab. xxviii. 49. & Tab. xxix. 35. in utr. brach. & Tab. xxxiii. 60. & Tab. xxxi. u. in utr. brach.

t Eustach. Tab. xxxiii. 59. & 60. *Abductor longus*, Eustach. Tab. xxviii. 35. 36. & Tab. xxx. 4. 5. sin. & 4. dext.

u Eustach. Tab. xxviii. 55. & Tab. xxix. 29. in utr. man. & Tab. xxx. 17. & Tab. xxxi. 5. & Tab. xxxii. 40.

cum *Extensore minore*, post Extensorem majorem pollicis <sup>w</sup>, dein post Extensorem minimi, & communem digitorum <sup>x</sup>, ultra quos nudi sunt <sup>y</sup>, nisi quod tendo *Extensoris-minoris* in fine ex parte subeat tendini Extensoris majoris pollicis. *Extensor major pollicis manus* <sup>z</sup> juxta posteriorem praecedentium partem primo per cubitum descendit, post tendine suo per dorsum manus <sup>a</sup>; pollicisque; quoad in cubito manet, subjectus Indicatori <sup>b</sup>, Ulnari externo <sup>c</sup>, Extensori minimi, communique <sup>d</sup>; tendine suo à fine cubiti nudus <sup>e</sup> à musculis. Ab hujus parte eadem & inferiore & posteriore, eodem se modo per cubitum sub Ulnari externo <sup>f</sup>, Extensore minimi, communique, & ex parte sub tegumentis communibus inter Ulnarem externum & Extensorem minimi, demittit, perque dorsum manus, tum sub tendine Extensoris communis indici dato <sup>g</sup>, tum ab hujus posteriore parte sub tegumentis <sup>h</sup>, ad indicem *Indicator* <sup>i</sup> incedit.

Ex

w Eustach. Tab. xxix. 32. & 35. dext. testis 36. dext.

x Eustach. Tab. xxix. 33. 34. & 35. testis 28. in fin. brach.

y Eustach. Tab. xxix. 33. 34. & 35. fin.

*Abductor longus*, Eustach. Tab. xxviii. 35. 36. dext.

*Extensor parvus*, Eustach. Tab. xxix. 39. in utr. manu: & Tab. xxxii. 40.

z Eustach. Tab. xxviii. 52. 52. & Tab. xxix. 36. in brach. utr. & Tab. xxxi. 1. 1. in utr. brach.

a Eustach. Tab. xxviii. 52. infer. & Tab. xxix. 36. in manu utr. & Tab.

xxxi. 1. in manu utr.

b Eustach. Tab. xxix. 36. testis. 37. in dext. brach.

c Eustach. Tab. xxix. 36. testis. 25. dext.

d Eustach. Tab. xxix. 36. fin. testis 28.

e Eustach. Tab. xxix. 36. fin. & Tab. xxviii. 52. infer.

f Eustach. Tab. xxix. 37. testis. 25. in dext. brach.

g Eustach. Tab. xxix. 37. 37. fin. testis tendine 28.

h Eustach. Tab. xxix. 37. 37. fin.

i Eustach. Tab. xxix. 37. dext. & 37. 37. fin. & Tab. xxxi. 3. in utr. man.

k Eu-



Ex primis in interiore cubiti parte, ab extremo humero per totam cubiti longitudinem incedunt *Ulnaris internus*, *Palmaris longus*, & *Radialis internus*. Posterior *Ulnaris* <sup>k</sup>, ante eum *Palmaris* <sup>l</sup>, ante hunc *Radialis* <sup>m</sup>, à superiore parte *Palmaris* subjectus <sup>n</sup>, in medio fere cubito *Supinatori* longo. *Palmaris* autem sua aponeurosi se per volam sub tegumentis ejus dilatat <sup>o</sup>: & cum ventrem non habet <sup>p</sup>, proximus ab *Ulnari* <sup>q</sup> *Radialis* <sup>r</sup>. Et *Radialis* quoque tendo in intima volae penetrat, sub *Abductore* brevi pollicis, *Opponente* ejusdem, *Flexore*que brevi. Ante superiorem *Radialis* internæ partem *Pronator teres* <sup>s</sup>, ad medium tantummodo radii pertingens, extremoque suo *Supinatorem* longum <sup>t</sup> primo, dein *Radialem* externum longiorem <sup>u</sup>, post breviorē, subeuns: à principio autem pars ejus *Radiali* interno testā. Ante *Pronatorem* illum, & *Radialem* internum, siti de quibus supra à nobis dictum: & ante *Pronatorem* quidem tendo *Bicipitis* <sup>w</sup>, & *Supinator* brevis: ante eundem <sup>x</sup>, & *Radialem* internum <sup>y</sup>, *Supinator* longus.

P

In

k Eustach. Tab. xxviii. 14. in utr. brach. & Tab. xxx. 7. in utr. brach. & Tab. xxx. 25. in utr. brach. & Tab. xxxi. 7.

l Eustach. Tab. xxviii. 33. & Tab. xxxii. 33. & Tab. xxx. 8. & Tab. xxx. 23. & Tab. xxxi. 9.

m Eustach. Tab. xxviii. 32. & Tab. xxx. 8. sin.

n Eustach. Tab. xxviii. 32. feb. 23.

o Eustach. Tab. xxviii. 40. & Tab. xxxii. 47. & Tab. xxx. 12. 13. sin.

p Eustach. Tab. xxx. 12. 13. dext.

q Eustach. Tab. xxx. 7. dext.

r Eustach. Tab. xxx. 8. dext.

s Eustach. Tab. xxviii. 21. & Tab. xxx. 2. in utr. brach. & Tab. xxxiii. 51.

t Eustach. Tab. xxviii. 31. testis 30. dext.

u Eustach. Tab. xxxiii. 51. testis 52. sin.

w Eustach. Tab. xxx. tendo r. ante 2. in sin. brach. & Tab. xxxiii. 50. ante 51.

x Eustach. Tab. xxviii. 30. dext. ante 31.

y Eustach. Tab. xxviii. 30. dext. ante 32.

z En-

In eadem parte interiores hoc se habent modo. Statim post primos *Sublimis* <sup>a</sup> sequitur, inter eos autem nudus, & non modo per cubiti longitudinem jacens, sed & per volam tendinibus suis <sup>a</sup> sub aponeurosi Palmaris longi <sup>b</sup> incedens, posteaque etiam per internam digitorum partem <sup>a</sup>, ubi illi ad postremum Profundi tendinibus ex parte subjacent <sup>c</sup>: cum vero sola Palmaris aponeurosis adest, qua Palmari Sublimis tegetetur, tegumentis subjectus <sup>d</sup>. *Profundus* <sup>e</sup> in cubito post Sublimem <sup>f</sup>, simili modo à parte ulnae porrectus; sed tum à posteriore, tum à priori parte non Sublimi, verum ab hac Pronatori tereti, ab illa Ulnari interno <sup>g</sup>, ultraque eum vaginae tendineae cubiti subjacet; juxta manum quoque pars ejus inter Ulnarem internum & Sublimem nuda <sup>h</sup>, pars & inter hunc & Radialem internum: perque volam <sup>i</sup>, & per internam digitorum partem <sup>k</sup>, tendines suos, ut Sublimis, verum majorem partem sub tendinibus ejus <sup>l</sup>, ad postremum autem super eosdem <sup>m</sup>, demittit. Post eundem Sublimem <sup>n</sup> in cubito à parte radii sequitur *Flexor longus pollicis*

z Eustach. Tab. xxxii. 35. & Tab. xxxiii. 53.

a Eustach. Tab. xxviii. 43. 43. 43. 43. & Tab. xxxiii. 73. 73. 73. 73.

b Eustach. Tab. xxviii. 43. 43. 43. 43. recti 40.

c Eustach. Tab. xxviii. 43. 43. 43. 43. recti 44. 44. 44. 44.

d Eustach. Tab. xxx. 3.

e Eustach. Tab. xxx. 8. & Tab. xxxii. 36. & Tab. xxxiii. 54. dext. & sin. & Tab. xxxviii. L.

f Eustach. Tab. xxxii. 36. tectus 35.

g Eustach. Tab. xxx. 8. tectus 7. dext.

h Eustach. Tab. xxx. 8.

i Eustach. Tab. xxxviii. L-aβγδ. in vola.

k Eustach. Tab. xxviii. 44. 44. 44. 44. & Tab. xxxviii. L-aβγδ. in digitis.

l Eustach. Tab. xxviii. 44. 44. 44. 44. recti 41. 41. 41. 41.

m Eustach. Tab. xxviii. 44. 44. 44. 44.

n Eustach. Tab. xxxii. 37. tectus 35. & Tab. xxxiii. 55. dext. tectus. 53.

o Eustach.

*flexis manus* °, cujus pars prior Supinatori longo sub-  
 jacet °, & Radiali externo breviori, Radialique in-  
 terno °, partim etiam inter Radiales externos & Su-  
 pinatorem longum, interque hunc & Radialem inter-  
 num °, nuda est. Atque hujus *Flexoris* tendo pariter  
 per volam, secundum pollicis metacarpum °, & pri-  
 mo quidem per cavam Flexoris brevis pollicis partem,  
 deinde inter duas caudas ejus, post nudus à musculis,  
 secundum internam pollicis partem ° procedit. Deni-  
 que in inferiore parte cubiti post Profundum, Flexorem  
 longum pollicis °, Ulnarem internum, aliquando &  
 Radialem, ultimus *Pronator quadratus* °, parva parte,  
 & qua incipit, & qua definit, nudus.

## CAPUT XXIX.

*De situ musculorum, qui in Manu.*

**V**olam, internamque digitorum & pollicis partem  
 occupant à cubito demissi tendines: volam prae-  
 terea musculi in ea majorem partem siti. De tendini-  
 bus illis etsi in superiore capite satis dictum sit, eos-  
 dem tamen, quo melius capiantur volae proprii mus-  
 culi, hic rursus ordine ante eos summatim recensebi-  
 mus.

P 2

Prin-

o Eustach. Tab. xxviii. 27. & Tab.  
 xxx. 6. in utr. brach. & Tab. xxxii.  
 27. & Tab. xxxiii. 55. in utr. brach.  
 & Tab. xxxviii. K.

p Eustach. Tab. xxviii. 37. tectus 30.  
 dext.

q Eustach. Tab. xxviii. 37. tectus 32.

r Eustach. Tab. xxviii. 37.

s Eustach. Tab. xxviii. 42. & Tab.  
 xxxiii. 74. & Tab. xxxviii. K-β.  
 in vola & pollice.

t Eustach. Tab. xxxiii. 57. tectus.  
 55. in utr. brach.

u Eustach. Tab. xxxiii. 57. & Tab.  
 xxxviii. V.

a Eu:

Principio tegumentis volae substrata *Palmaris longi* a-  
poneurosis <sup>a</sup>. Dein secundum pollicis metacarpum, ip-  
sumque pollicem decurrit tendo *Flexoris longi pollicis* <sup>b</sup>.  
Sub *Palmaris longi* aponeurosi <sup>c</sup> ad digitos, perque  
eos, *Sublimis* tendines <sup>d</sup>. Post hos <sup>e</sup>, ad eosdem digi-  
tos, pariterque secundum eos, tendines *Profundi* <sup>f</sup>.

Ipforum in vola sitorum ordo hic. Inter duos quos-  
que tendinum *Profundi*, & ante tendinem quem indici  
dat, *Lumbricalium* <sup>g</sup> unus, tendinibus *Sublimis* ex par-  
te subjacentes <sup>h</sup>. In pollicis metacarpo sub tegumentis <sup>i</sup>,  
partimque etiam sub aponeurosi *Palmaris longi* <sup>k</sup>, re-  
peritur *Abductor brevis pollicis manus* <sup>l</sup>. Dein partim post  
eum <sup>m</sup>, partim ab ejus parte priore nudus <sup>n</sup>, partim  
à posteriore sub *Flexore pollicis brevi*, *Opponens polli-  
cis manus* <sup>o</sup>. Juxta eundem metacarpum pollicis, magis  
in vola locatus *Flexor brevis pollicis manus* <sup>p</sup>, cujus par-  
vam

a Eustach. Tab. xxviii. 40. & Tab.  
xxxii. 47.

b Eustach. Tab. xxviii. 42. & Tab.  
xxx. 18. in utr. man. & Tab. xxxiii.  
74. & Tab. xxxviii. K. β. in manu  
& pollice.

c Eustach. Tab. xxviii. 43. 43. 43. 43.  
testi 40.

d Eustach. Tab. xxviii. 43. 43. 43. 43.  
& Tab. xxxii. 55. 55. 55. 55. in  
dext. manu. & Tab. xxxiii. 73. 73.  
73. 73.

e Eustach. Tab. xxviii. 44. 44. 44.  
44. testi 42. 43. 43. 43.

f Eustach. Tab. xxviii. 44. 44. 44.  
44. & Tab. xxxviii. L. α β γ δ. in  
vola & digitis.

g Eustach. Tab. xxxii. 51. 52. 53. 54.  
& Tab. xxxviii. M. N. O. P.

h Eustach. Tab. xxxii. 51. 52. 53.  
54. testi 55. 55. 55. 55. dext.

i Eustach. Tab. xxviii. 41.

k Eustach. Tab. xxviii. 41. testis  
40.

l Eustach. Tab. xxviii. 41. & Tab.  
xxx. 15. in utr. man. & Tab.  
xxxii. 43. in utr. manu.

m Eustach. Tab. xxxii. 42. testis 43.  
in utr. manu.

n Eustach. Tab. xxxii. 42. in utr. ma-  
nu.

o Eustach. Tab. xxxii. 42. in utr.  
man. & Tab. xxxiii. 69.

p Eustach. Tab. xxxviii. Π Σ.

q Eu.

vam partem Abductor brevis pollicis integrit, & aponeurosis Palmaris longi, & tendo Flexoris longi pollicis, & Adductor pollicis. Mox infra Flexorem brevem *Adductor pollicis manus* <sup>q</sup>, atque is partim nudus <sup>r</sup>, partim sub duobus primis Lumbricalibus, eisdemque Profundi tendinibus. In illa deinde volae parte, quae est supra digitum minimum, *Palmaris brevis* <sup>s</sup> situs, mox infra cubitum, sub tegumentis. In eadem, tum sub Palmari brevi <sup>t</sup>, tum sub tegumentis <sup>u</sup>, *Abductor digiti minimi manus* <sup>w</sup>, & *Flexor ejus parvus* <sup>x</sup>. Post quos *Adductor metacarpi digiti minimi* <sup>y</sup>, qui partim liber ab iis, id est, tum pone Abductorem, tum ante Flexorem, tum inter eos; ex parte etiam subjectus Palmari brevi. Ubi autem deest Flexor brevis, *Adductor metacarpi minimi* testus Abductore minimi, & Palmari brevi, caeterum nudus. Intimi volae *Interossei* <sup>z</sup> sunt. Eorum plerisque primo incumbunt Profundi tendines, & Lumbricales: *secundo medii digiti, primo & secundo tertii*, atque illi *quarti*, tendines Profundi posteriores tres, iidemque Lumbricales: *primo indicis* Lumbricalis primus. Deinde *duobus illis, qui ad indicem pertinent*, Opponens pollicis,

P 3

q Eustach. Tab. xxxviii. 2. & Tab. xxxii. pars 45.

r Eustach. Tab. xxxii. pars 45.

s Eustach. Tab. xxxviii. 39.

t Eustach. Tab. xxx. 11. testus 10. in utr. manu.

u Eustach. Tab. xxx. 11.

w Eustach. Tab. xxx. 11. & Tab.

xxxiii. 72. & Tab. xxxvi. Q. & an Tab. xxxviii. W?

x An Eustach. Tab. xxxiii. 71?

y An Eustach. Tab. xxxviii. Q? an & Tab. xxxix Fig. 1. E?

z Eustach. Tab. xxxviii. X. Y. Z. F. A. & Tab. xxxix. Fig. 1. x. y. z. A. B. C. D.

a Equ.

cis, Flexor brevis ejusdem, Adductorque <sup>a</sup>, sic ut extrema tantummodo relinquant libera <sup>b</sup>: primo prae-  
terea Abductor indicis: primo *medii* eodem modo Ad-  
ductor pollicis <sup>c</sup>: *secundi* principio Flexor brevis polli-  
cis <sup>d</sup>: *primi annularis* principio Adductor metacarpi mi-  
nimi <sup>e</sup>, & quandoque principium Interossei auricula-  
ris: *secundi* principio Adductor metacarpi minimi <sup>f</sup>, a-  
liquando principium auricularis: Adductor metacarpi  
minimi, *illi quem habet auricularis* <sup>g</sup>, caudam ejus libe-  
ram relinquens <sup>h</sup>. Ad haec *primi medii* pars prior se-  
quitur post secundum indicis <sup>i</sup>, *secundi medii* posterior  
post primum annularis <sup>k</sup>, eadem *annularis secundi* post  
illum auricularis <sup>l</sup>.

Per dorsum manus, digitorum, pollicis, decur-  
runt tendines *Extensoris communis digitorum* <sup>m</sup>, *Exten-  
soris proprii digiti minimi* <sup>n</sup>, *Indicatoris* <sup>o</sup>, *Extensoris polli-  
cis utriusque* <sup>p</sup>, ut superiore capite relatum est. Et prae-  
ter

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxviii. Θ. A. testis z.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxviii. Θ. A.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxviii. Δ. testis z.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxviii. Γ. testis π.

<sup>e</sup> An Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. B. testis E?

<sup>f</sup> An Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. C. testis E?

<sup>g</sup> An Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. D. testis E?

<sup>h</sup> Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. D.

<sup>i</sup> Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. z. testis γ.

<sup>k</sup> Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. A. testis B

<sup>l</sup> Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. C.

testis D.

<sup>m</sup> Eustach. Tab. xxxviii. 45. 45. 45. in man. & Tab. xxxix. 28. in man. & Tab. xxxi. 1. p. p. in utr. manu.

<sup>n</sup> Eustach. Tab. xxxviii. 53. in manu: & Tab. xxxix. 27. in man. & Tab. xxxi. φ in manu utr.

<sup>o</sup> Eustach. Tab. xxxix. 37. 37. in manu sin. & 37. in dext. & Tab. xxxi. 3. in manu utr.

<sup>p</sup> *Magni*, Eustach. Tab. xxxviii. 52. in man. & Tab. xxxix. 36. in utr. man. & Tab. xxxi. 1. in manu utr.

*Parvi*, Eustach. Tab. xxxviii. 55. & Tab. xxxix. 39. in utr. man. & Tab. xxxviii. 60. in man. & Tab. xxxi. 5.

q Eu.

ter eos in intervallo pollicis indicisque, *Abductor indicis*<sup>q</sup>, contingens in vola sitos, Adductorem pollicis<sup>r</sup>, Flexorem brevem ejusdem, Lumbricalem primum, prioremque indicis Interosseum. Praeterque Abductorem illum, in manus dorso partes quorundam ex illis, de quibus hoc capite actum: *Interossei primi indicis*, *pollicis Flexoris brevis*, *Adductorisque*<sup>t</sup>, in intervallo pollicis indicisque: *Interossei primi & secundi digiti medii*, ac *secundi annularis*, in intervallis ossium metacarpi manus: *Abductoris digiti minimi*<sup>u</sup>, & *Abductoris metacarpi minimi*, à posteriore parte ossis metacarpi minimi. Ex his autem soli *Interossei duo medii*, & *secundus auricularis*, ex parte subjacent tendinibus Extensoris communis: *primus medii* etiam tendini Indicatoris: *secundus auricularis*, Extensori proprio digiti minimi.

## CAPUT XXX.

*De situ musculorum, qui in Natc.*

**H**ic *Gluteus magnus*<sup>a</sup> primus est. Sub quo *medius*<sup>b</sup>, magna parte sui: nam partim is ante magnum nudus à musculis<sup>c</sup>, à priore etiam parte sub Tensore vaginæ femoris<sup>d</sup>. Sub medio *minor*<sup>e</sup>, qui ex parte etiam

<sup>q</sup> Eustach. Tab. xxxiiii. 64. & Tab. xxxvi. f. & Tab. xxxii. 46.

<sup>r</sup> Eustach. Tab. xxxiiii. 64. contingens 66. & Tab. xxi. 42. conting. 40.

<sup>s</sup> Eustach. Tab. xxviii. 56. & Tab. xxxiii. 66.

<sup>t</sup> Eustach. Tab. xxxvi. Q.

<sup>u</sup> Eustach. Tab. xxi. X. & Tab. xxxi. X. in utr. lat. & Tab. xxx.

I.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxi. Y. & Tab. xxviii. S. in utr. lat. & Tab. xxxii. W. in lat. dextr.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxviii. S. in utr. lat.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxviii. S. testus R. in utr. lat.

<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxxvi. u. & Tab. xxxiii. y. in utr. lat.

f Eu.

tiam sub Pyriformi, & à latere inter medium & Tensorem vaginae, sub illa vagina sola. Infra medium *Pyriformis*<sup>f</sup>, in pelvi<sup>g</sup> incipiens à priori parte ossis sacri. Statim infra eum sequuntur *Gemini*<sup>h</sup> cum cauda *Obturatoris interni*<sup>i</sup>, quae inter eos incedit media, sic ut partem principii eorum contegat<sup>k</sup>: ipsa cum *Geminorum superiore* in fine sub extremo *Pyriformis*. Verum *Obturatoris* pars major<sup>l</sup> in pelvi haeret, adjacens ejus lateri<sup>m</sup>, sub Levatore ani. Infra Geminorum inferiorem denique *Quadratus femoris*<sup>n</sup>, principio suo post Semimembranosi principium. Caeterum *Pyriformis*, *Gemini*, cauda *Obturatoris interni*, *Quadratus*, post Gluteum magnum.

## C A P U T XXXI.

*De situ musculorum, qui in Femore.*

In parte posteriore per longitudinem femoris, *Biceps*<sup>a</sup>, & *Semitendinosus*<sup>b</sup>; ille ab externo latere, hic ab interno, uterque ab initio post Gluteum magnum<sup>c</sup>; *Semitendinosus* tendo, quo ad tibiā pertinet, in fine sub

f Eustach. Tab. xxix. g.

g Eustach. Tab. xxxviii. w. in utr. lat.

h Eustach. Tab. xxix. h. k. & Tab. xxxvii. s. t. in utr. lat.

i Eustach. Tab. xxix. i.

k Eustach. Tab. xxix. h. k. texti i.

l Eustach. Tab. xxxvii. w.

m Vesal. de H. C. F. Lib. ii. Tab. 16. EFG.

n Eustach. Tab. xxix. l.

Eustach. Tab. xxix. r. dext. &

rw. sin. & Tab. xxx. T. in utr. fem. & Tab. xxxi. a. b. sin. & b. dext.

b Eustach. Tab. xxix. q. in utr. fem. & Tab. xxx. V. in utr. fem. & Tab. xxxi. c. in utr. fem. & Tab. xxxvii. r. dext.

c *Biceps*, Eustach. Tab. xxix. r. sin. rectus X.

*Semitendinosus*, Eustach. Tab. xxix. q. sin. textus X.

d Eu-



sub Sartorii tendine. Tum *Semimembranosus* <sup>d</sup>, partim pone *Semitendinosum* <sup>e</sup>, partim ab utroque ejus latere in femore nudus <sup>f</sup>: extremus autem tendo ejus circa poplitem ab externa parte tectus tendine *Semitendinosi*, in fine capite interiore *Gemelli*, & ligamento laterali interno genu.

Qua vero femur priora spectat, ibi in superiore parte juxta latus externum, *Tensor vaginae femoris* <sup>g</sup>. Per longitudinem mediae prioris partis *Rectus cruris* <sup>h</sup>, solo se capite suo occultans, subjiciensque Tensori vaginae femoris <sup>i</sup>, Sartorio <sup>k</sup>, Iliaco interno, Gluteo minori. Juxta eum magis per interiora femoris porrectus *Sartorius* <sup>l</sup>, ad tibiam mox infra genu pertingit, totus nudus. Infra Tensorem vaginae femoris tum à priori parte, tum à latere externo, usque ad genu, *Vastus externus* <sup>m</sup>, qui superiore parte sua sub eodem Tensore haeret <sup>n</sup>, prioris parte sub *Recto cruris* <sup>o</sup>. Ad genu autem *Vastus internus* <sup>p</sup>, ab interiore eademque pri-

Q ore

d Eustach. Tab. xxix. p.p. in utr. fem. & Tab. xxxvi. D. & Tab. xxx. W. in utr. fem. & Tab. xxxi. d.d. in utr. fem.

e Eustach. Tab. xxix. p.p. tectus q. in utr. fem.

f Eustach. Tab. xxix. p.p. in utr. fem.

g Eustach. Tab. xxviii. R. in utr. fem. & Tab. xxx. M.

h Eustach. Tab. xxviii. V. in utr. fem. & Tab. xxxii. Y. dext. & Tab. xxx. R. dext.

i Eustach. Tab. xxviii. V. tectus R. in utr. fem.

k Eustach. Tab. xxviii. V. tectus X. in utr. fem.

l Eustach. Tab. xxviii. X. in utr. fem. & Tab. xxx. O. dext. & O. O. sin. & Tab. xxxi. g. in utr. fem.

m Eustach. Tab. xxviii. T. in utr. fem. & Tab. xxxii. a. dext. & Tab. xxxiii. Y. & Tab. xxix. t. & Tab. xxxvi. F.

n Eustach. Tab. xxviii. T. tectus R. in utr. fem.

o Eustach. Tab. xxviii. T. tectus V. in utr. fem. & Tab. xxxii. a. tectus Y. in dext. fem.

p Eustach. Tab. xxviii. W. in utr. fem. & Tab. xxxii. q. dext. & Tab. xxxiii. S. & Tab. xxxi. h. & Tab. xxxvi. E. E.

q Eu-

ore femoris parte collocatus, & nudus quidem inter Sartorium Rectumque <sup>q</sup>; utrimque tectus, ab una parte Recto <sup>r</sup>, ab altera Sartorio <sup>f</sup>. *Cruialis* <sup>t</sup> post Rectum, Vastofque <sup>v</sup>.

Sequuntur qui ab osse pubis, & ab ischii tubere, per femoris partem internam incedunt. Eorum superior *Pectineus* <sup>w</sup>, per inguen decurrit nudus, praeter extremo suo, quo subit Vastum internum <sup>x</sup>. Qui mox infra cum, *Adductor longus femoris* <sup>y</sup>, primo diu nudus <sup>z</sup>, se ad postremum subijcit Sartorio <sup>a</sup>, & Vasto interno <sup>b</sup>. Ab interno hujus latere multo longior *Gracilis* <sup>c</sup>, ad ipsam usque tibiam pertinens est, à fine femoris post Sartorium <sup>d</sup> incedens, & ubi se inserit, non modo Sartorio <sup>d</sup>, sed & aliquantum Semitendinoso intectus. Post Pectineum deinde, & post Adductorem longum, *Adductor brevis femoris* <sup>e</sup> repositus: sed extremum ejus ex parte inter eos liberum ab eis, & partim nudum, par-

q Eustach. Tab. xxviii. W. in utr. fem.

r Eustach. Tab. xxviii. W. tectus V. in utr. fem. & Tab. xxxii. e. tectus v. in dext. fem.

s Eustach. Tab. xxviii. W. tectus X. in utr. fem.

t Eustach. Tab. xxxiii. e. in utr. fem. & Tab. xxxvi. x.

u Post *externum*, Eustach. Tab. xxxiii. e. sin. tectus v. post *internum*, Eustach. Tab. xxxiii. e. sin. tectus z.

w Eustach. Tab. xxviii. P. in utr. fem. & Tab. xxxii. d. dext. & Tab. xxxiii. a. dext.

x Eustach. Tab. xxxii. a. tectus e.

in dext. fem.

y Eustach. Tab. xxviii. Y. in utr. fem. & Tab. xxxii. e. dext. & Tab. xxxiii. z. dext.

z Eustach. Tab. xxviii. Y. in utr. fem.

a Eustach. Tab. xxviii. Y. tectus X. in utr. fem.

b Eustach. Tab. xxxii. e. tectus e. in dext. fem.

c Eustach. Tab. xxviii. Z. dext. & Z. sin. & Tab. xxx. Y. & Tab. xxxi. f. in utr. fem. & Tab. xxxi. o.

d Eustach. Tab. xxviii. Z. tectus X. in utr. fem.

e Eustach. Tab. xxxviii. y.

f Eu-

partim sub Vasto interno. Postque eum<sup>f</sup>, Adductorem magnum<sup>g</sup>, Pectineum, extremumque Psoae magni<sup>h</sup> & Iliaci interni, *Obturator externus*<sup>i</sup>, qui inter Psoam & Pectineum parva ab his parte nudus. *Adductor magnus femoris*<sup>k</sup> à superiore parte sequitur post Pectineum, & Adductorem brevem<sup>l</sup>: infra hunc post longum<sup>m</sup>, infra hunc post Gracilem, Sartorium, Vastum internum<sup>n</sup>: inter Sartorium vero, Adductorem longum, Gracilemque, nudus est, sicuti & in superiore parte femoris à posteriore Gracilis<sup>o</sup>. Et ut ad posteriores, à quibus cepimus, desinamus, post Tensorem vaginae femoris Gluteus medius<sup>p</sup> & minor, post Vastum externum Bicipitis caput breve<sup>q</sup>, post Gracilem<sup>r</sup>, & post inferiorem partem Sartorii, postque inferiorem Vasti interni<sup>s</sup>, Semimembranosus, qui & post Adductorem magnum<sup>t</sup>, post quem praeterea Semiten-

Q 2

miten-

f Eustach. Tab. xxxviii. x. fin. tectus y.

g Eustach. Tab. xxxviii. x. dext. tectus z.

h Eustach. Tab. xxxviii. x. tectus rrs. in fin. fem.

i Eustach. Tab. xxxviii. x. in utr. fem.

k Eustach. Tab. xxxii. A. & Tab. xxxiii. II. dext. & Tab. xxxviii. z. A. in utr. fem. & Tab. xxix. nn. dext. & Tab. xxxvi. w.

l Eustach. Tab. xxxviii. z. fin. tectus y.

m Eustach. Tab. xxxii. A. tectus o. dext. & Tab. xxxiii. II. tectus s. in dext. fem.

n Eustach. Tab. xxxii. A. tectus o. dext.

o Eustach. Tab. xxx. X. & Tab. xxxi. e. & Tab. xxix. n. fin.

p Eustach. Tab. xxxviii. S. post R. in utr. fem.

q Eustach. Tab. xxxi. a. post Z & Tab. xxxvi. G. à posteriore parte F.

r Eustach. Tab. xxx. W. fin. post Y. & Tab. xxix. p. fin. super. post o.

s Eustach. Tab. xxxvi. D. à posteriore parte EE.

t Eustach. Tab. xxx. W. fin. post X. & Tab. xxix. p. fin. super. post n. fin.

u Eu.

mitendinosus <sup>u</sup>, Bicipitis longum caput <sup>w</sup>, Gluteus magnus <sup>x</sup>. Post Obturatorem externum Quadratus femoris.

## C A P U T XXXII.

*De situ musculorum, qui in Cruce.*

**I**n horum recensitione à posteriore parte cruris per anteriorem ad priorem progrediemur.

Per posteriorem *Gemellus* <sup>a</sup> se à condylis femoris sub tegumentis demittit: at capita abscondit, exteriore subeuns Bicipiti <sup>b</sup>, interiore Semitendinoso <sup>c</sup> & Semimembranoso <sup>d</sup>. *Plantaris* <sup>e</sup> sequitur, capite suo situs sub Bicipite <sup>f</sup>, ventre partim sub capite exteriore Gemelli, partim inter ejusdem capita sub tegumentis; post & venter extremus, & tendo, sub Gemello; post tendo à latere interno tendinis achillis sub tegumentis. Post Gemellum <sup>g</sup> & Plantarem <sup>h</sup> *Soleus* <sup>i</sup>, ultra Gemellum tamen

<sup>u</sup> Eustach. Tab. xxix. q. à posteriore parte n. in dext. fem.

<sup>w</sup> Eustach. Tab. xxix. r. à posteriore parte n. in dext. fem.

<sup>x</sup> Eustach. Tab. xxix. r. fin. à posteriore parte testus X.

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxix. A & E. & Tab. xxx. β. in utr. crur. & Tab. xxxi. i k l. in utr. crure: & Tab. xxxviii Δ. in utr. crure.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxix. A. testus r w. fin.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxix. θ. test. q. fin.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxix. θ. testus pp. fin.

<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxix. r.

<sup>f</sup> Eustach. Tab. xxix. r. testus n. dext.

<sup>g</sup> Eustach. Tab. xxix. π. fin. testus A & E.

<sup>h</sup> Eustach. Tab. xxix. ππ. dext. testus r.

<sup>i</sup> Eustach. Tab. xxix. ππ. dext. & π. fin. & Tab. xxx. δ. in utr. crure: & Tab. xxxi. mm. fin. & m. dext.

men tum ab externo latere <sup>k</sup>, tum ab interno, nudus. Supraque Soleum *Popliteus* <sup>m</sup>, post eodem <sup>n</sup>, & partim post Soleum <sup>o</sup>: capite suo post Bicipitem cruris, & ligamentum laterale externum genu: extremo post genu ligamentum laterale internum. Post Soleum vero *Flexor longus digitorum pedis*, *Flexor longus pollicis pedis*, *Tibialis posticus*. Et *digitorum Flexor* <sup>p</sup> ab interna parte, ad tibiam, nudus <sup>q</sup> ab interna eademque inferiore cruris parte. *Flexor pollicis* <sup>r</sup> ab externa & eadem inferiore, similiter ex parte nudus, sed & ab interna <sup>s</sup>, & ab externa cruris parte <sup>t</sup>. *Tibialis* <sup>u</sup> in medio, per totam cruris longitudinem, cujus tamen nil nisi pars superior Soleo & Popliteo subiecta, sequens Flexoribus modo dictis <sup>w</sup>, tendo etiam ab interna eademque inferiore parte cruris, inter os tibiae Flexoremque digitorum, nudus <sup>x</sup>. Horum trium tendines per pedem

Q 3

extre-

k Eustach. Tab. xxix. π. fin. & Tab. xxx. δ. dext. & Tab. xxxi. m. ab externo latere ikl. in fin. crure.

l Eustach. Tab. xxx. δ. fin. & Tab. xxxi. m. fin. ab int. lat. l. & m. dext. & Tab. xxviii. Δ. in utr. crure.

m Eustach. Tab. xxix. Δ. & Tab. xxxvi. γ.

n Post *Plantarem*, Eustach. Tab. xxix. Δ. rectus γ.

o Eustach. Tab. xxix. Δ. rectus ππ. dext.

p Eustach. Tab. xxix. γ. & Tab. xxxvi. L. & Tab. xxx. τ. & Tab. xxxi. z. & Tab. xxviii. z. in crure.

q Eustach. Tab. xxix. γ. & Tab.

xxx. τ. & Tab. xxxi. z. & Tab. xxviii. z. in crure.

r Eustach. Tab. xxix. i. & Tab. xxxvi. K. & Tab. xxx. v. in crure: & Tab. xxxi. p. in utr. crur. & Tab. xxviii. π. in crure.

s Eustach. Tab. xxx. v. in crure: & Tab. xxxi. p. in dextr. crur. & Tab. xxviii. π. in crure.

t Eustach. Tab. xxix. i. & Tab. xxxi. p. fin.

u Eustach. Tab. xxxvii. x. & Tab. xxx. ε. in crure: & Tab. xxxi. δ. in crure: & Tab. xxviii. φ. in crure.

w *Digitorum flexori*, Eustach. Tab. xxx. ε. rectus τ. in crure.

x Eustach. Tab. xxx. ε. in crure: & Tab. xxxi. δ. in crure: & Tab. xxviii. φ. in crure. y-Eu-

extremum pergunt, ut post dicemus.

Juxta Solei carneam partem ab externo cruris latere *Peroneus longus*<sup>y</sup>, à summo crure ad pedem usque. Itemque *Peroneus brevis*<sup>z</sup>, sed tantum à media cruris longitudine, mediisque per longitudinem praecedenti magnam partem subjacens<sup>a</sup>, dein & ex parte tendine tendini ejus, tum juxta malleolum externum, tum qua una pone eum incedunt. Proximè à Peroneis *Extensor longus digitorum pedis*<sup>b</sup>, sua quidem superiore parte ante longum, inferiore ante brevem, ex parte subjacens utrique<sup>c</sup>. Ante Peroneum brevem *tertius*<sup>d</sup>, mox infra Extensorem modo dictum, ex parte sub Peroneo brevi<sup>e</sup>. Et ante eundem Extensorem, juxtaque spinam tibiae, in priori cruris parte *Tibialis anticus*<sup>f</sup>. Interque eum, eundemque illum Extensorem, toto prope corpore latens, *Extensor proprius pollicis pedis*<sup>g</sup>; cujus modo inferior pars, ubi jam ad pedem appropinquat, emergit<sup>h</sup>. Cacterum tendines

*Tibi-*

y Eustach. Tab. xxix. 2. sin. & Tab. xxx. 1. in crure: & Tab. xxxii. 7. & Tab. xxxiii. 7. in utr. crure.

z Eustach. Tab. xxix. 11. sin. in crure: & Tab. xxx. 22. in crure: & Tab. xxxii. 8. & Tab. xxxiii. 8. in utr. crure.

a Eustach. Tab. xxix. 11. in crure sin. testus 2. & Tab. xxx. 22. testus 1. in crure.

b Eustach. Tab. xxix. 4. & Tab. xxx. 9. in crure dext. & Tab. xxv. 11. 1. in crure sin. & Tab. xxxii. 6. dextr.

c *Longo*, Eustach. Tab. xxx. 8. testus 1. in dextr. crure.

*Brevi*, Eustach. Tab. xxx. 8. testus 2. in dext. crure.

d Eustach. Tab. xxix. 7. sin. & Tab. xxx. 1. in crure: & Tab. xxviii. 5. in crure: & Tab. xxxii. 9.

e Eustach. Tab. xxx. 1. testus 22.

f Eustach. Tab. xxx. 1. dext. & Tab. xxviii. 11. in utr. crure: & Tab. xxxii. 4.

g Eustach. Tab. xxx. 1. in dext. crure: & Tab. xxviii. 4. in sin. crure. & Tab. xxxii. 12.

h Eustach. Tab. xxx. 1. in dext. crure: & Tab. xxviii. 4. in sin. crure.

a Em-

*Tibialis*, *Extensoris pollicis*, *Extensoris digitorum pedis longi*, *Peroneorum*, ulterius per pedem procurrunt, ut in sequenti capite mox docebimus, postquam huic adjecerimus, quod cum ligamentum cruris ossibus interjectum, musculosque posteriores à prioribus distinguens, superiorem partem intervalli illorum ossium non impleat, ibi *Extensor longus digitorum pedis*, *Tibialis anticus*, itemque *Extensor proprius pollicis pedis*, cum is ab ipso usque capite superiore fibulae incipit, contingant *Tibiale posticum*, ultimum eorum, qui in postica parte cruris.

## CAPUT XXXIII.

*De situ musculorum in dorso Pedis.*

Itaque à crure per latus internum pedis ad plantam pertinet *Tibialis postici* tendo <sup>a</sup>, ubi portionibus illis, quas per plantam spargit, ab inferiore parte adjecti, *Abductor pollicis*, *Flexoris longi digitorum* tendo, caput ad *Flexorem* illum accedens, *Flexor brevis pollicis pedis*, *Adductor ejusdem*, vagina tendinis *Peronei longi*, atque adeo ipse ille tendo: atque hi omnes plerumque. Per dorsum pedis incedit ab interno latere tendo *Tibialis antici* <sup>b</sup>, ad cujus extremum ab inferiore parte applicatus *Abductor pollicis* <sup>c</sup>, & Fle-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxx. e. in pede extr. & Tab. xxviii. f. in pede extr. & Tab. xxxii. 12. in pede extr. & Tab. xxxiii. 12. 13.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxviii. n. in pede

extr. utr. & Tab. xxxii. 4. in pede extr. & Tab. xxx. i. in pede fin. <sup>c</sup> Eustach. Tab. xxviii. n. in pede tectus 8.

<sup>d</sup> Eu-

Flexor ejus brevis. Ab externo latere tendo *Peronei tertii*<sup>d</sup>, ac infra cum ille *brevis*<sup>e</sup>, infraque cum, *longi*<sup>f</sup>. *Brevis* autem tendo illi longi subjacet, ubi per ligamentum, quod eos juxta malleolum coërcet, una incedunt: dein etiam ex parte <sup>g</sup> inter duo ligamenta, illud quod modo diximus, illudque quod mox infra malleolum. Per summum dorsum, tendo *Extensoris proprii pollicis*<sup>h</sup>, illique *Extensoris longi digitorum*<sup>i</sup>: hi porro per dorsum digitorum <sup>k</sup>, ille per pollicis<sup>l</sup>: omnes nudi.

Praeter eos autem partim sub tendinibus *Extensoris longi digitorum*<sup>m</sup>, *Extensoris proprii pollicis*, *Peronei tertii*<sup>n</sup>, ac *brevis*, partim nudus in dorso eodem pedis, pollicis, digitorum, situs *Extensor brevis digitorum pedis*<sup>o</sup>: in pollice autem extremus tendo ejus ad pollicem pertinens, subit tendinem *Extensoris proprii pollicis*<sup>p</sup>. Praeterque brevem illum partes quorundam, quos plantae accensemus, *Abductoris pollicis*<sup>q</sup>, *Flexo-*

d Eustach. Tab. xxviii. 5. in pede sin. & Tab. xxxii. 9. & Tab. xxx. <sup>e</sup> in pede extr.

e Eustach. Tab. xxx. 7. in pede extr.

f Eustach. Tab. xxx. 8. in pede extr.

g Eustach. Tab. xxxi. o. totus n. inter u. & w.

h Eustach. Tab. xxviii. 4. in utr. pede extr. & Tab. xxxii. 10. in utr. pede extr. & Tab. xxx. 2. in pede extr. & Tab. xxxiii. 12-3.

i Eustach. Tab. xxviii. 1. &c. in pede extr. utr. & Tab. xxxii. 7. in pede extr. utr. & Tab. xxx. 6. in utr.

pede extr.

k Eustach. Tab. xxviii. 12. 15. 18. 21. in fin. ped. extr.

l Eustach. Tab. xxviii. 4. in pollice utr.

m Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 3. w. &c. sub tendinibus per dorsum pedis porrectis.

n Eustach. Tab. xxxiii. 18.

o Eustach. Tab. xxxiii. 18-3. totus 12-3.

p Eustach. Tab. xxviii. 8. in utroq. ped. extr.



*Flexoris brevis ejus, Abductoris minimi<sup>a</sup>, itemque Flexoris ejus brevis<sup>r</sup>, & Interosseorum externorum<sup>f</sup>.*

## CAPUT XXXIV.

*De situ illorum, qui in Planta & Digitorum pedis parte inferiore.*

**P**rimi in planta, *Flexor brevis digitorum pedis, Abductor pollicis pedis, Abductor minimi pedis. Flexor brevis<sup>a</sup>* per mediam plantae longitudinem, ab interno latere pedis extremi *Abductor pollicis<sup>b</sup>*, ab externo ille *minimi<sup>c</sup>*. *Hujus* initium ex parte subjacet Flexori: *hujus*, saepe Abductor pollicis. *Flexoris* tendines per inferiorem digitorum partem procurrunt<sup>d</sup>, ubi primi, nisi quod in fine ex parte superscandant Flexoris longi tendines<sup>e</sup>. Rursus in planta post Flexorem brevem, *caput ad Flexorem longum digitorum accedens<sup>f</sup>*, cujus principium supra Abductorem minimi, pollicisque; pone hunc à latere calcanei nudum. Tum tendo *Flex-*

R

oris

q Eustach. Tab. xxix. 3. in ped. extr. utr.

r Casser. Tab. apud Spigel. Lib. iv. Tab. xxxix. Fig. 3. l. ad externum latus pedis extremi: & Bidloo Tab. LXXXII.

s Casser. Tab. apud. Spigel. Lib. iv. Tab. xxix. Fig. 3. l. l. l. l. pollicis proximae: & Bidloo Tab. LXXXII.

a Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 14. e.

b Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 13. f. & Eustach. Tab. xxviii. 8.

in utr. pede.

c Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 13. e. & Eustach. Tab. xxix. 3. in utr. pede extr.

d Casser. Tab. apud Spigel. Lib. iv. Tab. xlii. Fig. 2. tendines D. D. D. indigitis: & Bidloo Tab. LXXXV. I. tendines in digitis.

e Bidloo Tab. LXXXV. I. tendines in fine testis tendinibus musculi H.

f Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 14. a. & Cowper Myot. ann. 1724. Tab. Lxv. Fig. 2. 187.

g Vo-

oris longi digitorum <sup>g</sup>, Flexorisque longi pollicis <sup>h</sup>, quorum ille à latere calcis supra Abductorem pollicis incedit <sup>i</sup>, post supra Flexorem brevem digitorum; quatuor deinde, in quos se findit, tendinibus supra ejusdem brevis tendines, per plantam <sup>k</sup>, perque digitos <sup>l</sup>, solummodo ad postremum infra eos <sup>m</sup>: hic autem primum quidem à latere calcis supra Abductorem pollicis <sup>n</sup>, dein vero supra caput ad Flexorem longum digitorum accedens, hujus deinde Flexoris tendinem <sup>o</sup>, post Flexorem brevem digitorum <sup>p</sup>, ultra eum nudus <sup>q</sup>, per plantam, pollicemque.

Deinde autem reliqui in planta sitorum. Ex quibus primo *Lumbricales pedis* <sup>r</sup> in media planta, unus à cujusque tendinum Flexoris longi digitorum interiore latere, iique ex parte supra Flexorem brevem digitorum <sup>r</sup>.

*Flexor*

g Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 14. f. & Cowper. Myot. ann. 1724. Tab. LXV. Fig. 2. 186.

h Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 14. f. & Cowper. Myot. ann. 1724. Tab. LXV. Fig. 2. 4.

i Eustach. Tab. XXVIII. E. tectus 8. dext.

k Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 14. f. & Cowper. Myot. ann. 1724. Tab. LXV. Fig. 2. 186.

l Bidloo Tab. LXXXV. tendines musculi H. in digitis.

m Bidloo Tab. LXXXV. tendines musculi H. in digitis, tegentes illos I. ab inferiore parte.

n Eustach. Tab. XXVIII. E. tectus 8. dext.

o Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 14. f. f. tectus 7 f. & Cowper. Myot. ann. 1724. Tab. LXV. Fig. 2. 4. tectus 186.

p Casser. Tab. apud Spigel. Lib. IV. Tab. LXII. Fig. 2. M.M. tectus C C C.

q Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 14. f. in planta: & Cowper. Myot. ann. 1724. Tab. LXV. Fig. 1. 4.

r Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 14. p. etc. & Casser. Tab. apud Spigel. Lib. IV. Tab. XLII. Fig. 2. K. K. K. & Fig. 3. F. F. F. F.

s Casser. Tab. apud Spigel. Lib. IV. Tab. XLII. Fig. 2. K. K. K. K. tecti C C C.

t Eu

*Flexor brevis pollicis pedis* <sup>a</sup> à parte pollicis , partim supra Abductorem pollicis <sup>u</sup> , partim Flexorem brevem digitorum <sup>w</sup> , partim tendinem Flexoris longi pollicis <sup>z</sup> , eumque Flexoris longi digitorum <sup>y</sup> , primumque Lumbricalem <sup>z</sup> , alioquin nudus & in planta <sup>a</sup> , & à latere interno pedis <sup>b</sup> . Juxta latus ejus externum *Adductor pollicis pedis* <sup>c</sup> , supra tendinem Flexoris longi digitorum <sup>d</sup> , caputque ad eum accedens , & Flexorem brevem pollicis <sup>e</sup> , Lumbricalesque ac tendines Flexoris longi digitorum primos duos , vel tres , vel omnes . *Transversus pedis* <sup>f</sup> ab externo hujus Adductoris latere juxta digitos , supra tendines Flexoris longi digitorum , supraque Lumbricales , inter hos ex parte nudus .

R 2

- z Caffer. Tab. apud Spigel. Lib. iv. Tab. XLII. Fig. 1. H H. & Fig. 2. inter FF. & M M. & Fig. 3. R R. & Tab. XLIII. Fig. 1. E D. & Cowper. Myot. ann. 1724. Tab. LXV. Fig. 2. 180.  
u Caffer. Tab. apud Spigel. Lib. iv. Tab. XLII. Fig. 1. H H. testus E E.  
w Caffer. Tab. apud Spigel. Lib. iv. Tab. XLII. Fig. 2. qui est inter FF. & M M. testus C C C.  
x Caffer. Tab. apud Spigel. Lib. iv. Tab. XLII. Fig. 3. R R. testus C.  
y Caffer. Tab. apud Spigel. Lib. iv. Tab. XLII. Fig. 3. R R. testus B.  
z Caffer. Tab. apud Spigel. Lib. iv. Tab. XLII. Fig. 3. R R. testus F.

- superiore.  
a Caffer. Tab. apud Spigel. Lib. iv. Tab. XLII. Fig. 1. H H.  
b Caffer. Tab. apud Spigel. Lib. iv. Tab. XLII. Fig. 1. qui à superiore parte extremi O.  
c Caffer. Tab. apud Spigel. Lib. iv. Tab. XLIII. Fig. 1. C. & Bidloo Tab. LXXXVI. Fig. 2. D. & Cowper. Myot. ann. 1724. Tab. LXV. Fig. 2. 11. & Tab. LXVI. Fig. 1. 10. in planta.  
d Cowper. Myot. ann. 1724. Tab. LXV. Fig. 2. 11. testus 186.  
e Caffer. Tab. apud Spigel. Lib. iv. Tab. XLIII. Fig. 1. C. testus D E.  
f Caffer. Tab. apud Spigel. Lib. iv. Tab. XLIII. Fig. 1. I K L. & Bidloo Tab. LXXXVI. Fig. 2. E.

g Caf.

dus. *Flexor brevis digiti minimi pedis* <sup>a</sup> juxta digitum illum, partim supra Abductorem minimi <sup>b</sup>, partim nudus tum ab inferiore parte in planta <sup>c</sup>, tum ab exteriore in dorso pedis <sup>d</sup>. *Interossei* <sup>e</sup>, ut in vola, ab hac parte postremi sunt. Quorum *uterque digiti tertii, quartique, ille quinti*, quandoque & *secundus secundi*, supra tendines Flexoris longi digitorum: iidem, praeter illum quinti, & quoque tantum aliquando *secundus secundi*, supra Lumbricales. *Uterque quarti* supra caput ad Flexorem longum digitorum accedens: *secundus ejusdem* etiam supra Flexorem brevem digitorum. Omnes juxta digitos supra Transversum pedis <sup>m</sup>, praeter *primum secundi*: & cum Transversus tantum ab osse quarto metatarsi incipit, praeter illum quinti. *Primus autem secundi* totus supra Adductorem pollicis; supra quem etiam, sed tantum ex parte, *secundus ejusdem* <sup>n</sup>, & *tertii uterque* <sup>o</sup>. Ille minimi etiam ex parte supra Flexorem  
 rem

g Casser. Tab. apud Spigel. Lib. iv. Tab. XLII. Fig. 2. l. & Fig. 3. H. inferior: & an Cowper. Myot. ann. 1724. Tab. LXV. Fig. 2. 190? & Casser. Tab. apud Spigel. Lib. iv. Tab. XXXIX. Fig. 3. l. ab externo latere pedis extremi: & Bidloo Tab. LXXXII.

h Casser. Tab. apud Spigel. Lib. iv. Tab. XLII. Fig. 2. l. inf. tectus G G G H H.

i Casser. Tab. apud Spigel. Lib. iv. Tab. XLII. Fig. 2. l. inf.

k Casser. Tab. apud Spigel. Lib. iv. Tab. XXXIX. Fig. 3. l. ab externo latere pedis extremi: & Bidloo Tab. LXXXII.

l Casser. Tab. apud Spigel. Lib. iv. Tab. XLIII. Fig. 1. H. H. H. & Bidloo Tab. LXXXVI. Fig. 2. & 3. & Cowper. Myot. ann. 1724. Tab. LXVI. Fig. 1. 191. & Casser. Tab. apud Spigel. Lib. iv. Tab. XXXIX. Fig. 3. l. l. l. l. pollicis proximi: & Bidloo Tab. LXXXII.

m Casser. Tab. apud Spigel. Lib. iv. Tab. XLIII. Fig. 1. H. H. H. tecti I K L. & Bidloo Tab. LXXXVI. Fig. 2. A. A. A. tecti E.

n Casser. Tab. apud Spigel. Lib. iv. Tab. XLIII. Fig. 1.

o Casser. Tab. apud Spigel. Lib. iv. Tab. XLIII. Fig. 1.

rem brevem minimi <sup>r</sup>. Caeterum ex parte etiam à lateribus Lumbricalium, & tendinum Flexorum, nudi *uterque tertii & quarti, & ille quinti.* Sed pars praeterea *secundi digiti secundi* supra primum tertii, *secundi tertii* supra primum quarti, *secundi quarti* supra illum quinti. Atque *uterque secundi, secundus tertii, idemque quarti,* etiam ad dorsum pedis pertinent <sup>q</sup>, ibi ossibus metatarsi interjecti, & magnam quidem partem nudi, partim testis Extensore digitorum brevi, Extensorisque longi digitorum tendinibus, solo *primo secundi* à longi tendinibus libero.

Supereft tendo *Peronei longi*, qui primum supra Abductorem minimi <sup>r</sup>, tum per vaginam suam incedit <sup>f</sup> supra prima illorum Interosseorum, qui à vagina illa oriuntur, initia, illudque Adductoris pollicis, ad postremum supra Flexorem brevem pollicis.

R 3

H I

p Caffer. Tab. apud Spigel. I. lib. iv.

Tab. XLIII. Fig. 1. G. testus F.

q Caffer. Tab. apud Spigel. Lib. iv.

Tab. XXXIX. Fig. 3. l. l. l. l. pol-  
lici proximi: & Bidloo Tab.

XXXXII.

r Eustach. Tab. XXIX. 2. testus 3.  
in utr. pede extr.

s Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab.  
15. XY.



# HISTORIAE MUSCULORUM HOMINIS

## LIBER TERTIUS

*In quo singulorum historia traditur.*

### PROOEMIUM.



Quoniam ergo quae de situ musculorum existimavimus esse dicenda, absolvimus, tempus est ad accuratorem singulorum descriptionem proficisci, quam in hunc librum transferendam esse putavimus. Trademus autem cujusque originem, decursum, insertionem, formam, carneam tendineamque partem, cohaesionem, si quae sit, cum aliis, usum, icones. Trademus, quales frequentius invenimus in optimis corporibus hominum, qui ad plenum incrementum suum, roburque pervenerant: eos enim, utpote perfectiores, placuit eligere, cum quae se ratione in quaque parte aetatis, omnibusque in hominibus habeant, aut difficillime, aut nullo modo dici possit. Passim tamen adscribemus, quomodo etiam in perfectioribus discrepent, praesertim si frequenter, multumque discrepent. Multas autem, quas praeterea animadvertimus, varietates, quia multiplices, & pleraeque parvi momenti sunt, scientes praetribimus, ne rem per se satis impeditam, bis, quae parum utili-

utilitatis habent , magis impedivimus. Quanquam non alieni effemus ab eo , ut ad pleniorum operum naturae , etiam ludentis , cognitionem , quid à regula , quam proponemus , in aliis atque aliis recedat , subjiciatur : qua in re , si ex iis , quae adhuc vidimus , judicare licet , nullus invenietur finis , habebuntque semper , qui his capiuntur , sicut nos habuimus , rem anatomicam quo locupletent. Nobis inconstantia illa naturae non mediocriter auxit laborem , saepe , quid pro regula eligeremus , incertis. Eoque factum , ut didicerimus , non modo recte observandum , sed etiam iterum , ac saepius : & quod majus quiddam est , delectum esse quendam habendum eorum , quae observantur ; discernendaque quae perfectiora sunt , & ex naturae instituto imprimis facta , ab iis quae aberrant. Ita autem ad judicandum rogamus accedere ut velint , qui cum iis , quae natura ipsa , id est , corpora hominum , eis exhibebunt , haec nostra aliquando comparabunt. Origines , decursus , insertiones , & cohaesiones accuratissime persequemur. Figuram in genere , neglecturi minutiora , quae legenti difficultatis multum afferrent , utilitatis parum , & quae si expeterentur , pictura praestaret quam verbis exprimere. In genere quoque carneam tendineamque partem , & maxime quales illae in exterioribus musculorum apparent. Neque putamus faciundum , ut singulas cujusque fibras operose describamus : nam esset infinitus labor , & neque nobis jucundus , neque necessarius anatomes Cultoribus ; sufficitque earum decursus in universum cognovisse. His autem , qui res parvi momenti colligere amant , non magis quam illis , qui varietates , deerunt addenda. Et fortasse videbimur earum plus etiam satis admiscuisse : fere tamen nullas addemus , nisi quae non modo non turbent ,

sed

sed etiam juvent pleniorē cognitionem. Quid singuli soli & toti efficere valeant; cum nihil eis obstat, breviter indicabimus: quandoque etiam, cum pars altera earum, quibus affixi, firmata; aut cum tantummodo agunt parte quadam sui. Atque in his omnibus, ut hoc semel dicatur, cum corporis universi statum, partiumque positum, sumemus, quem in secundo libro definivimus; tantummodo in actionibus recensendis, ubi necessarium videbitur, alios interdum assumpturi. Spes enim est simplicibus his regulis effecturos esse, ut qui animum adhibere velint, non multum inventuri sint difficultatis ad eandem in omni alio statu, positumque, intelligenda. Quod vero attinet ad icones, etsi nostra cura expressas dare optavissimus, tamen nolumus editionem huius historiae differre, donec tantae molis opus aliquando possemus absolvēre; praesertim cum exsint Vesalianae & Eustachianae, utraeque profecto bonae, & illae etiam artificii plenae, hae accuratae, perspicuae, & quod non parvi momenti est, iudicio concinnatae. His itaque, quae praecipuam non modo tyronibus, sed etiam provectioribus, consummatisque in rebus anatomicis, utilitatem praebent, etiam nunc utemur, ut in superiore libro usi sumus. Per quem fere usi sumus Eustachianis, quoniam fere poterant sufficere, & ne per plures quaerendi labore augeremus difficultatem intelligendi: nullibique, nisi ubi illae non sufficiebant, adhibuimus alias. In hoc autem, ut descriptio plenior erit, ita etiam quaecumque bonae, aut tolerabiles sint, laudabuntur. Primasque dabimus Eustachianis, ut quae ad usum optima. Post eas sequentur Vesalianae, quae rebus quidem illis, quibus Eustachianae inprimis commendabiles, inferiores quam illae sunt; picturae autem artificio, & nativa rerum specie longe superiores. Atque ultimam apud



hos omnia invenirentur, & non haberemus necesse, alios quoque advocare, eoque onerare bibliothecam Myographicam! Ubi vero illi nos deficient, ad eos, qui quidque optime exhibuerunt, confugiemus. Adbibere autem iudicium in omnium delectu, ordineque, annitemur, ut in superiore annisi sumus libro. Haec in singulis musculis exequi studebimus. In eorum vero recensitione eum ordinem tenebimus, quo alii post alios à capite ad calcem dispositi sunt, quem superiore libro indicavimus; ut qui ex ejus praescripto quaerere eos aggredientur, aut demonstrari à nobis videbunt, minimo labore cujusque historiam adbibere operi possint: malimus enim in indicem conjicere, quinam ad quamque partem pertineant; eumque in quartum librum rejicere. Postremo decreveramus singulis subjicere nomina omnia, quae data eis sunt ab omnium aetatum Anatomicis, de quibus loquuntur monumenta: sed ea, quae olim conquisivimus, emitte, ut sunt, nolumus, veriti, ne quis error irrepserit; non vacat autem recensere. Non possumus tamen, quin adscribamus nomina, aut si qui sine nomine indicati, breves circumscriptiones, quibus usi sunt, qui principes in Myographia exstiterunt, suarumque observationum fructum publice protulerunt. Nam etsi videamur nostris, ad quae tantam contentionem animi adhibuimus, imprimis favere posse, nec tamen injuriosi esse in egregios illos Viros: tamen eorum etiam monumenta apud nos sunt in debito honore & pretio; quae ut facilius ab iis, qui & nostris uti, & illa quoque evolvere, è re sua putabunt, adhibeantur, ipsaeque simul noscantur, adjiciemus nomina, aut circumscriptiones, quibus musculi in iis significati. Hic vero ne quis expectet, nos omnes, qui de quaque re aliquid boni, aut memorabilis tradiderunt, exquisita cura congesturos: non sumus nescii,

S

quan-

*quantum suscipi remus negotii , si hoc vellemus conari ; & cogere mur plus etiam his temporis , quam commode possemus , impendere. Indicabimus praecipuos , & quorum plerosque jam diu collectos nunc habemus in promptu ; his , quae nobis non sine labore paravimus , qualiacunque sint , aliis aliquantum gratificandi voluntate. Nunc nihil amplius obstat , quominus ad ipsos musculos Te , Lector optime , admittamus.*

## REGIO PRIMA. CALVA.

## CAPUT I.

*De Epicranio.*

**T**enui quodam involucreo tectum caput est, ab imo occipitio, eique ab utroque latere finitima inferiore parte cranii, per latera calvae, perque occiput, verticemque, ac synciput, frontemque, ad supercilia, majoresque oculorum angulos, perque glabellam, & ab ea etiam excurrente per nasi dorsum. Inest ei musculosa natura, carnea ab utroque latere occipitis, carnea in fronte, superciliis, angulis majoribus, naso: *Occipitales* musculos vocant partes carneas posteriores, *Frontales* priorem; inter quas media tendinea. Occipitales<sup>a</sup> oriuntur ab ossibus temporum & occipitis, continuo, transversoque, à radice processus mammillaris, & quidem ab ejus posteriore parte, in occiput ab utroque latere ductu, supra principia Retrahentium auriculas, extremaque Sternomastoideorum. Tendinei

<sup>a</sup> Eustach Tab. xxix. A. A. & Tab. xxiv. B. & Tab. xxx. A. A. &

Cowper Myot. ref. ann. 1724. Tab. xxi. E.

<sup>b</sup> Ed-

dinci ab initio, mox fiunt carnei: notabilique intervallo disjuncti, ipsi autem tenues & lati, ac breviores quam latiores, oblique per occipitis latera in priora adscendunt, paullatim extenuati, donec in aponeurosem rotundo extremæ carnis ambitu quisque abeat. Hæc quoque tenues & latae, pergunt, sensimque convergunt; sæpe in fasciculos tendineos vi-  
sensos distinctæ: desinunt autem circa frontem, ab eisque caro procedit, quam dicunt musculos Frontales. Frequenter in robustis vidimus tenues tendi-  
neos fasciculos, secundum superiora lateris calvariae à posteriore parte in priorem porrectos; ad quos se Occipitalium oblique ex lateribus adscendentes fasciculi adju-  
gebant, decussantes eos, ipsisque se implicant. Frontalis<sup>b</sup> uterque ovato mucrone<sup>c</sup> incipit, descenduntque mucrones illi ad frontem<sup>e</sup>, & circa superio-  
rem eandemque mediam partem ejus se conjungunt in unum<sup>d</sup>: ex quo nata caro per ipsam frontem se de-  
mittit<sup>d</sup>, ejus latitudinem usque in tempora tenens, mediaque parte sui recta descendens<sup>e</sup>; ab hujus utra-  
que parte oblique ex lateribus veniens<sup>e</sup>, eoque fere obliquius, quo temporibus propior. A fronte per glabellam pergit<sup>d</sup>, quam integit, ad ejus se figuram angustans: ab eaque per dorsum nasi, per quod se

S 2 paulla-

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 1. E. E. & Tab. xxxv. a. a. & Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 1. A. & Cowp. Myot. ann. 1694. Fig. 1. A. A. & ann. 1724. Tab. xxi. A. & Tab. xxii. 17. & Santorin. Tab. 1. A.

<sup>c</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 3.

A. & Cowper Myot. ann. 1694. Fig. 1. A. & ann. 1724. Tab. xxi. A. & Tab. xxii. 17. & Santorin. Tab. 1. A.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 1. E. E-β.

<sup>e</sup> Santorin. Tab. 1. A.

f San-

paullatim extenuans, abit in tenuem aponeurosem; quae ab utroque latere confluit cum simili tenuitate eorum, quos Compressores narium appellavimus. Juxta superciliarum capita Frontalium caro extrinsecus dimittere in robustioribus solet portiones duas graciles, ab utroque latere unam; quae per latera summae radices nasi descendentes, modice convergunt, ac in priora magis quam finitima Frontalium caro, eminent, paulatimque exiliores fiunt, donec se jungant aponeurosi, quam modo diximus. Itemque ab harum externo latere alias duas, quae paulatim angustatae & extenuatae, descendunt, acceduntque ad anteriorem partem principii Levatorum labii superioris alarumque nasi. Ab harum autem externo latere ipsi Frontales se ossi frontis in angulis majoribus oculorum inserunt: atque ita quidem, ut cum ad supercilia venerunt, se ex lateribus secundum supercilia flectant ad angulos majores, ibique in mucronem<sup>f</sup> quisque exeat, paulatim acutorem, seseque in canthum illum curvantem, & quod dictum est loco, inter ortum Corrugatoris & Orbicularis palpebrarum, mox supra ligamentum, quo angulus major oculi alligatus ossi maxillari superiori, inserentem. In decursu ad canthum illum solent fasciculos quosdam Orbicularibus palpebrarum, aliquando & Corrugatoribus superciliarum continuare. Quin & non raro pars quaedam se Corrugatori circa tempus adjungit, circumiens cum eo canthum minorem. Quod hujus involucri inter Occipitales, ex occipitio in syn-

ciput

<sup>f</sup> Eustach. Tab. xxxv. aa-y. ut videtur;

caput, est, tanquam aponeurosi simile. Sic & quod à lateribus supra aures, & in temporibus superest, in fine adhaerens auriculis, qua faciunt introitus aurium cartilagineos; summoque margini zygomatum. Caeterum omni amplitudine sua cuti, interveniente panniculo adiposo, pertinaciter adnexum est. Frontales autem sursum & simul aliquantum in diversum trahunt, tenduntque, & explicant supercilia, quod infra supercilia usque ad palpebras est, angulos majores oculorum, glabellam; cutem quoque nasi sursum trahunt, & tendunt; simulque cutem reliquam capitis, quae retro frontem est, attrahunt ad eam; quo & corrugant frontem, rugis transversis: juvant etiam Levatores labii superioris alarumque nasi. Cutem capitis retrahunt Occipitales.

Est *Occipito-Frontalis*, Douglas Myogr. Cap. 4.

Partes ejus carnae posteriores sunt *Supercilium trahentes*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 7. *Occipitii musculi*, Fallop. Obs. an. *Occipitales*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 9. Cowper Myot. Cap. 6. Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 3. *Les muscles Occipitaux*, Winslow Exp. an. Traité de la tête, §. 260. & seq.

Pars carnea anterior, *Musculosa frontis cutem movens substantia*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 7. *Musculi frontis*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 3. *Musculus frontis*, Fallop. Obs. an. *Musculi Frontales*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 8. *Musculi cutis frontis*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. *Frontales*, Cowper Myot. Cap. 6. *Musculi frontis*, Morgagn. Adv. an. II. Anim. 9. *Frontales*, Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 5. *Les muscles Frontaux*, Wins-

low Exp. an. Trait. de la tête, §. 257. & seq.

Pars per nasi dorsum excurrens, *Nasum dilatantes*, adhuc à nemine cogniti, Columb. de re an. Lib. V. Cap.

4. *Quaedam carnosae fibrae*, à medio supercilio & spina navium exortae, &c. Fallop. Obs. an. *Musculus nasi*, Casser. Pent. Lib. III. Sect. I. Cap. 7. & 8. aut pars ejus. Pars *Elevatoris alae nasi*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 10. *Les Pyramidaux*, Winslow Exp. an. Trait. de la tête, §. 330. Huc pertinent *Proceri nasi*, Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 10.

## REGIO II. CIRCA AURICULAM.

### C A P U T II.

#### *De Attollente auriculam.* <sup>a</sup>

**P**ertenuis est, & caeteris auriculae musculis amplior, potestque praecedentis involucris pars haberi, à quo supra auriculam, aliquanto infra summum Temporale, tenuibus sparsisque tendineis filis sensim abscedit rotundi ambitus principio <sup>b</sup>, post paulatim angustior & crassior, extremo demum extenuatus, tendineusque; quo se affigit superiori & eidem priori parti eminentiae, quae in dorso auriculae est, qua extrinsecus cavum illud, quod medium inter crura antheliceis. Huc autem fasciculi ejus omni ex parte convergunt: sed

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 1. A. & Tab. xxviii. c. & Tab. xxxiv. A. & Valsalv. Tab. 1. Fig. 1. A. & Santorin. Tab. iii. Fig. 4. B. & Tab. 1. 4. & Casser. de voc. audit. org.

Tab. iii. org. audit. Fig. 1. BBB. & Pentacsth. Fig. eadem.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 1. A-a. & Tab. xxxiv. A-a. & Santorin. Tab. 111. Fig. 4. B.

<sup>c</sup> San-

priores magis in posteriora vergunt; quam posteriores in priora<sup>c</sup>; & posteriores minus insignes<sup>c</sup>. Sursum trahit auriculam, tenditque illam ejus partem, cui insertus; maxime si eodem tempore agant Frontales & Occipitales.

Est *Auriculae primus*, Fallop. Obs. an. *Primus proprium auriculae*, Casser. de aud. org. Lib. I. Cap. 5. & Pent. Lib. IV. Sect. I. Cap. 4. *Portio musculi Frontalis supra Crotaphitam ad aurem producti*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 14. *Attollens auriculae*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. *Le premier de l'oreille*, du Verney Trait. de l'oreil. I. Part. pag. 3. *Attollens auriculam*, Cowper Myot. Cap. 11. *Superior auriculae*, Valsalv. de aur. Part. I. Cap. 1. §. 6. *Le premier, & le second mitoyen*, Vieussens Trait. de l'oreil. I. Part. Chap. 2. *Superior auriculae*, Santorin. Obs. an. Cap. 2. §. 2. *Le superieur de l'oreille*, Winslow Exp. an. Trait. de la tête, §. 372.

## CAPUT III.

De Anteriore auriculae<sup>a</sup>.

**P**ertenuis & hic est, sed multo minor & angustior; eodem caeterum modo nascens ex Epicranio, supra zygoma fere medium. Proccedit retrorsum, & simul modice deorsum, paullatim se angustans, & ex earneo in extremum tendineum extenuans. Cum venit ad priorem partem auriculae, subit eam, & se inserit

<sup>c</sup> Santorin. Tab. 111. Fig. 4. B.<sup>a</sup> Santorin. Tab. 111. Fig. 4. d.<sup>a</sup> Val.

ferit dorso heliis eminentiae illius, quae concham distinguit : eamque eminentiam trahit in priora sursum, ac tendit.

Est *Auriculae musculus anterior*, Valsalv. de aur. Part. I. Cap. 1. §. 6. *l'Antérieur*, Vieuss. Trait. de l'oreil. I. Part. Chap. 2. *Musculus novus conchae proprius*, Santorin. Obs. an. Cap. 2. §. 4. *l'Antérieur de l'oreille*, Winslow Exp. an. Trait. de la tête, §. 373.

#### C A P U T I V.

##### *De Retrahentibus auriculae* <sup>a</sup>.

**T**res Retrahentes sunt satis similes inter se, parvi, graciles, ab initio tenues, tendinosi, angusti; inde sensim angustiores, sed carnei, & primo crassiores, post tenuiores; ad postremum tendinei. Oriuntur ab exteriori & eadem posteriore parte radices processus mammillaris, statim supra finem Sternomastoidei : indeque fere ex transverso pertinent ad medium maxime dorsum superioris illorum auriculae cavorum, in quae concham heliis eminentia distinguit. Itaque concham tendunt, auriculam trahunt retrorsum. Aliquando medius insignior est, crassior, longiusque veniens. Inferior aliquando deest, plerumque degenerat: nam & longius venit, saepe ex occipitio, aliquando inter ultima extrema Cucullaris & Complexi : & major est, &

<sup>a</sup> Valsalv. Tab. 1. Fig. 3. C. C. C. & Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xlv. Fig. 7. 39. & Casser. de voc.

audit. org. Tab. 11. organ. aud. Fig. 1. A. B. C. & Pentact. Fig. eadem.

<sup>a</sup> Eu-



& modo ad inferiorem partem conchae pertingit, modo circa eam in tenuitatem sensim evanescit, modo etiam parte quadam se continuat extremo Sternomastoideo. Infra hunc aliquando adhuc unum vidimus, pergracilem, & imperfectiorem.

Sunt *Auris musculus à mammillari processu proficiscens*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 10. *Secundus auriculae*, Fallop. Obs. an. *Secundus propriorum auriculae*, Casser. de aud. org. Lib. I. Cap. 5. & Pent. Lib. IV. Sect. I. Cap. 4. *Proprius auris externae*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 14. *Le second de l'oreille*, du Verney Trait. de l'oreil. I. Part. pag. 3. *Retrabens auriculam*, Cowp. Myot. Cap. 11. *Posterior auriculae*, Valsalv. de aur. Part. I. Cap. 1. §. 6. *Le postérieur*, Vieuss. Trait. de l'oreil. I. Part. Chap. 2. *Posterior auriculae*, & *Postici*, Santor. Obs. an. Cap. 2. §. 10. Huc quoque pertinent *Postici corrugatores*, seu *Occipitales minores*, Santor. Obs. an. Cap. 1. §. 4. *Le postérieur*, Winslow Exp. an. Trait. de la tête, §. 374.

## REGIO III. FACIES.

### CAPUT V.

#### *De Orbiculari palpebrarum.*

**H**ic in sphincterum numero habetur, formamque habet ovatam, tegumento similis. A cantho  
T autem

a Eustach. Tab. xlii. Fig. 1. FF.  
& Tab. xxviii. cc. & Tab. xxxv.  
bb. & Cowp. Myot. ann. 1694.  
Fig. 1. B. & ann. 1714. Tab. xxi.

B. & Tab. xxii. 27. 27. & Sant.  
Tab. 1. DEF. & Casser. Pent. Tab.  
1. org. vis. Fig. 1. BBDD.  
b Sant.

autem majore orsus, circumeunſque oram cavi offei oculi ſimul cum utraque palpebra, rurfus ad eundem canthum redit <sup>b</sup>. Et in cantho ſua ſuperiore parte inhaeret <sup>c</sup> tum offi frontis, ſtatim ſupra priorem partem offis unguis; tum vicinae parti offis maxillaris ſuperioris: deinde & ſuperiori parti ligamenti <sup>c</sup>, quod ab offe maxillari ſuperiori, è regione commiſſurae palpebrarum in cantho majore, ex tranſverſo ad commiſſuram illam deductum, pro longitudine ſua latum, planum, robuſtum. Inferiori in eodem cantho inhaeret <sup>c</sup> orae foraminis oculi, factae à proceſſu naſali offis maxillaris ſuperioris; itemque inferiori parti ligamenti <sup>c</sup>, quod diximus. Et qua his inhaeret, tendinoſus eſt. Praeterea exigua portione canthum majorem aliquando circumit, ea non affixus parti ulli. Eſt vero inſignior & craſſior, qua ab ora foraminis oculi incipit: exilior, anguſtiorque, qua à ligamento. Illa <sup>d</sup> quoque parte craſſior manet, & latior: haec <sup>e</sup>, qua inprimis palpebrae obductae <sup>e</sup>, tenuior, & anguſtior; quanquam totus non admodum craſſus ſit. Praeter palpebras autem totum tenet ſupercilium, magnamque genae partem, & quod ab angulo minore uſque in tempus eſt <sup>f</sup>, cum harum partium cute intervenſu panniculi adipoſi omni exteriori amplitudine ſua conglutinator. Adde quod juxta caudam ſupercilii accipiat inſignem

Cor-

<sup>b</sup> Santorin. Tab. 1. \*DEF\* ſin.

<sup>c</sup> Santorin. Tab. 1. \*.

<sup>d</sup> Santorin. Tab. 1. D. & Caſſer. Pentacth. Tab. 1. organi viciuſ Fig. 1.

BB,

<sup>e</sup> Santorin. Tab. 1. E. F. & Caſſer.

Pentacth. Tab. 1. org. viſ. Fig. 1. DD.

<sup>f</sup> Santorin. Tab. 1. D.

<sup>g</sup> San-

Corrugatoris supercilii partem <sup>g</sup>, eaque extimus ejus margo per canthum minorem, genamque, fiat <sup>h</sup>. Atque ille margo ex fasciculis laxius conjunctis constat, reliquo musculo strictius compacto. Et fere solus ille margo circum canthum minorem continuus est: partes enim, quae per palpebras incedunt, suis fibris ultra canthum minorem conveniunt in angulos acutos <sup>b</sup>, seseque decussant, implicantque, ea parte frequenter tendineae, & aliquando tendineum discrimen efficientes. Vidi easdem partes dicto in loco simul in acutum mucronem abeuntes, panniculo adiposo innexum, integentemque illum Orbicularis marginem, quem ex supercilio circum canthum minorem in genam continuo ductu incedere dixi. Cum incipit Orbicularis agere, palpebras adducit ad se invicem: cum pergit fortius, easdem comprimit, corrugatque; supercilium praeterea, & angulum minorem, genamque, cum palpebris, & contrahit, & aliquantum adducit ad canthum majorem; premit denique globum oculi.

Interdum ab ejus inferiore parte, quae juxta canthum minorem est, & quae à Corrugatore fit, pergracilis secedit portio <sup>i</sup>, descenditque oblique, mox adjungens se ad exteriorem marginem Levatoris labii superioris, (aut ad Zygomaticum minorem) & cum eo per labium illud dispergens; quod paullo quam ille magis extrorsum attollit: & videri quoque potest Orbicularem posse detrahare.

T 2 Est,

<sup>g</sup> Santorin. Tab. f. C.  
<sup>h</sup> Santorin. Tab. i. E. F.

<sup>i</sup> Santorin. Tab. i. o.

<sup>a</sup> San-

Est, qui *duo palpebrarum muscoli*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 9. *Palpebrarum primus, orbicularis*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 8. *Exterior, qui totum oculum ambit*, Fallop. Obs. an. *Orbicularis palpebrarum*, Fabric. de ocul. Part. I. Cap. 12. una cum *supercilii musculo*, Ibid. Part. III. Cap. 14. *Orbicularis palpebrae musculus major*, Casser. Pent. Lib. V. Indic. Tab. I. Fig. 1. BBB. una cum *minoribus palpebrarum musculis*, Ibid. DD: vide & Lib. V. Sect. I. Cap. 8. *Orbicularis latus cum Ciliari*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 10. *Qui Claudentes palpebras, sive Semicirculares*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. *Sphincter*, Molinett. Diss. an. path. Cap. 5. *Orbicularis palpebrarum*, Cowper Myot. Cap. 7. Douglas Myogr. Cap. 5. *Orbicularis oculi*, Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 6. & seq. *Le muscle Orbiculaire*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 286. & seq.

Portio, quae se adjungit ad Levatorem labii superioris, est *perpetuus lacertulus ab imo Orbiculari*, Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 7.

## C A P U T V I.

*De Corrugatore supercilii.*

**A**b osse frontis in glabella (ubi alter alterum pæne contingit) & capite supercilii incipit, modo uno latiore, modo duobus, modo tribus tendinosis acutis principiis: indeque paulatim latior, & pri-

a Santorin. Tab. I. I. &amp; Cowp. Myot.

ann. 1724. Tab. xxv. Fig. f. b.

b San-

primo crassior, mox tenuior, per dorsum supercilii ossei se inflectit, cumque ultra mediam ejus longitudinem processit, se valde extenuat, acceditque ad anteriorem, & ad superiorem Orbicularis palpebrarum partem; cum qua confluit, pergitque circum angulum minorem<sup>b</sup>, ut in ejus historia retulimus, cum eo quoque adnexus cuti, interventu panniculi adiposi: partim se etiam extremo Frontali continuare solet. Glabellam & supercilium deprimit, adducitque simul ad nasum; glabellam & caput supercilii corrugat, & in priora magis eminere facit, pilosque earum partium erigit in priora; caudam supercilii, & quod mox infra eam est, non corrugat, sed praetendit palpebrae superiori: ac cum Orbiculari contrahit ambitum oculi.

Est, qui sub cute supercilii, &c. Coiter. Obs. anatom. chirurg. pag. 109. An pertinet ad *supercilii musculum*, Fabric. de ocul. Part. III. Cap. 14. ? Notatus à Volcbero Coiter, *deprimendo, corrugando, & retrahendo versus nares supercilio destinatus*, Riolan. Anthropog. Lib. V. Cap. 8. *Corrugator*, apud Cowper. Myot. Cap. 6. in Frontali. *Musculus Frontalis verus, seu Corrugator Coiteri*, Douglas Myogr. Cap. 4. *Corrugator*, apud Morgagn. Adversar. anat. II. Animadv. 12. *Corrugator supercilii*, Santorin. Obs. anat. Cap. 1. §. 6. *Le muscle Sourcilier*, Winslow Exposit. anat. Trait. de la tête, §. 265. 266.

T 3

C A.

<sup>b</sup> Santorin. Tab. I. C.

<sup>a</sup> Cow-

## CAPUT VII.

*De Compressore naris<sup>a</sup>.*

**P**arvus hic musculus, totusque tenuis, angusto principio oritur ab exteriori parte radice alae nasi, juxta illam, cui insertus est Levator labii superioris alaeque nasi; cum cujus etiam extremo ad alam nasi pertinente, à principio commixtus est. Ab ortu latescit sensim, & per lateris nasi amplitudinem illam, quae inter extremum nasum osseum alamque est, incurvo ductu incedit ad dorsum nasi: quod antequam attingat, se in membranae speciem extenuat, eaque se cum simili membranaceo Frontalium extremo conjungit; fasciculis porro subtilibus dorsum nasi conscendens, donec eos dexter sinisterque commisceant<sup>b</sup>, praesertim superiores. Latus mobile nasi premit septum versus, eoque narem aliquantum comprimit, & cutem lateris mododicti corrugat ex transverso: sed necesse est, ut alae radix eodem tempore retineatur à Depressore suo; caeteroquin enim eam attollit in priora, inprimis si dexter sinisterque conspirent. Quod si uterque cum Depressoribus illis agat, his tamen praevaletibus, alae deprimuntur, & narium latera mobilia aguntur septum versus, ac cutis, qua latera illa, & ad quam ea pertinent dorsi nasi pars, vestita, circum ea ipsa tenditur. Atque hic notandum, Compressoris principium cum Depressore alae per-

<sup>a</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xx1. g G. & Tab. xx11. 35. & San-

torin. Tab. I. 22. sin. & a. dextr.

<sup>b</sup> Santorin. Tab. 1. 22. sin. & a. dextr.  
g Eu-

pertinaciter connexum esse; & cum eodem ita cum naturam aliquando conjungere, ut efficiat pene unum ex duobus illis.

Est, de quo Falloppius, *Alium praeterea invenio musculum carnem, &c.* Obs. an. in musculis nasi, buccarum, & labiorum. An *parvus nafi musculus*, Casser. Pent. Lib. III. Sect. I. Cap. 9. qui est *alius externus, qui alam naris dilatat sine elevatione nafi*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 13. & *primi partis Constringentium alas*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. ? *Elevator alae nafi*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 10. De quo Morgagni; *Itaque animadvertimus in Eustachii Tabulae*, &c. Adv. an. II. Anim. 12. *Transversus*, Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 11. & 12. Videtur esse *le Transversal ou inferieur*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 332.

## CAPUT VIII.

*De Levatore labii superioris alaeque nafi<sup>a</sup>.*

**L**abii superioris partem, quae à latere alae nafi est, & finitimam ipsius alae attollit canthum majorem versus, unde à processu nasali ossis maxillaris superioris, secundum surgentem de gena nasum, descendit; partimque fasciculos tenues inserit superiori parti alae, juxta genam; partim ulterius per vicinum labium decurrit<sup>b</sup>, ubi pertinaciter & ad panniculum adiposum, &

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xlii. Fig. 1. H. & Tab. xxviii. g. & Casser. Pent. Tab. ii. org. olfact. Fig. 1. G. & San-

torin. Tab. 1. ST.  
<sup>b</sup> Santorin. Tab. 1. S.

<sup>c</sup> San.

& ad Nasalem labii superioris , Orbicularemque oris adnexus. Principii angustus est , tenuisque , & tendinosus : inde à primo paulatim latior , primumque crassior , mox tenuior , per labium denique insigniter extenuatus , sensumque evanescens. In fine se conjungit & commiscet cum principio Compressoris naris , extremoque Levatoris labii superioris : & antequam ad labium venerit , pertinaciter connectit cum Depressore alae nasi , ei se etiam aliquando parte quadam continuans. Ad haec à parte ea , qua spectat nasi latus , portionem <sup>c</sup> tenuem per pingue lateris nasi demittit ad alam , eam versus paulatim evanescentem. Dum vero attollit labium cum ala , cutem , quae inter haec est angulumque majorem , laxat , & in priora aliquantum surgere facit ; augetque lacunam illam , qua gena ab ala nasi labioque superiore determinatur. Atque eandem lacunam , ut semel quaeque , quantum fieri potest , dicantur , pariter , cum agunt , insigniorem efficiunt Levator labii superioris , Zygomaticus uterque , Levator anguli oris , Buccinator.

Est pars *alae nasi musculi* , praesentis capitis ( de buccarum , labiorum , & nasi alarum musculis ) in altero latere quinti , aut omnium noni & decimi , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 13. Pars parisi sexti ( eorum , quibus narium pinnae , labia , & totius faciei cutis moventur ) ab ipso ( Vesalio ) quinto in loco numerati , Fallop. Obs. an. in musculis nasi , buccarum , & labiorum. Vide & Co-

c Santorin. Tab. 1. T.

a Eu-



Columb. de re anat. Lib. V. Cap. 6. *Musculus supercilii musculo junctus superiori labro insertus*, Casser. Pent. Lib. III. Indic. Tab. II. Fig. 1. G. *Pars primi, nasi alas abducentis*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. *Retractor alae nasi & Elevator labii superioris*, Cowp. Myot. ann. 1694. Cap. 9. *The second of the common of the nose*, Dougl. Myogr. Cap. 7. *Pars Elevatoris labii superioris proprii*, Ejsd. Cap. 8. *Dilatator alae nasi & Elevator labii superioris*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 10. *Pyramidalis, cum Pyramidalis vel socio vel parte*, Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 9. *La grande portion de l'Incisif lateral*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 562. una cum illo, quem dicit, *le muscle oblique ou lateral*, ibid. §. 331. ut videtur.

## CAPUT IX.

*De Levatore labii superioris <sup>a</sup>.*

**L**atum ei principium, & aliquando simplex <sup>b</sup>, aliquando in duo <sup>c</sup>, aut tria capita paene aequaliter <sup>c</sup>, alias & inaequaliter fissum; quo in gena supra foramen, quod infra orbem osseum oculi est, oritur secundum inferiorem partem istius orbis, latitudinem, quae ferme à surgente de gena naso, usque qua os jugale in latus prominere incipit, porrecta, tenens. Perque genam se modice in priora ad labium superius demittit,

V

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 1. I. K. & Tab. xxviii. h.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxviii. h.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 1. I. K. <sup>d</sup> Eu-

tit, sensim angustior, nec admodum crassus. Ad labium autem inter nasum angulumque oris pertingit<sup>d</sup>, & cum praecedente, ejus etiam ad exemplum, definit: quin & priusquam se per labium extenuet, cum Depressore alae nasi pertinaciter connectit. Labium trahit oculum versus, modiceque simul in latus: eoque in priora surgere facit, quod genae inter oculum labiumque est.

Est pars alae nasi musculus, praesentis capitis (de buccarum, labrorum, & nasi alarum musculis) in altero latere quinti, aut omnium noni & decimi, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 13. Pars partis sexti (eorum, quibus narium pinnae, labia, & totius faciei cutis moventur) ab ipso (Vesalio) quinto in loco numerati, Fallop. Obs. an. in musculis nasi, buccarum, & labiorum. Vide & Columb. de re an. Lib. V. Cap. 6. Ex propriis, qui superius labrum sursum trahit, Riolan. anthr. Lib. V. Cap. 12. Pars primi, nasi alas abducentis, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. Elevator labii superioris, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 10. Pars Elevatoris labii superioris proprii, Dougl. Myogr. Cap. 8. Elevator labii superioris, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 7. Elevator musculus proprius labri superioris, seu Incisorius, Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 22. L'autre portion de l'Incisif lateral, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 562. 563. & 564.

C A-

d Eustach. Tab. xli. Fig. 1. IK-a.

a Eus

## CAPUT X.

De Zygomatico minore <sup>a</sup>.

**Q**uem Zygomaticum minorem appellamus, cum plerisque datum invenimus, exilem, orientem <sup>b</sup> à priore parte lateris externi ossis jugalis, paullo infra quam à media ejus altitudine; & in priora ad labium superius descendentem; quod in latus oblique sursum trahit. Propter illud autem exteriori se margini Levatoris labii superioris jungit, cum eoque per idem illud labium dispergit. Fit ut pars <sup>c</sup> exilis abscedat ab ejus principio, quae se ad imum Orbicularis palpebrarum marginem adjungat, per eum incedens canthum majorem versus.

Est the shortest fleshy slip, &c. Dougl. Myog. Cap. 8. in Elevatore labii superioris proprio. De quo Morgagn. Sic ab osse jugali fasciculum fibrarum non contemnendum, &c. Adv. an. II. Anim. 12. Zygomaticus minor, Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 23. Le petit Zygomatique, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 560.

## CAPUT XI.

De Levatore anguli oris <sup>a</sup>.

**O**ritur <sup>b</sup> è fossula, quae impressa priori parti ossis maxillaris superioris, inter dentes molares primos

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 1. L. Santorin. Tab. 1. Q.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 1. L-s.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 1. L-β.

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 3. E.

<sup>b</sup> Santorin. Tab. 1. O. dext.

<sup>a</sup> Cow;

mos & foramen; quod infra orbem osseum oculi; ex eaque circa mediam altitudinem intervalli, quod modo diximus: estque ab ortu tenuis, latiorque. Paulo deinde crassior, & modice angustatus, descendit ad latus anguli oris, juxta quem se praecipue continuat <sup>c</sup> Depressori ejus, atque etiam Orbiculari oris partem dat, qua is se per labium inferius flectit. Angulum illum, malaeque partem, quae à latere menti est, attollit: quo & genar, qua sub oculo prominet, collecta surgit in priora, ut in subridente.

An est pars *alae nasi musculi*, praesentis capitis (de buccarum, labrorum, & nasi alarum musculis) in altero latere quinti, aut omnium noni & decimi, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 13. ? Ipse tamen tertii eorundem paris, qui sunt Zygomatici majores, partem esse suspicatus est, in Examine Obs. Fallop. in nasi alas, labia, & buccas moventibus; Num tertium vero meum, &c. Est, de quo Fallop. Dum tertium par descripsit; novum musculum praetermisit, &c. Obs. an. De quo Riolan. Labrum inferius sursum trahitur à musculo, &c. Anthr. Lib. V. Cap. 12. Secundus, ad latera trahens, five abducens, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. Elevator labiorum, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 10. & ann. 1724. Cap. 7. Elevator labiorum communis, Dougl. Myog. Cap. 8. Elevator labrorum communis, seu caninus, Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 24. & 36. Le. Canin, Winslow Exp. aa. Trait. de la tête, §. 561.

C A-

<sup>c</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxii. 21. continuatus 22.

a Eu-

## CAPUT XII.

*De Zygomatico majore<sup>a</sup>.*

**M**ajor ab externo latere ejusdem , à quo minor , ossis , paullo supra hujus marginem inferiorem , ibi ubi processum suum posteriorem inchoat , eodem atque ille modo , nisi quod descendat rectius , incedit ad oris angulum , ultraque eum pergens , seseque deorsum curvans , abit in Depressorem ejus<sup>b</sup>. Principium habet tenue , angustum , tendinosum : ab eo fit modice plenior , sic ut gracilis maneat , & multo latior sit , quam crassior : post sensim modiceque latior sit , tenuiorque. Juxta oris angulum non modo abit in Depressorem ejus , sed quadam etiam tenui parte decurrit pone continuationem Depressoris Levatorisque anguli ejusdem , & se juxta illum angulum adjungit exteriori parti Buccinatoris , cum eoque pergit ad Orbicularem oris , ejus deinde partem efficiens. Ab exteriori quoque parte , à latere anguli oris , subtilissimis fasciculis per exteriora primum Depressoris anguli , dein Depressoris labii inferioris , sub pingui labii , quod statim post cutem est , excurrit , à latere anguli per proximam labii inferioris partem in latus oppositum. Angulum oris cum subjecta ei malae parte attrahit eum locum versus , qui medius inter tempus &

V 3 aurem :

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 1. N. & Tab. xxviii. k. & Tab. xxxv. f. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxii. 20. & ann. 1694. Fig. 1. G.

Santorin. Tab. 1. P.  
<sup>b</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 1. N.  $\beta$ . Cowper Myot. ann. 1694. Fig. 1. G. continuatus H.

<sup>a</sup> Eu-

aurem : atque eo simul genam , ut praecedens , verum insignius , in tumorem sub oculo collectam surgere in priora facit , eandemque cogit tempus versus , ut in ridente.

Est unus ex quatuor muscutorum labris propriorum duobus primis , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 13. *Zygomaticus* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 12. *Primi paris, five attollentis labium superius* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. haud dubie. *Zygomaticus* , Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 10. *Zygomaticus* , Dougl. Myog. Cap. 8. Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 7. Morgagn. Adv. an. II. Anim. 12. *Zygomaticus major* , Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 26. & 36. *Le grand Zygomatique* , Winsl. Exp. an. Trait. de la tête , §. 559.

An fasciculi ejus sub pingui labii inferioris excurrentes , sunt *Corrugatoris seu Protrusoris* , Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 31. *ordo exterior* , §. 32.?

### C A P U T XIII.

#### *De Depressore anguli oris* <sup>a</sup>.

**D**epressor anguli oris valde tenuis est , & ab exteriori parte pertinaciter conjunctus cum panniculo adiposo , ab interiore cum Depressore labii inferioris. Incipit <sup>b</sup> ab exteriori parte imi marginis maxillae

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xlii. Fig. 1. P. dext. & Tab. xxxv. i. utr. lat. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxii. 22. & ann. 1694. Fig. 1. H. Santorin.

Tab. 1. X.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xlii. Fig. 1. P. ~~aa~~. Santorin. Tab. 1. X.

xillae inferioris , à latere menti ; latus ibi , sed statim angustior , seseque quo magis adscendit , magis angustans ; totusque modice in priora recurvans. Adscendit usque ad angulum oris ; juxta quem se exteriore sui parte continuat <sup>c</sup> Zygomatico majori : interiore autem , quae praecipua , Levatori anguli <sup>d</sup>. Qua vero angulum oris spectat , secundum eum se flectit ad labium superius , abitque in exteriorem Orbicularis partem , qua is labium superius ab oris angulo juxta os ambit. Angulum oris deprimit ; contrarius praeterea Zygomatico majori & Levatori anguli oris. Quibusdam in imo mento dexter sinisterque lunato ductu cohaerent <sup>e</sup>.

Hic à Vesalio haud dubie habitus pro parte Latissimi colli , qui est alterius lateris primus musculus , eorum qui buccas & labra movent , de H. C. F. Lib. II. Cap. 13. Est à menti lateribus adscendens in labrum superius , Sylv. Isagog. anat. Lib. II. Cap. 7. in musculis moventibus labra. Labium superius deorsum movens , à mento in illud labium delatus , Laurent. Histor. anat. Lib. V. Cap. 15. Ex propriis , quo superius labrum deorsum movetur , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 12. Quarti paris propriorum labiis , Vessling. Synt. Cap. 13. Depressor labiorum , Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 10. & ann. 1724. Cap. 7. Depressor labiorum communis , Dougl. Myogr. Cap.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 1. P-β.  
Cowper. Myot. ann. 1694. Fig. 1.  
H. continuatus G.

<sup>d</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab.  
xxii. 22. continuatus 21.  
<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxxv. ii. a.

a Eu.

Cap. 8. *Labiorum communis depressor*, seu *Triangularis*, Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 28. & 36. *Le Triangulaire*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 566.

## C A P U T XIV.

*De Depressore labii inferioris \**

**T**enuitate praecedentis similis, paullo supra, quam ab eo, unde ille, maxillae loco oritur, ab initio ad finem usque latus. Saepe autem margo ejus exterior fit à portione Latissimi colli, ad eum accedente. Ad os à latere menti, perque menti latus, & per labium inferius, oblique adscendit, & pertinet ad totam prope longitudinem labii inferioris, hoc ubi rubrum esse incipit desinens, sine extenuato. Ac dexter cum sinistro sua amplitudine quasi conglutinator est; itemque alter cum Orbiculari oris, uterque cum Depressore anguli oris. Labium inferius, & quod infra id à latere menti est, ipsumque mentum, oblique in latus, in quo situs, detrahit.

Est unus ex quatuor muscutorum labris propriorum duobus inferioribus, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 13. A quo labrum inferius deorsum movetur, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 12. *Tertii paris, deprimentis inferius labium*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. *Quinti paris propriorum labii*, Velling. Synt. Cap. 13. *Depressor labii*

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 1. Q. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxii. 25.

Santorin. Tab. 1. Y.

<sup>a</sup> San-



*labii inferioris* , Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 10. & ann. 1724. Cap. 7. *Depressor labii inferioris proprius* , Dougl. Myogr. Cap. 8. *Labri inferioris Depressor proprius* , Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 32. Pars ejus, qui le *Quarré* , Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 567.

## CAPUT XV.

*De Nasali labii superioris* .

**M**usculus quidam parvus tenuisque , cui Nasalis labii superioris nomen posuimus , se à globo , imaque parte septi nasi demittit ; in globo ab apice cartilaginis , è qua cum pare ejus globus ille majorem partem fit , oriens tenuissimo principio : indeque continuo secundum marginem septi , ex ejus involucris , usque qua labium septo continuatum , principio pariter tenuissimo , sed latiore. Retrorsumque secundum ima septi incedit ad labium , sensim crassior , sensimque latior , & saepe cum pare sui conjunctus. Cum ad labium venit , flectit se ; perque labium incedit angulum oris versus , adjungens se ad Orbicularem oris , hac parte pertenuis , sensimque evanidus : ita autem ad Orbicularem se adjungit , ut pro parte ejus haberi posset. Et juvat eum , adducendo angulos oris ad se mutuo , & ex transverso contrahendo & corrugando labium superius : videtur etiam deprimere nasi septum , globua.que.

An ad *Elevatorem labii superioris proprium* relatus à

X

Cow-

a Santorin. Tab. 1. i. ab utr. lat.

a Eu.

Cowpero, Myot. ann. 1724. Cap. 7. ? Est *tertius fibrarum ordo*, &c. Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 20. Caeteri non distinxerunt ab Orbiculari oris.

## C A P U T XVI.

*De Buccinatore<sup>a</sup>.*

**B**uccinatore, qui tenuis est, membrana oris, qua buccam vestit, extrinsecus tota operitur, per eam ab utraque maxilla, ubi hae dentes molares posticos continent, interque eas à partibus finitimis, ad os procedente. A superiore, principio tenui, nec valde lato, oritur extrinsecus pone molarem intimum, statim supra gingivam: ab inferiore, principio simili, ab eminentia oblonga, quam ejus illa causa habet inter intimi pariter molaris exteriorem partem, & radicem processus coronoidei. Loco intermedio continuatus est Constrictori superiori pharyngis: praetereaque mox supra continuitatem illam, tenui angustoque & tendineo principio oritur ab exteriore parte extremi hamuli processus aliformis: tali quoque orientem vidi à fundo intercapedinis, quae est inter hamulum & lamellam externam dicti processus. Per buccam ad os procedit; ad quod cum pervenit, abit in interiorem partem Orbicularis oris: & quidem aliqui ex superioribus ejus fasciculis in illam Orbicularis abeunt, quae in labio superiore: sic & aliqui ex inferioribus in eam, quae in inferiore: quidam

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 3. D. & Tab. xxxiii. D. Cowper Myot.

ann. 1724. Tab. xxii. 19. Santorin. Tab. 1. N.

a Eu-

dam in ipso augulo oris se decussant, sic ut illi, qui ex inferiore parte veniunt, ad eam Orbicularis, quae in labio superiore, pertineant; qui è superiore, ad eam, quae in inferiore. Totus autem ad membranam os vestientem, tanquam si agglutinatus esset, adhaeret. Angulum oris cum utroque labio in latus retrorsum trahit, ac contrahit angulum; quo ea simul buccae pars, quae à latere oris est, contrahitur in rugas. Caeterum buccam quoque firmat, & movet.

Est *Buccarum*, *labrorum*, & *nasi alarum*, *secundus alterius lateris*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 13. *Musculus buccae*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 6. *Bucco*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 12. *Contrahens*, *communis buccarum labiorumque*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. *Buccinator*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 10. & ann. 1724. Cap. 7. Dougl. Myogr. Cap. 9. Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 35. & 36. *Le Buccinateur*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 556. & 558.

## CAPUT XVII.

*De Orbiculari oris<sup>a</sup>.*

**O**rbicularis oris prima specie videtur toti circumductus esse ori, ac per utrumque se flectere labium, sibi que ipsi tanquam in circuli speciem continuari, & neque oriri, neque se inferere. Est vero

X 2

alio-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xlii. Fig. 1. GG. & Fig. 1. RR. Cowper Myot. ann.

1724. Tab. xxii. 23.

b Dix-

aliorum propago, si non totus, certe prope totus: nempe Buccinatorum, Depressorum angulorum oris, Levatorumque, & Zygomaticorum majorum. Pars ejus interior fit à Buccinatoribus, quibus se adjungit Zygomaticorum majorum portio. Pars prior in labio superiore, à Depressoribus angulorum: in inferiore, à Levatoribus. Etenim ex inferiore parte secundum angulum oris adscendit, & dein per labium superius decurrit pars Buccinatoris, una cum parte Depressoris, Buccinatori extrinsecus adjuncta: ex superiore secundum eundem angulum descendunt, juxtaque cum praecedentes decussant, ac dein per labium inferius decurrunt, pars itidem Buccinatoris cum parte Zygomatici, adjunctaque istis ab exteriori parte portio Levatoris. Ita conjunctae, & ex dextra sinistraque parte venientes propagines, sibi invicem per labia continuantur: ex quo fit, quem vulgo putant esse continuum per oris ambitum; nisi quod dubitaverim, an viderim aliquot tenues fasciculos per angulos oris circumductos filo continuo; & quidem inter Buccinatorum Zygomaticorumque propagines à parte posteriore, & illas Depressorum Levatorumque angulorum à priore. Accedunt (nuper tamen nullas vidimus) quatuor portiones, ab utraque utriusque maxillae parte una, quas adjicere ipsi posse videmur. Duae <sup>b</sup> parvae, tenues, nec admodum latae, ab exteriori parte maxillae inferioris, utrimque infra eminentem alveolum dentis canini incipiunt, indeque in diversa euntes, se secun-

<sup>b</sup> *Dextra*, Santorin. Tab. 1. s.

*c Dext-*

cundum inferiorem partem Orbicularis incurvo ductu, lateſcentesque, ferunt ad ſui quiſque lateris angulum oris; magisque extenuati & dilatati, ſe commiſcent cum Orbiculari, continuantque inferiori & eidem interiori parti Buccinatorum. Ejusmodi deinde duae, ab utraque parte una, mox ſupra gingivam ſuperiorem, qua ea ſupra dentes, qui ſecant, eſt, ortae, ſimiliter eunt ad oris angulos, commiſcentque ſe cum Orbiculari, & continuant Buccinatorum parti ſuperiori. Ex his omnibus fit muſculus quidam tenuis; nec valde latus, ambiens os; cui à priori parte pertinaciter adnexi ſunt Naſales labii ſuperioris, juxta naſum; inde uſque ad oris angulos, Levatores labii ſuperioris alarumque naſi, Levatores labii ſuperioris; Zygomatici minores: in labio inferiore, Depreſſores hujus labii. A poſteriore parte velatur membrana oris. Ex quo perſpicuum, os eum contrahere, & corrugare labia. Si vero omnes labiorum & buccarum muſculi ſimul agant, labia, buccasque, apprimunt ad dentes, & gingivas; & diverſimode quidem, ſi ipſi diverſis modis agant, aut vi inaequali: ſi aliqui eorum, aut aliis aliisque partibus ſui, aut virium differentia, aut ſucceſſione quadam, & inexplicabilibus quidem diverſitatibus, buccas, & inprimis labia, tot modis movent non modo, ſed etiam in tot, tamque diverſas figuras formant, ut mirabile ſit.

*Eſt moles carnea, muſculoſa tamen, quae utrumque labium*

X 3

c *Deſſra*, Santorin. Tab. 1. h.

a Cow-

*bium format*, Fallop. Obs. an. in musculis nasi, buccarum, & labiorum: vide quae Vesalius in Exam. Observ. Fall. in nasi alas, labia, & buccas moventibus, in fine. *Musculus orbicularis*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 12. *Quartum par*, *Constringens*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. *Constrictor labiorum*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 10. *Sphincter labiorum*, Dougl. Myogr. Cap. 8. *Orbicularis labiorum*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 7. Vid. Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 21. & 36. quo etiam pertinet *Corrugatoris seu Protrusoris*, Ejusdem, ibid. §. 31. *interior ordo*, §. 32. *Sunt les Demi-Orbiculaires*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 553. 554.

Portiones accessoriae inferiores sunt *Productores inferioris labri*, Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 30. *Les Accessoires du Demi-Orbiculaire inferieur*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 569.

Portiones accessoriae superiores sunt *Labri superioris fibrarum secundus ordo*, Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 19. *Les Sur-Demi-Orbiculaires*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 555.

## C A P U T XVIII.

### *De Depressore alae nasi<sup>a</sup>.*

**H**ic ab ossē maxillari superiore extrinsecus ubi gingiva, ab alveolis dentium incisorum, saepe & à superiore parte alveoli canini, lato, semicirculari, & tendinoso principio orsus, inde aliquantum latescens, totus-

<sup>a</sup> Cowper Myot. ref. ann. 1694. Fig. 111. D.

<sup>b</sup> San-

totusque crassitudinis modicae, adscendit, seseque tegumentis nasi inserit per tractum hunc; à septo nasi secundum foramen nasi, qua is cum labio cohaeret, usque ad alam, ac deinde circum hujus radicem: vidi qui se non nisi circum alam infereret. Atque hanc nasi partem deorsum trahit, eoque simul labium superius, quoniam id cum naso junctum, modice deprimit: quin & narem aliquantum comprimit, alam cogens septum versus. Ejus superior pars pertinaciter connexa cum Compressore naris, Levatore labii superioris alaeque nasi, Levatore labii superioris: & plerumque parte quadam ad interiorem Compressoris naris accedit; aliquando & accipit aliquam à Levatore labii superioris alaeque nasi.

Huic adjacentem vidimus *Anomalum* quendam<sup>b</sup>, qui aberrans ipsius pars esse videtur, subjectusque Levatori labii superioris alaeque nasi, & Levatori labii superioris, quibusdam tributus. *Anomalum* dicimus, quoniam unus omnium eidem ossi, à quo oritur, insertus, totoque decursu eidem illi ossi incumbit, à principio ad finem usque rectus, nec contingens partem mollem, quam movere possit. Quare nullum etiam usum habere videtur. Ab osse maxillari superiore circa summam partem fossulae canini orientem vidimus, desinentemque ad locum, qui est paullo infra ortum Levatoris labii superioris: à primo tendinosum, angustum, tenuem; dein carneum, latius, crassius; à medio rursus angustantem se,  
exte-

<sup>b</sup> Santorin. Tab. 1. f.

<sup>c</sup> Tali

extenuantemque ; in fine tendineum. Vidimus & à principio latum , & prorsus cohaerentem cum Depressore alae nasi : inde sensim angustiores , primoque diu crassiores , dein tenuiores , in fine tendineum , insertumque ossi maxillari circa mediam altitudinem orae foraminis nasi ossei. Vidimus alias ejus varietates <sup>c</sup>.

Est *Constrictor alae nasi ac Depressor labii superioris*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 9. *Depressor labii superioris proprius*, Dougl. Myogr. Cap. 8. *Constrictor alae nasi*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 10. *Musculus labii superioris arctandis naribus communis*, Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 17. & 18. & huc quoque pertinet *Myrtiformis*, seu *pinnarum Dilator proprius*, ibid. §. 14. *L'Incisif mitoyen*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 565.

Anomalous est *Rhomboidaeus*, Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 25. Ejus generis quoque est *narium Lateralis*, ibid. §. 13.

## C A P U T XIX.

### De Levatore menti<sup>a</sup>.

**L**evator menti, ex priore parte maxillae inferioris mox infra marginem ejus superiorem, inter eminentem alveolum canini symphysemque maxillae, veniens, descendit ad mentum, sensimque se alter ad alter-

<sup>c</sup> Talis apud Santorin. Tab. 1. d.  
<sup>a</sup> Santorin. Tab. 1. q. Cowp. Myot.  
ref. a. 1694. Fig. 14. F. ab utr. lat.

& ann. 1724: Tab. xxxi. 26. ab  
utr. lat.

a Eustach.



alterum curvat, donec se in mento commisceant, partimque continent; cujus praeterea pingui fasciculos immiscent. Modicae latitudinis est, sensimque latefcit, nullibi, quam qua coit cum altero, latior; ex quo ambo simul lunae cornutae speciem quodammodo referunt: fit & ex tenuiore sensim crassior. Hoc mentum attollimus: quod cum attollitur, simul labium inferius sursum cogitur.

Est *Elevator labii inferioris*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 10. & ann. 1724. Cap. 7. *Elevator labii inferioris proprius*, Dougl. Myogr. Cap. 8. *Elevator labri inferioris*, Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 29. *L'Incisif inferieur*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 568.

## REGIO IV. MALA CUM LATERE CALVAE.

### C A P U T XX.

#### *De Massetere* <sup>a</sup>.

**M**asseter longe praecedentibus crassior & valentior, brevis, & aliquantum quam latior, longior. Origo ei est primo ab inferiore & eadem prior parte extremi processus ossis maxillaris superioris <sup>b</sup>, cui os jugale innixum: tum à toto margine inferiore, totaque interiore parte zygomatis <sup>c</sup>, usque ad tuber-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 1. D. &

& Tab. f. D.

Tab. xxxiii. C. Vesal. de H. C. F.

<sup>b</sup> Santorin. Tab. 1. M. dext.

Lib. 11. Tab. 2. C. & Tab. 4. A.

<sup>c</sup> Santorin. l. c.

d Cow-

cum committendae maxillae inferioris causa emi-  
nens : & supra zygoma etiam ab interiore parte mem-  
branae tendineae , qua Temporalis extrinsecus ob-  
ductus , quaeque affixa zygomati. Descendit per ex-  
teriorem partem lateris maxillae inferioris , ejusque se  
amplitudini prope toti affigit , à summo processus co-  
ronoidei , usque ad angulum maxillae <sup>d</sup>. Dum descen-  
dit , fit primo sensum crassior , post tenuior : & an-  
gustat se paullatim , sed permodice. Estque valde  
tendinosus , maxime qua oritur , quaque se inserit :  
& qua oritur , extrinsecus etiam à priore parte plane  
tendineus , indeque diu per exteriora deorsum : car-  
neus autem , qua oritur ab interiore parte zygomatis ,  
& à membrana tendinosa. Extérieure autem parte sua ,  
praeterquam qua juxta aurem est , oblique in postero-  
ra descendit : interiore ( quae ex parte à posteriore ex-  
terioris nuda ) rectius deorsum , maxillam cito attin-  
gens , desinensque ad processum coronoideum. Qui-  
busdam duae illae partes diu distinctae , aliis ex toto.  
Atque his pars illa , quam oblique descendere dixi-  
mus , oritur ab osse maxillari , & à jugali , aliquanto  
ante inferiorem partem suturae zygomatis oriri desi-  
nens : rectior autem à tota longitudine zygomatis , &  
à membrana tendinea quam diximus ; sensimque fit  
angustior , & ubi à zygomate abscedit , tenuior est ,  
extremo quoque tenuior , & tendinosa , aut tendinea.  
Masseter maxillam inferiorem recte adducit ad superio-  
rem , ad eamque apprimat : illa autem ab hac de-  
ducta ,

<sup>d</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxiii. 67.

ducta , ac firmata , capitis priorem partem deprimit. Cumque pars ejus rectior sola agit , productam maxillam restituit.

Est inferiorem maxillam moventium alterius lateris secundus , seu *Masseter* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 15. *Masseterus & mansorius dictus* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 11. *Massiter* , Fallop. Obs. an. *Tertius attollens maxillam masseter* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 15. *Tertii paris , lateralis* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. *Masseter* , Cowper Myot. Cap. 18. Dougl. Myogr. Cap. 20. Santorin. Obs. an. Cap. i. §. 37. *Le Masseter* , Winsl. Exp. an. Trait. de muscl. §. 828. & seq. & §. 1221.

## C A P U T XXI.

*De Temporalis <sup>a</sup>.*

**T**emporalis primum sui principii ambitum quasi semicircularem <sup>b</sup> habet , pertenuemque : se autem demittit ab omni illa amplitudine lateris calvariae , quae sit à processu superiore ossis jugalis , à finitimo latere ossis frontis , à processu maximo ossis multiformis , ab osse verticis , & squamoso : demittit quoque à membrana tendinea , qua extrinsecus vestitus ; tendinosus quidem qua ab osse jugali , & ab eminentiis , quae in inferiore parte lateris processus multiformis , & vicini

Y 2

squ-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 3. A. & Tab. xxxiii. A. & Tab. xxxvi. a. Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab.

2. A. & Tab. 4. r. <sup>b</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 3. A-aa. & Tab. xxxvi. a-aaa.

c Cow-

squamosi ; caeterum fere carneus. Ex tanta amplitudine fibras in angustum colligit , quanto angustior , tanto fere quoad oritur crassior ; post paulatim decrescens , donec ei processus coronoideus maxillae inferioris illigetur <sup>c</sup>. Ante sui autem medium magis magisque ex minimis initiis ita in tendineam naturam vertitur , ut in fine majorem partem tendineus sit. Et jam circa medium , indeque ad finem usque , extrinsecus tendineus <sup>d</sup> est : tendinisque principium occultat caro tenuis , quae radiata forma ad exteriorem ejus partem sensim accedit , eumque accessu tendineae naturae , in quam abit , auget. Affigit se vertici processus modo dicti , indeque margini tum priori <sup>e</sup> , tum posteriori <sup>f</sup> , fere ad radicem usque ; ab interiore autem praeterea parte eminentiae , quam idem ille processus habet juxta priorem partem radice suae ; totique fere amplitudini , quae est pone dictam illam eminentiam , tantum qua huic amplitudini affixus , nec ibi fere nisi extrinsecus , carneus. Caeterum à priori parte quasi in duos abit mucrones : brevior eundemque tenuiorem , affixum priori margini processus : longiorem & eundem crassiorem , affixum eminentiae , quam processum illum ex interiore parte habere modo diximus. Maxillam inferiorem attollit , & ad superiorem apprimat , eandemque simul trahit retrorsum.

<sup>c</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxxi. supra F.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxiii. A-a. & Tab. xxxvi. a-3.

<sup>e</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. V.

Fig. 1. 66. infertus E.

<sup>f</sup> Callier. Tab. apud Spigel. Lib. iv. Tab. 1. Fig. 1. L. infertus n. Bidloo Tab. xii. Fig. 5. N.

sum. Parte sua media, itemque posteriore, sed imprimis media, caput maxillae, cum id sub tuberculo ossis squamosi haeret, retrahit in sinum ejusdem. Contrariis modis caput movet, ubi maxilla inferior à superiore deducta, firmataque. Nec praetereundum, quod pars ejus posterior & eadem inferior, sub zygomate ad maxillam descensura, se circum sinuatam radicem processus zygomatici inflectat, praesertim si maxilla inferior deducta sit: quo fit, ut eam rectius sursum trahat, quam caeteroqui posset.

*Est inferiorem maxillam moventium primus alterius lateris musculus, seu temporalis*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 15. *Temporalis*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 11. Fallop. Obs. an. Arant. An. obs. Cap. 28. Riolan. Anthr. Lib. 5. Cap. 15. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. Cowp. Myot. Cap. 18. Dougl. Myogr. Cap. 20. Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 37. *Le Crotaphite*, Winsl. Exp. an. Trait. de muscl. §. 832. & seq. & §. 1220.

## REGIO V. CAVUM OCULI

### C A P U T XXII

#### *De Levatore palpebrae superioris<sup>a</sup>.*

**P**alpebra superior musculo exiguo, quo attollatur ad aperiendum oculum, instructa est; cui origo

Y 3

à su-

<sup>a</sup> Eust. Tab. xxxix. Fig. 2. G. Bidloo Tab. xi. Fig. 4. A.

b Ea-

à superiore parte foraminis ossis multiformis, quo nervus opticus intrat; unde sub lacunari foraminis oculi ad palpebram incedit. Ex angusto principio se primum modice dilatat, posteaque sensim longe magis, totus praetenuis, à principio tendineus, inde carneus, primumque crassior, post extenuatus, & ad postremum in aponeurosem<sup>b</sup> carnea parte tenuiorem versus; qua paullatim exilescente, ad cartilaginem palpebrae superioris, cui tarfi nomen, pertinet<sup>c</sup>. Sic vero decurrit, ut primo rectiore ductu conscendat globum oculi, dein circum eum se demittat. A globo itaque hic musculus, cum agit, sustinetur, tarsumque circum eum sursum in posteriora vertit, eodem interim ad globum interna parte sua aequaliter apto manente. Eoque aperit oculum, palpebram aequaliter complicatam retrorsum trahens, simulque tarsum subjiciens ei parti ambitus oculi, quae infra supercilium est. Hic, Rectusque attollens oculi, à principio cohaerent inter se, unaque cum vagina nervi optici.

Est palpebrarum secundus, oculum aperiens, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 8. *Musculus parvus & tenuis, &c. palpebram attollens*, Fallop. Obs. an. in musculis palpebrarum. De quo Vesal. *Is namque gracili admodum principio*, &c. Exam. Obs. Fallop. in palpebram moyentibus. *Qui superiori palpebrae aperiendae destinatus est*, Arant. Anat. obs. Cap. 19. *Rectus*, Fabric. de ocul.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxix. Fig. 2. G-β.    <sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. G-γ.  
a Equ-

ocul. Part. I. Cap. 12. *Palpebrae superioris primus*, Casfer. Pent. Lib. V. Sect. I. Cap. 8. *Superiorem palpebram attollens*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 10. *Apertor oculi, attollens palpebram superiorem*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. *Pyramidalis*, Molinett. Dissert. an. path. Cap. 5. *Aperiens palpebram Rectus*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 7. & ann. 1724. Cap. 8. *Aperiens palpebram rectus*, Dougl. Myogr. Cap. 5. *Le Releveur propre*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 285.

## CAPUT XXIII.

*De Obliquo superiore oculi<sup>a</sup>.*

**O**bliquus superior singulari artificio prae caeteris oculi constructus est. Juxta internum latus Levatoris palpebrae superioris, ab eodem optici foramine oritur, principio tenui angusto tendineo: gracili deinde ventre, eoque ad medium longitudinis intumescente, post detumescente, procedit ad canthum majorem, ubi in gracilem tendinem<sup>b</sup> abit. Is vero speciem orbiculi, ossi frontis juxta canthum majorem sub supercilio affixi<sup>c</sup>, transit; transeunsque, se circum cartilaginem ejus<sup>d</sup> deorsum curvat<sup>e</sup>, & cum elapsus ex eo est, retrorsum simul & in latus externum descendit<sup>f</sup> ad superiorem partem globi oculi; ad quem appropinquans latefcit, & extenuatur; seque

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxix. Fig. 4. D.

Fig. 7. K.

<sup>b</sup> Eust. Tab. xxxix. Fig. 4. D-*γδ*.<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxix. Fig. 4. E.<sup>c</sup> Casfer. Pentesth. Tab. 11. Org. vifus Fig. 1. & 2. G. Bidloo Tab. xi.<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxxix. Fig. 4. D-*γ*.<sup>f</sup> Eustach. Tab. xxxix. Fig. 4. D-*δ*.

g Eu.

seque scleroticæ inserit <sup>g</sup>, paullo post mediâ summam partem globi. Globum oculi vertit, sic ut pupillam deorsum ad prominentem sub cantho minorem genam dirigat: eundem eodem tempore à superiore parte per latus internum, perque partem inferiorem, in latus externum rotat: quin & totum globum in priora protrahit, canthum majorem versus. Orbiculus supradictus constat ex tenui cartilagine <sup>d</sup>, per transversum concava, & semicanalis affumili; à posteriore autem parte in priorem orbiculata; à cujus extremis orta, & ossi frontis affixa ligamenta tenuia, orbiculum perficiunt, crassitudini tendinis Obliqui sua diametro respondentem; ita tamen, ut tendo ille libere per eum mobilis sit: mobilis quoque ipse orbiculus, qui cartilagine sua tendinem sustinet, & continet; permittente quoque figura cartilaginis, ut tendo ad eam ante & retro facillime volvatur. Ab hoc orbiculo tendinem ad globum usque comitatur membranaei quid, specie vaginae obsequiosae, lubricaeque.

Hoc in loco alium quoque musculum <sup>h</sup>, quem aliquando invenimus, memorasse aptissimum fuerit. Rarus is admodum inventu, & unde nomen dari posset, gracillimus, comes Obliqui superioris, cum eodem oriens, sed juxta orbiculum in tenuitatem se dilatans, visusque in lubricam, laxamque membranam, quae tendinem Obliqui complectitur, evanescere. An fuit aberrans quaedam Obliqui pars?

Vide

<sup>g</sup> Eustach. Tab. xxxix. Fig. 4. D-1.

Fig. pag. 25. G?

<sup>h</sup> An Molinett. Diff. anat. & path.

a Eu-



Vide Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 12, *circumductionis opifices*. Est *Tertius palpebrarum*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 8. *Duorum in gyrum flectentium prior*; Fallop. Obs. an. in oculi musculis. *Quintus*, ibid. & Vesal. Exam. in oculos moventibus. *Obliquus ille, qui per trochleam ducitur*, Arant. Anat. obs. Cap. 19. *Trochleae musculus*, Fabric. de ocul. Part. I. Cap. 11. *Trochlearis*, Casser. Pent. Lib. V. Sect. I. Cap. 18. *Alter ex obliquis Superior seu Major*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 11. *Sextus, Obliquorum secundus, Circumagens interior, aut superior, vel etiam major*, Spigel. de H. C. F. Lib. II. Cap. 5. *Obliquorum, qui major est*, Molinett. Diss. an. path. Cap. 4. *Obliquus superior or Trochlearis*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 8. & ann. 1724. Cap. 9. *Obliquus superior*, Dougl. Myogr. Cap. 6. Morgagn. Adv. an. VI. Anim. 77. & 78. *L'Oblique superieur*, Winslow, Hist. de l'Acad. Roy. de Scienc. ann. 1721. p. 310. & seq. & Exp. an. Trait. de la tête, §. 245. 246. 252. & seq.

An Gracillimus est *Rectus quintus*, Molinett. Diss. an. path. Cap. 4. & *musculus Trochlearis*, ibid. Indic. Tab. pag. 25. G?

## CAPUT XXIV.

*De quatuor Rectis oculi<sup>a</sup>.*

**R**ecti pene similes inter se, ab intimo foramine oculi<sup>b</sup> deducuntur ad globum, & ad quatuor qui-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxix. Fig. 2. 3. <sup>b</sup> Bidloo Tab. xi. Fig. 7. & 8.

4 f.

c Eu.

quidem partes ejus, superiorem, inferiorem, lateralem utramque. Principiis suis continent nervum opticum<sup>c</sup>, ubi is primum ingressurus est foramen oculi: *Attollens*<sup>d</sup> autem oritur partim à margine ossis multiformis, qui inter foramen optici, & quod infra id sequitur, medius; partim à superiore parte ipsius foraminis optici, ab externo latere Levatoris palpebrae superioris: *Abductor*<sup>e</sup> à marginis foraminis illius, quod post optici foramen sequitur, parte inferiore eademque cavum osseum oculi spectante, qua foramen illud rotundum est, juxta rimae, in quam abit, initium: *Depressor*<sup>f</sup> ab inferiore & eadem cavum osseum oculi respiciente parte portionis osseae, quae foramen modo dictum, illudque optici discriminat: *Adductor*<sup>g</sup> ab illo latere foraminis optici, quod est à parte nasi. Omnes ab initio prope tendinei sunt, mox carnei: omnes ab initio tenues, & angusti, procedentes fiunt sensim aliquantum latiores, & primo crassiores, extremo modice angustiores, & non longe ab eo extenuati, abeunt in tendinem<sup>h</sup> tenuem, satis latum, brevem. *Attollens* plerumque ab initio cohaeret cum Levatore palpebrae superioris, & cum *Adductore*; hic cum *Depressore*, hic cum *Abductore*. Inter cos vero *Abductor* longissimus est<sup>i</sup>, *Adductor* brevissimus, reliqui

c Eustach. Tab. xxxix. Fig. 3. C-a. F-a. G-a; & Fig. 7. C-a. E-a. F-a.

d Eustach. Tab. xxxix. Fig. 3. F.

e Eustach. Tab. xxxix. Fig. 3. G. & Fig. 7. C.

f Eustach. Tab. xxxix. Fig. 5. EE.

g Eust. Tab. xxxix. Fig. 3. C. & Fig. 7. F.

h Eustach. Tab. xxxix. Fig. 3. F-θ. G-β. Fig. 4. C-β. Fig. 5. F-β. C-β. E-θ.

i Eustach. Tab. xxxix. Fig. 3. G.

k ut

qui duo prope aequales. Quoad ad globum incedunt, rectiores sunt: eum cum attigere, circum eundem se inflectunt<sup>k</sup>, donec pervenerint ad locum, qui est multum ultra mediam rotunditatem globi, inter opticum & corneam intercedentem; ubi se inserunt<sup>l</sup>, à partibus illis quatuor, quas in principio diximus. Et innectunt se scleroticae, ac cum ea prorsus conjungunt in unum. Globum oculi in partem omnem quam facillime, & vi levissima versatilem, vertunt, ac pupillam dirigunt, *Attollens* sursum, *Depressor* deorsum, laterales in suum quisque latus: quod efficere valent, quia se & priori parti globi inserunt, & circum globum extremo suo curvant, plane ut de Levatore palpebrae superioris docuimus.

*Attollens* est *Tertius oculum movens*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 11. Unus ex *quatuor oblongis musculis*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 9. Unus ex *quatuor, qui rectis motibus praefecti*, Fallop. Obs. an. in musculis oculorum. Ex iis, *qui rectis famulantur motibus*, Arant. Anat. obs. Cap. 19. *Rectus superior*, Fabric. de ocul. Part. I. Cap. 11. *Qui à physiognomicis superbus dicitur*, Casser. Pent. Lib. V. Sect. I. Cap. 18. *Attollens, sive Superbus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 11. *Primus, Attollens*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. *Superbus*, Molinett. Dissert. an. path. Cap. 4. *Elevator oculi*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 8. & ann. 1724. Cap. 9. *Elevator*, Dougl. Myogr. Cap. 6. *Le Releveur*, Win-

Z 2

flow,

<sup>k</sup> ut G. Fig. 4. Tab. xxxix. Eustach.  
<sup>l</sup> Eustach. Tab. xxxix. Fig. 5. F-77.

G-7. Fig. 5. C-7. E-77.

flow, Hist. de l'Acad. Roy. de Scienc. ann. 1721. & Exp. an. Trait. de la tête, §. 241. & seq. & 249. & seq.

Abductor est *Secundus oculum movens*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 11. Unus ex *quatuor oblongis musculis*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 9. Unus ex *quatuor, qui rectis motibus praefecti*, Fallop. Obs. an. in musculis oculorum. Ex iis, *qui rectis famulantur motibus*, Arant. Anat. obs. Cap. 19. *Rectus exterior*, Fabric. de ocul. Part. I. Cap. 11. *Quem indignatorium appellant*, Casser. Pent. Lib. V. Sect. I. Cap. 18. *Abducens sive Indignatorius*, Riolan. Anth. Lib. V. Cap. 11. *Quartus, Abducens*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. *Iracundus*, Molinett. Dissert. an. path. Cap. 4. *Abductor oculi*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 8. & ann. 1724. Cap. 9. *Abductor*, Dougl. Myogr. Cap. 6. *L'Abducteur*, Winslow, Hist. de l'Acad. Roy. de Scienc. ann. 1721. & Exp. an. Trait. de la tête, §. 241. & seq. & 249. & seq.

Depressor est *Quartus oculum movens*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 11. Unus ex *quatuor oblongis musculis*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 9. Unus ex *quatuor, qui rectis motibus praefecti*, Fallop. Obs. an. in musculis oculorum. Ex iis, *qui rectis famulantur motibus*, Arant. Anat. obs. Cap. 19. *Rectus inferior*, Fabric. de ocul. Part. I. Cap. 11. *Qui humilis vocatur*, Casser. Pent. Lib. V. Sect. I. Cap. 18. *Deprimens, sive Humilis*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 11. *Secundus sive Depressor*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. *Humilis*, Molinett. Dissert. an. path. Cap. 4. *Depressor oculi*, Cow-

Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 8. & ann. 1724. Cap. 9. *Depressor*, Dougl. Myogr. Cap. 6. *Deprimens*, Morgagn. Adv. an. VI. Anim. 77. *L'Abbaïsseur*, Winslow, Hist. de l'Acad. Roy. de Scienc. ann. 1721. & Exp. an. Trait. de la tête, §. 241. & seq. & 249. & seq.

Adductor est *Primus oculum movens*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 11. Unus ex *quatuor oblongis musculis*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 9. Unus ex *quatuor, qui rectis motibus praefecti*, Fallop. Obs. an. in musculis oculorum. Ex iis, *qui rectis famulantur motibus*, Arant. Anat. obs. Cap. 19. *Rectus interior*, Fabric. de ocul. Part I. Cap. 11. *Qui barbaris bibitorius appellatur*, Casser. Pent. Lib. V. Sect. I. Cap. 18. *Adducens; sive Bibitorius*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 11. *Tertius, Adducens*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. *Bibitorius*, Molinett. Dissert. an. path. Cap. 4. *Adductor oculi*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 8. & ann. 1724. Cap. 9. *Adductor*, Dougl. Myogr. Cap. 6. *L'Adducteur*, Winslow, Hist. de l'Acad. Roy. de Scienc. ann. 1721. & Exp. an. Trait. de la tête, §. 241. & seq. & 249. & seq.

## CAPUT XXV.

*De Obliquo inferiore oculi<sup>a</sup>.*

Solus inter oculi musculos à priore parte foraminis ejus incipit<sup>b</sup>, caeterisque longitudine cedit. In fundo

Z 3

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxix. Fig. 5. D.

<sup>b</sup> Casser. Pentesth. Tab. 11. Org. vi-

fus, Fig. 1. N. & Fig. 2. Q.

fundo foraminis modo dicti , juxta oram ejus , ab osse maxillari superiore , inter futuram ejus ossis propriam , & os unguis , hic musculus oritur , principio angusto tenui tendineo : à quo carneus , & paulatim latior , crassiorque primo , post tenuior , sub globo oculi procedit ad externum latus , & simul nonnihil oblique retrorsum ; seseque ad globum oculi sursum incurvans , ad externum ejus latus , ultra mediam rotunditatem , quae inter corneam & opticum , desinit , extremo tendineo tenui & lato , eo quo Recti modo , scleroticæ se innectens. Hic contrarius superiori , pupillam sursum ad caudam supercilii dirigit , simulque globum ab externo latere per partem inferiorem , latiusque porro internum , in superiora nonnihil rotat. Globum quoque protrahit nasum versus , aequè ac superior , verum deorsum.

Vide Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 11. *circumductionis opifices*. Est *Quintus oculi* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 9. *Sextus* , Fallop. Obs. an. in musculis oculorum , & Vesal. Exam. in oculos moventibus. *Obliquus alter brevis* , Arant. Anat. obs. Cap. 19. *Obliquus infernus* , Fabric. de ocul. Part. I. Cap. 11. *Sextus* , Casser. Pent. Lib. V. Sect. I. Cap. 18. *Inferior* , seu *minor obliquus* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 11. *Quintus* , qui *Obliquus primus est* , & *Volvens* , sive *Circumagens exterior nobis dictus* , aut *inferior* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. *Obliquus minor* , Molinett. Dissert. an. path. Cap. 4. *Obliquus inferior* , Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 8. & ann. 1724. Cap. 9. Dougl. Myogr. Cap. 6. Mor-

Morgagn. Adv. an. VI. Anim. 78. *L'Oblique inferieur*, Winslow, Hist. de l'Acad. Roy. de Scienc. ann. 1721. & Exp. an. Trait. de la tête, §. 247. & seq. & 252. & seq.

## REGIO VI. AURICULA.

## CAPUT XXVI.

*De Tragico \*.*

**S**equentes auriculae minuscule sunt, & praetenuae, veri tamen, quorum etiam actiones in nobis observavimus. Ex iis Tragicus paullo minus latus quam longus, oritur à media exteriori parte cartilaginis conchae, juxta tragus; secundum quem adscendit, & ad cujus etiam superiorem partem, vicinamque conchae, desinit, medio paullo crassior quam extremis. Eam, cui incumbit, conchae partem deprimit, facitque planiorem: superiorem tragi marginem in priora extrorsum vertit. Vidimus gracili portione usque ad acutum helici processum pertinentem, ad eum detrahendum. Vidimus non modo dicto processui insertum, sed etiam continuatum Majori helici musculo.

Est *Musculus tragi*, Valsalv. de aur. Part. I. Cap. 1. §. 7. Santorin. Obs. an. Cap. 2. §. 7. De hoc, & sequentibus auriculae, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 375.

C A

\* Valsalv. de aur. Tab. 1. Fig. 4. B.  
Santorin. Tab. 111. Fig. 4. f. &

Tab. 1. 8.

4 Val.

## CAPUT XXVII.

*De Antitrágico <sup>a</sup>.*

**Q**ua antitragus maxime eminet, ibi ab exteriorē parte cartilaginis ejus Antitragicus procedit; indeque secundum exteriora illius partis marginis conchae, quae supra antitragum est, adscendit, usque ad imam partem anthelicis, ubi se eidem margini in ipso angulo incisurae, quam cartilago auriculae pone antitragum habet, inserit. A latiore & subrotundo principio fit sensim angustior: ab initio, & in fine tendinosus est, & tenuior. Extremum anthelicem deprimit antitragum versus; hujus maxime eminentem marginem nonnihil extrorsum in posteriora vertit; marginem conchae, inter ortum insertionemque suam medium, premit, incurvat, ut in concham assurgat, magisque tendatur.

Est *Musculus antitrégi*, Valsalv. de aur. Part. I. Cap. 1. §. 7. Santorin. Obs. an. Cap. 2. §. 9.

## CAPUT XXVIII.

*De Majore helicis <sup>a</sup>.*

**H**elicis musculorum major à superiore parte processus ejus acuti <sup>b</sup> per eam ipsius helicis partem,

<sup>a</sup> Valsalv. de aur. Tab. 1. Fig. 4. D.

Santorin. Tab. 111. Fig. 4. g.

<sup>a</sup> Santorin. Tab. 111. Fig. 4. b. &c

Tab. 1. f.

<sup>b</sup> Santorin. Tab. 111. Fig. 4. a.



tem, quae statim supra illum processum, atque adeo tragus est, adscendit, cartilagini ejus extrinsecus adjectus. Oblongus est, & angustus; ubi incipit, tendinosus, in fine extenuatus, pertinens ad cartilaginem helicis, qua ea incipit à capite abscedere. Premit, deprimit, percutit partem eam helicis, cui incumbit: illam vero, cui insertus, modice deorsum trahit.

Est *Helicis musculus*, Santorin. Obs. an. Cap. 2. §. 5.

## CAPUT XXIX.

*De Minore helicis<sup>a</sup>.*

**M**inor & ab helice oritur, & eidem se inserit. Helix ubi è concha per priora auriculae adscensura est, incisuram in cartilagine sua habet, cujus inferiori margini altera sui hic musculus parte affixus est: altera, postquam inde per exteriora helicis adscendit, hujus ipsius margini, prope è regione cruris inferioris anthelicis; utraque parte illa tendinosus, & tenuior; ipse angustus, brevisque. Incisuram illam contrahit, partemque quam occupat, premit, percutit.

Sunt *Fibrae musculares in plana helicis facie*, Santorin. Obs. an. Cap. 2. §. 6.

A a

C A-

<sup>a</sup> Santorin. Tab. 1. 7. & Tab. 111. Fig. 4. c.

## CAPUT XXX.

*De Transverso auriculae \*.*

**A**mplior his Transversus, sed minus carneus, à concha ad anthelicem & scapham brevibus pertinet fasciculis. Dorso cavi superioris conchae adhaeret, ubi illa à posteriore, & à superiore parte maxime eminet. Inde magis latescens, se ima maxime parte retrorsum ex transverso fert: supra eam, ut quaeque superior est, ita ea magis magisque sursum; summa pene recta. Et affigit se cavo anthelicis dorso, eminentique scaphae. Aliquando pars scaphae inserta, ab altera distincta est. Laxius autem fasciculi, ex quibus hic musculus constat, conjuncti sunt, media parte crassiores, extremis tenues, & tendinei: qui ad anthelicem pertinent, longiores, quam qui ad scapham. Contrahit quod auriculae inter concham & anthelicem cum scapha intercedit: idem, una cum concha, & scapha, tendit. Hoc eum, si quid possit, effecturum, res ipsa docet. Plerumque autem imperfectus est, carnea naturae expers: quo minus mirum videri debet, actionem ejus in vivis non apparere, ut neque nobis adhuc apparuit. Quoniam tamen in robustis conspicuus est, musculis eum inseruimus.

Sunt *Fibrae transversae in gibbo auriculae*, Valsalv. de aur. Part. I. Cap. 1. §. 7. *Fibrae, quae in convexa conchae parte*, Santorin. Obs. an. Cap. 2. §. 9.

a Valsalv. de aur. Tab. 1. Fig. 3. D D.

C A-

a Du

## REGIO VII. AURIS INTERNA.

## CAPUT XXXI.

*De Externo malleo<sup>a</sup>.*

**E**x minimis sunt, qui ad malleum & stapedem pertinent. Externo autem mallei, quamvis tantulo, & venter, & tendo, sicut multis maximorum. Venter oblongus est, & ab acuto initio primo crassior, mox gracilescit, atque in tendinem, se ipso multo longiorem, abit. Oritur ab exteriori parte acuti processus, quem ultimus ossis multiformis angulus, inter os squamosum & petrosum interfertus, exigit: procedit secundum finitimam commissuram ossis squamosi & petrosi, atque adeo oblique in latus retrorsum modiceque sursum: rimam deinde, quae ad finem modo dictae commissurae inter eadem illa ossa relicta, tendine suo intrat<sup>b</sup>, posteaque se retrorsum flectens, pergit per eum extremi ossis partis illius, quae porum acusticum continet, sinum<sup>c</sup>, per quem malleus processum suum longissimum eundemque gracillimum porrigit; totique se processus illius longitudini affigit<sup>d</sup>. Malleum in priora trahit, modiceque porum acusticum versus; ex quo malleum sequens membrana tympani planior fit, & modice laxior; sed inaequaliter,

A a 2                      maxi-

<sup>a</sup> Du Verney, Pl. vi. Fig. 5. CD.

<sup>c</sup> & Fig. 4. C. & Pl. V. Fig. 1. K.

<sup>b</sup> & Pl. vii. Fig. 2. E. Valsalv. Tab.

iii. Fig. 5. J. Cowper Myot. an.

1724. Tab. xxvi. Fig. 3. & 4. 41.

<sup>b</sup> Du Verney Pl. v. Fig. 1. K.

<sup>c</sup> Du Verney Pl. vii. Fig. 2. E. in 2. 3.

<sup>d</sup> Du Verney Pl. vi. Fig. 5. D. insertus 2.

a Val-

maxime laxata illa parte , quae à priori parte mallei.

Est *Musculus auris externus* , Folio , apud Bartholin. Epist. medicin. Cent. I. Ep. 63. Indic. Fig. 2. h. & g. *Le premier de ceux qui appartiennent au marteau ; & l'externe* , du Verney Trait. de l'organ. de l'ouïe , I. Part. pag. 27. & II. Part. p. 76. *Obliquus auris* , Cowper Myot. Cap. 12. *Musculus processus minimi* , Valsalv. de aur. Part. I. Cap. 2. §. 7. & Part. II. Cap. 5: §. 2. *Obliquus auris vel externus Duvern.* Douglas Myogr. Cap. 11. *Le muscle antérieur du marteau* , Winsl. Exp. an. Trait. de la tête , §. 400.

## C A P U T XXXII.

*De Laxatore tympani \*.*

**I**nter mallei musculos minimus Laxator tympani ; qui à nobis , ni quid forte in re tam subtili difficilique hallucinati sumus , adhuc inventus est oriri ibi ubi membrana tympani adhaeret poro acustico ; & quidem juxta illius pori partem eandem & superiorem , & nonnihil posteriorem. Sensim autem gracilior , manubrio se mallei juxta radicem processus brevioris affigit , extremo gracillimo ; toto decursu descendens introrsum , & modice in priora. Mallei manubrium trahit retrorsum simul & sursum , & porum acusticum versus ; eoque membranam tympani eodem versus trahit , laxat , facitque planiorem.

Est

<sup>a</sup> Valsalv. de aur. Tab. III. Fig. c.  
H. Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

XXVI. Fig. 1. & 4. 40.

*Est Alter in superiori meatus auditorii regione consistens, Casser. de aud. org. Lib. I. Cap. 13. & Pent. Lib. IV. Sect. I. Cap. 12. Qui à me primam inventus est, Casser. de aud. org. Lib. III. Cap. 10. & Pent. Lib. IV. Sect. III. Cap. 10. Novus musculus, Fabric. de aur. Part. I. Cap. 6. Exterior, ibid. Part. III. Cap. 6. Auris internae externus, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 14. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. Externus mallei, Schelham. de aud. Part. I. Cap. 3. §. 4. Externus auris, vel Laxator externus, Cowper Myot. Cap. 12. Musculus processus minoris mallei, Valsalv. de aur. Part. I. Cap. 2. §. 6. & Part. II. Cap. 5. §. 2. Externus auris Aquapendent. vel Jul. Casser. Placent. Douglas Myogr. Cap. 11. Le muscle externe ou supérieur du marteau, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 399.*

## CAPUT XXXIII

*De Tensor tympani<sup>a</sup>.*

**S**imilis Externo mallei Tensor tympani, sed major. A superiore hic parte tubae Eustachianae<sup>b</sup>, quae nempe tuba illa calvariae basem spectat, assimilisque est naturae cartilagineae, circa ossis multiformis foramen admittens vasa ad duram matrem, tenuissimo principio abscedit: unde procedens, primo modice crassior fit, latiorque; dein rursus gracilior, donec

A a 3 in

<sup>a</sup> Eustach. Tab. XLII. Fig. 9. & Fig. 10. Du Verney Pl. VI. Fig. 4. D. & Fig. 5. E. F. Cowper Myot. ref. ann. 1724. Tab. XXVI. Fig. 4. 3. 8.

& 2. 41. Valsalv. Tab. III. Fig. 5. K. & Tab. X. Fig. 1. d.  
<sup>b</sup> Valsalv. Tab. 2. Fig. 1. e.

in tendinem vertatur <sup>e</sup>. Proce-  
dit retrorsum ad tympa-  
num, dein per id ipsum, modice simul & extrorsum  
& sursum declinans. Mox autem ab ortu recipitur in se-  
micanalem, qui ejus causa partim supra tubae osseae  
partem, partim in superiore & eadem priore parte  
tympani, è regione membranae tympani, formatus  
est; atque in eo vagina <sup>d</sup> quadam tendinosa, quae  
canalem perficit, retinetur, ne elabatur. Ad cujus  
canalis finem cum tendo ejus pervenit, exit ex eo, fle-  
xitque se <sup>e</sup> circum vaginam, decurrens membranam  
tympani versus <sup>f</sup>, simulque modice retrorsum: sese-  
que ad postremum mallei manubrio inserit <sup>g</sup>, infra pro-  
cessum ejus gracillimum; & ei quidem manubrii parti,  
quae spectat fundum tympani, oppositum membra-  
nae. Hic musculus ob singularem suum decursum aptus  
est ad mallei manubrium à poro acustico retrahendum  
ad oppositam tympani partem, & modice eodem tem-  
pore in priora; quo fit, ut cum malleum sequatur  
membrana tympani, eam intro trahere valeat, ac  
tendere, cavamque efficere à parte pori acustici.

Est musculus ossiculi malleo comparati, Eustach. Epist.  
de audit. organ. *Musculus ab Eustachio observatus*, A-  
rant. Anat. obs. Cap. 12. 14. 15. & 16. *Musculus*  
*malleum*

<sup>e</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 9. & 10.

<sup>d</sup> Du Verney Pl. vi. Fig. 4. D. Val-  
salv. Tab. iii. Fig. 1. K. Cowper  
Myot. ann. 1724. Tab. xxvi. Fig.  
a. C.

<sup>f</sup> Du Verney Pl. vi. Fig. 5. 3. 4.  
Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

xxvi. Fig. 1. & 8. a.

<sup>g</sup> Du Verney Pl. vi. Fig. 1. F. Cow-  
per Myot. ann. 1724. Tab. xxvi.  
Fig. 3. C. & Fig. 4. C.

<sup>f</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab.  
xxvi. Fig. 8. & 3. C.

<sup>g</sup> Du Verney Pl. vi. Fig. 4. D.

a Du

*malleum ad incudem movens*, Fabric. de aur. Part. I. Cap. 6. *Internus*, ibid. Part. III. Cap. 6. *Auris internae secundus*, Casser. de aud. org. Lib. I. Cap. 13. *Qui ab osse cuneiformi prognatus*, Casser. de aud. org. Lib. III. Cap. 10. & Pent. Lib. IV. Sect. III. Cap. 10. *Alter internus*, & *in concha latitans*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 14. *Internus*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. *Musculus internus auris*, Molinett. Diss. an. path. Cap. 9. *Internus mallei*, Schelham. de aud. Part. I. Cap. 3. §. 4. *Le second de ceux qui appartient au marteau*; & *l'externe*, Du Verney Trait. de l'organ. de l'ouïe, I. Part. p. 28. & II. Part. p. 76. *Internus auris*, Cowp. Myot. Cap. 12. *Musculus majoris processus*, Valsalv. de aur. Part. I. Cap. 2. §. 5. & Part. II. Cap. 5. §. 6. *Internus auris Eustach.* Douglas Myogr. Cap. 11. *Le Monogastrique*, Vieuss. Trait. de l'oreill. Part. II. Chap. 4. *Le muscle interne du marteau*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 401. 402.

## CAPUT XXXIV.

*De Stapedio* \*.

**S**tapedius quoque ventrem & tendinem habet. Venter haeret in cavernula ossis petrosi, quae in tympano ante inferiorem partem aquaeductus Falloppii est: ex eaque oritur, & per eandem oblique in priora adscen-

\* Du Verney Pl. v. Fig. 8. B. & Pl. viii. Fig. 1. c. Valsalv. Tab. iii. Fig. 10. B. Cowper Myot. ann.

1724. Tab. xxvi. Fig. 4. 43. Fig. 8. & 3. L.

scendit. At tendo ejus ex ejusdem cavernulae rotundo ore exit <sup>b</sup>, & quamprimum exiit, flectit se per tympanum in priora <sup>b</sup>, rectaque petit <sup>c</sup> posteriorem partem capituli <sup>d</sup> stapedis. Hoc igitur capitulum ad os cavernulae attrahit, quo ita movet stapedem, ut pars posterior basis ejus in vestibulum auris introeat, prior ab eodem recedat.

Anne est *ligamentum peculiare*, à quo stapes *sustinetur*, Schelham. de audit. Part. I. Cap. 3. §. 6? Est *le muscle de l'étrier*, du Verney Trait. de l'org. de l'ouïe, I. Part. p. 30. & II. Part. p. 85. *Musculus stapedis*, Cowp. Myot. Cap. 12. *Stapedis musculus*, Valsalv. de aur. Part. I. Cap. 2. §. 11. & Part. II. Cap. 5. §. 3. *Stapidaeus vel musculus stapedis*, Duvern. Dougl. Myogr. Cap. 11. *Le second muscle de l'oreille interne, que nous appellons petit*, Vicuss. Trait. de l'oreill. Part. II. Chap. 4. *Le muscle de l'étrier*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 403.

## REGIO VIII. COLLUM.

### C A P U T XXXV.

#### *De Latissimo colli a.*

**T**egmen est sub communibus tegumentis explicatum, carneum, latum, tenue, cum panniculo

<sup>b</sup> Du Verney Pl. viii. Fig. 1. c.

<sup>c</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxvi. Fig. 3. L.

<sup>d</sup> Du Verney Pl. V. Fig. 8. Valsalv. Tab. iii. Fig. 10. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxvi. Fig. 4. 43.

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxx. u. Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 3. r. & Epit. Tab. musc. 1. O. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxi. 18. 18. 18. 18. 19.

<sup>b</sup> Eu-



lo adiposo conglutinatum. In pectore infra claviculam , & in humero , inque latere colli , à membrana , qua panniculus adiposus ex interiore parte obductus , tenuissimum sparsis fibris format orsum ; à quo paulatim crassior , & paullo angustior , per collum , cujus partem dimidiam alteram velat , adscendit ; oblique in priora à recto tramite deflectens. A priori parte pertingit ad menti latus , ibique se maxillae infra ortum Depressoris anguli oris inserit <sup>b</sup>. Mox autem à posteriore parte finis mododisti malam conscendit <sup>c</sup> , ubi primo plerumque portionem dat Depressori labii inferioris , fasciculos praeterea tenues interiori parti Depressoris anguli oris , post cum eodem se conjungens , decurrensque , & saepe fibras per exteriorem partem ejus ad angulum oris porrigens. Sed in latere colli multi fasciculi priusquam malam attingant , desinere solent. Saepe etiam tum à priori parte infra mentum , tum maxime in latere , multi à reliquo musculo disjuncti , & quasi errantes inveniuntur. Angulum oris , labium inferius , quod malae à latere menti est , cutem colli , quae est infra malam , trahit deorsum & parum oblique in latus : eodem tempore totam cutem , quae superiorem partem pectoris , vicinum humerum , vicinamque colli partem vestit , sursum in priora trahit , ac colli cutem premit , truditque extrorsum. Maxillam vero depri-

Bb mere

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxx. x.

ann. 1724. Tab. xxi. 19.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxx. y. Cowp. Myot.

d San-

mere valeat, nec ne, difficile dictu; quanquam non putarem.

Non alienum videtur hic loci subijcere similes membranaceos musculos, qui aliquando Latissimi partes haberi possunt, aliquando distincti sunt, saepe desunt. Eorum alter <sup>d</sup> insignior, ex mala, circa medium Masseteris, nascitur ut Latissimus; quibusdam etiam ex ipsa tendinosa Masseteris superficie: inque priora per malam, è modica latitudine sensim angustior, procedit, tandemque se Latissimo jungit, & cum eo angulum se oris versus curvat sursum, perque exteriora Depressoris anguli oris, posteaque sub tenuitate Zygomatici majoris, quae per labium inferius excurrit, sensim evanescit. Alter ad auriculam pertinet <sup>e</sup>, constatque ex fibris tenuibus, sensim infra auriculam primum conspicuis, in fine tendineis, ac desinentibus ad priorem partem lobi auriculae, & ad inferiorem cartilaginis, quae ima conchae & auris introitus cartilaginei efficit. Hic auriculam detrahit, tenditque concham & principium introitus auris: ille angulum oris trahit retrorsum modiceque deorsum. Inveniuntur, quibus ejus, qui ex mala venit, loco, Latissimus latior est, vestiens id omne quod à latere menti, labiique inferioris, usque ad subjectam lobo auriculae partem malae est <sup>f</sup>; summaque parte sui veniens ex colli parte, quae non multum abest à lobo; interque cum

<sup>d</sup> Santorin. Tab. 1. n.

<sup>e</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XXI: 18. juxta lobum auriculae ::

ubi pars est Latissimi.

<sup>f</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 32. rOH.

eum & locum ubi ipse se maxillae inserit, interjectam malam conscendens. Eorumque fasciculorum quo quisque superior, eo minus recta per collum, perque malam in priora adscendit, summo denique margine, à confinio lobi ad angulum oris, aut plane, aut fere transverso; cujus tamen summi marginis fasciculi aliquando ad os ipsum non pertinent, sed in itinere circa priora Maffeteris evanescent.

Est alterius lateris primus musculus, eorum qui buccas & labra movent, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 13. *Musculus latus in collo positus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 5. Πλάτυσμα μυνώδης, Fallop. Obs. an. in auricularum musculis. *Quinti paris maxillae*, Arant. Anat. obs. Cap. 30. *Musculus auriculae & utrique labro communis*, Casser. de aur. Lib. I. Cap. 5. & Pent. Lib. IV. Sect. I. Cap. 4. *Musculus latus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 15. *Detrahens quadratus, communis buccarum labiorumque*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. *Quadratus genae, seu Tetragonus*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 10. *Quadratus genae vel Latissimus colli*, Dougl. Myogr. Cap. 9. *Quadratus genae, or Quadratus colli, by some call'd Tetragonus, and by Galen, Platysma myoides*, Cowp. Myot. ann. 1724. Cap. 7. *Platysma-myodes*, Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 33. Le Peaucier, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 570. & seq.

Pars ex mala nascens, est *Risorius novus*, Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 34.

Pars ad auriculam pertinens, est *Portio musculi cutanei supra parotidem ad aurem adscendentis*, Riolan.

B b 2

Anthr.

Anthr. Lib. V. Cap. 14. *Adducens ad anteriora*, Spiegel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. *Sunt fibrae carnae à musculo Quadrato colli ad partem auriculae inferiorem delatae*, Vallatv. de aur. Part. I. Cap. 1. §. 6. *The common, proceeding from the Quadratus genae*, Dougl. Myogr. Cap. 10.

## C A P U T XXXVI.

*De Sternomastoideo<sup>a</sup>.*

**A**ngustum, & fere tendineum Sternomastoidei principium, à quo per exteriora carnis suae aliquandiu tendinosus. Eique principio origo ab ossis pectoris parte priore & eadem superiore<sup>b</sup>, non longe à capite claviculae. Unde usque ad finem paulatim latior, & diu magis magisque intumescens, post rursus sensim extenuatus, & ad postremum in brevem, sed latum, & tenuem tendinem<sup>c</sup> versus, aut extremo suo majorem partem tendineus; ascendit ad illam capitis partem, quae retro aurem est<sup>d</sup>, atque ibi se incurvo ductu affigit exteriori parti processus mammillaris, ab imo ad summum, fere per amplitudinem ejus mediam; continuoque retrorsum, vicinae parti mammillari ossis temporis, huicque vicinae parti occipitis: & ubi se affigit, ibi ossa illa eminent, & asperiora sunt, lunato, inque inferiora patulo, ductu. Caput,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxv. f. Vesal. de H.

C. F. Lib. II. Tab. 4. 6.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxv. f. 2.

<sup>c</sup> Cowper Myot. ref. ann. 1724. Tab.

XI. III. 94. C.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxv. f. 8. & Tab. xxxii. z.

put, si rectum sit, oblique in illud latus, in quo situs, inque priora deorsum agit, cervicem eo versus curvans, faciemque in oppositum latus aliquantum dirigens. Si cervix in posteriora flexa sit, eo eam, simulque in latus, magis, priusquam supra dicto modo flectat, incurvat, ac caput deprimat. Cervice recta, rigidaque, caput, cum ita conversum est, ut facies in illud latus, in quo ipse situs, directa sit, restituit.

Est *Musculus à pectoris osse & clavícula in caput inserti*, pars ex *pectoris osse pronata*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 28. Pars eadem *septimi caput moventis*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 17. Eadem *septimi paris*, eorum qui caput movent, Eustach. de mot. capit. Eadem *Mastoides*, Riolan. Anth. Lib. V. Cap. 21. Spiegel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 7. Cowper Myot. Cap. 22. *Mastoidaei*, Dougl. Myogr. Cap. 18. Eadem ejus, qui *le Sterno-mastoidien, ou Mastoidien exterieur*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 706. & seq. & §. 1169. & seq.

## CAPUT XXXVII.

*De Cleidomastoïdeo<sup>a</sup>.*

Similis prope Cleidomastoïdei decursus: nam à summo pectoris recta petit processum mammillarem, sed incipiens à superiore & eadem priore clavi-

Bb 3                      culae

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxv. t. dext. & Tab. xxix. K. Vesal. de H. C. F. Lib.

II. Tab. 4. Y.

culae parte <sup>b</sup>; juxta caput ejus, quo ossi pectoris innixa; & aliquando ab ipsa hujus capitis radice; descendens ad priorem partem mucronis processus modo dicti <sup>c</sup>: quocirca rectius ascendit. Contra etiam quam ille, ex lato paulatim angustior; atque ex tenuiore, cum procedit, primo tantum modice crassior, deinde tenuior. Et jam ab initio maximam partem carneus, sed extrinsecus tendinosus, in fine demum fit tendo <sup>d</sup> crassius, brevis, ex ea parte, qua incumbit ei Sternomastoïdeus, primum & praecipue incipiens. Actio ejus ab illa praecedentis, cujus & aliquando pars censerî potest, vix discrepat, nisi quod caput rectius quam ille, in latus trahat, collumque rectius quoque curvet, ac caput non aequè multum convertat. Vidi in duas caudas jam cito abeuntem, quae una ad processum mamillarem usque incedebant. Vidi ab ejus posteriore parte separatam partem anteriorem, eamque sensim modiceque angustioiorem & crassioiorem, seseque adjungentem posteriori margini Sternomastoïdei, cujus, solito angustioris, latitudinis partem prope dimidiam faciebat. Vidi similem portionem graciliorem.

Est *Musculi à pectoris osse & clavicula in caput inserti*, pars à *clavicula pronata*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 28. Pars eadem *Septimi caput moventis*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 17. Eadem *septimi paris*, eorum

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxv. t.-a.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxix. K.-a.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxv. t.-b.

<sup>e</sup> Eustach.

rum qui caput movent, Eustach. de mot. capit. Eadem *Mastoidaei*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 21. Spiegel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 7. Cowp. Myot. Cap. 22. *Mastoidaei*, Dougl. Myogr. Cap. 18. Eadem ejus, qui le *Sterno-mastoidien*, ou *Mastoidien antérieur*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 706. & seq. & §. 1169. & seq.

## CAPUT XXXVIII.

*De Coracohyoideo<sup>a</sup>.*

**E**x ventribus duobus<sup>b</sup>, quos tendo medius jungit<sup>c</sup>, constat: interdum tamen, praesertim in aetate junioribus, ubi caeterum tendo est, nil nisi caro angusta & tenuis invenitur, & ea quibusdam ex parte tendinea. Ventres longi, tendo brevis. Ventrium primus principio lato & praetenui procedit à summa ora superioris marginis scapulae<sup>d</sup>, juxta lunulam, quae ad radicem processus coracoidei; aliquando etiam à ligamento lunulam illam perficiente: in aliis autem inde eum tenui & angustiore tendine vidimus procedere, coque longo, paulatim angustiore, & à sua superiore parte carnem producente, ex qua venter à primo initio acutus, ut sensim nascebatur, latior & crassior. In quibusdam ab ora superiore scapulae, non longe

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 5. ll. & Tab. xxxiii. Z. fin. Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 5. RS. & Epitom. Tab. musc. III. MN.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 5. l. l.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 5. ll. & Vesal. Lib. II. de H. C. F. Tab. 5. inter RS.

<sup>d</sup> Morgagn. Advcrs. II. Tab. 1. T.

longe ab angulo superiore oritur : in aliis ab eo ipso angulo ad lunulam usque , principio latiore. Ab ortu circum thoracem , vicinaque colli , in priora modiceque fursum procedit incurvo ductu , paullatim quam ab initio angustior , & crassior : ubi vero ad priorem colli partem appropinquat , extenuatur , atque angustatur , & in tendinem illum , quem diximus , densatur , angustiore , & tenuiore , tanquam si inter Cleidomastoïdeum à parte priore , & Scalenum priorem venamque jugularem internam à posteriore , compressus fuisset. Hic tendo è superiore parte ventris primi sensim ortus , se quoque fursum curvat , post rursus carneus redditus , efficit ventrem alterum , quem ex sua interiore parte primum producit , cumque primo sensim crassiorem , dein tenuiorem , ac primo etiam sensim modiceque latiore , in fine angustiore. Adscendens is oblique , ipse autem primo leviter incurvus , post rectus , pervenit ad os hyoïdes , ejusque se basis inferiori eidemque priori parti , juxta cornu hyoïdis , extremo tenuiore , eoque tendineo , inserit . Frequenter ex parte continuat se extremo Stylohyoïdeo. Os hyoïdes eodem tempore trahit & deorsum , & retrorsum , & in illud latus , ubi ipse situs : quanquam non nisi cum pare sui animadvertatur agere , cum eoque recte detrahat , ac simul retrorsum cogat. Ubi se per collum curvat , retinetur membrana quadam , eaque quibusdam subtendinea , quae ab eo ad claviculam usque exporrecta. Sed in



in uno, alteroque corpore multo brevior fuit, incipiens à media longitudine claviculae, à parte ejus superiore.

Est *septimus*, & *octavus* propriorum ossis *u* referenti, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 17. *Quartus hyoidis*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 12. *Quarti paris hyoidis*, Fallop. Obs. an. in musculis hyoidis ossis. *Quarti paris*, ossi *hyoidi*, ad linguae motum destinatum, Arant. Anat. obs. Cap. 26. *Quarti paris ossis hyoidis*, Casser. Pent. Lib. II. Sect. I. Cap. 8. *Coracohyoides*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 16. *Paris quarti*, oblique deorsum trahentis, *Coracohyoides* appellati, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 6. *Coracohyoides*, Cowper Myot. Cap. 13. *Coracohyoides*, Morgagn. Adv. an. I. §. 27. *Coracohyoidaeus*, Dougl. Myogr. Cap. 12. *Coraco*, seu *Costo-Hyoides*, Santorin. Obs. an. Cap. 6. §. 18. *L'Omo-plat-hyoidien*, communement *Coraco-hyoidien*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 865. & seq. & 1246. & seq.

## CAPUT XXXIX.

*De Sternohyoïdeo.*

**S**ternohyoïdei principium plerumque affixum interiori parti ossis pectoris, & quidem eminenti margini partis ejus illius, qua sustinet claviculam, juxta cartilaginem costae primae, atque ejus etiam cartila-

Cc

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. r. m. & Tab. xxxiii. c. Vesal. de H. C. F.

Lib. II. Tab. 1. C. & Tab. 4. S. Cowp. Myot. a. 1724. Tab. xxii. 44.  
<sup>b</sup> Eu-

tilaginis <sup>b</sup> finitimae superiori eidemque posteriori parti, ligamentoque, quo clavicula cartilagini illi alligatur: aliquando praeterea capitis claviculae parti eidem & posteriori & inferiori. Adscendit, modice primum parem sui versus, mox rectius: latus ab ortu, & pertenuis; dein paullo quam in principio crassior, leviterque se ad finem usque angustans, donec extenuato tendineo fine pertingat ad inferiorem partem basis hyoidis, juxta ejus medium <sup>c</sup>. Eamque detrahit. Interdum intus in carne ejus, ibi ubi aliquantum supra sternum progressus, linea <sup>d</sup> tendinea transversa tenuis. Vide autem, quâ natura à proposito aliquando declinet. In optimo quodam corpore latum principium oriebatur ab interiore parte sterni, juxta finem costae primae; & ab externo latere abibat in Sternohyoideum: ab interno autem, postquam venerat ad cartilaginem, qua augetur sustentaculum claviculae, ei se, tanquam si in itinere deficeret, inferebat, parte visenda, cui extremum extenuatum erat, & tendineum.

*Est ossi v referenti propriorum alterius lateris primus; Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 17. Primus hyoidis, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 12. Primi paris hyoidis ossis, Fallop. Obs. an. in musculis hyoidis ossis. Primi paris ossi hyoidi, ad linguae motum destinatum, Arant. Anat. obs. Cap. 26. Secundi paris ossis hyoidis, Casser. Pent.*

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxiii. f.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. f. m-g.

<sup>d</sup> Morgagn. Adv. an. 1. Tab. 2. Fig.

1. n.

a Eul-

Pent. Lib. II. Sect. I. Cap. 8. *Sternohyoidaeus*, Riolan.  
 Anthr. Lib. V. Cap. 16. *Secundi paris*, *detrahentis*,  
*Sternohyoidei*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 6.  
*Sternohyoideus*, Cowper Myot. Cap. 13. *Sternohyoides*,  
 Morgagn. Adv. an. I. §. 7. *Sternohyoidaeus*, Dougl.  
 Myogr. Cap. 12. *Sternohyoides*, Morgagn. Adv. II.  
 Anim. 13. *Sterno-Hyoides*, Santorin. Obs. an. Cap. 6.  
 §. 18. Heister. Comp. anat. §. 322. in nota. *Le Sterno-*  
*hyoidien*, ou *Sterno-cleido-hyoidien*, Winfl. Exp. an. Trait.  
 des muscl. §. 870. & seq. & 1249.

## CAPUT XL.

*De Sternothyreoïdeo<sup>a</sup>.*

**I**nfra eum Sternothyreoïdeus nascitur, pariter tenuis, sed latior, & insigniter, dum adscendit, angustans se. Ab initio autem adhaeret amplitudini internaë ossis pectoris, è regione inferioris partis cartilaginis costae primae; post margini ejusdem ossis, juxta eandem dictae cartilaginis partem, atque ejus etiam ipsius cartilaginis finitimae interiori parti. Latiore & tenuiore, & fere tendineo, sine inserit<sup>b</sup> se eminentiae oblongae, quae oblique excurrit per externam partem lateris cartilaginis thyreoïdae: qui tamen aliquando multo angustior fuit, tantummodo ad imam partem ejusdem eminentiae pertinens. Angustiore

Cc 2

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 5. n. fin. & Fig. 12. G. & Tab. xxxiii. b. c. dextr. Vcsal. de H. C. F. Lib. II.

Tab. 5. P.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 5. n-β. & Fig. 12. G-β.

<sup>c</sup> Eu-

stioire autem, quam praecedens esse solet, & eodem crassiore, tendinosoque, ac cum praecedente aliquando conjuncto, se inserit tuberculo, quod ex eadem illa cartilagine, supra dictam eminentiam, ad priorem partem radice processus superioris eminet. Medio inter hos fines loco plerumque portione quadam accedit ad pharyngis Constrictorem inferiorem: saepe & ab exteriori parte adscendit longius<sup>c</sup>, jungitque se posteriori margini Hyothyreoidei, & cum eo pertinet ad cornu hyoïdis. Alias ludit eo natura magis, ut bicipitem invenerim, capitibus se demum, postquam aliquandiu per collum processerant, conjungentibus, ac deinde tamen fere ad finem usque distinctis: eorumque alterum praecipuum erat, oriebaturque tum ab imo margine ossis primi sterni, tum à laterali, à fine costae secundae fere usque ad summum primae; tum ab ipsa proxima superiore parte cartilaginis primae: alterum, quod pro accessorio musculo haberi posset, angustum, oriens à superiore & eadem posteriore parte mediae longitudinis cartilaginis primae, & à vicino ligamento, quo clavicula ad cartilaginem illam alligata. Caeterum in plerisque, cum supra os pectoris processit, lineam tendineam<sup>d</sup> tenuem undulatam habet, eamque in aliis transversam, in aliis obliquam. Cartilaginem thyreoïdeam, atque adeo laryngem deprimit; si cum sui pare agat, recte: nam si quando solus ageret, oblique deprimeret. Dum vero

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 12. G. 72.

<sup>d</sup> Casser. de Laryng. Tab. 1. Fig. 1.

supra I. infer. & Fig. 3. supra E.

infer. & Casser. Tab. apud Spigel.

Lib. iv. Tab. 2. Fig. 3. supra E.

infer.

a Eu-

vero deprimat, simul laxat asperam arteriam. Dici etiam posset adiutor esse Constrictori pharyngis supra dicto, itemque Hyothyreoideo ad deprimendum hyoides, cum partem eis dat.

Est *communium laryngis musculorum tertius, & quartus*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 21. *Primus communis laryngis*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 14. *Secundi paris communium laryngis musculorum*, Fabric. de laryng. Part. I. Cap. 8. & Part. III. Cap. 8. *Primi paris communium laryngis*, Casser. de voc. aud. org. Tract. I. Lib. I. Cap. 4. & Lib. III. Cap. 9. *Bronchius*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 18. *Primi paris extendentium thyroïdem, vulgo Bronchii dicti, at nobis Sternothyroïdei*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 6. *Sternothyroïdeus*, Cowp. Myot. ann. 1694. Cap. 15. *Sternothyroïdes*, Morgagn. Adv. an. I. §. 6. & 7. *Sternothyroïdeus*, Dougl. Myogr. Cap. 14. *Sternothyroïdes*, Morgagn. Adv. an. II. Anim. 13. *Sternothyroïdeus*, Cowp. Myot. ann. 1724. Cap. 17. *Sterno-Thyroïdes*, Santor. Obs. an. Cap. 6. §. 5. 6. & 8. *Le Sterno-Thyroïdien*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 445. & seq. & 462.

## CAPUT XLI.

*De Hyothyreoideo <sup>a</sup>.*

**P**rocedit ab inferiore & eadem interna parte tum basis <sup>b</sup> ossis hyoidis juxta cornu, tum basi propin-

Cc 3

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 5. o. &    <sup>b</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 12. E-2.  
Fig. 12. E.

c Eu-

pinquae ipsius cornu<sup>c</sup> longitudinis fere dimidia; tenuis ab initio, ac satis latus. Primum deinde aliquanto crassior, post extenuatus, eadem prope, qua ortus, latitudine descendit, pertingitque<sup>d</sup> ad eandem in thyreoïdea eminentiam oblongam, ad quam Sternothyreoïdeum desinere diximus; aliquando & ad imum thyreoïdeae marginem, ante illam eminentiam. Hoc thyreoïdeam attollimus, hyoïdes deprimimus: recte rursus, utentes utroque; cum si possemus uno, attolleremus, deprimeremusque oblique.

Est *communium laryngis primus, & secundus*. Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 21. *Secundus communium laryngis*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 14. *Primi paris communium laryngis musculorum*, Fabric. de laryng. Part. I. Cap. 8. & Part. III. Cap. 8. *Secundi paris communium laryngis*, Casser. de voc. aud. org. Tract. I. Lib. I. Cap. 4. & Lib. III. Cap. 9. *Hyothyroïdeus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 18. *Paris flectentis thyroïdem, quod Hyothyroïdes dicitur*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 6. *Paris Hyothyroïdei*, de Marchett. Anat. Cap. 11. *Hyothyroïdeus*, Cowp. Myot. ann. 1694. Cap. 15. & ann. 1724. Cap. 17. *Hyothyroïdes*, Morgagn. Adv. an. I. §. 6. *Hyothyroïdaeus*, Dougl. Myogr. Cap. 14. *Hyo-Thyroïdes*, Santorin. Obs. an. Cap. 6. §. 7. *Le Thyro-Hyoïdien, ou Hyo-Thyroïdien*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 447. & 462.

CA-

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 12. E-8.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 12. E-γγ.

& Fig. γ. o-β.

<sup>a</sup> Eu-

## CAPUT XLII.

*De Biventre maxillae inferioris <sup>a</sup>.*

**R**adicem processus mammillaris ossis temporis ex interiore parte findit incile quoddam, ex quo, & quidem ab interiore eodemque humiliore margine ejus, Biventer oritur <sup>b</sup>, inde ad imum mentum leviter lunato, directisque sursum cornubus, procedens ductu; atque ibi se inferens <sup>c</sup> posteriori parti imi marginis maxillae inferioris, juxta menti medium. Est vero medius tendineus <sup>d</sup>, extremis utrimque carneus <sup>e</sup>, id est, vere biventer. Venter primus, qui ab initio non admodum latus est, fit primo ex tenuiore crassior, mox totus paullatim gracilescit, & in tendinem abit, ex parte sui exteriori, qua spectat Pterygoideum internum, citius sensimque prodeuntem: atque is tenuis est, teres, portione musculi longus; rursusque in ventrem, & ab inferiore quidem parte citius, vertitur, sensim & tumidiorem, & latiore; juxta maxillam autem extenuatum, angustioreque, & ab ortu suo aliquandiu, maxime ex interiore parte, tendinosum. Tendinosus quoque venter primus, praesertim

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxv. m. a. n. & Tab. xxxii. rr. fin. Vcsal. de H. C. F. Lib. ii. Tab. f. Hl. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxiii. 68. 68.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxv. m. - 8. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxiii. 68. infra C.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxv. n. - 7. Cowper

Myot. ann. 1724. Tab. xxiii. 68. juxta B.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxv. mn. - 4. Cowper Myot. rcf. ann. 1724. Tab. xxxi. B.

<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxxv. m. n. Cowper Myot. rcf. ann. 1724. Tab. xxxi. A. C.

f Cow-

tim qua oritur, praefertimque à posteriore parte: alter qua se inferit. Saepe à ventre secundo vario modo abludit portio, eaque quibusdam insignis, se conjungens cum eodem ventre Biventris alterius lateris, aut cum simili abludente portione ejus. Tendinis extremo laxae annuli specie superinjecta aponeurosis quaedam, qua concursus Sternohyoidei, Coracohyoidei, Stylohyoidei, Mylohyoidei, extrinsecus obductus; eaque satis lata, tenuis, laxa. Quin & è tendinis extremo, tendinoseque initio ventris secundi, ab inferiore parte exit aponeurosis <sup>f</sup> lata, tenuis, adjungens se ad aponeurosem modo dictam, & plerumque priori parti basis hyoïdis adnectens <sup>g</sup>, sine lato, inter extrema Mylohyoidei, Sternohyoidei, Coracohyoidei: eaque laxae adnectitur hyoïdi. Unde fit, ut deorsum actio hyoïde, in tendinis ventrisque secundi confinio se insigniter flectat, retentus aponeurosibus, quas diximus; atque adeo ab ortu ventre primo, tendineque, rectius incedat in priora deorsum usque ad latus ossis hyoïdis; flexoque ibi tendine extremo, postea ventre secundo in priora recto ducto adscendat ad mentum <sup>h</sup>. Frequenter praeterea medius tendo per medium Stylohyoïdeum, ob id tunc fissum, transit <sup>i</sup>. Hic musculus & maxillam inferiorem movet, & caput. Maxillam proprie, quam à superiore oblique deducit, agitque retrorsum, aponeurosibus, quae retinere videntur,

<sup>f</sup> Cowper Myot. ref. ann. 1724. Tab. xxxi. D.

<sup>g</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxiii. supra M.

<sup>h</sup> Eustach. Tab. xxxv. mæn.

<sup>i</sup> Eustach. Tab. xxxv. mæn. sinist. & Tab. xxxii. f. r. sin.



dentur, non impediētib; ob laxitatem suam, ne contractione ventrium rectus fieri possit, breviorque; immoto interim, neque tamen ne moveatur, retento, hyoide. Caput, cum maxilla, ne deorsum cedat, magis quam caput firmata; tunc posteriorem capitis partem detrahens, eoque efficiens, ut prior se attollat. Atque ita cum natura construxit, ut rectus fieri contractione sua possit, neque tamen impedimento sit partibus vicinis, aut ab eis ipsis impediatur. Dedit habere carneam naturam, ubi spatii est, ei, etiam contractae, recipiendae, id est tum à principio, inter processum mamillarem & maxillae posteriorem partem; tum in extremo, infra maxillam: tendinem autem, ubi sub maxilla deducitur per angustias; quibus etiam ventres in tendinis confinio accommodavit; effecitque primum, ubi maxillae angulum subiturus est, sensim graciliorem; secundum, ubi emersurus est, ex gracili sensim habitiorē. Videtur autem natura, quoniam unus venter non suffecisset ob parvitatem, dedisse duos, non permittente loci angustia, ut efficeret unum majorem: tendinemque laxè alligasse hyoïdi, ut in loco suo, quantum satis est, retineretur, ne aliquantum deflueret cum laryngem cum hyoïde & lingua modo deorsum insigniter agimus, modo sursum. Ex quibus, puto, intelligi potest & id, quod efficit; & modus, quo agit; & constructionis singularis ratio. Quamquam autem constructionis singulorum rationem tradere non susceperim, in hoc tamen non erat praeteriēda, quo intelligeretur actio clarius; praesertim cum aliud atque

D d

aliud

aliud naturae institutum hic quaesiverint clarissimi homines. An autem & hyoïdes, cum id insigniter deorsum actum, adductaque eodem tempore maxilla inferior ad superiorem, attollit? non negaverim posse, quamvis certe huic officio paratus non sit.

Est alterius lateris maxillam moventium quartus, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 15. *Maxillae inferioris quartus*, os aperiens, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 11. *Quarti maxillae paris*, Arant. Anat. obs. Cap. 27. *Digastricus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 15. *Alterius paris maxillae*, *Deprimentis biventris*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. *Paris Digastrici*, sive *Biventris*, Vesling. Synt. Cap. 13. *Digastricus seu Biventer*, Cowp. Myot. ann. 1694. Cap. 18. *Digastricus*, Dougl. Myogr. Cap. 20. Morgagn. Adv. an. II. Anim. 12. *Digastricus*, seu *Biventer*, Cowp. Myot. ann. 1724. Cap. 18. *Digastricus*, Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 37. *Le Digastrique*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 848. & seq. & 1224. & seq. *The Digastric*, Monro, Medic. Essais, Vol. I. Art. 11.

## C A P U T XLIII

*De Stylohyoïdeo<sup>a</sup>.*

**S**tylohyoïdeus exili tendine, qui deinde per exteriorem partem carnis aliquandiu decurrit, oriens ab inferiore parte, processus styliformis ossis temporis,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. f. i. & Tab. xxxv. l. fin. & Tab. xxxii. l. fin. Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 4. Q.

<sup>b</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxxii. D.

<sup>c</sup> Eust.

ris, juxta officulum, quod illi processui adjunctum, in multis mobile est; aut ab eadem parte initii illius ipsius officuli; musculus fit sensim paullo habitior, gracilis tamen, ac prope teres; dein rursus gracilescit: descenditque oblique in priora ad os hyoïdes, ac se sine tenui tendineo affigit priori & eidem inferiori parti basis hyoïdis<sup>c</sup>, qua cornu cum ea connexum, statim supra Coracohyoïdeum, cui se saepe ex parte continuat. Quibusdam non basi, verum cornu juxta basem insertus. In quodam ab exteriori margine suo demittebat fasciculum ad Hyothyreoïdeum, ejus se exteriori margini continuantem. Non raro fissus; transitum praebet Biventri<sup>d</sup>, ut superiore capite jam annotatum. Frequenter autem se, cum ad os hyoïdes appropinquat, findit in portiones duas, inter quas elabitur Biventris tendo; easque planiores, sensim graciliores, vertentes se in tendines tenues, planos, sensum angustiores, breves; qui, postquam Biventris tendo exiit, conjungunt se in extremum tendineum, breve, tenue, acutum. Invenimus aliquando in duos graciles distinctum, inter quos Biventris tendo ince-  
debat. Os hyoïdes, solus si ageret, traheret sursum, ac simul retrorsum, & in latus: nunc autem, cum fere dexter sinisterque aequa vi agant, os illud recta attollunt in posteriora. Semel defuit unus.

*Est tertii paris ossi v referenti propriorum, Vesal. de*

D d 2

H.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxv. l.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxv. l. fin. & Tab.

xxxii. s. fin.

<sup>a</sup> Eu-

H. C. F. Lib. II. Cap. 17. *Tertius hyoidis*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 12. *Tertii paris hyoidis ossis*, Fallop. obs. an. in musculis hyoidis ossis. *Tertii paris ossi hyoidi*, ad linguae motum destinatum, Arant. Anat. obs. Cap. 26. *Tertii paris ossis hyoidis*, Casser. Pent. Lib. II. Sect. I. Cap. 8. *Styloceratoides*, Riolan. Anth. Lib. V. Cap. 16. *Tertii paris*, oblique sursum trahentis, sive *Styloceratohyoides*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 6. *Paris Stylohyoides*, de Marchett. Anat. Cap. 11. *Stylohyoides*, Cowp. Myot. ann. 1694. Cap. 13. *Stylohyoidaeus*, Dougl. Myogr. Cap. 12. *Stylohyoides*, Cowp. Myot. ann. 1724. Cap. 13. *Stylo-hyoides major*, Santorin. Obs. an. Cap. 6. §. 20. *Le Stylo-hyoidien*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 862. & seq. & 1245.

## C A P U T XLIV.

*De Stylohyoideo altero \*.*

**Q**uidam & alterum habent, haud multum dissimilem, longe autem exiliorem, ejusdem usus. Vissus is est ab ejusdem processus extremo, ab ejus inferiore parte, oriri, & cum praecedente incedere, sed citius in tendinem tenuem teretemque abire, eumque in fine magis extenuatum, & in quibusdam aliquantum dilatatum; alias in extremum gracile, ad postremum tendineum: suoque sine pertinere ad hyoidis officuli gra-

\* Eustach. Tab. xli. Fig. II. K.  
Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

xxviii. Fig. 3. X.

a Eu-

graniformis latus , quo illud spectat cornu subjectum ; aliquando etiam ad ipsius cornu finitimam priorem partem. In alio oriebatur cum Stylopharyngeo , tendine gracili , longoque ; unde caro sensim primo intumescens , & in duas inaequaliter divisa partes , referentes musculos duos.

Est *Stylo chondrobyoidaeus* vel *Stylo byoidaeus alter* , Douglas Myogr. Cap. 12. *An elegant small muscle* , &c. Drake Anthr. Book III. Chap. 17. De quo Cowper , *Besides this , i have frequently found another muscle* , &c. Myot. ann. 1724. Cap. 13. in *Stylohyoideo*. *Stylo-byoides novus* , Santorin. Obs. an. Cap. 6. §. 20.

## CAPUT XLV.

*De Stylogloss<sup>a</sup>.*

**A** b eodem styloformi<sup>b</sup> & Styloglossus , gracilis , longissimusque linguae. Procedit ad eam ab illa styloformis parte , quae mobilis in junioribus ; plerumque autem fere ab extremo ejus , alias à longitudine media ; & à superiore quidem eademque interiore parte ; frequenter & à vicino ligamento , quod inter processum illum , maxillaeque angulum intercedit. Hinc paulatim latior , & primo tendinosus , tenuis , satis angustus ; mox totus carneus , & paullo primum crassior , mox sensim tenuior , in priora in-

D d 3 tror-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 8. H. & Fig. 11. F. Bidloo Tab. xiv. Fig. 1. C.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 8. H.-a. & Fig. 11. F.-a.

<sup>c</sup> Bid-

trorsum vadit , petens eam imae partis linguae partem , quae est juxta marginem ejus lateralem ; in quam & dilatatus quasi evanescit , ad eam primo accedens juxta finem Ceratoglossi <sup>c</sup> , atque inde juxta eum <sup>c</sup> , juxtaque finem Basioglossi <sup>c</sup> , ulteriusque in priora fasciculis tenuibus usque ad linguae apicem excurrans. Solet quoque , ubi primum ad finem Ceratoglossi venit , partem aliquam ab inferiore parte sua deorsum curvare , eaque se continuare huc adscendenti tum Ceratoglossi <sup>d</sup> , tum Genioglossi. Linguam oblique in latus retrorsum trahit ; & si depressa sit , eodem simul tempore attollit. Potest & os hypoides attollere , cum est Ceratoglossio continuatus : & premere membranam oris , cum Genioglossio. Linguam , quando simul agit dexter & sinister , dilatant.

Est *quintus* , & *sextus linguae musculorum* ., Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 19. Columb. de re an. Lib. V. Cap. 13. *Tertii paris linguae musculorum* , Fallop. Obs. an. in linguae musculis. *Tertii paris propriorum linguae* , Arant. Anat. obs. Cap. 27. *Secundi paris linguae* , Casser. Pent. Lib. II. Sect. I. Cap. 6. & Sect. III. Cap. 5. *Styloglossus* , Riolan. Anthr. Lib. 5. Cap. 17. *Sexti paris , oblique trahentis , Styloglossi* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 6. *Styloglossus* , Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 14. Dougl. Myogr. Cap. 13. Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 14. *Le Stylo-Glosse* , Winsl. Exp. an. Trait. de la tête , §. 518. & seq. & 527. CA-

<sup>c</sup> Bidloo Tab. xiv. Fig. 1. C.  
<sup>d</sup> Calier. Pentasth. Tab. 1. Org. gust.

Fig. 2. OP.

\* a Eu-

## CAPUT XLVI.

*De Stylopharyngeo.*

**A** b eodem quoque processu <sup>b</sup> Stylopharyngeus, pariter gracilis, longusque, ut qui se ad cartilaginem thyreoideam demittat. Ab interiore & eadem inferiore parte principii portionis illius, quae adjuncta styloformi, mobilis est aetate junioribus, oritur. Tenuis primo, & tendinosus, sensimque primo crassior, post tenuior, quasi teres, sed aliquantum tamen latior quam crassior, & paullatim ab ipso usque principio, modiceque se dilatans, in priora, modiceque simul introrsum descendit ad latus pharyngis, & ad membranam, ex qua is proprie constat, se applicat: per cujus deinde latus pergit descendere, inde inprimis paullatim latior <sup>c</sup>, extenuatusque, ac cum extremo Palatopharyngeo conjunctus <sup>d</sup>; cum quo commune extremum <sup>e</sup> efficit, ad thyreoideam <sup>f</sup>, pharyngemque <sup>g</sup> pertinens. Sed & à priori parte illius, qua se thyreoideae inserit, secundum membranam pharyngis, ac dein secundum interiora thyreoideae decurrit latescens, & per membranam, quae laryngem ex interiore parte vestit, tenuissimis, paullatimque

<sup>a</sup> Eustach. Tab. XLII. Fig. 6. O. & Tab. XLI. Fig. 8. F. & Fig. II. I. & Tab. XXXIII. P.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. XLI. Fig. 8. F.-s. & Fig. II. I.-s.

<sup>c</sup> Cowper Myot. ann. 1694. Fig. 6. A.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. XLII. Fig. 6. Q. &

P. & Tab. XLI. Fig. II. P.

<sup>e</sup> Eustach. Tab. XLII. Fig. 6. P. & Tab. XLI. Fig. II. P.

<sup>f</sup> Eustach. Tab. XLI. Fig. II. P.-s. & Tab. XLII. Fig. 6. P.-s.

<sup>g</sup> Eustach. Tab. XLII. Fig. 6. P.-ss. inf. & Tab. XLI. Fig. II. P.

que dispersis fibris evanescit. Adde quod à superiore parte aliquando det portionem Constrictori superiori pharyngis. Nonnihil retrorsum ac simul extrorsum attollit thyreoideam cum pharynge; quo pharyngem etiam facit brevior. Si dexter simul cum sinistro agat, pharyngem, cui in descensu adhaerent, in latera diducunt.

Est *Quarti parvis linguae, quod & faucibus adscribi potest*, Fallop. Obs. an. in linguae musculis. *Stylopharyngeus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 19. *Tertii parvis faucium, Stylopharyngei*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 6. *Stylopharyngeus*, Cowper Myot. Cap. 16. *Stylopharyngæus*, Valsalv. de aur. Part. I. Cap. 2. §. 20. & 21. *Stylopharyngæus*, Morgagn. Adv. an. I. §. 8. *Stylopharyngæus*, Dougl. Myogr. Cap. 15. *Stylopharyngæus*, Morgagn. Adv. II. Anim. 14. *Stylo-Pharyngæus*, Santorin. Obs. an. Cap. 7. §. 7. *Le Stylo-Pharyngien*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 477.

## C A P U T XLVII.

*De Mylohyoïdeo<sup>a</sup>.*

**M**ylorhyoïdeus appellatur, qui à maxilla inferiore, maxime qua ea parte in mala est, pertinet ad os hyoïdes. Cujus tendinosa origo<sup>b</sup>, ab eminentia

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xlii. Fig. 1. 2. & Tab. xxxv. k k. Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 4. R. Casser. de Laryng. Tab. 1. Fig. 1. E. E. in utr. lat. &

Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 2. Fig. 1. E. & E.  
<sup>b</sup> Eustach. Tab. xlii. Fig. 1. 2. & 3.

c Ea-



mentia per longitudinem maxillae, à dente molare intimo fere usque ad symphysem maxillae, ex inferiore parte oblique porrecta: à cujus longitudine tota procedit oblique in priora, ac sui parem versus, cum quo & coit per totum illud intervallum, quod inter mentum & os hyoïdes; ad hoc posteriore solummodo parte sua pertingens. Partim igitur ad os hyoïdes <sup>c</sup>, sine autem tendineo tenui lato, desinit; & quidem ad basis <sup>d</sup> ejus priorem eandemque inferiorem partem: partim ad parem sui <sup>e</sup>, cum quo saepe in ipso coitu lineam tendineam tenuem efficit, & interdum ab inferiore parte aponeurosem tenuem, satisque latam; multis caeterum fibris carneis pari sui continuatus. Et pars ejus prior brevissima; ut sequuntur sequentes, ita longiores; longissima, quae pertinet ad hyoïdes. Latus est, & fere latitudinis ejusdem à principio ad finem: est & satis crassus; primum vero modice crassescit, post se lente extenuat. Cum vero dexter sinisterque se maximam partem conjungant inter se, ut unus dici possint, una etiam agunt, partesque quae statim supra eos sitae sunt, premunt, aguntque sursum: hyoïdes depressum si sit, attollunt, firmant deinde. An & depresso hyoïde, retentoque, maxillam inferiorem deprimunt?

E c                      Est

c Eustach. Tab. xli. Fig. 5. a-y  $\delta$ .  
Cassér. de Laryng. Tab. 1. Fig. 1.  
F. & Cassér. Tab. ap. Spigel. Lib.  
iv. Tab. 2. Fig. 1. D.

d Eustach. Tab. xxxv. kk.

e Eustach. Tab. xxxv. kk. kk. Cassér.

de Laryng. Tab. 1. Fig. 1. E.E. E.E.  
& Cassér. Tab. ap. Spigel. Lib. iv.  
Tab. 2. Fig. 1. E.E. Cowp. Myot.  
ann. 1724. Tab. xxvii. 47. Bidloo  
Tab. xy. Fig. 1. E.E.

a Eu<sup>r</sup>

Est *Secundi paris ossi* v referenti *propriorum*, Vefal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 17. *Secundi paris hyoidis ossis*, Fallop. Obs. an. in musculis hyoidis ossis. *Secundi paris ossi hyoidi*, ad *linguae motum destinatorum*, Arant. Anat. obs. Cap. 26. *Primi paris ossis hyoidis*, Casser. Pent. Lib. II. Sect. I. Cap. 8. *Milohyoides*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 16. *Primi paris*, *recta attollentis*, *Geniohyoidei*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 6. *Mylohyoides*, Cowper Myot. Cap. 13. *Mylohyoidaeus*, Fallop. Dougl. Myogr. Cap. 12. Morgagn. Adv. an. II. Anim. 13. *Mylo-Hyoides*, Santorin. Obs. an. Cap. 6. §. 19. *Le Mylo-hyoidien*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 854. & seq. & 1243.

## C A P U T XLVIII.

*De Geniohyoideo<sup>a</sup>.*

**G**eniohyoideus ab eadem maxilla, verum ab illa parte<sup>b</sup>, quae ex adverso menti est, ab asperae, quam ibi habet, eminentiae parte inferiore, recta decurrit ad scrobem, quae in superiore & eadem prior parte basis hyoïdis, juxta illius medium<sup>c</sup>. Plus una vice extremum suum praeter solitum latius habentem vidimus, ut latitudinem basis hyoïdis ad cornu usque sine suo teneret; parte illa, qua latior solito,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 5. b. & Fig. 8. M.

Fig. 8. M.-a.

<sup>b</sup> Casser. de Laryng. Tab. 1. Fig. 2. sub A. superiore. Eust. Tab. xli.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 5. b-β. & Fig. 8. M-β.

to, tenuior: quam etiam vidimus distinctam ab eo, insertamque & basi juxta cornu, & proximae superiori cornu parti. Ex graciliore fit primo paullo crassior, dein extenuatur ad finem usque, à principio ad finem usque modice latescens, à priore, & à posteriore parte, & qua contingit parem sui, planior, nec fere nisi in ipso ortu tendinosus. Os hyoïdes ad mentum trahit. Hyoïde autem depresso, satisque retento, maxillam detrahare fortasse potest.

Est *Quinti paris hyoidis ossis*, Fallop. Obs. an. in musculis hyoidis ossis. *Quinti paris ossi hyoidi, ad linguae motum destinatum*, Arant. Anat. obs. Cap. 26. pars hyoidi inserta. *Geniohyoïdeus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 16. Cowper Myot. Cap. 13. *Geniohyoïdaeus*, Dougl. Myogr. Cap. 12. *Le Genio-hyoidien*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 859. & seq. & 1244.

## C A P U T XLIX.

*De Ceratogloss<sup>a</sup>.*

**C**eratoglossus & Basioglossus breviores & latiores, quam de quo ante egimus, Styloglossus; tenues praeterea, & toti carnei. Ille orsus à parte exteriori marginis inferioris cornu hyoïdis<sup>b</sup>, saepe ab ipso ejus extremo ad eam partem fere usque, qua cum basi connexum; adscendit modice extrorsum, sensim angustior.

E c 2

a Eustach. Tab. xli. Fig. 8. I.

b Eustach. Tab. xli. Fig. 8. I-ss.

c Bid-

gustior. Extremas fibras paullatim dispergit per partem inferiorem eandemque posteriorem & lateralem linguae <sup>c</sup>, quam deorsum & introrsum trahit, & si cum pare sui agit, ex lateribus contrahit, angustatque. Forsitan & os hyoïdes, lingua magis quam illud firmata, aut sursum acta, attollit. Cumque fibris posterioribus quibusdam Styloglossò continuatus <sup>d</sup> est, ut saepe fieri diximus in illius historia, eum quoque detrahit.

Videtur esse pars *tertii*, & *quarti linguae musculorum*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 19. *Secundi paris linguae*, Fallop. Obs. an. in linguae musculis. *Secundi paris propriorum linguae*, Arant. Anat. Obs. Cap. 27. *Tertii linguae musculorum paris*, Casser. Pent. Lib. II. Sect. I. Cap. 6. & Sect. III. Cap. 5. *Pars Basio-glossi*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 17. Est *Quinti paris*, *Deprimentis*, sive *Ceratoglossi*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 6. *Ceratoglossus*, Cowp. Myot. Cap. 14. *Ceratoglossi pars*, quae *properly the Ceratoglossus*, Dougl. Myogr. Cap. 13. *Pars Ceratoglossi*, Morgagn. Adv. an. II. Anim. 13. *Le Kerato-Glosse*, pars ejus qui *le Hyo-Glosse*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 520. & seq. & 528. Ad hunc quoque, aut potius fortasse ad Basio-glossum, pertinet *le Chondro-Glosse*, Ejusd. ibid. §. 520. & seq.

C A-

<sup>c</sup> Bidloo Tab. xiv. Fig. 1. H.<sup>d</sup> Casser. Pentacth. Tab. 1. Organ.

gust. Fig. 2. P.O.

\* Eu-

## CAPUT L.

De *Basoglosso* <sup>a</sup>.

**H**ic autem insignior, & primo angustior, oritur à basis <sup>b</sup> hyoidis inferiore & eadem priore parte, juxta cornu; & ab ipsius cornu proxima priore: adscendit ut praecedens, sed sensim latior: ad linguam definit <sup>c</sup>, ut idem ille, sed à parte ejus prioris: & ad quam definit, linguae partem movet, contrahitque, fere ut ille suam; ac forsan quoque os hyoides, ut illum diximus, attollit.

Videtur esse pars *tertii*, & *quarti linguae musculorum*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 19. Haud dubie pars *secundi paris linguae*, Fallop. Obs. an. in linguae musculis: itemque *secundi paris propriorum linguae*, Arant. Anat. obs. Cap. 27: & *tertii linguae musculorum paris*, Casser. Pent. Lib. II. Sect. I. Cap. 6. Est pars *Basoglossi*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 17. Videtur & pars *quinti paris*, *Deprimentis*, sive *Ceratoglossi*, Spiegel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 6. Est *Ceratoglossi* pars *named Basio-glossus*, Dougl. Myogr. Cap. 13. Pars *Ceratoglossi*, Morgagn. Adv. an. II. Anim. 13. *Basio-glossus*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 14. *Le Basio-Glosse*, pars ejus qui *le Hyo-Glosse*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 520. & seq. & 528.

Ec 3

CA-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 8. K.<sup>b</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 8. K.-a.<sup>c</sup> Bidloo Tab. xiv. Fig. 1. D.<sup>a</sup> Eu-

## CAPUT LI.

*De Chondroglosso.*

**E**adem fere , sed minus insignis , actio Chondroglossi , musculi parvi , quem saepe invenimus , à superiore parte principii ossiculi graniformis , aliquando etiam à vicina basi hyoidis , ad linguam adscendentem , seseque Genioglosso intermiscentem , immergentemque inferiori parti radices linguae , à latere , juxta initium Lingualis.

Est *paris Chondro-glossi* , vel *Ceratio-glossi* , latine *Corniculo-lingualis* , Verheyen. Anat. Tract. IV. Cap. 19. Fortasse & *Chondroglossus* , Valsalv. de aur. Part. I. Cap. 2. §. 20. An *Chondroglossus* , Dougl. Myogr. Cap. 13. in *Ceratoglossio* ?

## CAPUT LII.

*De Genioglosso.*

**G**enioglossus major est , quam linguae caeterorum quisque. Principium ei angustum & tendinosum , oriens statim supra Geniohyoideum , ab aspera eminentia , quae in interiore parte maxillae inferioris est , propter ejus symphysem. Ab eo fit primo paullo crassior , mox sensim extenuatur. Ab eodem se paul-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. II. A. & B. & Fig. 8. L. Casser. Pentasth. Tab. II. Org. gust. Fig. 1. H. L. Cowper

Myot. ann. 1604. Fig. v. D. & D. & ann. 1714. Tab. xxviii. Fig. 1. 49.

b Cow-

tim, insigniterque pandit, retrorsum cuns ad imam partem linguae<sup>b</sup>, cuius se longitudini toti juxta medium immiscet, atque etiam ultra excurrit ab inferiore parte. Et divergunt fibrae ejus, ab uno quasi puncto tanquam radii ad longitudinem illam pertingentes. Superiores brevissimae, ad linguam retrorsum vadunt sub membrana oris, & cum ad linguam pervenere, decurrunt ad ejus apicem: sequentes quo inferiores, eo & longiores, eoque ad linguae partem ab apice remotiorem perveniunt. Ob quam causam omnes trahunt linguam in priora, sed pro vario decursu suo, quem linguae situs mutat, diversimode. Ubi linguam attigere, flectunt se in latus, supra Ceratoglossum & Basioglossum ad linguae marginem tendentes. Ab inferiore autem parte juxta basem linguae abit in fasciculum gracilem, brevem, in fine aliquando fere tendineum; quo se inserit superiori parti principii ossiculi graniformis hyoidis. Ibidemque praeterea à latere, mox supra fasciculum illum, multos fasciculos tenues in latus per membranam pharyngis sursum curvat; quorum pars maxima accedit ad anteriorem partem Ceratoglossi: pars per latus pharyngis decurrit retrorsum sursumque: pars se priori parti Constrictoris superioris pharyngis visa continuare; pars Styloglossi. Ergo & os hyoïdes ad mentum trahere potest: membranam pharyngis firmare, premere, contrahere. Semel praeterea vidi ligamentum, quo os hyoï-

<sup>b</sup> Cowper Myot. ann. 1694. Fig. v.  
D: & D. & ann. 1724. Tab. xxviii.

Fig. 1. 49.

<sup>c</sup> Heist.

hyoïdes alligatum processui styloformi, paulatim in tenuem carnem abeuns, sensim latiore, & cum Ceratoglossum subierat, curvantem se sursum, continuantemque imae, eique se sursum curvanti, parti illius portionis Genioglossi, quae incedit per latus pharyngis. Caeterum Genioglossus in duos posset distinguui, lateralem, & medium: illum huic ab externo latere applicatum, & ab eodem ejus latere cum eo se linguae longitudini fere ad apicem usque inferentem: hunc paullo majorem, & non modo ad mediam linguae longitudinem totam pertinentem, sed etiam ad hyoïdes, & per latus pharyngis excurrentem, quo dictum modo.

Ubi autem Genioglossus dexter sinisterque juxta posticam partem radices linguae se contingunt, & conjungunt; ibi vel ab iis, vel ab ipsa lingua, assurgunt fibrae <sup>c</sup>, efficientes fasciculum sensim & exiliorem & angustiore, qui per epiglottidis ligamentum medium incedens, pertinet ad illius dorsum, eamque in priora erigit, curvatque.

*Est novus linguae*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 19. *Tertius, & quartus linguae*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 13. *Primi paris linguae*, Fallop. Obs. an. in linguae musculis. *Quinti paris ossi hyoïdi, ad linguae motum destinatum*, Arant. Anat. obs. Cap. 26. pars ad linguam pertinens. *Primi paris musculorum linguae*, Casser. Pent. Lib. II. Sect. I. Cap. 6. *Genioglossus*, Rio-

c Hist. Comp. Tab. VIII, Fig. 34. k.

a Aq



Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 17. ubi vitioſe impreſſum *Baſiogloſſus* : vide Anthr. ann. 1618. & 1626. *Secundi paris*, *Extrahentis linguam*, *Geneogloſſi*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 6. *Geniogloſſus*, Cowp. Myot. ann. 1694. Cap. 14. Dougl. Myogr. Cap. 13. Cowp. Myot. ann. 1724. Cap. 14. *Le Genio-Gloſſe*, Winſl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 522. & ſeq.

Faſciculus ad epiglottidem pertinens : hic vide Veſal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 21. *duos muſculos laryngis operculi* : Columb. de re an. Lib. V. Cap. 14. *Veſtalius binos alios muſculos communes deſcribit*, &c. Eſt *unus muſculus in epiglottide humana*, Fabric. de laryng. Part. I. & III. Cap. 3. Vide Caſſer. de voc. aud. org. Traſt. I. Lib. I. & II. Cap. 6 : Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 18. Morgagni *geminum epiglottidis levatorem*, Adv. an. I. §. 28. *Hyo-epiglotticos*, Pauli Praef. in van Horne opuſc. §. 63. *Ab utroque latere epiglottidis membranacei ligamenti plures fibrae*, &c. Verheyen. Anat. Traſt. III. Cap. 11. Eſt *Retraſtor epiglottidis*, Santorin. Obſ. an. Cap. 6. §. 16. *Epiglottidis attollens*, Heiſt. Comp. an. §. 324. in nota l. *Gloſſo-epiglottidens*, ibid. Explic. Tab. VIII. Fig. 38. k. Vide *les Hyo-Epiglottiques*, Winſl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 458.

# C A P U T LIII.

## De Linguali<sup>a</sup>.

**I**nferiori parti linguae, inter ejus medium latusque, Lingualis totus inhaeret, ex ipſius linguae radice

Ff

ſen-

<sup>a</sup> An Euiſtach. Tab. xli. Fig. jr. C?

<sup>a</sup> Eu-

Insensim exorians, decurrensque inde ad apicem usque, in quo sensim evanidus. Modicae latitudinis est, ac tenuis. Inque decursu suo commiscet se cum Basioglossio, qua is se linguae immiscet; dein cum Styloglossio, ad apicem usque: atque etiam per linguam incedenti inhaeret Genioglossio, fibras ejus decussans. A principio fasciculos quosdam accipit à Genioglossio: inter cujus partem eam, quae se in latus curvans, accedit ad Ceratoglossum; illamque, quae se linguae ibidem inserit, oritur. Linguam facit brevior, contrahit, curvatque in inferiora, apicem ejus trahens in fundum oris.

Est *Lingualis*, Dougl. Myogr. Cap. 13. An les fibres longitudinales, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 513?

## C A P U T LIV.

*De pharyngis Constrictore inferiore* <sup>a</sup>.

**L**ati autem & tenues sunt pharyngis Constrictores à nobis vocati, quorum operimento pharynx extrinsecus vestita. Quos neque unum putamus esse dicendos, à multis, iisque diversis, partibus orientem; neque in tot scindendos, à quot partibus oriuntur. Non unum dicendos, quia satis primum distincti sunt in dextros & sinistros; evidenter autem  
ab

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 8. R. & Tab. xlii. Fig. 4. K. Cowp. Myot.

ann. 1724. Tab. xxviii. Fig. 3. PQ

<sup>b</sup> Eu-

ab utroque latere in tres , actione etiam aliquantum discrepantes. Non scindendos in tam multos , quia revera sunt tantummodo ab utraque parte tres , sed à pluribus una partibus procedentes , ut multi alii , etiam majores , quos tamen non partimur : nihilque attinet , hic tam minute partiri , & in re non facili , etiam augere difficultatem iis , qui cognoscere cupiunt. Qui è sex illis ab utraque parte inferior est , se à cartilagine cricoïdea , & à thyreoïdea <sup>b</sup> retrorsum flectit , ambitque pharyngis inferiora , usque ad mediam posticam partem ejus , ubi cum pare sui coit <sup>c</sup>. Ut ipse latus , ita & principium ejus , sed in aliquot portiones divisum : & primum angustiore <sup>d</sup> oritur ab inferiore parte lateris externi cricoïdeae , juxta partem ejus posteriorem , mox infra processum inferiorem thyreoïdeae , qui cricoïdeam continet : deinde <sup>e</sup> angusto , ab exteriori parte imi processus modo dicti thyreoïdeae : post ampliore , ab ejusdem cartilaginis eminentia oblonga , cui Sternothyreoïdeus , & Hyothyreoïdeus , inserti : tum angusto , à tuberculo , quod in eadem cartilagine est ad radicem processus ejus superioris ; aliquando & ab exteriori parte marginis ejus , qui supra tuberculum illud : partem insuper medio loco inter duas postremas portiones accipit à Sternothyreoïdeo ; nonnunquam & à

F f 2

Cri-

b Eustach. Tab. xli. Fig. 8. R-aa.

c Valsalv. de aure Tab. vi. GG

GGg-3.

d Valsalv. de aure Tab. vi. H.

e A thyreoïdea , Valsalv. de aure

Tab. vi. GGg. Eustach. Tab. xli.

Fig. 8. R-aa.

f Val-

Cricothyreoideo, inter priores duas. Ejus fibrae inferiores valde tenues; sequentes insigniores. Inferiores, magis transversae; sequentium quaeque magis & magis adscendunt; qua de caussa, quo quaeque superiores, ita & longiores, itaque ad angulum acutiorum ex utroque latere conveniunt: at inferiores pleraeque earum, quae à cricoidea procedunt, potius incurvo ductu dextrae sinistris continuantur. Sic conjuncti inter se dexter, sinisterque, dum se circum pharyngem curvant, sursum versus simul in longum mucronem porrigunt, acutoque ejus extremo desinunt aliquanto supra mediam pharyngis longitudinem. Idem, qua adjacent Constrictoribus sequentibus, in fine fibras, suas cum iis commiscunt. Pharyngem constringunt: fortasse & laryngem attollunt, parte sua superiore.

Pars ejus, quae oritur à thyreoidea, est *Communium laryngis musculorum quintus, & sextus*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 21. *Oesophagum completentis*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 14. pars unius lateris. *Tertii paris muscularum*, qui faucibus dilatandis, aut constringendis inferuntur, Fallop. Obs. an. pars inserta in primam cartilagine[m] laryngis.

Ipse totus est *Communium laryngis musculorum tertii paris*, Fabric. de laryng. Part. I. & III. Cap. 8.

Pars,

Valsalv. de aure Tab. vi. HH.  
Cowper. Myot. ann. 1724. Tab.  
xxviii. Fig. 3. 57. infer.

Cowper. Myot. ann. 1724. Tab.  
xxviii. Fig. 3. PQ.

a Euf.

Pars, quae à thyreoïdea, *Oesophagum ambientis*, Cas-  
 ser. de voc. aud. org. Tract. I. Lib. I. Cap. 4. & Lib.  
 III. Cap. 9. pars unius lateris. Eadem *quarti faucium*,  
 Laurent. Hist. an. Lib. V. Cap. 19. *Quem Oesophagum*  
*vocant*, ibid. Quaest. 5. Eadem *Oesophagei*, Riolan.  
 Anthr. Lib. V. Cap. 19. *Primi paris constringentium fau-*  
*ces*, *Oesophagiaei*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap.  
 6. & *Secundi paris*, *Cephalopharyngaei*, ibid. pars in  
*thyroidem cartilagem inserta*.

Ipse totus, *Sphincteris*, seu *Oesophagei*, de Marchett.  
 Anat. Cap. 11. pars unius lateris.

Pars, quae à thyreoïdea, *Oesophagaei seu Sphincteris*  
*gulae*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 16. pars unius  
 lateris. *Paris Thyropharyngaei*, Valsalv. de aur. Part. I.  
 Cap. 2. §. 20. *Pharyngaei*, Dougl. Myogr. Cap. 15.  
 pars, quae *Thyreo-pharyngaeus Vals.* *Thyropharyngaeus*,  
 Morgagn. Adv. an. H. Anim. 18. Pars *Oesophagei*, seu  
*Sphincteris gulae*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 16.  
*Thyro-pharyngaeus*, Santorini Obs. an. Cap. 7. §. 8. &  
 10. *Le Thyro-Pharyngien*, Winsl. Exp. an. Trait. de  
 la tête, §. 482.

Pars, quae à cricoïdea, est *Cricopharyngaeus*, Val-  
 salv. de aur. Part. I. Cap. 2. §. 20. *Pharyngaei*, Dougl.  
 Myogr. Cap. 15. pars, quae *Crico-pharyngaeus Vals.*  
 Pars *Oesophagaei*, seu *Sphincteris gulae*, Cowper Myot.  
 ann. 1724. Cap. 16. *Crico-Pharyngaeus*, Santorini Obs.  
 an. Cap. 7. §. 10. *Le Crico-Pharyngien*, Winsl. Exp.  
 an. Trait. de la tête, §. 483.

## CAPUT LV.

*De pharyngis Constrictore medio \*.*

**H**aud aliter medius & complectitur pharyngem mediam, & ab ejus postica parte cum eodem alterius lateris convenit <sup>b</sup>, oriens ab hyoïde. Angustior est ubi oritur; post se admodum dilatat. Itaque fibrae ejus tanquam ex puncto radiatim divergunt, brevissimis inferioribus, & quasi transversis; reliquis, ut situ superioribus, etiam longioribus, & magis adscendentibus: unde & qua dextrae sinistris occurrunt, angulos faciunt, eo minores, quo quaeque superiores. Supra quoque ambo hi muscoli in longum, ut inferiores, mucronem desinunt, qui per pharyngis posteriora adscendens, & ad extremum tendineus, tenuis, affigit se ossi occipitis, ante foramen magnum, à parte inferiore. Quare attollunt os hyoïdes, atque adeo & laryngem: pharyngem constringunt, attollunt, faciunt breviorē. In aliis autem uno hic musculus capite incipit à superiore parte fere totius cornu hyoïdis <sup>c</sup>, & aliquando praeterea à proxima additamenti graniformis; in aliis à solo additamento: in aliis, capitibus duobus, mox confluentibus; altero <sup>d</sup>, eoque latiore, à superiore & eadem exteriorē parte extremi cornu; altero <sup>e</sup>, ab additamento.

Hu-

a Eustach. Tab. xli. Fig. II. L. & Tab. xlii. Fig. 4. I. dext. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxviii. Fig. 3. O.

b Eustach. Tab. xlii. Fig. 4. II. a

Valfalv. de aur. Tab. vi. FFFF-3.

c Eustach. Tab. xli. Fig. II. L. aa;

d Valsalv. de aure Tab. vi. F. infer.

e Valsalv. de aure Tab. vi. F. super.

Hujus pars, quae à cornu hyoïdis oritur, est *Tertii paris musculorum*, qui faucibus dilatandis, aut constri-  
gendis inserviunt, Fallop. Obs. an. pars inserta in *hyoi-*  
*dis latera*. Pars *tertii faucium*, Laurent. Hist. an. Lib.  
V. Cap. 19. Pars *Cephalopharyngei*, Riolan. Anthr. Lib.  
V. Cap. 19. *Secundi paris faucium*, *Cephalopharyngei*,  
pars in *hyoidis latera inserta*, Spigel. de H. C. F. Lib.  
IV. Cap. 6. *Pterygopharyngei*, Cowper Myot. ann.  
1694. Cap. 16. pars, quae oritur *from the extremities*  
*of the os hyoides*.

Ipse totus est *paris Hyopharyngaei*, Valsalv. de aur.  
Part. I. Cap. 2. §. 20.

Pars, quae à cornu, *Pharyngaei*, Dougl. Myogr.  
Cap. 15. pars, quae *Hyo-cerato-pharyngaeus*.

Pars, quae ab ossiculo graniformi, *Pharyngaei*,  
Dougl. Myogr. Cap. 15. pars, quae *Cbondro-pharyn-*  
*gaeus*.

Ipse totus, *Pterygopharyngei*, Drake Anthr. Book I.  
Chap. 9. pars, quae *from the os hyoides*. *Hyopharyn-*  
*gaeus*, Morgagn. Adv. an. II. Anim. 18. Pars *Oeso-*  
*phagaei*, seu *Sphincteris gulae*, Cowper Myot. ann. 1724.  
Cap. 16. *Hyo-Pharyngaeus*, Santorin. Obs. an. Cap. 7.  
§. 8. & 10. *Le Hyo-Pharyngien*, Winslow Exp. an.  
Traité de la tête, §. 479.

Pars inserta ossi occipitis, est *Pharyngaei*, Dougl.  
Myogr. Cap. 15. pars, quae *Cephalo-pharyngaeus*. *Pha-*  
*ryngis musculi Solitarii seu Azygi*, Santorin. Obs. an.  
Cap. 7. §. 2. *Le Cephalo-Pharyngien*, Winsl. Exp. an.  
Traité de la tête, §. 475.

*De Constrictore pharyngis superiore<sup>a</sup>.*

**P**haryngem hic pariter, sed partem ejus superiorem, amplectitur; pariterque ex latere advenit, & in fine sui se pari immiscet, continuatque<sup>b</sup>. Partes unde procedit, sunt hae: primum Genioglossi pars, quam se per latus pharyngis curvare diximus: supra hanc, latus radice linguae, ubi primum Styloglossus attingit Ceratoglossum; unde pertenuis portio: dein interna maxillae inferioris, juxta superiora fossulae molaris postremi: tum media principii Buccinatoris, cui continuatus est: post interna totius longitudinis hamuli<sup>c</sup> processus pterygoidei, & hujus ipsius lamellae internae, ad hamuli radicem: plerumque & pars superior marginis postici tendinis Circumflexi palati<sup>c</sup>, ubi ille ultra hamulum dictum processit. Ad superiorem partem ejus extrinsecus accedentem frequenter inveni portionem ab imo petroso, ex latere retrorsum se curvantem, gracilem, latescentem, & ubi dilatata, tenuissimam: aliquando & parvum fasciculum à processu styliformi, decurrentem ab interno latere Stylopharyngei: alias similem fasciculum ad partem ejus inferiorem, abscedentem autem à superiore & eadem interna Stylopharyngei, ubi is se primum applicat pharyngi. In decursu suum superiorem marginem

<sup>a</sup> Eustach. Tab. XLII. Fig. 4. H. in utr. lat. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XXVIII. Fig. 3. MN.  
<sup>b</sup> Eustach. Tab. XLII. Fig. 4. HH-23.

Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XXVIII. Fig. 3. MN. MN.  
<sup>c</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XXVIII. Fig. 2. L.

<sup>a</sup> Eur:



nem incurvum habet, sursum patulum; coque se sub Levatore palati mollis, & sub tuba Eustachiana per latus retrorsum flectit in superiora: eandemque viam sequentes fibrae tenent, nisi quod quo inferiores, eo ad extremum magis è transverso decurrant ad finem. Sed imas, quae priores earum, quae à maxilla inferiore, inveni deflectentes à praecedentibus, ac se deorsum in priora curvantes, fibrisque Genioglossi continuantes. Caeterum extremum hujus musculi se Constrictori medio, praeter deflectentes illas fibras, innectit. Pharyngis partem, quam ambit, premit, constringit, trahit in priora, sursumque. Ad haec illa pars ejus, quae oritur à tendine Circumflexi palati, deorsum molle trahit palatum.

Pars ejus, quae oritur à maxilla inferiore, an est *Septimus*, & *Octavus linguae musculorum*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 19? *Nonus*, ac *decimus linguae musculi*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 13? *Primi paris propriorum linguae*, Arant. Anat. obs. Cap. 27? *Myloglossus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 16. ann. 1618. & 1626? quem praeteriit ann. 1649. *Quarti paris linguae*, *Attollentis*, *Myloglossi*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 6? *Paris Myloglossi*, Vessling. Synt. an. Cap. 11? de Marchett. Anat. Cap. 11? *Paris Mola-lingualis*, Verheyen. Anat. Lib. I. Tract. IV. Cap. 19? *Est Pharyngaei*, Dougl. Myogr. Cap. 15. pars, quae *Mylo-pharyngaeus*. An *Myloglossus*, Morgagn. Adv. an. II. Anim. 13? *Est Oesophagaei*, seu *Sphincteris gulae*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 16. pars, quae oritur ab inferiore maxilla,

G g

maxilla, Explanat. Tab. 28. Fig. 3. MM. *Paris Mylopharyngaei*, Santorin. Obs. an. Cap. 7. §. 5. & 10. Haud dubie *le Mylo-Glosse*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 517. & 528. vide & §. 480.

Pars, quae à lingua, *Tertii paris musculorum*, qui *faucibus dilatandis, aut constringendis inserviunt*, Fallop. Obs. an. pars, quae *inscritur in radicem linguae*. *Pterygopharyngei*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 16. pars, quae *oritur from the root of the tongue*. *Paris Glossopharyngaei*, Valsalv. de aur. Part. I. Cap. 2. §. 20. aut pars ejus. *Pharyngaei*, Dougl. Myogr. Cap. 15. pars, quae *Glossopharyngaeus*. *Pterygopharyngei*, Drake Anthr. Book I. Chap. 9. pars, quae *from the side of the tongue*. *Oesophagaei*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 16. pars, quae *oritur à radice linguae*, Explan. Tab. 28. Fig. 3. NN. *Paris Glossopharyngaei*, Santorin. Obs. an. Cap. 7. §. 6. & 10. *Le Glosso-Pharyngien*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 478.

Pars, quae à processu pterygoideo, fortasse est *Sphenopharyngaeus*, Velling. Synt. an. Cap. 3: & *paris Sphenopharyngaei*, sive *Pterygopharyngaei*, de Marchett. Anat. Cap. 11. Est *Pterygopharyngei*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 16. pars, quae *oritur from the pterygoid process of the os cuneiforme*. *Pharyngaei*, Dougl. Myogr. Cap. 15. pars, quae *Pterygo-pharyngaeus*. *Pterygopharyngei*, Drake Anthr. Book I. Chap. 9. pars, quae *from the processus pterygoideus*. Est *paris Pterygopharyngaei*, Morgagn. Adv. an. II. Anim. 18. *Oesophagaei*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 16. pars, quae *oritur à processu pterygoideo*, Explan. Tab. 28. Fig.

3. LLL. Est *paris Pterygo-Pharyngaei*, Santorin. Obs. an. Cap. 7. §. 3. *Le Pterygo-Pharyngien*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 476.

Pars, quae à tendine Circumflexi, *Oesophagaei*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 16. pars, quae à tendine Pterygostaphylini, Explan. Tab. 28. Fig. 3. LLL.

Pars, quae à Genioglossa, haud dubie *Lacertus alter ab lingua ad pharyngem*, Santorin. Obs. an. Cap. 7. §. 7. Est *Le Genio-Pharyngien*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 480.

Portio à petroso, an *Pharyngaei*, Dougl. Myogr. Cap. 15. pars, quae *Salpingo-pharyngaeus*? *Le Petro-Pharyngien*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 476?

## CAPUT LVII

*De Salpingopharyngea<sup>a</sup>.*

**S**alpingopharyngeus, exilissimus pharyngis musculorum, ab inferiore eademque priore cartilagineae, quae tubae Eustachianae inest, naturae prope extremæ incipiens parte, postquam inde per posteriora pharyngis, per spatium satis notabile, descendit, adjungit se ad Palatopharyngeum, & cum eo commistus pergit<sup>b</sup>, desinitque; tenuis primo, angustus, tendineus; paullo deinde crassior; qua accedit ad Palatopharyngeum, latescens; qua pergit cum eo, magis magisque, tenuior simul. Pharyngem attollit, nonnihil in priora; & facit eum eodem tempore bre-

Gg 2 viorem.

<sup>a</sup> Eustach. Tab. XLII. Fig. 6. L.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. XLII. Fig. 6. LMP.  
<sup>a</sup> Eu-

viorem. Quin & tubam nonnihil detrahit. Erunt fortasse, quibus videbitur Palatopharyngeo fuisse adjungendus: nos autem separavimus ab eo, quod ipse diu separatus est; & ne ejus accessione Palatopharyngeus intelligeretur difficilior.

Sunt carnaeae fibrae, quae oriuntur *from the root of the cartilage excavated for the meatus à palato ad aurem*, &c. Drake Anthr. Book I. Chap. 9. Est *Salpingo-pharyngeus*, Santorin. Obs. an. Cap. 7. §. 4. An le *Spheno-Salpingo-Pharyngien*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 476?

## C A P U T LVIII.

*De Palatopharyngeo*<sup>a</sup>.

**D**ubii aliquandiu, in palatone, an in pharynge hujus initium poneremus, maluimus in palato, quoniam in pharynge prorsus in unum conjunctus est cum Stylopharyngeo; ibi sine controversia desinente; non multum repugnaturi, si quis malit in pharynge, quia palato potius, quam pharyngi tributus. Ergo in medio latitudinis palati mollis, à palati ossi postico margine usque ad radicem uvulae, lato principio incipit: sic autem, ut dexter ibi sinistro continuatus sit, & à priori etiam parte juxta posticum marginem palati ossi, medio loco inter aponeuroses Circumflexorum,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. XLII. Fig. 6. NM.  
Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

XXIX. Fig. 1. N. & Fig. 2. N.

b Val-

orum , ex membrana tendinosa , quae è naribus veniens procedit per superiora palati mollis , enasci ex parte soleat : & accipere fasciculum , qui è postico margine aponeurosis Circumflexi exeat. Principium hoc tenue est , tenuius autem juxta radicem uvulae. Inde dexter sinisterque à se invicem in latera digrediuntur <sup>b</sup> , angulos suis fibris in posteriora patulos facientes , maxime prioribus , sequentibus minus minusque. In latus igitur per palatum molle decurrit , qua per id decurrit , paulatim angustior ; posterioribus quidem fibris paene transversis , caeteris ut prioribus , magis retrorsum euntibus. Cum ad palati finem venit , se porro in latus modiceque retrorsum curvat , sensimque rursus latior , descendit per lateralem pharyngis partem <sup>c</sup> , oblique posteriorem petens ; & ubi fere ad posteriorem venit , se non multo post commiscet <sup>d</sup> cum Stylopharyngeo & Salpingopharyngeo , ut supra diximus. Communeque horum trium extremum <sup>e</sup> per posteriora pharyngis eundo latefcit , extenuat se , & ad postremum partim inserit cartilagini thyreoideae <sup>f</sup> , tum lateri ejus externo ad radicem processus superioris , tum porro toti margini postico , infra eundem processum : partim evanescit <sup>g</sup> in inferiorem partem membranae pharyngis ,

G g 3                      cujus

b Valsalv. de aure Tab. vi. 2. 2. & Tab. v. Fig. 2. GHH. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxix. Fig. 1. NN.

c Eustach. Tab. xlii. Fig. 6. M.

d Eustach. Tab. xlii. Fig. 6. MO

L.P.

e Eustach. Tab. xlii. Fig. 6. P.

f Eustach. Tab. xlii. Fig. 11. P-a. & Tab. xlii. Fig. 6. P-b.

g Eustach. Tab. xlii. Fig. 6. P-aaa.

h Eu.

cujus latitudinem , inter margines posticos thyreoïdeae interjectam , cum pare sui tenet <sup>h</sup> ; cum quo etiam , & cum Constrictore tum medio tum inferiore ; fibras commiscet. Ubi à palato per pharyngem descendit , decurrit per arcum illum , qui in faucibus se à radice uvulae pone tonsillam demittit. Hic ignoscant , qui aliter sentiunt , quod hunc , qui simplex nobis apparuit , in plures , eo , quod fere triplicem ortum habeat , non diviserimus. Cum utrique Palatopharyngei simul agunt , ut agere semper apparent , palatum molle detrahunt , praesertim latera ejus , maxime juxta uvulam : simul curvant illud , redduntque concavum in inferiora & priora , & ex lateribus contrahunt : suntque contrarii Circumflexorum margini posteriori. Pharyngem vero eodem tempore sursum trahunt , redduntque breviorē , & laxiorem. Hi inprimis , cum deglutimus , ex faucibus depellunt cibum , & potionem ; clauduntque viam , quae in nasum patet ; adjuti à Constrictoribus superioribus pharyngis , & à lingua. Etenim palatum molle contrahunt , aguntque deorsum simul & contra linguam ; eoque deprimunt deglutiendum , cum id sub palato molli haeret ; impediuntque , ne pressione ejus palatum cedat in superiora , sinatque illabi aliquid in nasum. Cumque eodem tempore Constrictores superiores contrahunt fauces circa palatum , eo & apprimunt eas , aptantque ad postica palati mollis , ne quid intermedio loco pellatur in nasum ; & à posteriore

<sup>h</sup> Eustach. Tab. XLII. Fig. 6. P.Q.

riore parte premunt deglutiendum contra linguam. Vicissim autem hoc eodem tempore, quo & Palatopharyngei, & Constrictores superiores, quo dictum modo agunt, lingua, ea parte, quae in faucibus est, tum surgit contra palatum molle, tum posteriorem partem faucium urget. Et non modo exquisitè aptant se inter se mutuo lingua, palatum molle, & postica faucium, ut spatium nullum remaneat intermedium: sed ita etiam se inter se comprimunt, ut, si quid contineant deglutiendum, premant illud, comprimantque undique, praeterquam à parte inferiore; & simul depellant in pharyngem, quam Palatopharyngei eadem contractione sua & attollunt, ut occurrat deglutendo; & laxant, ut facile accipere id possit; adjuti in eo à Stylopharyngeis & Salpingopharyngeis. Quin & iidem Palatopharyngei laryngem hoc eodem tempore attollunt. Dabitur fortasse venia, si praeter institutum hujus libri sequentia deglutitionis hic summatim adscribamus, quoniam illustrari eo poterunt utilitates musculorum. Ex faucibus dum depellitur, quo diximus modo, deglutiendum, & clauditur aditus ad laryngem, ne quid illabatur; & expeditur via, quae est per pharyngem in stomachum: ad hunc autem modum. Lingua hoc tempore, dum postica faucium urget, retrorsum inclinat epiglottidem. Mox celeritate magna larynx attollitur contra linguam, eique valide apprimitur: quo fit, ut non modo glottis supponatur inclinatae epiglottidi; sed etiam ut ipsa epiglottis, à lingua summoque laryngis intercepta, pressaque, integat laryngis summum, totamque operiat glotti-

glottidem. Hoc itaque tempore statim infra radicem linguae postica pars laryngis sequitur, submota plane epiglottide, ut depulsionem non impediat, tutissimeque condita glottide. Tunc Constrictores pharyngis protinus contrahunt eam circa laryngem, ac deglutendum ad postica laryngis apprimunt, facileque, & ex toto, ob lubricitatem viae, depellunt in stomachum: quo facto relaxant se omnia, & restituunt. Atque haec apparent consideranti fabricam partium, eaque quae fiunt, cum deglutimus. Ut vero Palatopharyngei depellunt ex faucibus, ita etiam condunt simul glottidem, attollendo laryngem. Non attollunt autem soli, sed una cum Stylopharyngeis & Hyothyreoideis. Nunc redeamus ex hac digressionem in viam, dicamusque de Constrictore isthmi faucium, à quo cum pare sui agente, depulsio ex faucibus juvatur.

Aut hic, aut Constrictor isthmi faucium, sunt *les fibres demi-circulaires*, &c. Dionis, Anat. VIII. *Demonst. on voit à côté deux arcades qui font l'entrée des fentes nasales; elles sont faites de fibres demi-circulaires*, &c. Est *paris Pharyngostaphylini*, Valsalv. de aur. Part. I. Cap. 2. §. 19. & *Staphylinopharyngaei*, ibid. §. 20. *Musculus columellae, in thyroidis lateralem oram infixus*, Morgagn. Adv. an. I. §. 8. Est *Thyreo-staphylinus*, Dougl. Myogr. Cap. 16. Sunt fibrae carnae, quae oriuntur *from the side of the uvula*, Drake Anthropol. Book I. Chap. 9. Est *Oesophagaei*, Cowp. Myot. ann. 1724. Cap. 16. *pars springing from the uvula*, Explan. Tab. 28. Fig.



Fig. 2. NN. *Thyro-Palatinus cum Hypero*, seu *Palatopharyngaeo*, Santorin. Obs. an. Cap. 7. §. 12. & 13. *Le Pharyngo-Staphylin*, una cum eo, qui *le Thyro-Staphylin*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 496. & 497. *Le Thyro-Pharyngo-Staphylin*, ibid. §. 497. quo etiam pertinet *le Peristaphyli-Pharyngien*, ibid. §. 478.

## CAPUT LIX.

*De Constrictore isthmi faucium.*

Nempe Constrictor isthmi faucium exilis, & latitudinis modicae, tenuisque, fibrarum carnearum contextus est, musculo non absimilis, à superiore parte marginis linguae circa radicem ejus, palatum molle forma conscendens arcus; per id deinde latescens, donec se pari sui ex altero latere venienti continuet<sup>a</sup>. In palato connexus est cum principio Palatopharyngei. Inter linguam palatumque decurrit ante tonsillam, per arcum illum, qui in faucibus à latere linguae pertinet ad palatum molle. Palatum ad linguam trahit, contrahit, concavum facit à parte linguae; hanc contra palatum agit: sic contrahit isthmum faucium, ex quo nomen invenit. Haec autem maxime fiunt, simul agente utroque.

Aut hic, aut Palatopharyngeus, sunt *les fibres demi-circulaires*, Dionis Anat. VIII. *Demonstr. on voit à côté deux arcades qui font l'entrée des fentes nazales; elles*  
Hh *sont*

<sup>a</sup> Cowper Myot. ann. 1714. Tab. xxix. Fig. 1. §3. §3. supra H. con-

tinuati.

<sup>a</sup> Eu;

*sont faites de fibres demi-circulaires* ; &c. Est *paris Glossostaphylini* , Valsalv. de aur. Part. I. Cap. 2. §. 19. *Glossostaphylinus* , Dougl. Myogr. Cap. 16. *Glossostaphylinus* , Cowp. Myot. ann. 1724. Cap. 15. *Paris Glossostaphylini* , seu *Glossopalatini* , Santorin. Obs. an. Cap. 7. §. 14. *Le Glossostaphylin* , Winfl. Exp. an. Trait. de la tête ; §. 495.

## C A P U T LX.

*De Levatore palati molli<sup>a</sup>.*

**C**ontrario atque Palatopharyngei & Constrictores modo dicti , majorem partem modo palatum molle<sup>a</sup> trahunt , quibus ab officio Levatorum nomen dedimus : attollunt enim retrorsum. Vera huic Levatori origo ab extremo osse petroso<sup>b</sup> , qua id tuba Eustachiana perforatum est ; & ab inferiore quidem parte canalis illius extremi , statim sub principio partis tubae ejusdem illius , quae tota mollis. In principio autem tenuis , angustus , tendinosus ; fit deinde carneus , crassior , latior , quasi teres , sed per latera planior ; post rursus tenuior , latescere pergit , ut procedit , latior , tenuiorque , sed lente. Et ad palatum molle descendit in priora introrsum ; ubi hoc attingit , inprimis latescens. Per hoc deinde decurrit , intexens se ei , fibris ad mediam ejus latitudinem , sed simul oblique in priora , incedentibus : nam & in priora maxime latescit : atque ita latescit , ut per-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. XLII. Fig. 6. F. dext. & F. F. sinist. Valsalv. de aur. Tab. IV. n. dext. Cowper Myot. ann.

1724. Tab. XXVIII. Fig. 4. r. 4. <sup>b</sup> Valsalv. de aur. Tab. IV. ad K. inferiorum.

<sup>c</sup> Eu-

pertineat ad totam illam longitudinem palati molliſ, quae eſt à poſtico margine oſſei, uſque ad radicem uvulae. In medio denique palato dextri ſiniſtrique ſibrae inter ſe coeunt<sup>c</sup>, invicemque ſe continuant, ſic ut angulos in ipſo coïtu efficiant, in poſteriora patulos; quorum qui priores, minores. Et in eodem palato commiſcent ſe cum Palatopharyngeis. Ad quorum etiam ſimilitudinem ſe à priori parte ſine tendineo tenui innectunt membranae tendinoſae, quae incedit per ſuperiora palati molliſ, veniens è naribus; cum eaque ad medium poſticum marginem oſſei pertinere videntur. Hi ſunt, qui, dum palatum molle retrorſum attollunt, viam, quae caeteroquin ex ore, & ex faucibus, in naſum eſt, claudunt eo tempore, quo ore, naſoque patulis, ſolo tamen ore ſpiritum ducimus. Duobus enim modis viâ è faucibus in naſum clauditur. Primo, cum patulo licet naſo, ſpiritum ſolo ore ducimus; quo tempore palatum molle attollitur, & oppanditur viae in nares; quod eſt Levatorum palati: quanquam ſere eodem tempore agentes Conſtrictores ſuperiores pharyngis, anguſtent quoque poſtica faucium circa palatum molle. Altero, cum deglutimus; quo tempore & palatum molle ex lateribus contractum agitur deorſum, & fauces circa palatum ex tranſverſo contractae, ad id ipſum aptantur, ap-primunturque: quorum illud eſt Palatopharyngeorum, hoc pharyngis Conſtrictorum ſuperiorum. Priorem modum facile animadvertimus, ſi fauces in ſpeculo

Hh 2

con-

<sup>c</sup> Eulaſch. Tab. xlii. Fig. 3. FFF-aa.

a Eu-

contemplantes , depressa leniter lingua , ore solo nitimur spirare : posteriorem , cum demisso in fauces digito , deglutire conamur ; quo is & à palato molli, & à faucibus , in unum contractis , comprimitur , urgeturque deorsum. Illum vero efficere Levatores , concurrentibus fere Constrictoribus ; hunc Palatopharyngeos una cum iisdem Constrictoribus , constructionis eorum ratio , comparata cum iis , quae fiunt , declarat. Revertamur autem ad Levatores. Non attollunt modo palatum , sed mutant etiam figuram ejus. Ore solo , naso interim patulo , spirantes , attollimus palatum molle totum , certo autem modo , quem depingere verbis conabor. Pars ejus prior attollitur sic , ut sua amplitudine sensim magis magisque surgat oblique retrorsum , oppandaturque viae , quae in nasum est : maxime autem attollitur media per longitudinem ; ex quo concava fit ab inferiore parte , lateribus planioribus. Posterior autem pendula manet , dependens à priore , suaeque amplitudine à priore parte os spectans , à posteriore postica faucium : mediaque in angulum formatur , divergentibus inde lateribus rectoribus , & in utrumque se demittentibus latus. Quin & è faucibus per latera ad palatum adscendentes arcus , fiunt pene recti , & ex lateribus usque ad radicem uvulae convergunt in angulum , distractique per longitudinem , tenduntur. Recti quoque fiunt , qui à lingua adscendunt arcus , tendunturque. Atque haec omnia fiunt , agentibus Levatoribus : fiunt autem ob diversam connexionem , mobilitatemque , & mollitudinem partium ipsius palati molli.

Est

Est haud dubie *secundi paris musculorum*, qui *saucibus dilatandis*, aut *constringendis inserviunt*, Fallop. Obs. an. quem ex Falloppio *Sphenopharyngei* nomine descripsit Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 19. Est *Pterygstaphylinus internus*, Riola. ibid. Cap. 20. *Secundi paris dilatantis fauces*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 6. *Paris interni gargareonis*, Velling. Synt. an. Cap. 11. *Paris Pterygstaphilini interni*, de Marchett. Anat. Cap. 11. *Sphaenopalatinus*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 17. *Paris Salpingostaphylini*, Valsalv. de aur. Part. I. Cap. 2. §. 19. *Columellae musculus*, in *triangularem expansionem deorsum productus*, Morgagn. Adv. an. I. §. 8. *Salpingostaphylinus*, Vals. *Ptery-staphylinus externus vulgo*, Dougl. Myogr. Cap. 16. *Sphaenostaphylinus*, Drake Anthr. Book III. Chap. 14. *Sphenopalatinus*, Morgagn. Adv. an. II. Anim. 14. *Sphenostaphylinus*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 15. *Salpingo-staphylinus*, seu *Salpingo-palatinus*, Santorin. Obs. an. Cap. 7. §. 15. *Paris Sphaeno-staphylini*, rectius *Salpingo-staphylini*, Heist. Comp. an. §. 326. *Le Petro-Salpingo-Staphylin ou Salpingo-Staphylin interne*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 501.

## CAPUT LXI.

*De Circumflexo palati.*

Circumflexi faciliore, ut videtur, nomine appellatum, quoties ex sententia eruere, omnique  
H h 3 ex

a Eustach. Tab. XLI. Fig. 11. e. & Tab. XLII. Fig. 6. DE. Valsalv. de aure Tab. IV. m. Cowp. Myot.

ann. 1724. Tab. XXVIII. Fig. 4. 55.

ex parte contemplari potuimus, duo capita habere invenimus. Eorum alterum praecipuum esse, portione musculi peramplum; procedere primo ab extremo osse petroso, juxta externum latus Levatoris praecedentis; continuoque à radice interna eminentiae acutae ossis multiformis, quae est pone foramen tertii rami quinti paris nervorum; ab interiore parte eminentiae illius oblongae, quae ex eodem osse inter foramen modo dictum, & os petrosam eminet; è sinu oblongo, impresso radici parietis interni processus aliformis, ab exteriori parte: ejusque capitis initium tenue & tendineum esse qua procedit à petroso, & ab acuta eminentia multiformis: carneum, qua ab eminentia oblonga, & è sinu; & tenue quidem, qua ab eminentia; crassius, qua ex sinu. Alterum, initio angustiore, tendineo, tenui, adhaerere superiori parti lateris externi cartilagineae naturae, quae adscribitur tubae Eustachianae, non ita longe à parte ejus ossea<sup>b</sup>. Haec capita inter se conjuncta lamellarum instar, & jam cito confluere in musculum tenuem & latum, sensim angustiorem, sensimque primo crassiolem, post tenuiorem, seseque in priora secundum exteriorem partem parietis interni processus pterygoidei demittentem, & ubi ad finem ejus pervenit, in tendinem<sup>c</sup> latum abeuntem. Hunc se circum hamulum processus pterygoidei inflecte-

b Valsalv. de aur. Tab. iv. m. sinist.

& Tab. x. Fig. 1. ff.

c Eustach. Tab. xli. Fig. 13. 6-β.

& Tab. xlii. Fig. 6. E. Valsalv.

de aure Tab. iv. m. & Tab. x. Fig. 1. inter ff.

d Eu-

flectere <sup>d</sup>, postea latefcentem <sup>e</sup> procedere <sup>e</sup> per palati mollis initium, ad posticum lunatum marginem palati ossei, eique se usque ad suturam palati inferere specie aponeurosis, pertinacissime etiam adnexae membranae tendinosae, quae ex naribus venit, decurritque per superiora palati mollis. Et plerumque praeterea vidimus aponeurosem ejus à parte sua postica dare fasciculum Constrictori superiori pharyngis, & Palatopharyngeo. Ipsiusque musculi partem priorem se non flectere circum hamulum, sed antequam ad eum pervenerit, desinere, ac se sine tendineo inferere imae parti processus pterygoidei, ad externum latus radices hamuli, portione multo minore, quam qua se flectit. De actione ejus, experiundo quid possit, haec observavimus: tendere, concutere, deorsum in latus simul & in priora nonnihil trahere palati mollis partem osseo vicinam: tubam Eustachianam tantillum dimovere; & quidem latus ejus externum deprimere internum versus, ac sic angustare tubam: reniti portionibus illis, quibus Constrictorem superiorem pharyngis, & Palatopharyngeum, ab ejus aponeurosi oriri ante retulimus.

*Est primi paris musculorum, qui faucibus dilatandis, aut constringendis inserviunt, Fallop. Obs. an. Pterygstaphylinus externus, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 20. Primi paris dilatantis fauces, quod aliquibus Sphaenopharyngeum dicitur*

d Eustach. Tab. xli. Fig. 13. Ө-Ө.

Valsalv. de aure Tab. iv.

e Valsalv. de aure Tab. iv. m. ultra hamulum l.

a Heist.

dicitur , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 6. *Paris Pterygostaphilini externi* , de Marchett. Anat. Cap. 11. *Pterygopalatinus seu Spbaenopterigopalatinus* , Cowp. Myot. ann. 1694. Cap. 17. *Pterygostaphylinus* , ibid. ann. 1724. Cap. 15. *Novus tubae Eustachianae musculus* , Valsalv. de aur. Part. I. Cap. 2. §. 18. & Part. II. Cap. 5. §. 11. *Musculus tubae novus Valsalv. vel Palato Salpingaeus* , Dougl. Myogr. Cap. 17. *Pterygostaphylinus* , Drake Anthr. Book III. Chap. 14. *Pterygopalatinus* , Morgagn. Adv. an. II. Anim. 14. *Musculus tubae novus* , Santor. Obs. an. Cap. 2. §. 11. *Le Spbeno-Salpingo-Staphylin* , Winsl. Exp. an. Trait. de la tête , §. 498. & seq.

Pars ejus , quae pertinet ad palatum , est *le Spbeno-Staphylin* , & *le Spbeno-Salpingo-Staphylin* , ou *Salpingo-Staphylin externe* , Winsl. Exp. an. Trait. de la tête , §. 499. ad quem pertinet *le Pterygo-Staphylin superieur* , §. 500.

Pars , quae ad processum pterygoïdeum , est *le Pterygo-Salpingoidien* , ibid. §. 499.

## C A P U T LXII.

*De Azygo uvulae <sup>a</sup>.*

**A**zygus per medium palatum molle , perque totam uvulae longitudinem decurrit , enascens ex inferiore parte membranae tendinosae palati mollis , quam in proxime superioribus capitibus memoravimus ; cique , & extremis tendineis Levatorum palati , principio

<sup>a</sup> Heist. Comp. an. ann. 1727. Tab. viii. Fig. 38. k.

<sup>a</sup> Eu-



cipio tendineo tenui implicatus, juxta futuram palati ossei, ut ab eo procedere videatur. Non longe inde carneus fit, eaque parte primum acutus tenuisque, mox laefcit, fitque crassior, post prope teres, gracilis, sensimque gracilescens. Uvulam in priora attollit, & facit brevior.

Sunt, de quibus Dionis, *la luette est composée de deux petits muscles ronds qui viennent de la cloison du nez*, &c. Anatom. VIII. Demonstr. Est *Columellae musculus teres*, Morgagn. Adv. anat. I. §. 8. *Palato-staphylinus*, Dougl. Myogr. Cap. 16. *Azygos*, Morgagn. Adv. an. II. Anim. 14. *Le muscle de la luette*, Littre, Hist. de l'Acad. Royale des Scienc. ann. 1718. p. 302. *Uvulae azygos Morgagnii*, Heist. Comp. an. ann. 1719. Praef. *Uvulae Azygos*, Santorin. Obs. an. Cap. 7. §. 16. *Azygos Morgagni*, Heist. Comp. an. ann. 1727. §. 326. Sunt *les Staphylins ou Epistaphylins*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 502. *Les Staphylins ou Epistaphylins moyens*, ibid.

## CAPUT LXIII.

*De Cricothyreoideo<sup>a</sup>.*

**C**ricothyreoideus inter cartilaginem cricoideam & thyreoideam intercedit, ad utramque pertinet,  
 I i movet

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 11. S. fin.  
 Casser. de Laryng. Tab. 1. Fig. 4.  
 G. & Fig. 5. F. & Tab. xiii. Fig.

4. I. & Casser. Tab. apud Spigel.  
 Lib. iv. Tab. 2. Fig. 4. H.

movet utramque, hanc deprimens in priora, illam attollens, eoque glottidem in posteriora aliquantum dirigens, brevis, & ad rationem longitudinis suae latus. Oritur à latere prioris partis cricoïdeae <sup>b</sup>; adscendit oblique retrorsum, priore parte sua rectius, post hanc ut posterioribus, obliquius; inserit se priori parti toti processus inferioris thyreoïdeae, & mox ante eum, inferiori margini ejusdem cartilaginis, primo ab exteriori parte <sup>c</sup>, post ab interiori <sup>d</sup>. De hoc memorabile, quod frequenter loco unius duo inveniantur, posterior & prior; aliquando tantum leviter distincti, aliquando ex toto. Posterior à media longitudine lateris cricoïdeae, per totam ejus altitudinem, ortus, adscendit oblique retrorsum, suoque extremo implet totum lunatum thyreoïdeae marginem, qui fit tum ab ejus processu inferiore, tum ab ipso margine imo, à processu illo usque ad tuberculum, quod é media fere marginis longitudine eminet; ex parte etiam pertinens ad interioriorem ejusdem marginis partem. Prior mox ante posteriorem situs, mox ante eum quoque & oritur, & se inserit. Tantum autem à superiore margine cricoïdeae oritur, & se inserit à tuberculo supradicto thyreoïdeae usque ad medium latitudinis inter idem illud tuberculum & priorem mediam thyreoïdeae partem. Minor est posteriore, paulloque rectius, quam ille, adscendit. Uterque

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. II. S. aa.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. II. S. bb.

<sup>d</sup> Casser. de Laryng. Tab. xiii. Fig.

4. I. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab.

xxx. Fig. 3. 61. Santorin. Tab. III.

Fig. 1. E.

a Eu-

terque caeterum primo tenuis, crassescit sensim, post se extenuat: uterque ex angustiore modice latescit, sed posterior ad finem usque, prior in fine se rursus angustat. Actione aliquantum discrepare videntur: in eo autem, ut posterior thyreoideam magis, quam prior, trahat in priora; cricoideam autem in posteriora: prior rectius & deprimat thyreoideam, & attollat cricoideam.

De hoc Vesal. *Quatuor itaque primam secundae iungen-*  
*tium, &c.* de H. C. F. Lib. II. Cap. 21. Est *Musculorum*  
*laryngis, qui ipsius proprii dicuntur, primus, Columb. de*  
*re an. Lib. V. Cap. 14. Paris, quod exortum à cricoide*  
*cartilagine in scutiformem inseritur, Fallop. Obs. an. in*  
*musculis laryngis: vide Vesal. Exam. in laryngis mus-*  
*culis, in principio. Ex propriis laryngis musculis anterior*  
*exteriorque, Fabric. de laryng. Part. I. & III. Cap. 8.*  
*Praeter hos notantur in scutiformi, &c. Primi paris propri-*  
*orum laryngis, Casser. de voc. aud. org. Tract. I. Lib. I.*  
*Cap. 5. & Lib. III. Cap. 8. Cricothyroideus anticus, Rio-*  
*lan. Anthr. Lib. V. Cap. 18. Alterius paris extendentium,*  
*Cricothyroidei antici dicti, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap.*  
*6. Paris Cricothyroidis, Vessling. Synt. Cap. 11. Paris Cri-*  
*cothyroidei, de Marchett. Anat. Cap. 11. Paris Cricothy-*  
*roidis, Verheyen. An. Lib. I. Tract. III. Cap. 11. Crico-*  
*thyroideus, Cowp. Myot. ann. 1694. Cap. 15. Cricothyre-*  
*oidaeus, Dougl. Myogr. Cap. 14. Cricothyroideus, Cow-*  
*per Myot. ann. 1724. Cap. 17. Crico-Thyroides, Santo-*  
*rin. Obs. an. Cap. 6. §. 6. Le Crico-Thyroidien, Winsl.*  
*Exp. an. Trait. de la tête, §. 448. 449. & 463.*

*De Cricoarytaenoides postico*<sup>a</sup>.

**Q**uo sequentium laryngis musculorum utilitates, quas tradam, accipi melius possint, necesse est, quaedam de laryngis fistula praemittere. Magno in fauces à superiore parte laryngis patet ore, inter epiglottidem & additamenta, quae insident summitatibus cartilaginum arytaenoidearum; rotundiore à parte priore, quae sit ab epiglottide; inde in angulum formato, membranaceis lateribus in posteriora convergentibus: glottidem deinceps appellabo. Haec à posteriore parte, in ipso coeuntium laterum angulo, inter additamenta arytaenoidearum, incisa est; quam dicam glottidis rimulam. Intus autem in larynge rima quaedam, illius assimilis, quae intus in tibiis sonum concipit: oblonga, & per mediam fistulam continuentibus lateribus pertinens à priore ejus parte ad posteriorem. Haec potissimum moderatur sonum, instructa musculis, à quibus simul cum latitudine & longitudine figura ejus mirifice mutatur, ut in singulis memorabo. Eorum qui Cricoarytaenoides posticus vocatur, amplo pro sua magnitudine initio<sup>b</sup> occupat alteram de duabus illis sinuatis superficiebus, quae in postica parte cricoideae. Ipse parvus, paulatim  
latim

<sup>a</sup> Eustach. Tab. XLII. Fig. 2. K. & Fig. 3. N. Casser. de Laryng. Tab. 1. Fig. 9. D. Casser. Tab. ap. Spiegel. Lib. IV. Tab. 2. Fig. 6. D.

Cowper Myot. an. 1714. Tab. xxx. Fig. 2. 62. Santorin. Tab. III. Fig. 1. F.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. XLII. Fig. 2. K-ss.  
<sup>c</sup> Eu-

latim angustior, primum diu modiceque crassior, postremo extenuatus, ascendit oblique extrorsum ad sui lateris cartilaginem arytaenoideam, cujus se affigit <sup>c</sup> basi, & ejus quidem extremo tuberculo, quod illa à postica parte in latere externo exigit. Arytaenoideam extrorsum modiceque simul retrorsum erigit primum, dein inclinat: itaque cum ambo eodem tempore agunt, arytaenoideas à se invicem deducunt, à priore inprimis, & à superiore parte; quo glottidem, quantum potest, patefaciunt, ejusque rimulam diducunt. Sed & eodem tempore easdem cartilagineas convertunt, sic ut illam earum partem, qua se mutuo respiciunt, dirigant ad priora: eoque glottidis rimam internam quam maxime diducunt; cujus pars posterior rotunda fit ex co.

Est *propriorum laryngis quintus*, & *sextus*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 21. *Musculorum laryngis*, qui *ipsius proprii dicuntur*, *secundus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 14. *Ex propriis laryngis musculis posterior*, ab *infima innominatae parte*, &c. Fabric. de laryng. Part. I. & III. Cap. 8. *Huic oppositus est*, qui *extendit*, &c. *Secundi paris laryngis propriorum*, Casler. de voc. aud. org. Tract. I. Lib. I. Cap. 6. *Paris Cucullaris*, ibid. Lib. III. Cap. 8. *Cricoarytaenoideus*, Riolan. Anth. Lib. V. Cap. 18. *Extendentis recta*, sive *aperientis rimulam paris primi*, *Cricoarytaenoidei postici*, Spigel. de H. C. P. Lib. IV. Cap. 6. *Cricoarytaenoidius posticus*,

Ii 3 Cow-

c. Eustach. Tab. XLII. Fig. 1. N-β.

a Eu.

Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 15. & 1724. Cap. 17.  
*Paris Cricoarytaenoidaei posterioris*, Morgagn. Adv. an. I.  
 §. 28. *Cricoarytenoidaeus posticus*, Dougl. Myogr. Cap.  
 14. *Le Crico-Arytenoïdien postérieur*, Winsl. Exp. an.  
 Trait. de la tête, §. 450. & 464.

## C A P U T LXV.

*De Arytaenoïdeo obliquo* <sup>a</sup>.

**H**ic inter laryngis musculos, qui omnes parvi sunt, minimus, pertenuis, angustus. Ab exteriori & eadem posteriore parte basis arytaenoïdae unus<sup>b</sup>, unde propter finem Cricoarytaenoïdei postici oritur, oblique repit ad posteriorem verticis arytaenoïdae alterius, ubi se tum circum partem illam, tum circum cartilagineum ejusdem verticis additamentum flectit in priora, latefcens deinde, & se ab inferiore parte<sup>c</sup> continuans Thyreoarytaenoïdeo, à superiore<sup>d</sup> secundum glottidis marginem, qui inter arytaenoïdeam & epiglottidem intercedit, pergens ad epiglottidem, & ad ejus latus evanescens extenuatus. Arytaenoïdeas adducit ad se mutuo, & fortasse epiglottidem quoque inclinât in posteriora. Contrahit autem & glottidem, & rimulam ejus, & rimam internam. Et cum dexter cum sinistro conspirat, summitates quidem arytaenoïdeas-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. XLII. Fig. 2. G. & HH. & Fig. 1. H. & II. Morgagn. Adv. 1. Tab. 2. Fig. 1. k. Santorin. Tab. III. Fig. 1. d.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. XLII. Fig. 1. I.-a.

Santorin. Tab. III. Fig. 1. c.

<sup>c</sup> Santorin. Tab. III. Fig. 1. l. & Fig. 2. Q.

<sup>d</sup> Santorin. Tab. 1.1. Fig. 1. supra l.

dearum apprimunt ad se mutuo : latera autem , quibus illae se mutuo respiciunt , & quae sunt ad rimam internam glottidis , adducunt ; ita autem , ut apprimant ea ad se mutuo à parte posteriore , à priore aliquantum divergere faciant : unde rimam internam , dum angustant , à posteriore parte in angulum comprimunt. Quibusdam alter eorum deest , suppletque ejus defectum pars transversa, eodem modo incipiens , ascendens , desinens ; nisi in his dicendus sit obliquus cum transverso conjunctus esse in unum. Aliquibus , quibus ita conjuncti esse putari poterant , fibrae obliquae ad arytænoideam cum transversis desinebant , ultra non excurrentes. Vidimus , quibus uterque obliquus deficiebat , & quibus quaedam transversae fibrae tantum quodammodo obliquae erant. Aliquando non ab arytænoïdea oritur , sed à capitulo cricoïdeae , cui illa insidet.

An paris *Crico-arytænoïdis superioris* , Verheyen. Anat. ann. 1710. Lib. I. Tract. III. Cap. 11 ? De quo Morgagni , *Quae vero post has locantur , facpe in plures junctae fasciculos* , &c. Adv. an. I. §. 28. *Arytænoïdacus minor* , Dougl. Myogr. Cap. 14. An ad eum pertinet *Arytæno-epiglottæus* , Pauli Praef. in van Horne opuscul. §. 63 ? Est Paris *Thyro-Arytænoïdis obliqui* , Santorini. Obs. an. Cap. 6. §. 12. una cum *Ary-Epiglottidaco* , ibid. §. 13. *L'Arytænoïdien croisé* , Winsl. Exp. an. Trait. de la tête , §. 453. 454. 466. *Le Crico-Arytænoïdien supérieur* , ibid. §. 455. an huc etiam pertinet *l'Arytæno-Epiglottique* , ibid. §. 457. & 467 ?

C A-

*De Arytaenōideo transverso.*

**T**ransversus latior & crassior, quam praecedens: mediaque parte longitudinis suae crassior, inde in utrumque extremum sensim tenuior, ad postremum tendineus. Extransverso jacet, ab altera arytaenōidea deductus ad alteram, & eidem utriusque parti affixus, quae est margo interior partis posterioris, per duas fere tertias altitudinis à basi. Saepe supplet obliquorum defectum, ut diximus. Saepe & obliquis fibras impertit, cum quibus aliquando ad epiglottidem iis fibris procurrit. Saepe & Thyreoarytaenōideis, eis se partim recta continuans, partim per exteriora summi marginis eorum adscendens cartilaginem thyreoideam versus. In duas cum aliquando partes ex transverso quodammodo divisum vidimus; inferiorem & superiorem, quarum inferior crassior erat. Arytaenōideam alteram ad alteram adducit, eoque comprimit rimulam glottidis, internamque rimam arctat, & à posteriore parte comprimit, fere ut obliqui.

Est proprium laryngis undecimus, ac duodecimus, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 21. *Musculus extremus laryngis omnium minimus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 14. *Sextum par à Vesalio*, &c. Fallop. Obs. an. in muscu-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xlii. Fig. 2. FFFF.  
Casser. de Laryng. Tab. xiii. Fig.  
2. & 3. & 6. C. & Fig. 7. H. &c

Fig. 12. 13. & 14. E. Santorin.  
Tab. iii. Fig. 1. cc. Cowper Myot.  
ann. 1724. Tab. xxx. Fig. 2. 6r.  
<sup>a</sup> Eu-



musculus laryngis: Sunt *Alii duo*, qui *ipsius arytaenoidis musculi proprii censentur*, Fabric. de laryng. Part. I. & III. Cap. 8. *At motus arytaenoidis ad latera*, &c. Est *Musculus laryngis, conjuge destitutus*, Casser. de voc. aud. org. Tract. I. Lib. I. Cap. 7. *Tertius semicircularis*, ibid. Lib. III. Cap. 8. *Arytaenoideus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 14. *Flectens ad latera, sive Claudens secundum par*, *Arytaenoideum*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 6. *Secundum par Arytaenoides dictum*, Vesling. Synt. an. Cap. 11. *Exile par, quod arytaenoidum proprium dicitur*, de Marchett. An. Cap. 11. *Arytaenoides*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 15. & 1724. Cap. 17. *De quo Morgagni, Porro in nobis quae earum fibrarum anticae, seu interiores sunt*, &c. Adv. an. I. §. 28. *Arytaenoidaeus major*, Dougl. Myogr. Cap. 14. *Ary-Arytaenoidis fibrae interiores*, Santorin. Obs. an. Cap. 6. §. 12. *L'Arytenoïdien transversal*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 453. 455. & 466.

## C A P U T LXVII.

*De Cricoarytaenōideo laterali <sup>a</sup>.*

**C**ricoarytaenōideus lateralis ab initio adhaeret cricoideae <sup>b</sup> summi marginis exteriori parti, in latere, statim juxta insidentem ei arytaenōideam; itemque ligamento, quo cricoidea & thyreoidea à priori parte colligatae inter se: in fine, basi arytaenōideae

K k

<sup>a</sup> Eustach. Tab. XLII. Fig. 1. L. Casser. de Laryng. Tab. XIII. Fig. 4.

D. Santorin. Tab. III. Fig. 2. L.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. XLII. Fig. 1. L. <sup>c</sup> Eu.

deae<sup>c</sup>, pariter à latere, mox ante finem Cricoarytaenoidei postici. Brevis itaque, adscendit oblique, retrorsum inclinans se; caeterum sensim angustior, & diu modice crassior, in fine rursus tenuior, ac tendinosus. Arytaenoideam trahit in priora, vertitque simul; ita autem, ut cum uterque hic musculus agit, priores mucrones basium arytaenoidearum agantur se mutuo versus, donec se aut prope, aut plane contingant; ipsae vero à posteriore parte aliquantum divergant: ex quo glottidis rimae internae pars anterior, quae est ante cartilagine arytaenoideas, minuitur, & ad postremum plane comprimitur, contingentibus se lateribus ejus: pars autem posterior, quae ab iisdem cartilaginibus fit, angusta rima patet, eaque connivente à parte priore, rotundiore à posteriore, multoque brevior, quam ipsa caeterum rima interna. Simul etiam eodem modo vertuntur summitates arytaenoidearum, suisque prioribus partibus magis sibi mutuo obvertuntur, ex eo à posteriore parte modice divergentes; quo fit, ut rimula glottidis, cum ea angusta est, diducatur modice.

Est *proprium laryngis septimus*, & *octavus*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 21. *Alter musculus, nunc dicto contiguus*, &c. *Musculorum laryngis, qui ipsius proprii dicuntur, tertius*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 14. *Ex propriis laryngis musculis, internorum primi paris*, Fabric. de laryng. Part. I. Cap. 8. *Unum par ab in-*  
*nominata*

<sup>c</sup> Eustach. Tab. XLII. Fig. 1. L-8.

nominata , &c. Et Part. III. Cap. 8. *Quibus musculis opponuntur illi, qui utrinque in angulo sunt, &c. Tertii paris laryngis propriorum*, Caster. de voc. aud. org. Tract. I. Lib. I. Cap. 6. & Lib. III. Cap. 8. *Alterum vero eadem ossi, alarum instar, praepositum, &c. Extendentis ad latera, sive aperientis rimulam secundi paris, Cricoa-rytaenoidci lateralis*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 6. *Cricoaerytaenoides lateralis*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 15. & 1724. Cap. 17. *Cricoaerytaenoidaeus lateralis*, Dougl. Myogr. Cap. 14. *Le Crico-Arytenoïdien latéral*, Winll. Exp. an. Trait. de la tête, §. 451. & 464.

## C A P U T L X V I I I .

*De Thyreoarytaenoides.*

**R**imam glottidis internam magis minuunt Thyreo-arytaenoidci, arytaenoides eodem modo in priora, sed magis, inclinantes; eodemque vertentes modo, sed à priori parte magis ad se mutuo. Itaque comprimunt pariter priorem partem rimae illius, verum magis, fortiusque, atque ita, ut à posteriore parte multo brevior rima maneat, caque etiam angustior. Causa est, quod Thyreoarytaenoides magis à priori parte incipiat, tendensque ad arytaenoidem, oblique extrorsum incedat, leviter adscendens. Incipit ab inferiore parte internae partis thyreoideae, juxta ejus medium: vidi & ex parte incipientem à ligamento, quo colligatae à priori par-

K k 2

te.

a Eustach. Tab. XLII. Fig. 1. K. Caster. de Laryng. Tab. XLII. Fig. 4. &c.

f. E.

b Eustach. Tab. XLII. Fig. 1. K. &c.  
c Eu-

te sunt cricoïdea & thyreoïdea. Procedens angustior fit, totus tenuis; ascenditque, & pertingit <sup>e</sup> ad priorem aryaenoïdeae partem, quae ex adverso ejus, cui Arytaenoïdeus transversus insertus; atque ei se mox supra finem Cricoaryaenoïdei lateralis inserit. A superiore parte ejus, qua se, quo dictum loco, inserit, fasciculum <sup>d</sup> plerumque vel dat Arytaenoïdeo obliquo, vel ab eo accipit. Sed & fibrae tenues <sup>e</sup> per partem illam ejus, qua thyreoïdeae obversus, & imprimis per superiorem ejus partem, ac deinde per membranam laryngis, ubi illa facit lateralem partem glottidis, ascendunt, ad postremum in tenuitatem evanescentes circa epiglottidem, quam fortasse retrorsum inclinant. Aliquoties praeterea à me repertus tenuis fasciculus <sup>f</sup>, ab interiore eademque superiore parte thyreoïdeae, non longe à fissura cordiformi, oriens, indeque descendens secundum interiora thyreoïdeae, & cum ad Thyreoaryaenoïdeum venit, altera parte per exteriora ejus, altera per interiora decurrens, insertusque aryaenoïdeae, mox supra Cricoaryaenoïdeum lateralem. Pars hujus musculi decurrit secundum ventriculum laryngis, ei extrinsecus adjecta: cumque iccirco valet premere, & moderari.

Est *proprium laryngis nonus*, & *decimus*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 21. *Musculorum laryngis, qui ipsius proprii dicuntur, quartus*, Columb. de re an. Lib. V.

<sup>e</sup> Eustach. Tab. XLII. Fig. 1. K-β.

<sup>d</sup> Santorin. Tab. III. Fig. 2. Q.

<sup>e</sup> Santorin. Tab. III. Fig. 1. f. & Fig.

2. N.

<sup>f</sup> Santorin. Tab. III. Fig. 1. g. & Fig.

2. O.

a Eu-

V. Cap. 14. *Ex propriis laryngis musculis, internorum secundi paris*, Fabric. de laryng. Part. I. Cap. 8. *Ultimi musculi duo sunt*, &c. Et Part. III. Cap. 8. *Flexio constringit clauditque rimulam*, &c. *Quarti paris laryngis propriorum*, Casser. de voc. aud. org. Tract. I. Lib. I. Cap. 6. & Lib. III. Cap. 8. *duo à postica internae scutiformis parte*, &c. *Thyroarytaenoides*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 18. *Paris Thyroarytaenoides*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 6. *Thyroarytaenoides*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 15. *Le Thyroarytaenoidien*, Doudart, Hist. de l'Acad. Roy. des Scienc. ann. 1700. p. 276. *Thyroarytaenoides*, Morgagn. Adv. an. I. §. 28. *Thyrearytenoides*, Dougl. Myogr. Cap. 14. *Thyroarytaenoides*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 17. *Thyro-Arytaenoides*, Santorin. Obs. an. Cap. 6. §. 9. *una cum Thyro-Epiglottidæo majore*, ibid. §. 14. *Le Thyro-Arytenoidien*, Winsl. Exp. an. Trait. de la tête, §. 452. & 465. *una cum eo, qui le Thyro-Epiglotique*, ibid. §. 456. & 467.

## REGIO IX. SUB MALA.

## CAPUT LXIX.

*De Pterygoïdeo interno.*

**C**avo processus pterygoïdei inhaeret <sup>b</sup> hujus interni principium, à cujus fundo per totam orbitur longitudinem, & ab interiore parte parietis ex-

K k 3

ter-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 13. f. V. Fal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 6. D.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 13. f. a.

<sup>c</sup> Eu-

terni paullo minus quam tota; & ubi cavum illud jam definit, ab inferiore quoque parte ossis palati, quâ dehiscenti processui pterygoideo interfertum. Fert se inde ad inferiora amplitudinis internae illius partis maxillae inferioris, quam ea ad caput erigit; eique se ad imum angulum usque inserit<sup>c</sup>, antequam inferat, extenuare se incipiens, pergensque dum se inserit, & ubi se inserit, tendinosus. Tendinosus quoque ab initio est, maxime à parte faucium; sensimque, donec se extenuet, modiceque intumescit. Et latior est quam crassior, primoque sensim latior fit, in fine angustior. Nisi quod maxillam inferiorem nonnihil oblique in latus sibi oppositum trahat, eam fere recte adducit ad superiorem; vicissimque capitis priorem partem detrahit, cum deducta maxilla inferior, satisque firmata.

Est *Tertius musculus*, qui in ore latitat, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 15. *Musculus in ore latitans*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 11. *Latens in ore*, Fallop. Obs. an. in maxillae musculis. *Pterygoideus internus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 15. *Quinti paris, maxillam abducentis*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. *Paris Pterygoidis sive Alaris interni*, Vesling. Synt. Cap. 13. *Pterigoides internus*, Cowper Myot. Cap. 18. *Pterigoidaeus internus*, Dougl. Myogr. Cap. 20. *Pterygoïdes interior*, Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 37. *Le grand Pterygoidien, ou Pterygoidien interne*, Winslow  
Ex-

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 13. 1-β.

<sup>a</sup> Eu-

Exposit. an. Trait. des muscl. §. 842. &amp; seq. &amp; 1222.

## CAPUT LXX.

*De Pterygoideo externo<sup>a</sup>.*

**E**xternus minor. Juxta praecedentem oritur, tum ab amplitudine exteriori prope tota parietis externi processus pterygoidei, ejusque etiam margine, qui spectat cavum pterygoidis; tum à finitima inferiore parte ossis maxillaris superioris<sup>b</sup>, & aliquando etiam ab exteriori portionis pterygoideae ossis palati. Inde incrementum modice, dein decrescit, latior quam crassior; in finem autem principio multo angustius abit, eumque tendinosum; quale & principium. Ac majorem partem se collo maxillae inferioris inserit<sup>c</sup>, ubi id ab interiore parte partis prioris, statim sub capitulo suo, sinuatum est: capsulae praeterea articulum maxillae cum osse temporis continenti: priori denique & eidem internae parti marginis lamellae cartilagineae, quae articulo illi interjecta. Quas partes quoniam recta petit, atque adeo, ut cognito loco unde oritur, eoque in quo desinit, facile perspicitur, retrorsum incedit, ac simul nonnihil sursum & extrorsum, maxillam inprimis in priora trahit, & simul oblique in latus alterum cogit, caput ejus è sinu ossis temporis protrahens, subjiciensque tuberculo ejusdem; trahens & lamellam interjectam, ne remaneret; & cap-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 13. Δ. sinist.  
Cowper Myot. ann. 1724. Tab.  
xxiv. 7. & Tab. xxxi. 70.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 13. Δ. s.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 13. Δ. d.  
Cowper Myot. ann. 1724. Tab.  
xxiv. 70. & Tab. xxxi. 70. dext.

<sup>a</sup> Eu-

capfam , ne corrugata foret impedimento. Eodem tempore maxillam attollit , donec dentes ei infixi , aut fere , aut leviter contingant superiores. Cum vero maxilla prorsus firmata , caput movet in contrarium.

Est novi paris musculorum , Fallop. Obs. an. in maxillae musculis. *Musculi Temporalis illa pars , quae ab externa sede processuum , quos vespertilionum alis comparamus , &c.* Vesal. Exam. in moventibus inferiorem maxillam. *Quintum par exerendae maxillae Falloppio adscriptum ,* Arant. Anat. obs. Cap. 30. *Pterygoideus externus ,* Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 15. *Quarti paris , Pterygoidei abducentis ,* Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 5. *Paris Pterygoidis sive Alaris externi ,* Vesling. Synt. Cap. 13. *Pterygoideus externus ,* Cowper Myot. Cap. 18. *Pterigoidaeus externus* Fall. Dougl. Myogr. Cap. 20. *Pterygoides exterior ,* Santorin. Obs. an. Cap. 1. §. 37. *Le petit Pterygoidien , ou Pterygoidien externe ,* Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 845. & seq. & 1223.

## REGIO X. PECTUS.

## CAPUT LXXI.

*De Pectorali <sup>a</sup>.*

**P**ectus occupat musculus magnus , crassus , valens , quem Pectoralem vocant. Is ambitu quasi semicircu-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxv. y. Vesal. Epit. Fig. muscl. 1. Q. & de H. C. F. Lib. 1. Tab. 1. L. Cowp. Myot.

ann. 1724. Tab. xxii. 107. Bidloo Tab. xx. H.

b Eu.



circulari oritur , primo à priore parte fere tota claviculae <sup>b</sup> partis illius , quae ad thoracis speciem incurva est : deinde à priori margine ossis pectoris <sup>c</sup> , à radice sustentaculi claviculae , usque ad eum locum , ubi cartilago costae quintae inserta ; eaque parte frequenter in medio pectoris cum parte sui se decussat fasciculis tendineis parvis ; aliquando etiam conjungit se iis , aut & ipsa carne : deinde ab exteriori parte tum cartilaginis extremae modo dictae , tum extremae sextae , frequenter & septimae : post extrinsecus cohaeret cum aponeurosi Obliqui externi abdominis <sup>d</sup> ; à qua etiam portio <sup>e</sup> parva , eaque distincta , accedere ad eum solet ; earumque aliquando invenimus duas. Praeterea autem intus etiam portiones accipit à priore parte , & ea ossi pectoris vicina , cartilaginum quibus costae superiores quatuor ad os pectoris pertinent : atque etiam à priore totius cartilaginis , & saepe ipsius extremae partis ossae , costae quintae ; qua parte cum Recto abdominis aliquando cohaeret : & plerumque diu à reliquo musculi portiones illae internae distinctae sunt. Ab his partibus petit superiorem ossis humeri <sup>f</sup> , fasciculisque omni ex parte originis radiorum instar cocuntibus , se insigniter coangustat. Itaque pars superior descendit oblique ; sequentes quoque , fere usque ad medias , sed minus minusque , ut inferiores : quae mox supra medias , transversae sunt : post has

L I reli-

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxv. y.-s.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxv. y.-ßy.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxv. y.-γδ. Casser.

Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 8.

juxtae.

<sup>e</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv.

Tab. 8.α.

<sup>f</sup> Eustach. Tab. xxxv. y.-s.

<sup>g</sup> Eut-

reliquae prout inferiores, adscendunt magis & magis. Qua oritur à clavicula, primo crassior est, post sensim tenuior: sed qua à sterno, & à costis, & ab Obliquo, primo tenuis, tendinosus, aut totus tendineus, & in multa exilia principia tendinea distinctus; dein carneus, intumescit paulatim, nec multo post rursus detumescit. Et frequenter pars illa, quae à clavicula, ab altera distincta diu est <sup>g</sup>; & haec quoque circa medium ossis pectoris non raro aliquandiu divisa <sup>h</sup>; nonnunquam in plures distincta fasciculos <sup>i</sup>. Ubi ad humerum appropinquat, pars ejus plus quam dimidia superior in brevem, latumque tendinem <sup>k</sup> abit, qui ad humerum descendit. Quae superest inferior, ubi humerum petens à pectore recedere incipit, se circum superiorem flectit <sup>l</sup> in posteriora sursum, quo propior humero, eo magis; pariterque in tendinem <sup>m</sup> abit, sed plerumque citius nascentem, longiorem, adscendentem, prioremque decussantem <sup>n</sup>, ac pone eum non incedentem modo, sed ipsi etiam applicatum, cum eoque in fine connexum. Saepe duo hi tendines ab inferiore parte conjuncti sunt, unumque referunt in superiora complicatum, ex eoque quasi geminum: saepe posterior in aliquot partes divisus. Tali se fine inserit eminentiae ossis humeri oblongae

g Eustach. Tab. xxxv. y-z. & Tab. xxviii.

h Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxii. 107.

i Vesal. Epit. Fig. musc. 1. Q. dext.

k Vesal. de H. C. F. Lib. ii. Tab. 4. A-T. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab.

xlvi. in 107.

l Bidloo Tab. xx. in I.

m Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xlvii. 107. juxta C.

n Vesal. de H. C. F. Lib. ii. Tab. 4.

h. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xlvii. in 107.

a Eu-

longae, & in parte ejus interiore, aliquantum infra tuber inaequabile magnum capitis superioris, per longitudinem jacenti, ac sinum, per quem Bicipitis caput alterum se demittit, à priori parte terminanti: illique se parti ejus, quae hunc sinum spectat, infert; atque in ipso sinu continuat tendineo fini tum Latissimi dorsi, tum Teretis majoris; plerumque praeterea ab inferiore parte conjungit cum extremo Deltoide. Non longe autem à fine lateſcunt tendines, tam in superiorem, quam in inferiorem partem. Et ab inferiore parte hujus extremi tendinei circa axillam abscedit aponeurosis, adjungens se ad tendineam vaginam, qua humero circumpositi muscoli sub tegumentis communibus corporis obducti. Hic musculus & ad humerum, totumque adeo brachium; & ad truncum corporis pertinet. Adducitque alterum ad alterum, sed perquam diversis modis, tum pro vario eorum positu, tum prout vel totus agit, vel tantummodo parte quadam sui. Quippe cum brachium secundum latus corporis naturaliter pendet, attrahit id ad latus illud, modiceque simul in priora: cum ab eo recta in latus sublatum, deprimit ad idem, pariterque simul in priora: idem in priora sublatum, trahit ante pectus; retrorsum actum, in priora: humerum priori parte sua in exteriora conversum, vertit in contrarium introrsum. Haec cum se ex omni parte simul contrahit. Pars ejus quae descendit, cum sola agit, os humeri praeterea attollit: transversa agit recte in priora: quae adscendit, non solum os humeri, sed totum quoque humerum, id est scapulam & cla-

viculam, trahit deorsum. Contrariis modis truncum movet, obfirmato, quantum necesse est, humero.

Est *Primus brachium moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 23. *Primus humeri musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 16. *Pectoralis*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 24. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 14. Verheyen. Anat. Lib. I. Tract. VI. Cap. 1. Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 25. Dougl. Myogr. Cap. 30. Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 25. *Le grand Pectoral*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 185. & seq. & 935. & seq.

## C A P U T LXXII.

*De Serrato antico <sup>a</sup>.*

**S**erratus anticus potius certe scapulae, quam costis adscribendus est. Quocirca ab his procedere eum dicemus. Procedit igitur ab exteriori parte costarum plerumque trium ex superioribus, non longe à cartilagineis earum portionibus; partim quoque ab harum ipsarum principio, maxime primo & secundo capite: modo autem à tertia, quarta, & quinta; modo à secunda, tertia, quarta <sup>b</sup>. Et incipit totidem capitibus; tertio, id est imo, à superiore margine <sup>c</sup> costae inferioris earum, quas diximus: secundo partim ab eodem mediae, partim à tota latitudine <sup>d</sup> osseae partitis

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxv. x. & Tab. xxxii. I. Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 4. k. & Tab. 5. f.

<sup>b</sup> Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. II. 71.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxv. x-j.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxv. x-y.

c Eu.

tis ejus , ductu obliquo , deorsum in posteriora inclinato : primo denique à superiore , ab eaque aut ut tertium ab inferiore , aut <sup>c</sup> ut secundum à media. Estque tertium caeteris insignius. Omnia ab initio tenuia & tendinosa , tenuiora autem , & tota tendinea , qua à cartilaginibus , & à partibus osseis juxta cartilagineas , oriuntur ; manentque aliquandiu tendinosa. Hinc se in triangularem quasi formam coangustat , paulatim crassior , sed ad extremum rursus tenuior : sursumque ac simul modice in latus procedit ad coracoideum scapulae processum , ejusque extremo , à superiore & eadem interna parte ejus , tendineo se , tendinosove , & angusto extremo affigit <sup>f</sup> ; quo aliquando cum Coracobrachialis & Bicipitis brachii communi principio conjunctus. In media autem carne paulatim tendinem inchoat , citius ab exteriori parte apparentem , ibique in inferiore parte <sup>g</sup> citissime. Ergo supradictum processum , atque adeo ipsam scapulam , in priora deorsum ad pectus trahit. Haec cum retinetur , magis autem cum attollitur , costas , à quibus oritur , attollit , trahitque in latus.

Est *Musculus qui scapulam antrorsum agit* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 23. *Primus scapulam moventium* , ibid. Cap. 26. *Secundus scapulae* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 15. *Serratus minor* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 23. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 13. *Serratus*

L1 3

tus

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxv. x-β.<sup>f</sup> Eustach. Tab. xxxv. x-ε.<sup>g</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv.

Tab. 15. α.

a Eu-

*tus anticus minor*, Velling. Synt. Cap. 9. Cowp. Myot. ann. 1694. Cap. 19. Dougl. Myogr. Cap. 25. Verheyen. Anat. ann. 1710. Lib. I. Traët. VI. Cap. 2. Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 19. Vide Morgagn. Adv. an. II. Anim. 15. Est *le petit Pectoral*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 156. & seq. & 916. & seq.

## CAPUT LXXIII.

*De Subclavio<sup>a</sup>.*

Potiore etiam jure Subclavium claviculae adscribimus, non costae primae, quippe qui hanc modo perparum, etiam ad caput sublato humero, valeat dimovere. Parvus is musculus, qui tendine<sup>b</sup> planiore incipit à tuberculo, quod est in priore parte costae primae, paullo antequam ea in cartilaginem facessat; aut ab ipsius cartilaginis principio<sup>c</sup>, à parte exteriore.\* Tendo non admodum longus, in latus procedit, paullatim latior, & in carnem se vertens, unde venter<sup>d</sup> crassus, oblongus, latescens, & fere ad finem usque crassescens, in fine se extenuans; qui sub clavicula secundum ductum ejus porro pergit, dumque pergit, ejusdem se inferiori parti<sup>e</sup>, à loco modice à capite ejus primo distante, ad eum usque, ubi incumbit processui coracoïdeo; & aliquando etiam

am

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxv. u. Vesal. Epit. Fig. musc. 1. O. fin. & de H. C. F. Lab. II. Tab. 4. d. Castl. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 18. F.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxv. u. a. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxxiii. 73.

B.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxv. u. 3.

<sup>d</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxxiii. 73. A.

<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxxv. u. 77.

a Eu-

am huic ipsi processui, extremo fine suo. Claviculam attrahit ad os pectoris, impeditque, ne ab eodem in latus recedat: eandem cum processu coracoideo, id est totum humerum, ducit deorsum in priora. Costae primae priorem partem trahit in latus, simulque sursum, cum humerus firmatus est, praesertim cum sublatus; sed, ut in principio dictum, perparum, eoque minus, quo propius os pectoris oritur.

Est *Primus in altero latere thoracem moventium*, Vescal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 35. *Primus thoracis musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 20. Fallop. Obs. an. in thoracis musculis. *Qui sub clavicula occultatur*, Fabric. de Respir. Lib. II. Cap. 11. *Subclavius*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 31. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 9. Cowp. Myot. ann. 1694. Cap. 19. Dougl. Myogr. Cap. 21. Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 19. *Le Souclavier*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 170. & 919. & seq.

## REGIO XI. LATUS THORACIS.

## CAPUT LXXIV.

*De Serrato magno<sup>a</sup>.*

**S**erratum magnum, quoniam praecipue scapulae datus est, à costis, sicut anticum, deducemus ad eam.

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiii. m. & Tab. xxvi. f. Vescal. Epit. Fig. musc. iii. R. sin. & Fig. ii. Q. sin. & de H. C. F. Lib. ii. Tab. 2. ooo. &

Tab. 5. m. & Tab. 7. L. & Tab. ii. X. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 18. DD.

<sup>b</sup> Eu.

eam. Est autem peramplus, satis tenuis. Ab octo costis superioribus oritur<sup>b</sup>, capitibus distinctis novem<sup>b</sup>: primo<sup>c</sup> (quod aliquando deest) ab exteriori & eadem inferiore parte costae primae, mox infra principium Scaleni medii, cum quo saepe cohaeret: secundo<sup>d</sup> ab exteriori secundae, frequenter initio obliquo, à superiore margine costae in priora deorsum aliquandiu ducto: tertio<sup>e</sup> ab eadem, initio simili praecedentis, & infra illud ab inferiore margine costae in posteriora aliquandiu sursum ducto: reliquis singulis ab exteriori similiter parte reliquarum singularum costarum<sup>f</sup>. Pleraque etiam ex parte à principio inhaerere<sup>b</sup> solent Intercoastalibus externis proximis. Ex his statim confluunt<sup>g</sup> superiora duo, aliquando tria: reliqua longius disjuncta manent<sup>h</sup>, & fere ad scapulam usque. Ac primorum quodque quod inferius, id & longius ex priore parte venit, quam proximum superius: at septimum prope aequè longe ac sextum, octavum non tam longe quam septimum, rursusque nonum non tam longe quam octavum. Primum ab initio exile: secundum tertiumque latum & rectum: reliqua angustiora, & similia anguli acuti<sup>i</sup>.

Primum

b Eustach. Tab. xxxiii. m-αβγδςζ ηθι.

c Eustach. Tab. xxxiii. m-α. ubi tamen primum non distinguit à secundo.

d Eustach. Tab. xxxiii. m-β.

e Eustach. Tab. xxxiii. m-γ.

f Eustach. Tab. xxxiii. m-δ, ε, ζ, η, θ, ι.

g Eustach. Tab. xxxiii. m-αβ. ubi ac quidem distincta.

h Eustach. Tab. xxxiii. m-γδςζηθι. & Tab. xxxvi. f-αβγδςζ. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 18. DD.

i Eustach. Tab. xxxiii. m-δ, ε, ζ, η, θ, ι. Vesal. Epit. Fig. musc. iii. R. sin. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 18. a. a. a. a. infer. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. xxxii. 72-3. 4. 5. 6. 7. 8. Bidloo, Tab. xx. E. E. E. infer. k Eu-



Primum & secundum crassiora , reliqua tenuiora. In quibusdam decimum <sup>k</sup> accedit , à costa nona <sup>l</sup> ; quod tam longe non venit ac nonum , multoque est exilius. In quibusdam & undecimum , à costa decima , decimo exilius , neque tam longe veniens. Ab illa porro costarum parte procedunt , quae est in parte priore lateris corporis , simul efficientia principium à primo initio per ambitum rotundum <sup>m</sup> , & angulatum. Ipse musculus circum costas retrorsum incedit ad scapulae basem usque , sensim se ex latissimo contrahens <sup>n</sup> , totique longitudini dictae basis , oraeque obliquae , quae à summa basi incipit , ex interiore parte inferens <sup>o</sup>. At quinque capita inferiora radiorum instar coeuntia , abeunt praecipue in extremum <sup>p</sup> crassum , angustum , sine tenuiore & tendinoso insertum scapulae angulo inferiori : ad haec & decimum , undecimumque , cum adsunt , se adjungunt. Tertium vero , quartumque , simul faciunt amplam illam partem , quae thoraci ac scapulae interjecta , totaque tenuior , basem inprimis attingit , extremo lato <sup>q</sup>. Ex his tertium ita latefcit ad effigiem trianguli , ut attingat majorem partem basis. Primum denique secundumque , quae in unum confluere diximus , efficiunt partem <sup>r</sup> media illa crassiorem , quae ad oram scapulae brevissimam , mediam inter basem oramque

M m

supe-

<sup>k</sup> Eustach. Tab. xxxvi. f. g.

<sup>l</sup> Eustach. Tab. xxxvi. f. h.

<sup>m</sup> Eustach. Tab. xxxiii. m.

<sup>n</sup> Caslr. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 18. DD.

<sup>o</sup> Ibid. bb.

<sup>p</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxxii. 72. C.

<sup>q</sup> Ibid. 72. CA.

<sup>r</sup> Ibid. 72. BD.

superiorem, praecipue pertinet. Totus musculus modice primum ab ortu crassior fit, & non longe à fine rursus extenuatur. Scapulam in priorem corporis partem trahit: ea autem retenta, costas, à quibus oritur, retrorsum, extrorsumque. Jam vero scapula nec sursum, neque deorsum praeter solitum acta, capita superiora duo simul insigniter adscendunt, ob idque deprimunt scapulae partem superiorem. Tertium: media parte sui prope transversum, scapulam rectius in priora trahit. Quartum quoque prope transversum, tantum modice descendit, scapulamque in priora trahens, modice simul attollit eam. Quintum adscendit modice, reliqua deinde quo inferiora, magis<sup>u</sup>; itaque deprimunt scapulam ad rationem obliquitatis suae. Septem autem superiora capita costas decussant, facitque eorum unumquodque angulum acutum cum illius costae, à qua oritur, parte inferiore: ex quo deprimunt eas. Octavum fere tenet costae suae ductum, eamque nec attollit, nec deprimat. Nonum, decimumque, si accesserint, supra suas paullum adscendunt, quas tamen vix attollunt. Sublata scapula, caput nonum, decimumque, nonnihil attollunt costas suas: reliqua minus deprimunt.

*Est secundus in altero latere thoracem moventium, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 35. Secundus thoracis muscu-*

<sup>s</sup> Eustach. Tab. xxxiii. m-a2.

<sup>t</sup> Ibid. m-γ.

<sup>u</sup> Ibid. m-ζ. η. θ. ι. & Tab. xxxvi. f-d.

<sup>1, ζ. η.</sup>

a Eu-

*musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 20. *Qui à Galeno passim musculus in finis scapularum situs appellatur*, Fabric. de Respir. Lib. II. Cap. 11. *Serratus major*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 31. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 13. *Serratus major anticus*, Verheyen. Anat. Lib. I. Tract. VI. Cap. 2. Cowper Myot. Cap. 19. Dougl. Myogr. Cap. 25. Vid. Morgagn. Adv. an. II. Anim. 15. *Est le grand Dentelé*, Winsl. Hist. de l'Acad. Roy. des Scienc. ann. 1719. pag. 50. & Exp. an. Trait. des muscl. §. 160. & seq. & 902. & seq.

## REGIO XII. ABDOMEN.

## CAPUT LXXV.

*De Obliquo externo abdominis a.*

**P**roximi tres amplitudine insignes sunt, & iidem tenues. Obliquus externus à principio latus, angulatusque, multis capitibus, quorum principia acutis angulis quodammodo similia<sup>b</sup>, incipiens. Octo<sup>c</sup> ei capita, à totidem costis inferioribus oriunda: aliquando novem, uno accedente à quarta. Omnia, præter infimum, non admodum longe à costarum parte cartilaginea incipiunt. Primum quidem ab imo margine costarum

Mm 2

stac

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxv. A. & Tab. xxviii. 1K. & Tab. xxix. W. Vesal. Epit. Fig. musc. 1. T. dext. & Fig. 11. L. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 3. E. & Tab. 9. P. & Tab. 2. ppp. Bidloo Tab. xxxi. CC. Cowper Myot. ann. 1724.

Tab. xiv.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxv. A-γ d. i. z. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xiv. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

<sup>c</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xiv. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

d Eu4

istae quintae, quartaevae : sequentia ab exteriori parte suae quodque costae, margine oblique posito, & à superiore parte costae ad inferiorem in posteriora ducto <sup>d</sup> : praetereaue ab ipsa ora inferiore costae, ab eaque saepe distincto principio tendineo, aut tendinoso ; cum de caetero ab initio subtendinea sint : penultimum saepe & à cartilagine undecimae : at infimum ab extrema cartilagine duodecimae, ubi frequenter connexum cum Transversi abdominis principio. Eorum superiora saepe portionibus exiguis cohaerent cum Serrati magni principiis : inferiora cum illis Latissimi dorsi : pleraque cum finitimis Intercostalibus. Primum exilius : secundum majoris & latitudinis & crassitudinis : rursus majoris tertium, rursusque quartum : quintum & sextum non ita lata, sed crassiora : crassissimum septimum, idemque latius duobus praecedentibus : octavum quoque crassum ; at quibusdam tenue & tendineum. Omnia aliquandiu manent distincta, contingunt se tamen : & aliquando aliquod eorum rursus per longitudinem fissum. Proceduntque oblique in priora deorsum, quo & reliqua musculi caro, cum capita illa coaluerunt, pergit. Fibrarum <sup>e</sup> autem superiores modice descendunt ; ab his subsequentes quo inferiores, eo etiam magis. Sic procedens musculus, cum ad corporis partem priorem pervenit, in amplam aponeurosem <sup>f</sup> totus extenuatur ; cujus fibrae <sup>g</sup> eo in univcrsum, quo carnae, quibus continuatae sunt, modo

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxv. A. γ. δ. ε. ζ.

<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxxv. A. α. Cowp.

Myot. ann. 1724. Tab. xiv.

<sup>f</sup> Eustach. Tab. xxxv. A. β. Cowp.

Myot. ann. 1724. Tab. xiv. AA.

<sup>g</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

xiv.

<sup>h</sup> Eu-

modo porro incedunt. Suo autem superiore margine à costa prima earum, unde incipit, per transversum in priora pergit ductu lunato, ibi cum ima Pectoralis parte aponeurosi sua connexus. Posteriore à costa ultima oblique descendit <sup>h</sup> in priora. Desinit à superiore parte ad priorem cartilaginum extremarum costae sextae, & septimae, ac finitimam ossis pectoris <sup>i</sup>, ibi in tenue paullatim evanescens. Inde se per totam abdominis longitudinem, ad pubis synchondrosem usque, continuat <sup>k</sup> aponeurosi paris sui, sic ut multae fibrae tendineae, eaeque frequenter in fasciculos collectae, ab utraque altera per alteram longe excurrant, ejusque fibras decussent: multae etiam se implicant in eandem abdominis longitudinem convenientibus aponeurosibus Obliquorum internorum, & Transversorum: ex qua conjunctione, implicationeque, fit quam dicunt lineam albam <sup>l</sup>; quae supra umbilicum latior, insigniorque; infra eum exilior. Post autem juxta pubis synchondrosem aponeurosi in duos fissa tendines <sup>m</sup>, alterum mediam spectantem pubem, alterum ad externum praecedentis latus, eoque angustiores & multo crassiores, hic Obliquus desinit. Sequae altero eorum commiscet cum ligamentis, quae pubis synchondrosem à priore parte continent; cum usque ante synchondrosem illam descendit in latus oppositum, decussans parem sui: altero inserit tuberculo,

Mm 3

<sup>h</sup> Eustach. Tab. xxix. W.

<sup>i</sup> Eustach. Tab. xxxv. A-ak.

<sup>k</sup> Eustach. Tab. xxviii. KK. & Tab. xxxv. AB-ai.

<sup>l</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 1.

<sup>m</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

xiv. ab utroque latere C.

culo , quod è superiore eademque priore parte ossis pubis eminet ; proximaeque spinae , quae ab ejus tuberculi latere externo est ; ex parte etiam ab interno ejusdem tuberculi latere cum ligamentis supra dictis commiscet. Medium autem inter eos intervallum <sup>a</sup> , simile fissurae amplae , formaeque ovatae , & à superiore parte rotundioris , ab inferiore in anguli speciem formatae , atque oblique in priora deorsum vergentis , relinquitur ; per quod in viro vasorum spermaticorum funiculus cum Cremastere <sup>o</sup> , in foemina uteri ligamenta dicta rotunda procedunt. Ejusque fissurae latera crassiora sunt , ut quae ab ipsis tendinibus recta procedentibus fiunt : pars superior tenuior , constansque è portione tendinea latiuscula , quae se à tendine exteriore ad interiorem demittit , eosque , qua primum à se invicem ad fissuram faciendam discedere incipiunt , connectit inter se , firmatque. Posteriore denique parte hic musculus pertinet ad superiorem eandemque exteriorem prioris partis longitudinis cristae ossis ilium , carne <sup>p</sup> primum , eaque in finem tendinosum extenuata ; dein aponeurosi. Ab ejusdem autem cristae extremo priore aponeurosis ejus ad eum ossis pubis locum usque , cui inscrere se eam diximus , abit in marginem <sup>q</sup> crassum , qui cum vagina tendinea , quae femur ambit , cohaeret , eique tenuem portionem dat , & primum ab extrema

<sup>a</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

xiv. C.

<sup>o</sup> Eustach. Tab. xxviii. N.

<sup>p</sup> Eustach. Tab. xxxv. A. 7.

<sup>q</sup> Eustach. Tab. xxxv. A. 8. Cowp.

Myot. ann. 1724. Tab. xiv. c.

a 28-

triema crista aliquantum solet rectius descendere, postea nonnihil incurvus, in superiora patulus; in fine rursus rectior. Juxta hunc marginem, & ubi se inserit, aponeurosis similiter satis crassa est, de caetero tenuior infra umbilicum, rursusque tenuior supra eum. Perforataque aliquot foraminibus, quibus exeunt vasa & nervi: majoribus, & fissurarum similibus, infra umbilicum, & ibi maxime non longe à linea alba. Multiplex hujus Obliqui functio. Peritoneum coërcet, firmat, premit, comprimit: sic abdomen contrahit, & quae id continet, premit: exprimit excrementa, urinam, foetum, aliaque in abdomine contenta, cum evacuamus alvum, vesicam, uterum in partu, ventriculum in vomitu: premendo viscera abdominis Diaphragma agit sursum, ad angustandum thoracem, premendos pulmones, aëremque ex iis exprimendum, in expiratione, formatione vocis, flatu, risu, excreatione, tussi, sternutatione; figuram abdominis immutat. Costas, à quibus procedit, trahit deorsum, urget retrorsum. Lumbos in aversum, inque alterum, quam in quo situs, latus curvatos erigit; erectos flectit in priora, inque illud, quod occupat, latus; & modice simul torquet, pectus in oppositum latus aliquantum convertens: sic thoracem antrorsum, & in latus, in quo locatus ipse, inclinat; fundamentum spinae, quod fit ex osse sacro, coxarumque duobus, attollit in partem eandem.

Est *Oblique descendens*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 31. *Obliquus descendens*, Columb. de re an. Lib. V.

V. Cap. 22. *Obliquus externus*, Laurent. Hist. an. Lib. V. Cap. 32. & Quaest. 9. *Oblique descendens*, Fabric. de Respir. Lib. II. Cap. 11. *Obliquus descendens*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 34. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 10. *Oblique descendens*, de Marchett. Anat. Cap. 2. *Obliquus descendens*, Cowp. Myot. ann. 1694. Cap. 1. Dougl. Myot. Cap. 1. *Oblique descendens*, Verheyen. Anat. ann. 1710. Lib. I. Tract. II. Cap. 6. Morgagn. Adv. an. II. Anim. 10. *Obliquus descendens*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 1. *Obliquus descendens, seu exterior*, Santorin. Obs. an. Cap. 9. §. 1. 3. & 4. *L'Oblique externe*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 71. & seq. & 115. & seq. & 120. & seq. & 129. & seq.

## C A P U T LXXVI.

*De Obliquo interno abdominis <sup>a</sup>.*

**O**bliquus internus & Transversus paullo minoris amplitudinis sunt, quam externus; inter se autem tum amplitudine, tum forma prope similes; utpote qui ambitu suo contingunt imum thoracis marginem, lumborum vertebrae, cristam ossis ilium, inguen, pubem, lineam albam. Obliquus autem ad hunc se habet modum. Gemina primum aponeurosi, post in unam confluenta, cum Serrato postico inferiore

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxv. C. & Tab. xxxvi. ig. & Tab. xxxii. R. Vesal. Epit. Fig. muscl. 1. g. sin. & Fig. 11. fg. sin. & de H. C. F. Lib.

11. Tab. 4. II. & Tab. 11. ab. Casfer. Tab. ap. Spigel. Lib. 1v. Tab. 9. EE. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. 11. & v. 2.

b Eu-



ore (quemadmodum in ejus historia melius referemus) procedit <sup>b</sup> à spinis vertebrarum lumborum inferiorum trium, & sequentibus ossis sacri; itemque à processibus transversis vertebrarum lumborum inferiorum: dein & aponeurosi sua à superiore parte illius cristae ossis ilium partis <sup>c</sup>, quae ultra processus transversos lumborum eminet in posteriora: post à superiore parte reliquae cristae illius <sup>d</sup>, usque ad extremum prius; quā parte tenuis est, & primum tendineus, mox carneus <sup>e</sup>: & ubi illa crista à priore parte desinit, ita cum finitima parte imi tendinei marginis Obliqui externi cohaeret, ut nasci ex eo videatur. Nata inde carne <sup>e</sup> circum abdomen tendit in priora. Ea vero quasi radiata <sup>e</sup>, fasciculis superioribus mediisque in universum adscendentibus, primis autem ex his rectius, sequentibus se magis & magis, ut sequuntur, inclinantibus: ab his proximis transversis: illis denique, quae ab extrema priore parte cristae ilium, margineque Obliqui, ut inferioribus, rectius etiam, rectiusque descendantibus. Eadem in priore parte abdominis, inter costae decimae extremum pubisque lateralem partem, in latam aponeurosem <sup>f</sup> lunato vertitur termino, quae se in duas lamellas <sup>g</sup> tenuiores

N n                      divi-

b Eustach. Tab. xxxvi. g. Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. II. ab.

c Eustach. Tab. xxxvi. g-γ.

d Eustach. Tab. xxxvi. 1-aa. & Tab. xxxv. C-γ. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 10. LLO. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. v. 2 Q.

e Eustach. Tab. xxxvi. i. & Tab. xxxv. C-a. Casser. Tab. ap. Spigel.

Lib. IV. Tab. 9. FF. & Tab. 10. L. sin. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. II. 2.

f Eustach. Tab. xxxv. C-β. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 9. HHH. & Tab. II. BB.

g Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. II. CC. DD.

h Cow-

dividit ; supra umbilicum quidem , postquam modicum processerat integra ; infra eum , mox ab ortu suo. Non dividit autem tota , sed tantummodo maxima parte sui : nam quod ejus est infra locum , qui circa medium inter umbilicum pubisque synchondrosen , simplex manet. Lamellarum altera , quae prior <sup>a</sup> , non ita diu post per abdominis longitudinem totam adnascitur <sup>i</sup> aponeurosi Obliqui externi , posteriorem partem ejus ad lineam albam usque vestiens <sup>k</sup> : posterior eodem modo ad priorem partem aponeurosis Transversi accedit <sup>l</sup> ; supra umbilicum autem , cum ipsa modicum processit ; infra eum , simulac nata est. Mediumque hae lamellae comprehendunt Rectum. Inferior autem aponeurosis pars , quae simplex , conjuncta à priore parte cum aponeurosi Obliqui externi , à posteriore cum illa Transversi , cum iis ante Rectum petens lineam albam. Totus musculus pandit se ab ortu suo , atque à superiore parte extremis tendineis inserit , primo inferiori parti extremae costae duodecimae , tum osseae partis <sup>m</sup> ejus , tum cartilagineae <sup>n</sup> : dein eidem parti undecimae <sup>o</sup> , dein cartilagini <sup>p</sup> decimae : inque illarum costarum intervallis connectit cum Intercostalibus. Post suae aponeurosis lamella posteriore imo inserit thoracis margini , qui sit è cartilaginibus costae nonae , octavae , septimae , usque ad os carti-

<sup>a</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xv.  
DD. Eustach. Tab. xxxii. R-β.

<sup>i</sup> Eustach. Tab. xxxv. C-ηβ.

<sup>k</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab.  
xiv. BB.

<sup>l</sup> Eustach. Tab. xxxiii. r. Vefal. de

H. C. F. Lib. ii. Tab. 6. Δ-b.

<sup>m</sup> Eustach. Tab. xxxvi. i-β.

<sup>n</sup> Eustach. Tab. xxxvi. i-γ.

<sup>o</sup> Eustach. Tab. xxxvi. i-δ.

<sup>p</sup> Eustach. Tab. xxxv. C-ιζ.

cartilaginis mucronatae ; & hujus ipsius ossis , cartilaginisque , margini : priore autem secundum thoracis eundem illum marginem evanescit in aponeurosem Obliqui externi. Aliquando aponeurosis non affigit se dicto margini , sed modo secundum eum , etiam utraque lamella sua , procedit. Ab inferiore parte caro valde tenuis est , ibidemque circa medium intervalli inter extremam ilium cristam , mediamque pubem , mox supra imum marginem tendineum Obliqui externi , fibris in viro quasi sparsis & Cremasteri principium dat , & tum supra <sup>q</sup> , tum infra <sup>r</sup> vasa spermatica decurrit , donec ad extremum in aponeurosem abeat , hac parte tenuem ; quae se cum aponeurosi Transversi inserit <sup>r</sup> , pone illam Obliqui externi , iisdemque , atque illa , partibus , id est , pubis spinæ , tuberculo , ligamentis. In foemina autem , quae Cremasterem nullum habet , recta decurrit ad partes easdem ; infraque imum marginem ejus elabuntur rotunda uteri ligamenta. Lumbis , peritoneao , abdomini , thoraci toti , eadem in universum praestat , quae Obliquus externus. Verum imi thoracis marginis priorem partem deorsum & nonnihil spinam versus trahit : eam , quae in latere corporis est , deorsum simulque retrorsum in exteriora ; eoque à se invicem , & ab ultima vera , deducit extrema costarum spuriarum. Lumbos dum flectit , torquet , contrario , atque externus , modo.

N n 2

Est

<sup>q</sup> Eustach. Tab. xxxii. R 7.<sup>r</sup> Eustach. Tab. xxxv. C 1.

a Eu-

Est *Oblique adscendens*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 31. *Obliquus ascendens*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 22. *Obliquus internus*, Laurent. Hist. an. Lib. V. Cap. 32. *Obliquus ascendens*, Fabric. de Respir. Lib. II. Cap. 11. Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 34. Spiegel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 10. *Obliquus internus*, Riolan. Anim. in Laurent. Cap. 32. Lib. V. *Oblique ascendens*, de Marchett. Anat. Cap. 2. Verheyen. Anat. ann. 1693. Tract. II. Cap. 5. *Obliquus ascendens*, Cowper Myot. Cap. 1. Dougl. Myogr. Cap. 1. Drake Anthr. Book I. Chap. 5. *Oblique ascendens*, Verheyen. Anat. ann. 1710. Lib. I. Tract. II. Cap. 6. *Obliquus internus*, Morgagn. Adv. an. II. Anim. 10. *Obliquus ascendens*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 1. *Obliquus alter*, seu *interior*, Santorin. Obs. an. Cap. 9. §. 1. 3. & 4. *L'Oblique interne*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 87. & seq. & 115. & seq. & 120. & seq. & 128. & 129. & seq.

## C A P U T LXXVII.

*De Transverso abdominis <sup>a</sup>.*

**T**ransversus ductu fere continuo oritur ab his: interiore parte costarum<sup>b</sup> inferiorum septem, extremis

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiii. q. & Tab. xxxvii. o. & Tab. xxxviii. o. Vesal. Epit. Fig. musc. iii. T. sin. lat. & Fig. iv. k. dext. lat. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 6. d. & Tab. 12. p. Casser. Tab. ap. Spiegel. Lib. iv. Tab. 12. FFFFF. Bidloo Tab.

xxxii. RR. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xvi. f.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvii. o. & Tab. xxxiii. q. dext. Vesal. Epit. Fig. musc. iv. k. dext. lat. & Fig. iii. T. sin. lat. Casser. Tab. ap. Spiegel. Lib. iv. Tab. 12. ff.

c Ew-

tremis processibus transversis <sup>e</sup> imae dorſi ( aut inferiore parte costae imae , ubi illa secundum processum transversum incedit ) & lumborum superiorum quatuor , superiore eademque interiore parte cristae <sup>d</sup> ossis ilium , eique proxima imi tendinei marginis Obliqui externi. Uno ab unaquaque costarum principio abscedit , saepe rursus in partes aliquot fisso : primo plerumque ab extrema parte ossea , & proxima cartilagineae sextae , aut à sola cartilaginea , non longe ab ossea : secundo à cartilagine septimae , pariter haud longe ab initio ejus : tertio à principio cartilaginis octavae : quarto ab extrema ossea parte , totaque cartilaginea nonae : quinto ab extrema ossea , & cartilaginea proxima decimae : sexto à principio cartilaginis undecimae : septimo ab extrema duodecima. Omnia modice lata , pleraque ab initio tendinea , tenuia. Ad haec Diaphragmati continuare se solet in tribus inferioribus costarum intervallis : saepe & qua oritur à costa septima , & octava , & nona ; ubi interdum etiam pectinatim cum eo coit. A processibus transversis <sup>e</sup> , & ab illa cristae <sup>f</sup> parte , quae est juxta externam partem initii Quadrati lumborum , lato tendine <sup>g</sup> procedit , cui primus margo in singulis intervallis processuum transversorum , illoque quod inter transversum secundae ab osse sacro & os ilium intercedit , lunatus : ad

N n 3 cum-

c Eustach. Tab. xxxvii. o-βββββ.

d Eustach. Tab. xxxvii. o-γγγ. & Tab. xxxiii q-β. Vesal. Epit. Fig. musc. iv. k. dext. lat. & Fig. iii. T. sin. lat. & de H. C. F. Lib. ii. Tab.

6. A. & Tab. 12. p.

e Eustach. Tab. xxxvii. o-βββββ.

f Eustach. Tab. xxxvii. o-γ.

g Eustach. Tab. xxxvii. o-a. in dextr. lat.

h Eu-

eumque tendinem ab interiore parte accedit aponeurosis tenuis, quae à processibus transversis procedens, vestit priora Quadrati lumborum. A crista ilium, ante Quadratum lumborum, principio subtendineo. A margine autem Obliqui aut oritur, aut ita ut oriri videatur, adnatus ei est. Et pars tendinea à processibus transversis, & à crista, aliquandiu in priora pergit membranae specie, priusquam se vertat in carnem, sua superiore parte adhaerens imo margini costae duodecimae <sup>b</sup>, ad ejus mucronem usque: in principio praeterea connexa cum aponeurosi communi Serrati postici inferioris & Obliqui interni abdominis, & cum ea adnexa cristae <sup>i</sup> ilium. Itaque pars carnea <sup>k</sup> & à costis <sup>b</sup>, & à tendine <sup>l</sup> supradicto, & à crista <sup>d</sup> ilium, margineque Obliqui externi procedit, indeque se circum peritonaeum flectit in priora. Ejus autem fibrae pleraeque in universum transversae sunt <sup>m</sup>: sed inferiores, earumque praecipue illae, quae à priore parte cristae ilium, & ab Obliqui margine oriundae, deorsum eo se magis inclinant <sup>n</sup>, quo ipsae inferiores situ. Eaedem fibrae inferiores partem efficiunt longe reliquo musculo tenuiorem, quae se cum inferiore parte carnis Obliqui externi, cui similis est, quamque ex fibris quasi sparsis constare diximus, prorsus commiscet. Ad postremum

h Eustach. Tab. xxxviii. o-j.

i Eustach. Tab. xxxviii. o-y.

k Eustach. Tab. xxxiii. q-s. & Tab.

xxxviii. o-s. & Tab. xxxviii. o.

Castér. Tab. ap. Spigel. Lib. iv.

Tab. 12. FFFfF. & IIII. Bidloo

Tab. xxxii. RR. Cowper Myot.

ann. 1724. Tab. xvi. f. DDBC.

l Eustach. Tab. xxxviii. o.

m Eustach. Tab. xxxviii. o-s. & Tab.

xxxiii. q-s.

n Eustach. Tab. xxxiii. q-s.

o Eu-

postremum in priore parte abdominis, per longitudinem ejus totam, ab intervallo inter costam septimam & os cartilaginis mucronatae interjecto, ad latus pubis usque, caro hujus musculi in amplam desinit aponeurosem<sup>o</sup>, lunato termino. Haec reliquam abdominis amplitudinem ad lineam albam usque complexa, in itinere, jam non longe ab initio suo, cum aponeurosi Obliqui interni plane coit in unum<sup>p</sup>. Se autem circa medium inter umbilicum & pubis synchondrossem locum, ex transverso findit, jam fere ab ipso principio suo ad lineam albam usque; totaque superiore parte earum, in quas se findit, peritoneum proxime ambit, vestitque posteriorem partem lamellae posterioris aponeurosis Obliqui interni; cum qua incedit pone Rectum: inferiore autem se inter Rectum illum & peritoneum, ut superiore, non interfecit; sed vestiens posteriorem partem aponeurosis Obliqui externi, qua illam simplicem esse diximus, cum ea incedit ante Rectum & Pyramidalem. Et à superiore parte continua Triangulari sterni, cum eo inserit se inferiori parti marginis mucronatae cartilaginis<sup>q</sup>: mox autem ante ejus cartilaginis mucronem conjungit se cum eadem aponeurosi Transversi lateris alterius, cum ea mucroni illi inserta: infra hunc cum eadem alterius per longitudinem lineae albae<sup>r</sup> cohaerens est, unaque: ab inferiore parte tota tenuis, connexaque cum

<sup>o</sup> Eustach. Tab. xxxiii. q-y. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 12. gg. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xvi. f. EE.

<sup>p</sup> Eustach. Tab. xxxiii. r. Vesal. de H. C. F. Lib. ii. Tab. 6. a-b.

<sup>q</sup> Eustach. Tab. xxxiii. q-d.

<sup>r</sup> Eustach. Tab. xxxiii. o.

<sup>a</sup> Eu-

cum imo margine Obliqui externi , deinde cum vagina tendinea femur ambiente , posteaque inserta ossi pubis cum Obliquo interno. Peritonaeum complectitur , firmat , contrahit , premit introrsum : sic comprimit abdomen , efficitque , quae comprimendo abdomen efficere Obliquum externum retulimus. Costas , à quibus oritur , si cum pare sui agat , adducit , id est , dexteris ad sinistras ; quo pars illa extremi thoracis , quae fit ex illis , unde hic musculus procedit , costarum partibus , angustatur. Cartilaginem mucronatam trahit in latus. Sub imo hujus musculi margine delabitur funiculus spermaticus in viro , ligamentum uteri rotundum in foemina. Nunc , antequam ad reliquos abdominis procedam , hoc unum , quanquam ex supradictis apparere possit , hic significantius monendum videtur , Obliquos & Transversum suis se aponeurosis ab utroque latere conjungere inter se , itemque in linea alba dextros & sinistros ; eoque sex illos simul referre fasciam quandam latam , ab utroque latere triplicatam , in medio simplicem , circumductam abdomini , aptissimamque ad continendum & comprimendum.

Est *Transversus* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 31. *Transversalis* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 22. *Transversus* , Fabric. de Respir. Lib. II. Cap. 11. Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 34. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 10. *Transversalis* , Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 1. Dougl. Myogr. Cap. 1. *Transversus* , Morgagn. Adv. an. II. Anim. 10. *Transversalis* ,



*salis*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 1. *Transversus*, Santorin. Obl. an. Cap. 9. §. 1. & 3. *Le Transverse*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 107. & seq. & 115. & seq. & 120. & seq. & 128. & 133.

## CAPUT LXXVIII.

*De Recto abdominis* <sup>a</sup>.

**R**ectus teniae latae effigie per abdomen, ex pube veniens, secundum umbilicum incedit ad imum pectus. In pube tendinibus duobus exoritur ex priore parte ligamenti, quo synchondrosis ossium pubis à priore parte constricta: raro ab ipso osse, ne quidem parte quadam sui. Alter eorum latior, crassus, praecipuus, è superiore parte ligamenti veniens; alter, is vero juxta mediam pubem, longe gracilior, & longior, longiusque veniens: ac mox confluunt in unum, qui non multo post in carnem se vertit. Sic incipiens musculus, quo adscendit altius, latefcit magis, sed modice: & primum fit sensim aliquanto crassior, mox se in universum lentissime ad finem usque extenuat. Tribus autem extremis definit, ad costae septimae <sup>b</sup>, sextae <sup>c</sup>, quintae <sup>d</sup> cartilagine: quorum primum fere latius & crassius esse solet, duo reliqua in tendineum finem extenuata.

O o

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiii. n. Vefal. Epit. Fig. musc. iii. m. dext. & de H. F. C. Lib. ii. Tab. 5. A. & Tab. 6. f. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 10. DD. & Tab. 12. AAA. Bidloo Tab. xxxii. LL. & PP. Cowp.

Myot. ann. 1724. Tab. ii. 4. 4. & Tab. xvi. 4.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxiii. n. a.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxiii. n. β.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxiii. n. γ.

nuata. Pertinetque primum ad inferiorem, atque etiam exteriorem partem cartilaginis septimae, non longe ab ejus extremo: secundum ad exteriorem sextae, sed propius mediam ejus longitudinem, juxta externum primi latus: juxtaque idem secundi latus, tertium, ad quintae cartilaginis partem similiter externam, sed fere ubi cartilago illa incipit; aliquando & ad ipsam extremam ossëam partem. In quodam, cui cartilago costae octavae ad os pectoris pertinebat, Rectus etiam extremae illi cartilagini inferebatur. In multis se sine suo cum Pectorali aliquantum conjungit. Proprium huic, quod carnem ejus lineae transversae tres <sup>e</sup>, in quatuor distinguant portiones; quarum linearum prima <sup>f</sup> è regione umbilici est, omnino transversa, quibusdam undulata: ultima <sup>g</sup> ibi ubi pectus primo conscendit, aut conscensurus est; obliqua, inque illud latus, in quo ipse musculus, declivis: secunda <sup>h</sup> inter illas prope media, transversa, saepe undulata. Aliquando & quarta <sup>i</sup>, infra umbilicum: aliquando dimidia, aut inchoata; sicuti & reliquae aliquando imperfectae, totam musculi non secantes latitudinem: nec nisi raro per totam carnis crassitudinem penetrant <sup>k</sup>, sed fere in priore superficie subsistunt. Pertinacissime autem adhaerent aponeurosi

e Eustach. Tab. xxxiii. n. 7. t. 3. Vefal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 5. u. u. u.

f Eustach. Tab. xxxiii. n. 7.

g Eustach. Tab. xxxiii. n. 8. Vefal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 5. u. super.

h Eustach. Tab. xxxiii. n. 1. Vefal.

de H. C. F. Lib. II. Tab. 5. u. med.  
i Vefal. Epit. Fig. musc. III. m. dext. infra umbilic. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. 1. & II. 4. infra umbil.  
k Ut ap. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XVI. 4. A. B.

neurosi Obliquorum communi, fiuntque ex eo, quod fibrae carneae se in tendineas vertant, innectentes se aponeurosi modo dictae. Itaque & portiones carneae se, ubi in lineas illas abiturae sunt, extenuant: ubi ab iisdem incipiunt, crassescunt. Quibusdam eorum, quibus hae lineae per carnem penetrabant, (in aliis totas, in aliis tantum juxta lineam albam penetrantes vidimus) ea parte innexae erant aponeurosi communi Transversi & Obliqui interni: quibusdam autem non. Actio Recti, fere quae Obliqui externi, praeterquam quod lumbos non torqueat.

Hic commodissime videmur descripturi rarum naturae ludentis exemplum, quod semel, iterumque vidimus, quodque non possumus praetermittere, Recti per pectus continuationem quandam, illi musculo quodammodo respondentem, quem<sup>1</sup> prae homine quaedam in pectore praecipuum habent animalia. Recti continuationem quandam dicimus, quoniam supra eum per pectus adscendit, quamquam distinctus ab eo. Orientem eum vidimus à priore parte extremae cartilaginis costae septimae & sextae, supraque eas ab aponeurosi Obliqui externi: desinentem ad ossis pectoris partem priorem, mox infra lunulam, quae in ejus summo est. Erat autem primo tenuis & tendineus, mox carneus, latitudinis duorum prope digitorum, sensim modiceque angustior, sensim primo crassior, post tenuior, in fine tendineus, angustus, & praeterquam quod ossi pectoris insertus esset,

O o 2

<sup>1</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 5. rft.

set , etiam conjunctus cum principio Pectoralis.

Est *Rectus* , praeter ejus *principium superius* ; Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 31. Columb. de re an. Lib. V. Cap. 22. Arant. Anat. obs. Cap. 40. *Rectus* , Fabric. de Respir. Lib. II. Cap. 11. Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 34. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 10. De Marchett. Anat. Cap. 2. in Obliquo ascendente. Verheyen. Anat. ann. 1693. Tract. II. Cap. 5. Cowper Myot. Cap. 1. Dougl. Myogr. Cap. 1. Verheyen. Anat. ann. 1710. Lib. I. Tract. II. Cap. 6. Santorin. Obs. an. Cap. 9. §. 1. *Le Droit* , Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 97. & seq. & 120. & seq. & 126. & seq.

## C A P U T LXXIX.

*De Pyramidali* <sup>a</sup>.

**R**ectum Pyramidalis juvat , qui saepe deest , vel ab uno , vel ab utroque latere , Recto tunc supplente vices ejus , illaque parte principii sui , cui caeteroqui Pyramidalis adjectus , latiore & pleniore , magisque carneo. Quin & dexter sinisterque inter se magnitudine plerumque non sunt aequales. Infra Recti tendinem praecipuum , etiam de ligamento , quo pubis ossa colligata , surgit principio latiore tendineo tenui ,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiii. u. Vesal. Epit. Fig. musc. iii. d. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 5. n. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 10.

I. & Tab. II. T. Bidloo Tab. xxxii. Q. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. 1. & xv. 3.

tenui, mox carneo. Pergit secundum lineam albam, fitque paullatim modiceque crassior, donec in fine extenuetur, seseque in acutum verticem sensim angustat, lato autem extremo, eoque tendineo & tenui, se, dum adscendit, communi aponeurosi Obliqui interni & Transversi in linea alba innectit; in plerisque tertiam longitudinis inter pubis ossa & umbilicum emetiens partem <sup>b</sup>. Sed & per totam extremi sui latitudinem fibras tendineas insignes Recto imperit, quae se in latus flectentes, ad eam Recti, quae lineae albae propinqua, partem primo accedunt; posteaque per priorem ejus, qua Pyramidalis incumbit, extrorsum adscendunt sensim evanidae, partimque in carneas ejus manifeste abeunt. Sic autem in plerisque.

An *musculus parvus qui procedit à fine musculi longitudinalis*, Massae, Anat. Cap. 21? Est *superius principium Recti abdominis*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 31: *carneum*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 22. *Musculus quidam totus carnosus*, &c. Fallop. Obs. an. in abdominis musculis. Vide Vesal. Exam. in abdominis musculis. *Carneum operculum*, Arant. Anat. obs. Cap. 40. *Pyramidalis*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 34. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 10. De Marchett. Anat. Cap. 2. Cowp. Myot. ann. 1694. Cap. 1. Dougl. Myogr. Cap. 1. Verheyen. Anat. ann. 1710. Lib. I. Tract. II. Cap. 6. Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 1.

Oo 3

Santo-

b Eustach. Tab. xxxiii. u.

a Eu-

Santorin. Obs. an. Cap. 9. §. 1. *Le Pyramidal*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 103. & seq. & 120. & seq. & 128.

# REGIO XIII. CIRCA FUNEM SPERMATICUM AC TESTEM.

## C A P U T LXXX.

### *De Cremastere* <sup>a</sup>.

**C**remasterem abdominis Obliqui & Transversus producant. Siquidem ab inferiore parte Obliqui interni & Transversi, qua illi à margine aponeurosis externi ante os ilium oriuntur, quaque eos conjunctos inter se esse diximus, maxime tamen ab Obliquo, portio <sup>b</sup> tenuis abscedens, ad funiculum spermaticum accedit: ad quam se tenuis pars <sup>c</sup>, descendens ab ea parte imi marginis tendinei Obliqui externi, quae est juxta os pubis, adjungit; quanquam tamen eam semper non viderimus. Ex his Cremaster fit; qui ad testem descendens, applicat se primum ad exteriorem partem funiculi spermatici, dein dilatat paulatim, funemque magis magisque complectitur, & cum venit ad membranam vaginalem testis, explicat se circum eam, paulatimque extenuat. Ejus autem primum principium, quod se ab Obliquo inter-

no

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiii. x. De Graaf de vir. org. Tab. 11. Fig. 1. CDEE. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xviii. 6.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxiii. x. 6 Cowper Myot. ann. 1724. Tab. 11. 6. <sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxiii. w.

no & Transverso demittit , longius est , & gracilius : alterum , quod ab Obliquo externo , & latius , & brevius. Et memorabili modo fibras ejus per vaginalem incedere vidimus in optimis corporibus. Quae spectabant testem alterum , descendebant rectius ; sequentes , tum quae à priori , tum quae à posteriore parte testis decurrunt , se , dum descendebant , curvabant extrorsum , eo magis , quo quaeque à rectioribus illis remotiores ; donec circa exteriorem testis partem pleraeque priorum continuarentur posterioribus. Et erant in parvos collectae fasciculos. Officium autem Cremasteris est , testem , qui caeterum à solo funiculo spermatico pendet , suspensum tenere ; attollere praeterea , & fortasse quoque comprimere in complexu venereo.

Est *Virilis testis musculus* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 33. *Musculus testiculi* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 23. *Testis musculus* , Fallop. Obs. an. in testium musculis. *Virilis testis musculus* , Vesal. Exam. in testium musculis. *Musculus testis* , Laurent. Hist. an. Lib. V. Cap. 36. *Cremaster* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 36. Barthol. Anat. inst. Lib. I. Cap. 22. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 12. De Marchett. Anat. Cap. 6. De Graaf de viror. org. pag. 23. Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 2. Dougl. Myogr. Cap. 2. Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 2. Santorin. Obs. an. Cap. 9. §. 1. *Le Cremaster* , Winsl. Exp. an. Trait. du bas-ventre , §. 518. & seq.

RE-

è ligamentis, quae per inferiores vertebrae excurrunt, tendinea lataque tenuitate primum paulatimque enascente <sup>e</sup>. Post is <sup>f</sup> sensim angustior & crassior, & ab exteriori latere suo carnem sensim producit <sup>f</sup>, eoque sensim exilior fit <sup>f</sup>. Alio <sup>g</sup> deinde plerumque principio, eoque minore, idem caput incipit, modo ab ejusdem tertiae vertebrae margine superiore, sub praecedente; modo ab inferiore parte corporis quartae, similiter ab ejus prioris partis latere, similiterque è ligamentis, quae per superficiem vertebrarum inferiorum excurrunt, tendinea nascente tenuitate; ac similiter etiam ex tendineo mox se in carnem, inprimis ab exteriori parte sua, vertente, eamque sensim crassiorem, & cum posteriore parte praecedentis principii confluentem. Aliquando & aliud <sup>h</sup> tendinosum accedit, ab imo margine quintae: aliquando etiam simile aliud, ab ejusdem parte priore media. Vidi dextrum hoc caput oriens à quarta, ut caeterum à quinta; & infra quartam è ligamentis, nullo alio accedente principio. Sinistri <sup>i</sup> quoque primum initium tendineum, tenue, latum; idque extrinsecus in latere sinistro eodem modo <sup>i</sup> inchoat ex ligamentis, quae occupant priorem partem corporum infra quartam à sacro; posteaque sensim angustat, efficitque crassius: sed inprimis oritur ab inferiore

Pp

eadem-

e Bidloo Tab. LII. H.

f Casp. Barthol. Diaphr. Tab. 1. Fig. 3. B. dext.

g Ut ap. Casp. Barthol. Diaphr. Tab. 1. Fig. 3. B-a-a. a. dext. Senac,

RS. dext.

h Ut ap. Casp. Barthol. Diaphr. Tab. 1. Fig. 3. B-a-a. a. dext.

i Bidloo Tab. LII. ad sinistram E.

k Casp.



eademque priore parte lateris sinistri corporis quartae, principio tendineo angusto, ad quod praecedens, è ligamentis natum, extrinsecus accedit; unde tendo <sup>k</sup>, ut in dextro capite, sensim angustior & crassior, carnem etiam ab externo latere suo, verum non tam cito, producens. Vidimus aliud <sup>l</sup> principium accedere, partim à ligamento, quod inter quartam quintamque interjectum; partim ab inferiore eademque priore parte lateris sinistri quintae. Vidimus hoc caput non à quarta, sed à tertia, & infra eam tenuitate sua oriri. Vidimus eodem modo oriri à quinta. Caput ab utraque parte secundum <sup>c</sup> exiliore longioreque tendine oritur à latere corporis quartae à sacro, aut tertiae, aut secundae, aut quintae, aut circa illa loca è ligamentis, quibus obductae vertebrae; aut à vertebbris & vicinis ligamentis. Tendo sensim crassescit, abitque in carnem, sensim crassiorem, latioreque. Hoc caput interdum ab altero latere deest, alias ab utroque. Tertium modo oriri vidimus à latere superioris marginis corporis quartae, modo à latere imi quintae, modo superioris ejusdem; modo & imi primae dorsi, vel solius, vel & ligamenti, quod interjectum ei proximaeque lumborum; principio non valde lato, tenui, tendineo, ab exteriori parte cito carneo, ab interiori diutius tendinoso: quod & aliquando invenimus triceps, procedensque à summo margine quartae lumborum, inferiore

<sup>k</sup> Casp. Barthol. Diaphr. Tab. 1. Fig. 3. B. sin.

<sup>l</sup> Ut ap. Casp. Barthol. Diaphr. Tab. 1. Fig. 3. B-a. 2. sin.

<sup>m</sup> Ve-

ore quintae, superiore ejusdem. Quartum tendineo, mox autem in carnem verso, principio oritur à priorè parte principii processus transversì quartae à sacro; cui se aliquando simile adjungit, ab eadem parte processus ejusdem quintae. In aliis hoc caput oriebatur ab ima dorsi. Et in quibusdam tantummodo à superficie principii Psoae abscedit tenuitate tendinea. Vidimus aliquando praeter octo dicta adhuc unum ab utroque latere caput, adjectum externo lateri secundi, angustum, ab initio tendineum, & ab inferiore oriens margine lateris corporis quintae à sacro, mox carneum, latescensque. Omnia adscendunt, & sensim crassiora fiunt; maximeque intumescunt media, quae diu disjuncta, coeunt postea lunato ductu, mediumque inter se relinquunt intervallum <sup>m</sup>, quo tanquam porta exit aorta <sup>m</sup>, introeunt canalès chyliiferi radices. Eadem cum secundis eodem modo confluunt, similibus, sed longe minoribus, interjectis intervallis <sup>n</sup>. Interque capita prima & secunda elabuntur nervi intercostales: in sinistro quidem latere solus truncus primitivus; alter enim inter duo principia capitis sinistri primi: in dextro autem uterque, itemque vena azyga. Aliquando truncus primitivus sinister penetrabat per caput sinistrum tertium, deficiente secundo. Pariter cum secundis tertia confluunt. Cum his postrema, sed rursus lunato, eoque ampliore, ductu; in

P p 2

multis

<sup>m</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab.  
7. q. Bidloo Tab. LI. circa E.  
<sup>n</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

xxxiv. & xxxv. inter D. & E: &  
D. & F.

multis tendineo margine °, sub quo Psoae elabuntur. Ab horum capitum conjunctione Diaphragma diffundit se in latitudinem, adscenditque in thoracis cratem <sup>p</sup>, ac simul se & in utrumque latus, & in priora curvat <sup>p</sup> ad ambitum thoracis internum; ad quem se deinde curvo pergente ductu demittit, pergitque secundum eundem, donec in imo ejus desinat. Amplissimum itaque, & ab inferiore parte concavum <sup>p</sup>, gibbum à superiore <sup>q</sup>. Amplior autem pars dextra, magisque sursum acta in thoracem, quam sinistra. Ubi thoracis ambitum fere contingit, abit in extrema tria; quorum duo lateralia <sup>r</sup> sunt, eaque amplissima; tertium <sup>r</sup> medium, quod multo angustius, & à quo divergunt lateralia. Medium rotundo per latera ambitu demittit se ad interiorem partem extremae cartilaginis mucronatae, eique subrotundo, inque partes aliquot fisso, sine inserit. Lateralia inserta interiori parti costarum septimarum, octavarum, nonarum, decimarum, undecimarum, qua illae thoracis marginem faciunt, simili prope ab utroque latere modo, extremis distinctis, latis, plerumque carneis, aut tendinosi, aliquando in partes aliquot fissis, occurrentibusque abdominis Transversorum principiis, atque eis se aliquando pectinatim interferentibus, saepe & ex parte continuantibus: quin & saepe in inter-

° Senac, V.

<sup>p</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 7. A. in ipso corpore.

<sup>q</sup> Eustach. Tab. IX. & Tab. XV. Fig. 1. 2. 3. 4. Th. Barthol. Anat. ref.

Lib. II. Tab. 3. CCDDD.

<sup>r</sup> Senac, EEGGGGHHX. EE GGGHHIX.

<sup>f</sup> Senac, FF.

intervallis costarum nonarum & decimarum, harum & undecimarum, itemque harum & duodecimarum, tendineo fine continuant se simili eorundem Transversorum initio. Inserta autem, septimarum quidem costarum parti cartilagineae, qua illa incipit, per dimidiam ejus longitudinem; quae extrema caeteris latiora, & se aliquando sextarum etiam costarum cartilaginibus inferunt, ubi illae latiore parte sui connexae cum illis septimarum: octavarum itidem cartilaginibus principio; aliquando etiam extremae osseae parti: nonis haud procul à cartilagine, & ipsi non raro cartilagini: eidem parti decimarum: eidem undecimarum: eidemque aliquando duodecimarum, aut soli cartilagini earum. Quod vero Diaphragmatis inter cavum abdominis & thoracis intercedit, prope totum tendineum est, tendine<sup>1</sup> per ambitum fere ovato in lateribus, ante in obtusum mucronem exeunte, inde in posteriorem partem sensim latiore, à posteriore insigniter lunato<sup>2</sup>, & in universum quidem concavo ab inferiore parte, sed in duo praecipue à lateribus cava magna, oblonga, quorum dextrum amplius<sup>3</sup>, distincto; in medio planiore, & ex transverso etiam modice gibbo, & à dextra ad sinistram aliquantum declivi. Et in totum tenuis est hic mus-

P p 3 culus,

<sup>1</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 7. k l m n. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxxiv. & xxxv. III. Senac, AZ&. Heist. Comp. ann. 1727. Tab. 111. Fig. 13. EEE.

<sup>2</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

xxxiv. Senac, LOONCC L. w Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxxiv. & xxxv. Senac, Z. & ubi dextra tendinis pars amplior sinistra.

<sup>3</sup> Casp.

culus, sed non ejusdem ubique tenuitatis. Etenim capita, de quibus ante dictum, ubi se conjunctura sunt, extenuata, simul abeunt in carnem non admodum crassam, quae se extenuat, donec vertatur in tendinem: per inferiorem autem utriusque lateris marginem, ubi tota carnea permanet, valde tenuis est. Tendo tenuis: à quo caro, itidem tenuis, mox paullo crassior, verum non diu post sensim usque ad finem extenuata. Duo praeterea habet foramina. Alterum<sup>x</sup> in carne sua, antequam tendo nascatur, juxta spinam, nonnihil ab hujus latere sinistro; oblongum, fissurae simile, medium patens, ab utroque extremo in angulum acutum, quorum inferior acutior, angustatum, à tendine deorsum vergens, in cujus margine caro paullo, quam circumcirca, crassior est. Alterum<sup>y</sup> in tendine, in dextra parte, juxta medium, nec longe à spina; magnum, & quodammodo ovatum. Hoc autem venae cavae inferioris in<sup>z</sup> thoracem admittendae causa paratum est: illud stomachi<sup>a</sup> in abdomen. Post haec omnia etiam de fibrarum decursu videtur dicendum. Cujus expositio si difficulter intelligetur, hoc me consolabor, quod non mea tantum culpa futurum sit, sed etiam implicatione ipsius rei. Postquam capita se commiscuere, nata ex eo caro adscendit, seseque in priora ad posticum lunatum

x Casp. Barthol. Diaphr. Tab. 1. Fig. 3. E. Cowper Myot. ann. 1714. Tab. xxxiv. & xxxv. L. Senac, inter MMNP.  
y Senac, a.

z Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 7. f. in ipso corpore.  
a Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 7. r. in ipso corpore.

tum tendinis ambitum curvat, quem <sup>β</sup> usque ad utrumque mucronem ejus posteriorem tenet, impletque. Ejusque mediae fibrae in universum adscendunt rectius <sup>β</sup>: hinc autem ab utroque latere sequentes adscendunt quoque, sed simul, ut à mediis remotiores, declinant magis ad latera <sup>β</sup>. Pars autem ab utroque latere postrema γ, eaque sola, ad finem usque carnea permanet, pollicis quasi latitudine, faciens inferiorem ab utroque latere Diaphragmatis marginem γ, à postremo capite ad costam undecimam lunato ductu γ, deorsum patuli curvaminis, incedentem, primum secundum extremum Quadrati lumborum, costam deinde duodecimam, post intervallum inter eam undecimamque intercedens. Haec de parte carnea prima, quae ad tendinem maximam partem desinit. Quae ab eo incipit secunda δ, ab ejus priore ambitu toto, usque ad utrumque mucronem posteriorem, procedit, curvans se ad thoracis ambitum; & ubi cum attingit, descendit ad ejus imum. Hujus pars media ε, quae ad cartilaginem mucronatam pertinet, rectius suis fibris descendit ad eam. Laterales ζ, ubi ad thoracis ambitum venerunt, descendunt quoque, sed modice in priora: eisque in posteriore eademque inferiore Diaphragmatis parte se adjungit \* pars, quam usque ad costam undecimam totam carneam permanere dixi. In aliquibus autem apparuit, tanquam  
 fi

β Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxxv. δ Senac, XHHGGGGEEFFEE  
 GGGHHIX.

γ Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxxv. G. G. ε Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxxv. G. adjuncta H. ab utroq. lat.  
 ζ Sc-

fi caro & à capitibus, & à costis, & à mucronata cartilagine, id est, ex omni ambitu, cui affixa, radiata forma ad tendinis ambitum tenderet <sup>ζ</sup>; deficientibus portionibus illis, quae caeterum carnae, ut dictum, permanent. Satis itaque simplex est carnearum decursus: sed tendinearum implicatus. A carnea parte prima ortae tendinae, fere per totam tendinis amplitudinem pergunt procedere <sup>η</sup> ut carnae, à quibus procedunt; continuoque progressu abeunt in carneas secundas: mediae itaque incedunt rectius; ab utroque latere sequentes, se magis in latera curvant, eoque magis, quo propiores mucronibus posterioribus tendinis. Ab his multae notabiliter, certoque quodam modo abludunt. Etenim ab utroque latere caro prima à superiore parte abit in fibras tendineas, quae per superiora tendinis decurrunt in priora <sup>θ</sup>, decussantes fibras ejus inferiores, & connexae cum iis. Dein in dextro latere per inferiora tendinis, ibique per lateralem ejus ambitum, porrecta lata quaedam aponeurosis, à carne, quae est ad mucronem posticum dextrum tendinis, incedens in priora, decussans tendinis, secundum quas incedit, fibras, & à priore parte conjungens se cum eo, desinensque in carnem priorem. Ei similem, sed imperfectiorem, in sinistro latere nonnunquam inveni. Jam à superiore parte, ab utroque latere tendinis, decurrit

<sup>ζ</sup> Senac, Figura superiore.

<sup>η</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxxv. I. I. in utroque latere: ut-

cunque.

<sup>θ</sup> Senac, &c.

currit similis aponeurosis, à priore parte, ad latus tendinis, ex carne sensim nascens tenuitate tendinea: inde sensim crassior, & secundum lateralem marginem tendinis, maxime per initium carnis secundae, ovato ductu incedens retrorsum; circumeunisque tendinis mucronem posteriorem, pergit deinde secundum lunatum posticum ejus marginem. Earum autem sinistra,\* cum venit ad superiorem angulum foraminis, quo stomachus exit, inde in priora procedit, ad postremumque abit in priorem partem extremi carnei dextri in aliis, in aliis sinistri: sed priusquam ad angulum mododictum venerit, parte quadam penetrat ad inferiorem tendinis partem<sup>†</sup>; acceptaque, cum penetravit, portione ab inferiore parte tendinis, juxta sinistram foraminis stomachi, flectit se dextrorsum<sup>‡</sup>, supraque foramen illud incedit ad priorem partem carnei extremi dextri; partimque decurrit secundum priorem partem foraminis, quo cava intrat; ubi se ad eam adjungit alia portio<sup>§</sup> tendinea, enascens ex inferiore parte carnis, quae est ad dextrum latus anguli superioris ilii foraminis, quod stomachi est: unaque ambiunt cavam, per priorem partem, perque latus externum, oram foraminis ejus ab ea parte facientes<sup>¶</sup>, seseque adjungentes ad aponeurosem, quam per lateralem ambitum tendinis in dextro latere ab inferiore parte incedere dixi. Quae vero in dextra parte per superiora tendinis decurrit aponeurosis, circa ima foraminis

Qq

cavae

† Senac, ad sinistram N.

\* Senac, bb.

‡ Senac, ad cc.

¶ Senac, bbcc.



cavae ad inferiorem partem tendinis, aut ex parte, aut ex toto, & modo citius, modo tardius, penetrat; posteaque se flectit circum sinistram partem foraminis cavae, ejus ab ea parte oram <sup>†</sup> efficiens, & in crassioris tendinis speciem collecta; indeque procurrat per priorem tendinis mucronem in priora, rursus extenuata, dilatata, & tanquam dispersa in fasciculos. Aliquando autem, ubi primum pervenit ad imum foraminis cavae, vel dat, vel accipit, portionem tenuem, quae per superiora posterioris partis marginis foraminis illius decurrit. Porro per superiorem partem tendinis ab utroque latere decurrunt fibrae quaedam tendineae à priore parte oblique in posteriorem, ad mucronem posticum; aliae rectiores, aliae leviter inflexae, aliae diversimode abludentes, decussantes reliquas tendinis, eisque se implicant: inque ipso mucrone posteriore penetrant in inferiora, & abeunt in carnem secundam, ab ultimo illo mucrone procedentem. Ad haec per priorem tendinis mucronem ab inferiore parte abludere solent fasciculi tendinei, ab uno latere ad alterum lunato ductu decurrentes, efficientesque aponeurosem tenuem & latam, stricte adnexam tendini, lunatam, in priora directis cornubus; quae ex priore parte extremi carnei unius lateris exeunt, eidem alterius continuo ductu continuata. Restat exponendus decursus circum foramina. In inferiore angulo illius, quod stomacho

v Senac, cc.  
 § Senac, cc.

• Cowper Myot. ann. 1724. Tab.  
 xxxiv. juxta C.

• Casp.

cho paratum est , caro ex utroque capite medio veniens , se decussat \* ; eaque quae è sinistro , decurrit per dextrum foraminis marginem ; quae è dextro , per sinistrum : & ubi se decussant , illa sinistri capitis prior , dextri posterior : aliquando autem aliquot fasciculi se decussant , alii post alios. Rursusque in superiorem angulum convenientes margines foraminis , juxta tendinis Diaphragmatis medium , se decussant , dextro priore † , sinistro posteriore ‡ . Ultraque hunc angulum , à parte ejus priore , fasciculi quoque tendinei multi se per tendinem decussant § , pertinentque qui è dextris veniunt , ad sinistram partem carnae partis secundae ; qui è sinistris , ad dextram. Cavae admittendae foramen ¶ potius triangulare est , quam rotundum , lunatis tamen lateribus : eoque non perforatus est tendo , sed relinquitur inter portiones ejus ; siquidem latus \* ejus posterius fit ab illa praecipua tendinis parte , quae à carne prima dextrorsum procedit ad secundam ; margine tenui , eoque rectiore , ad posteriorem partem foraminis pertinens : latus anterior ¶ fit à procurrente aponeurosi , quam per superiorem partem ambitus sinistri tendinis incedere retuli ; accedente portione tendinea , tum ab inferiore parte tendinis , qua is parte est ad sinistram foraminis stomachi ; tum à carne , quae ad dextrum latus anguli superioris foraminis mododicti : latus sinistram § fit

Q q 2

— Casp. Barthol. Diaphr. Tab. 1. Fig.

3. *supra* C. Senac, PQQ.

Verheyen Anat. Lib. i. T.  
Fig. 5, B. Senac, juxta N.

\* Cowper Myöt. ann. 1724. Tab.  
xxxiv. & xxxv. l. super.

τ Senac, dd.

à procurrente aponeurosi illa, quam dixi se per ambitum superiorem dextrae partis tendinis flectere. Plerumque praeterea inveni foramen insigne, aliquando etiam duo, accedente parvo, in tendine, supra foramen stomachi, relicta pariter inter decussantes se portiones tendineas. In his autem omnibus multas & magnas varietates animadverti, quibus hanc historiam obruere non videtur consultum; suffeceritque ea, quae in quamplurimis, iisque melioribus, satis constantia inveni, memorasse. Atque ad hunc Diaphragma se habet modum, cujus inferior amplitudo tota peritoneo obducta, praeterquam ubi hepar nudum contingit juxta cavam: superior (sed tantum qua cor & pulmones spectat) pericardio in medio, ab utroque latere pleura. Et firmat partes illas peritonei, pleurarum, pericardii, cum iis abdomen distinguens à thorace. Peritoneum contrahit, agitque deorsum; ac sic constringit ab hac parte abdomen, ad abdominalium similitudinem, eodem effectu, agens eos extrorsum, depressione viscerum. Dumque ejus tendinem caro deorsum omni ex parte, inque diversa, trahit; ipsaque contractione sua brevior fit, cavum thoracis augetur ad admittendum aërem in inspiratione, maxime ab utroque latere, ubi positi pulmones. Stomachum praeterea constringit, mox supra ventriculum. An vero & cartilagine mucronatam, & costas, quibus insertum, movet? Si movet, non potest nisi retrorsum, spinam versus, infle-

inflectere mucronatam : costas autem & introrsum, id est, tendinem suum versus; & nonnihil fursum trahere; aut retinere, & impedire, ne recedant in exteriora.

Est *Septum transversum*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 35. Columb. de re an. Lib. V. Cap. 21. Arant. Anat. obs. Cap. 34. *Diaphragma*, Laurent. Hist. an. Lib. IX. Cap. 4. & Quaest. 4. Fabric. de Respir. Lib. II. Cap. 8. Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 32. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 8. Highmor. Disq. anat. Lib. II. Part. I. Cap. 7. Pecquet Dissert. anat. Cap. 11. De Marchett. Anat. Cap. 9. Stenon. de musc. & gland. pag. 8. & 10. C. Bartholin. Diaphragm. struct. nov. Verheyen Anat. ann. 1693. Tract. III. Cap. 3. & ann. 1710. Lib. I. Tract. III. Cap. 4. Cowper Myot. Cap. 19. Dougl. Myogr. Cap. 21. Morgagn. Adv. an. V. Anim. 11. & 12. Santorin. Obs. an. Cap. 8. §. 7. 8. 9. & 10. *Le Diaphragme*, Senac, Hist. de l'Acad. Roy. des Scienc. ann. 1729. pag. 118. Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 654. & seq. & 1164. & seq.

## REGIO XV. SUB PECTORE.

## CAPUT LXXXII.

*De Triangulari sterni<sup>a</sup>.*

**M**agna naturae in Triangulari inconstantia est, ut frequenter etiam ne quidem uni eisdemque homini

Qq 3

mini

<sup>a</sup> Vesal. Epit. Fig. musc. v. Q. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 8. β. Cowper. Myot. ann. 1724. Tab. xxxiii.

77. Verheyen Anat. Lib. 1. Tab. 35. Fig. 2. abc.

b Cow-

mini idem sit uterque. Quare minime mirum videri debet, si nostra omni non conveniat descriptio, qui qualem frequentius invenimus, hic trademus. In optimis igitur corporibus quatuor eum capitibus incipere vidimus, à costa quinta, quarta, tertia, secunda, & quidem ab interiore parte principii cartilaginis<sup>b</sup>, quam ad os pectoris porrigunt; non raro etiam ipsius partis osseae extremae. Saepe postremum defecit<sup>c</sup>. Capita satis lata, ab initio tendinea & tenuia, cum non multum progressa, carnea, & sensim crassiora, diu plerumque disjuncta, in aliis conjuncta citius<sup>b</sup>: omniaque oblique descendunt ad os pectoris<sup>b</sup>; primum autem magis transversum; sequentia quo superiora, descendunt rectius. Ex horum conjunctione nata caro tenuis est, sensimque extenuatur, ac desinit in tenuem latumque tendinem, quo se inserit majori parti marginis cartilaginis mucronatae, juxta partem osseam; totique margini osseae partis ejus; post interiori parti extremarum cartilaginum costae sextae, (aliquando & septimae) quintae, quartae, tertiae; finitimaque his ossis pectoris<sup>b</sup>, in quibusdam. Tendo à superiore parte citius nascitur, ob idque longior est: quo inde quaeque pars ejus inferior, eo nascitur tardius, eoque est brevior, ut inferior etiam carne ad finem usque instrui soleat. In aliis tertiae costae cartilagini non inseritur: in aliis nullius cartilagini, sed tantum margini interno ossis pectoris, juxta extremas cartilagine<sup>c</sup>:

<sup>b</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxxiii. 77.

<sup>c</sup> Ver-

nes : in aliis , & ossi pectoris , & quibusdam ex cartilaginibus supra dictis. Tendo in aliis interruptus , & in plures angustos nullo certo ordine fissus. At in aliis unius musculi loco tres <sup>c</sup> , quatuorve , parvi reperti , eo quod capita non confluebant , sed ubi caeterum confluunt , detumescencia , in tendinem singula abibant , primo se inferente mucronatae cartilagini : secundo cartilagini extremae costae sextae , saepe & septimae : tertio quintae , & ossi pectoris finitimo : quarto extremae quartae , alias & tertiae , & finitimo ossi pectoris. In aliis modo postremum tantummodo , modo & proximum distinctum. Semper autem ab inferiore parte tendine suo cum tendine Transversi abdominis conjunctus est <sup>d</sup> : aliquando & carne sua cohaerent. Illam costarum , à quibus oritur , partem , ubi in cartilaginem vertuntur , deprimit , trahitque introrsum : maxime deprimit secundam , sequentes minus & minus , sed eas magis introrsum cogit. Quoniam vero est tanquam continuatio Transversi abdominis , aut certe principiorum ejus à costis <sup>e</sup> , deduxi eum à partibus , quas movere videtur.

Est *Sextus in altero latere thoracem hominis moventium* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 35. *Sextus thoracis* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 20. Fallop. Obs. an.

<sup>c</sup> Verheyen. Anat. Lib. 1. Tab. 35.

Fig. 2. a. b. c.

<sup>d</sup> Verheyen Anat. Lib. 1. Tab. 35.

Fig. 2. c. conjunctus cum d.

<sup>e</sup> Verheyen Anat. Lib. 1. Tab. 35.

Fig. 2. c. d. c. b. a.

<sup>a</sup> Eu-

an. in thoracis musculis. *Qui internae sterni sedi apponitur*, Fabric. de Respir. Lib. II. Cap. 11. *Triangularis*, & *Pectoralis internus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 31. *Triangularis*, Stenon. de musc. & gland. pag. 7. & 10. De Marchett. Anat. Cap. 9. Cowper Myot. Cap. 19. Dougl. Myogr. Cap. 21. Sunt *Sterno-costales* Verheyen Anat. ann. 1710. Lib. I. Tract. VI. Cap. 8. Santorin. Obs. an. Cap. 8. §. 10. *Les Sterno-costaux*, communement le *Triangulaire du sternum*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 697. & seq. & 1162.

## REGIO XVI. LUMBI ET COXAE PARS PRIOR.

### C A P U T LXXXIII.

#### *De Psoa parvo<sup>a</sup>.*

**F**requenter quidem cum in virili, tum in muliebri sexu, non tamen semper, repperitur. Angustiore autem, eodemque tenui, & fere tendineo, initio adhaeret imo margini corporis vertebrae dorsi imae, à latere; itemque ligamento, inter illud corpus, illudque summae lumborum interjecto; & aliquando etiam summo margini summae lumborum: accedit aliquando portio tendinea exilis, à processu transverso imae dorsi. Repperias & alterum principium, angustius, adhaerens lumborum summae margini imo, ligamentoque proxime inferiori: repperias

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxviii. q. Cowper Myot. ann. 1714. Tab. liv. 147.

<sup>b</sup> Eu-

rias, qui duobus principiis oriatur à latere corporis lumborum summae folius, altero à superiore parte ejus, altero ab inferiore, mox ante Psoam magnum. Inde ad ischion descendit, mox carneus<sup>b</sup>, nisi quod qua Psoae magno adjacet, à principio aliquandiu tendinosus sit: & primo quidem paulatim latior, non vero diu post angustior, diu crassior, tum tenuior, & tendinem<sup>c</sup> extrinsecus circa mediam lumborum longitudinem inchoans; qui tenuis, latus, in progressu post primum ortum suum primo sensim angustior, post se rursus magis magisque & lente dilatat, & ad postremum inserit margini ossis coxae, qui summam pelvis oram ante os ilium facit, juxta spinam, quam margo ille supra foramen magnum habet. Ad haec extremum ejus ab externo latere abit in aponeurosem tenuiorem, quae Psoam magnum simul cum Iliaco interno à priore parte, qua ante ischion delabuntur, ambiens, descendit ad inguen, abitque in tendineam femoris vaginam. Lumbos, ut Psoas magnus, erigit, curvat. Pelvem in priora attollit. Coërcet Psoam magnum & Iliacum internum, additque eis robur.

Est *Parvus Psoas*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 41. De Marchett. An. Cap. 19. Cowper Myot. Cap. 32. Dougl. Myogr. Cap. 29. Morgagn. Adv. an. II. Anim. 17. *Le petit Psoas*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 822. & seq. & 1217.

R r

C A-

b Eustach. Tab. xxxviii. q. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. liv. 147. A.  
c Eustach. Tab. xxxviii. q. a. Cow-

per Myot. ann. 1724. Tab. liv. 147. B.

a Eu-



*De Psoa magno .*

**P**soas magnus , quanquam carne multa continua-  
 que à lumbis oriri videatur , distinctis tamen in-  
 cipit capitibus , quae primum subtendinea , lata , te-  
 nuia ; dein paullatim crassiora : sed alia aliis proxime  
 adjacent , & cito commiscuntur. Decem numero  
 sunt , quorum quinque oriuntur à latere corporum  
 vertebrarum aliquot , ligamentorumque , quae inter-  
 jecta corporibus illis : quinque à processibus transver-  
 sis. Illorum superius & ab imo margine dorsi imae ,  
 & à proximo ligamento , & à superiore parte quin-  
 tae lumborum , & aliquando à capite costae duode-  
 cimae , aliquando tantum à superiore parte quintae  
 lumborum : secundum ab inferiore parte lumborum  
 quintae , proximoque ligamento , & à superiore quar-  
 tae : tertium eodem modo à quarta & tertia , eisque  
 interjecto ligamento : quartum à tertia & secunda , liga-  
 mentoque medio : quintum à secunda & prima , & à  
 ligamento medio. Haec à priore & eadem inferiore  
 parte processuum transversorum lumborum : sed ali-  
 quando nullum ab illo summae. Pars ejus prima ,  
 quae tum è capitibus illis juncta est , tum ex eorum  
 implicatione nata , se secundum lumbos demittit ,  
 estque summa parte sui tenuis & angusta , post cras-  
 sior

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxviii. rrs. Vefal.  
 Epit. Fig. musc. v. c. dextr. & de  
 H. C. F. Lib. ii. Tab. 8. e. Caf-

ser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab.  
 11. DD. Cowp. Myot. ann. 1724.  
 Tab. iiii. & Liv. 148.

<sup>b</sup> Caf-

fior paulatim, & primum latior, dein angustior, extrinsecus planior. Quae inde sequitur, sensim usque ad finem gracilescit, forma rotundula; seseque porro ab inferiore lumborum parte, sed nonnihil oblique in latus, demittit ad priorem ischii, quae juxta ilium est; delabensque per sinum ejus, ubi aponeurosi Psoae parvi extrinsecus obducta est, pergit, donec se tendine<sup>b</sup>, quem efficit, quemque ab ea parte<sup>b</sup>, qua contingit Iliacum internum, inchoat, inserat extremo, priorique parti trochanteris minoris, cum quasi comprehendens. Ad quem tendinem caro accedit ad finem usque, & infra cum quoque ipsi femori se inserit. Exteriori autem hujus Psoae parti, tendinique ejus per longitudinem, Iliacus internus se adjungit<sup>c</sup>, ut tendinem habeant communem<sup>c</sup>. Et cum eodem etiam Iliaco adhaeret capsulae, quae continet articulum coxae. Saepe capita à processibus transversis primae & secundae à sacro, aut & tertiae, oriunda, portionem<sup>d</sup> efficiunt ad ischion usque distinctam. Saepe portio parva, qua Psoas pelvem spectat, fere ad trochanterem usque carnea, ad postremum tamen tendinea, adjacens tendini communi, post jungens se cum eo, citius à parte posteriore, quam priore; ex quo tendo quasi geminus, aut in priora complicatus. Attollit hic Psoas femur in priora, coxam deprimit: simul autem fe-

R r 2

mur

b Caffer. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab.

31. E. Cowper Myot. ann. 1724.

Tab. Liv. inter 148. &amp; 149.

c Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

Liv. 148-149.

d Eustach. Tab. xxxviii. s. dextr.

a Eu-

mur per exteriorem partem retrorsum rotat ; coxam per priorem introrsum , si eam , dum firmatum femur , moveat. Lumbos quoque in priora simul & in latus curvat , retrorsum curvatos erigit.

Est *femur moventium sextus* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 38. & 56. *Quintus femoris* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 28. *Lumbaris* , sive *Psoas* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 41. *Lumbalis musculus* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 22. Bartholin. Anat. ref. Lib. IV. Cap. 11. *Psoas magnus seu Lumbalis* , Cowper Myot. Cap. 32. *Psoas magnus* , Dougl. Myogr. Cap. 39. Morgagn. Adv. an. II. Anim. 17. *Le Psoas, ou Lombaire interne* , Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 464. & seq. & 1077.

## C A P U T . LXXXV.

*De Quadrato lumborum <sup>a</sup>.*

**Q**uadratus lumborum è duabus fibrarum seriebus, origine & progressu inter se diversis, finemque tantummodo ex parte eundem habentibus, fit. Una, eaque praecipua, à superiore & eadem anteriore parte cristae ilium, mox à posteriore mediae longitudinis ejus; & à ligamento, quod à processu transverso vertebrae lumborum imae ad os ilium extrans-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxviii. p. dext. & Tab. xxxix. n. Vesal. Epit. musc. Fig. v. d. dext. & Fig. iv. l. sin. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 8. E. &

Tab. 14. P. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 13. N. & Tab. 6. P. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. III. 103.

b Eu-

transverso pertinet; oritur<sup>b</sup>, principio lato, crasso, tendineo. Mox id in ventrem vertitur tumidulum, sensim modiceque angustiolem, & oblique spinam versus adscendentem, eamque antequam attingat, abeuntem in tres, quatuorve portiones tendinosas, quae sensim & angustiores & exiliores, adnectunt se imae parti extremorum processuum transversorum secundae, tertiae, quartae, quintaevae lumborum: supra has, deinde exili tendineo fine pertingentem ad inferiorem partem lateris corporis vertebrae dorsi imae, juxta costam duodecimam: post lato, eodemque extenuato, ac tendinoso, ad internam partem marginis inferioris costae modo dictae, non longe à capite ejus primo: aliquando etiam lato & tendineo ad imum marginem lateris corporis dorsi secundae, alioque angustiore ad ejusdem processum transversum, alio denique latiore ad imum internum marginem costae undecimae, qui est supra finem ejus, quem pro vasis intercostalibus habet, juxta caput primum. Altera series oritur à superiore parte extremorum processuum transversorum trium, quatuorve primarum à sacro, aut tantum secundae & tertiae; tot capitibus, à principio satis latis, diuque tenuibus & tendineis, dein carneis, ac sensim crassioribus; quae decurrunt ante partes, quae insertae processibus transversis: inque latus oblique adscendunt, & ad priorem seriem se adjungunt. Nul-

R r 3 la

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxix. n. a. & Tab. xxxviii. p. a. dextr.  
<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxviii. p. b. dextr. & Tab. xxxix. n. b.

<sup>a</sup> Eu-

Ia hujus secundae seriei pars ad processus transversos lumborum pertingit. Utilitas Quadrati est, lumbos curvare in latus, coxam attollere, deprimere costas, ad quas pertinet.

Est *nonus*, & *decimus dorsum moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 38. *Primus dorsi musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 19. *Sexti paris dorsi*, Fallopp. Obs. an. in dorsi musculis. *Quadratus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 33. *Paris lumborum quadrati*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 11. *Quadratus lumborum*, Cowp. Myot. ann. 1694. Cap. 24. *Quadratus*, Dougl. Myogr. Cap. 29. *Quadratus lumborum*, Cowp. Myot. ann. 1724. Cap. 24. *Le Quarré des lombes, ou Lombarre externe*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 815. & seq. & 1215. 1216.

## C A P U T LXXXVI.

*De Iliaco interno <sup>a</sup>.*

**T**anta Iliaci interni à principio amplitudo, quanta ossis ilium ante sacrum. Nam ab ilium, qua abdomini obversum, parte superiore tota, statim infra cristam <sup>b</sup>, descendit; & ubi haec à priore parte definit, ab ejusdem ossis ora priore, tum ab ambitu interno, ac porro ab inferiore parte radices tuber-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxviii. u. Vesal. Epit. musc. Fig. v. f. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 8. A. Casser. Tab. 2p. Spigel. Lib. IV. Tab. 31. II.

Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LIV. 149.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxviii. u. *aa*,

c Cow-

tuberculi, quod ex eadem illa ora eminet; atque etiam à vicina capsae articulum coxae continentis: aliquando & parva portione à superiore parte ossis sacri, quae proxima ossi ilium. Principium crassius, qua ab ipso osse; tenuius qua ab ora priora, & à tuberculo, & à capsâ procedit. Extrinsecus autem apparet ab initio tenuis, intumescens deinde donec per inguen descendit, post detumescens: paulatimque se simul angustat. Cum ad ischion venit, per sinum ejus sub aponeurosi Psoae parvi cum magno descendit, quanto inde porro descendit, eo gracilior, eoque magis formam quasi teretem assumens. Conjungit<sup>c</sup> se cum Psoa magno, partemque tendinis communis efficit. Eademque, atque ille, nobis praestat, nisi quod lumbos non flectat, & paullo etiam magis femur illa sui parte, quae est à latere Psoae illius, vertat, coxamque magis introrsum deprimat. Ab eo portionem quandam aberrare vidimus, quae oriebatur ab ora ossis ilium, mox infra tuberculum, à quo Rectus cruris; descendebat secundum externum Iliaci latus, designebatque ad obliquam illam femoris lineam, quae mox infra trochanterem minorem eminet, & à qua Vastus internus incipit. Erat portio lata & tenuis, sensim angustior, sensim crassior, in fine tenuior.

Hic se primum nobis offert singulare naturae artificium, in aliis quoque musculis, ut in singulis memorabitur, observatum. Ubi Iliacus cum Psoa magno se demittit ab ischio ad femur, ibi bursam, vel

ve-

<sup>c</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LIV. 148-149.

<sup>a</sup> Ve-

vesicam quandam fabricata est, nullibi neque interruptam, neque patentem; à posteriore parte adhaerentem sinui ischii, per quem mododisti musculi delabuntur; infraque cum priori parti capsae, quae continet articulum coxae; à priore tum tendini communi eorundem musculorum, tum vicinae carni; inter ea sic complicatam, pressamque, ut pars ejus prior posteriorem ex toto contingat; magnam, tenuem, laxam, obsequiosam, intus humore quodam lubricante superinunctam. Quo fit ut musculi illi ad sinum ischii, capsamque, facilius ac promptius moveantur.

Est *Septimus femur moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 56. *Sextus femoris*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 28. *Iliacus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 41. *Iliacus internus*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 22. Cowper Myot. Cap. 32. Dougl. Myogr. Cap. 39. *L'Ihaque*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. s. 469. & seq. & 1078.

## REGIO XVII. CIRCA PERINAEUM VIRI.

### C A P U T LXXXVII.

#### *De Acceleratore<sup>a</sup>.*

**U**t pharyngis Constrictores pharyngem, sic Accelerator principium bulbi urethrae, qua is eminet,

<sup>a</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. Cap. 49. Fig. 1. H. I. Bidloo Tab. XLVII. Fig. 5. H. Cowper Myot.

ann. 1694. Fig. 12. C & ann. 1724. Tab. XVII. 7. A. & Tab. XIX. 7. Santorin. Tab. III. Fig. 5. D.

<sup>a</sup> Cow-

net, amplectitur, per ejus latus incedens, donec per ejusdem longitudinem ab inferiore parte alter se cum altero in medio jungat, continuetque. Est ligamentum quoddam duriusculum, quod à superiore parte urethrae, priusquam illa à vesica procedens penem subeat, sensim incipiens, sensimque plenius, decurrit ad penem, toto decursu adhaerens urethrae superiori parti, eamque peni alligans, ad quem ibi, ubi coeunt capita corporum ejus spongiosorum majorum, pertinet: ab eo, per longitudinem ejus totam, atque adeo juxta superiorem partem lateris urethrae, musculus hic sua posteriore parte oritur; continuoque inde tractu, ab inferiore parte capitis, quo corpus spongiosum majus incipit; & ab inferiore corporis ipsius<sup>b</sup>, cum id jam procedit per penem: qua vero parte à pene oritur, ortus ejus proximus est corpori spongioso minori. Quocirca latus est ab initio, à quo & tendineus, ac valde tenuis, post carneus & crassior, at tenuis tamen, fitque paulatim angustior. Ejus fibrae posteriores magis transversae, & brevissimae: sequentes ut priores, etiam obliquiores, magisque retrorsum tendentes, & longiores. Ubi igitur in quem diximus loco dexter cum sinistro coit, fibrae eorum angulos faciunt<sup>c</sup>, posteriores quidem vix, prope è directo convenientes; sequentes ut ab his longius distant, minores. Et ubi coeunt, saepe tendinei sunt, & tanquam tendinea linea

Sf

nea

<sup>b</sup> Cowper Myot. ann. 1694. Fig. xii.

c. &amp; ann. 1724. Tab. xvii. 7. a.

<sup>c</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

xvii. 7. A. &amp; Tab. xix. 7.

d. Sans



nea<sup>d</sup> discriminati. Atque ex utrisque fit vagina<sup>a</sup> quaedam musculosa, quae sua posteriore parte, quo dicitur modo, innexa Sphincteri ani externo, bulbum urethrae, id est, principium corporis spongiosi minoris, cujus imae, mediaeque parti juxta Sphincterem firmiter adhaeret, continet, comprimit; itaque tendit totum illud corpus, in erectione penis: comprimit pariter partem illam urethrae, ac per eam fluentem urinam, itemque, rigido maxime pene, semen ejicit; inprimis cum contracto simul Sphinctere externo, pars ejus posterior firmatur. Videtur autem haec vagina non modo comprimere, sed etiam in priora agere, quoniam à priore parte suae originis, duobus, & iis satis longis, à pene procedens mucronibus, iis per latera urethrae, ambientibus eam, aliquandiu retrorsum incedit, donec eos conjungat sub ea<sup>e</sup>.

Est *Primus penis musculus*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 49. Columb. de re an. Lib. V. Cap. 24. Laurent. Hist. an. Lib. V. Cap. 37. *Accelerator*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 38. *Inferior, sive urethram trahens*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 12. *Musculus urethrae*, Riolan. Anim. in Vessing. pag. 65. *Dilatator urethrae, sive Accelerator seminis, & urinae*, de Marchett. Anat. Cap. 6. *Urethram dilatans*, de Graaf de vir. org. pag. 143. *Accelerator urinae*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 3. Dougl. Myogr. Cap. 3. *Acceler-*

<sup>d</sup> Santorin. Tab. III. Fig. 5. D.  
<sup>e</sup> Bidloo Tab. XLVIII. Fig. 5. H. Cow-

per Myot. ann. 1724. Tab. XVII.  
7. 2.

a Vc.

*celerator*, Morgagn. Adv. an. III. Anim. 40. & Adv. IV. Anim. 20. *Accelerator urinae*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 3. *Accelerator*, Santorin. Obs. an. Cap. 10. §. 7. *Le Bulbo-Caverneux*, Winsl. Exp. an. Trait. du bas-ventre, §. 571. & seq.

## CAPUT LXXXVIII.

*De Erectore penis.*

Caput corporis spongiosi majoris comitatur, infra illud ortus<sup>b</sup> ab interiore parte tuberis ischii, paullo ante quam id in os pubis abeat. Vidimus alterum principium infra praecedens ab eodem tubere procedere. Parvus est, oblongus, ab initio tendineus, tenuis, angustus; mox carneus, paullatim & latior & crassior, insertus<sup>c</sup> capiti, quod comitatur, qua id pubis ossi non adjacet, fere ab ejus capitis principio, quoad illud ad penem incedit, aliquando etiam paullo ultra; sensim, dum se inserit, tenuior, & tum extrinsecus, tum ubi se inserit, tendinosus. Hoc itaque caput eodem tempore trahit & deorsum, & retrorsum, & modice in latus: quo & idem facit brevius, premitque, ac corpus spongiosum, cum id sanguine turgēt, magis tendit, ad erigendum, rigidumque efficiendum penem.

S f 2

Est

<sup>a</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. Cap. XLIX. Fig. 1. K. L. Bidloo Tab. XLVII. Fig. 5. F. Cowper Myot. ann. 1694. Fig. x. D. & Fig. XII. F. & ann. 1724. Tab. XVII. 8. B. & Tab. XIX. 8. F. Santorin. Tab.

III. Fig. 5. E.

<sup>b</sup> Santorin. Tab. III. Fig. 5. E.

<sup>c</sup> Cowper Myot. ann. 1694. Fig. XII. F. & Fig. x. D. & ann. 1724. Tab. XVII. b. Bidloo Tab. XLVII. Fig. 5. F.

<sup>a</sup> Eu-

Est *Tertius*, & *quartus penis musculus*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 49. *Posterior penis musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 24. *Erector*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 38. *Collateralis*, sive *penem erigens*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 12. Highmor. Disquis. an. Lib. I. Part. 4. Cap. 3. De Graaf de vir. org. pag. 143. *Penis erector*, Verheyen Anat. ann. 1693. Tract. II. Cap. 22. *Erector penis*, Cowp. Myot. Cap. 3. Dougl. Myogr. Cap. 3. *L'Ischio-Caverneux*, Winsl. Exp. an. Trait. du bas-ventre, §. 569.

## REGIO FOEM. GENITALIS MULIEBRIS AMBITUS.

### C A P U T LXXXIX.

#### *De Constrictore cunni* <sup>a</sup>.

**P**er genitalis muliebris ambitum, ab altero ejus latere, atque ad figuram ejus incedit. In latere posterioris partis cunni, ab ejus corporis spongiosi initio oritur, pertenuis ibi & tendineus, accipiensque fasciculum à proxima Sphincteris ani externi parte. Inde carneus, & tantum paullo crassior, totusque latitudinis tantummodo modicae, per latius introitus cunni, posteaque pone nympham, adscendit ad clitoridem, circa quam rursus tendineus, tenuiorque; cujusque se cruri, finitimaque corporis parti

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xiv. Fig. 1. M. De Graaf de mul. org. Tab. III. Fig. 2. E.E. & Tab. xii. mm. & nn. Cow-

per Myot. ann. 1724. Tab. xviii. II. Santorin. Tab. II. Fig. 1. G.

<sup>a</sup> Eu-

ti inserit. Cunnum contrahit, ejusque corpus spongiosum, cui extrinsecus assidet, premit, comprimit, & cum turget, stimulante venere, tendit.

An est *Orbicularis musculi*, suis fibris carnis, sinum (muliebrem) undique obvolvens, Arant. Anat. obs. Cap. 38. pars unius lateris? Est *Clitoridis inferior Latus*, & *Planus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 39: vid. & Animad. in Bauh. p. 137. & in Barthol. Cap. 34. Lib. I. *Portio carnea in externa parte ipsius vaginae*, de Marchett. Anat. Cap. 7. *Alius musculorum paris, quod clitoridi à plerisque adscribitur*, de Graaf de mul. org. Cap. 3. p. 25. *Vaginae musculi constrictorii*, Verheyen Anat. ann. 1693. Tract. II. Cap. 26. & ann. 1710. Lib. I. Tract. II. Cap. 28. pars unius lateris. Eadem *Sphincteris vaginae*, Cowper Myot. Cap. 3: vide & in *Erectore clitoridis*, ibid. *The second muscle belonging to the clitoris*, Dougl. Myogr. Append. concerning the muscles of the clitoris, &c. *Sphincteris vaginae*, Santorin. Obs. an. Cap. 11. §. 3. pars unius lateris. *L'autre muscle du clitoris*, Winsl. Exp. an. Trait. du bas-ventre, §. 636. & 637.

## CAPUT XC.

*De Erectore clitoridis* <sup>a</sup>.

**E**rector clitoridis Erectori penis, salva magnitudinis, qua inferior est, differentia, respondet, capiti

S f 3

<sup>a</sup> Eustach. Tab. XIV. Fig. 1. N. De Graaf de mul. org. Tab. XI. ik. & Tab. III. Fig. 1. GH. & Fig. 1. C.

Bidloo Tab. LI. Fig. 1. E. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XVIII. 10. Santorin. Tab. II. Fig. 1. E.

<sup>a</sup> Eu-

piti corporis spongiosi clitoridis, sicut ille penis, insertus, ad ulus eisdem.

Est clitoridis *musculus satis manifestus*, &c. Fallopp. Obs. an. in uteri cervice. Clitoridis *exilis musculus tensioni dicatus*, Laurent. Hist. an. Lib. V. Cap. 37. *Superior rotundus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 39. *Musculus, qui ab osse coxendicis oritur*, &c. de Graaf de mul. org. Cap. 3. pag. 24. *Clitoridis musculus*, Verheyen Anat. ann. 1693. Tract. II. Cap. 29. & ann. 1710. Lib. I. Tract. II. Cap. 31. *Erector clitoridis*, Cowper Myot. Cap. 3. *The first (belonging to the clitoris)* Dougl. Myogr. App. concerning the muscles of the clitoris, &c. *L'Ischio-Caverneux*, Winsl. Exp. an. Trait. du bas-ventre, §. 635.

## REGIO XVIII. CIRCUM ANUM.

### C A P U T XCI.

#### \* *De Sphinctere externo ani.*

**S**phinctere ani externo vir à foemina aliquantum discrepat. Primum autem qualis viro <sup>a</sup> sit, trademus; dein quid differat ab eo foemininus. Anum sub tegumentis communibus ambit, latus, tenuis, panniculo adiposo quasi adnatus. Itaque cum anus fissurae instar oblongus sit, fibras quoque Sphincter habet in ovatam figuram ei circumductas <sup>b</sup>, praesertim

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvi. r. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xix. 14. 14.

Santorin. Tab. III. Fig. 5. PQRST.

<sup>b</sup> Eu-

tim quibus ei proximus : reliquae enim incurva latera sua tum à priore parte ani , tum à posteriore in mucronem colligunt<sup>b</sup> ; & ex utroque latere convenientes , angulos efficiunt acutos : ex quo totus musculus tum in priorem partem , tum in posteriorem paulatim in angustum cogitur. Is vero suo posteriore mucrone aut adhaeret ipse coccygi extremo<sup>c</sup> , aut interventu ligamenti cujusdam , quod ab extremo coccygis anum versus productum. Priore , postquam primo à superiore parte Transversis perinaei & Acceleratoribus implicatus , per perinaeum procedit , exitque in caudam<sup>d</sup> , per medium pergentem perinaeum ; in aliis autem non valde longam , sensim angustiorrem , quasi triangularem , seseque innectentem inferiori parti Acceleratorum<sup>e</sup> , qua illi coeunt inter se : in aliis evanescentem in perinaeo. In aliis caudam illam invenimus longiorem , paulatimque graciliorem , tandemque exili tendine in perinaeo evanescentem. Cutem quae est circa anum , ipsumque anum , contrahit : perinaeum suo priore mucrone trahit retrorsum , eoque firmat Acceleratores , ac premit eosdem , eamque urethrae , quae per perinaeum incedit , partem ; juvatque feminis per eam fluentis , itemque urinae ejectionem.

Foemini<sup>f</sup> anum à priore parte in perinaeo rotundum-

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvi. r.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxvi. r. a.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxvii. q. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xix. 14. infer.

<sup>e</sup> Bidloo Tab. xlvii. Fig. f. Santorin. Tab. iii. Fig. f. S.

<sup>f</sup> Eustach. Tab. xiv. Fig. 1. K. Santorin. Tab. ii. Fig. 1. IK.

g Eu-

tundiore ambitu circumire<sup>g</sup> visus, totum illud spatium, quod inter anum cunisque ostium interjacet, sua tenens latitudine; ubi & portiones dat Constrictoribus cunni, ut Acceleratoribus dat virilis, cui caeterum similis est, & ad cujus etiam similitudinem ab exteriore parte sui prioris ambitus in mucronem abire<sup>h</sup> observatus, evanidum in perinaco, aut circa illud.

Est *Musculus orbiculatus intestino obductus*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 51. *Musculus orbicularis recti intestini sphaister dictus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 27. *Sphincter primus & externus, carnosus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 40. *Constrictor*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 12. *Sphincter ani*, Cowp. Myot. Cap. 5. *Sphincter externus*, Dougl. Myogr. Append. to the account of human muscles, pag. 10. *Sphincter ani*, Santorin. Obs. an. Cap. 10. §. 3. *Les Sphincters cutane's*, Winsl. Exp. an. Trait. du bas-ventre, §. 179. & 185. & seq.

Pars per perinaeum procurrens, videtur esse Levator ani *sextus gracilis & acuminatus*, Riolan. Anth. Lib. V. Cap. 40. Est *l'un des muscles dilateurs de l'uretre*, Littre, Hist. de l'Acad. Roy. des Scienc. ann. 1700. pag. 309. *Urethrae Dilator possicus*, Heist. Comp. an. ann. 1719. §. 345. *Penis musculus triangularis*, Morgagn. Adv. an. IV. Anim. 20. *Urethrae virilis Dilator possicus sive triangularis*, Heist. Comp. an. ann. 1727. §. 345.

C A-

g Eustach. Tab. xiv. Fig. 1. K.

h Santorin. Tab. II. Fig. 1. I.

a In

## CAPUT XCII.

*De Transverso perinaei \*.*

**E**xilis musculus à tubere ischii, juxta ortum Erectoris penis, (clitoridis in foemina) procedit in multis hominibus, adscenditque ut ille, magis tamen transversus, donec in perinaeum perveniat, mox ante anum. Non eodem autem in omnibus se habet modo. In optimis, quae incidimus, fuit à principio tendineus, tenuis, acutus; mox carneus, sensim crassior, sensimque latior, primum autem cito insigniterque, post lentius, non longe à fine extenuans se, interque Sphincterem externum & Acceleratorem interferens, majoremque partem continuans pari sui, partim Sphincteri externo, aut Levatori ani; partimque adjungens Acceleratori. Cum dexter sinisterque simul agunt, anum una cum finitimo perinaeo trahunt retrorsum; simulque anum, & extremum recti intestini aliquantum comprimunt, eo-que juvant excrementorum, cum elapsura sunt, expressionem.

An est *alius musculus ad virgae latus, minimus*, Stephan. de Dissect. Lib. II. Tab. p. 196. not. parerg. expl. D? *Levator ani parvus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 40? Est *Transversus*, Th. Bartholin. Anat. quart. T t ref.

<sup>a</sup> In vitro, Santorin. Tab. III. Fig. 7.  
I. Cowper Myot. ann. 1694. Fig.  
xii. E. & Glandularum quarund.  
descrip. Tab. II. Fig. 1. K. & Myot.

ann. 1744. Tab. XVII. 9. C. & Tab.  
XIX. 9.

In foemina, Santorin. Tab. II.  
Fig. 1. g.

<sup>a</sup> In



ref. Lib. I. Cap. 24. *Transversalis penis*, Cowp. Myot. Cap. 3. *Le Dilatateur, qui part de la partie interieure de la tuberosité*, &c. Littre, Hist. de l'Acad. Roy. des Scienc. ann. 1700. p. 309. *Levator ani parvus, seu externus*, Riol. Dougl. Myogr. Cap. 23. *Penis musculus transversus*, Morgagn. Adv. an. IV. Anim. 21. *Transversalis*, Santorin. Obs. an. Cap. 10. §. 6. *Transversus*, Heist. Comp. an. ann. 1727. §. 345. in nota. *Transversalis urethrae*, Morgagn. Epist. an. I. §. 88. *An le Transversale de l'uretre*, Winsl. Exp. an. Trait. du bas-ventre, §. 184. & *le Transverse*, ibid. §. 573?

In foemina, *Transversalis*, Santorin. Obs. an. Cap.

11. §. 2.

### C A P U T XCIII.

#### *De Transverso altero perinaei <sup>a</sup>.*

**A**Iterum, cui Transversi nomen convenire quodque possit, in idoneis corporibus semper invenimus, eumque tenuem, & latitudinis modicae. Ortus ab interna parte ossis pubis, circa ejus locum illum, qui medius inter ima tuberis ischii pubisque fynchondrosem, procedit introrsum ad perinaeum, seseque continuat pari sui, partimque conjungit cum Transverso praecedente, implicatque corpori illi molli, quod est circum urethram, qua illa parte est ante bulbi initium. Visus est posticae bulbi parti fila

<sup>a</sup> In viro, Santorin. Tab. III. Fig. 5.  
H.

In foemina, Santorin. Tab. II.  
Fig. 1. F.

<sup>a</sup> Vi.

inferuisse. Putamus premere priorem intestini recti extremi partem, eamque simul retrorsum agere, una cum urethrae parte proxima. In foemina visus desinere ad lateralem partem corporis spongiosi cunni, postquam se valde extenuasset.

Est *urethrae Elevator*, sive *Ejaculator*, Santorin. Obs. an. Cap. 10. §. 8. 9. An le Prostatique inferieur, Winsl. Exp. an. Trait. du bas-ventre, §. 575?

In foemina, est *Depressor urethrae*, Santorin. Obs. an. Cap. 11. §. 2.

## CAPUT XCIV.

De Levatore ani<sup>a</sup>.

**H**ic non prorsus idem viro foeminaeque. Utrique amplius. Utrique in pelve oritur ab osse pubis & ischio, per ductum hunc: à pubis ossis illa parte, quae est circa inferiora synchondrosis<sup>b</sup>, per superiora retrorsum circum principium Obturatoris interni, usque ad acutum ischii processum extremum<sup>c</sup>. Ductuque non interrupto oritur, praeterquam circa sinum magni foraminis coxarum ossis, quo vasa nervusque è pelvi exeunt ad interiora femoris, ubi una cum Obturatore interno intercisus. Maxima autem hujus principii pars tendinea est, & valde tenuis; tantum-

T t 2 modo

a Viri, Eustach. Tab. xxxvii. r. Vesal. de H. C. F. Lib. II. Fig. Cap. 51. B. C. Santorin. Tab. III. Fig. 5. GKLM. & Tab. II. Fig. 2. SQPO. Foeminae, Santorin. Tab. II.

Fig. 1. M.

b Santorin. Tab. II. Fig. 2. S.

c Eustach. Tab. xxxvii. r. a. Santorin. Tab. II. Fig. 2. D.

d Eu-

modo enim qua parte ossi pubis circa synchondrosem adhaeret, carneum; quaque ischii processui, subcarneum: & tunc tendinea demum in carnem vertitur, ubi pervenit ad lineam rectam inter duas extremas originis partes, id est, illam quae est juxta synchondrosem, illamque quae juxta ischii processum, ducendam; aut circa illum locum. Tenuis quoque pars carnea, quae fibris modice convergentibus sensim angustata, retrorsum it, circum rectum intestinum se curvans, & ad postremum tendineo fine, aut simplici, aut gemino, inserta priori parti coccygis ossium ultimi <sup>d</sup>, & aliquando etiam penultimi: inter coccygem autem anumque, & per totum quidem illud intervallum, continuata ex altero latere venienti Levatori, tendineo & tenuiore fine <sup>e</sup> mox infra coccygem, caeterum carneo <sup>f</sup>, fibris in ipso coitu angulos facientibus deorsum patulos, praeter paucas, quae rectius ab altero per alterum excurrunt. Jam vero pars <sup>g</sup> praeterea valde tenuis ad eum accedit, quae primum tendinea, deinde carnea, & latitudinis plus minus digitalis, venit ex angulo, in quem caput penis cum corpore spongioso urethrae coit; partimque è finitima interna parte ossis pubis. Haec quoque retrorsum incedit, primum secundum latus bulbi urethrae, post se ad Levatorem adjungit juxta Sphincterem ani externum, ut dubium sit, an ad Levato-

d Eustach. Tab. xxvii. r. Santorin.

Tab. iii. Fig. 5. inter L. & N. &

Tab. ii. Fig. 1. inter O. & E.

e Santorin. Tab. iii. Fig. 5. L. &

Tab. ii. Fig. 2. O.

f Santorin. Tab. iii. Fig. 6. M.

g Santorin. Tab. iii. Fig. 5. F.

vatorem, an Sphincterem pertinere dicenda sit. Unam igitur ambo Levatores taeniam efficiunt, quae circum rectum inprimis ducta, extremis suis pelvi, anguloque penis supradicto, quo memoravimus modo, affixa est; altero à dextra parte, altero à sinistra. Eaque posteriore extremi recti partem trahit in priora simulque modice sursum: constringit simul, excrementaque, per intestinum illud deorsum acta, exprimit; eademque opera ipsum rectum retinet, idemque, expressis excrementis, attollit, restituit. Retinet & coccygem, cumque eum pressa excrementa retrorsum egerunt, retrahit. Ad haec inferiora vesicae, atque adeo & vesiculas seminales, continet; & tum illius, tum harum evacuationem juvare potest. Et pars quoque inferior ejus ad rectum incedens, prostaticam ambit in itinere, proptereaque eam etiam premit, itemque urethram, qua ei prostata adjecta. Si quis vero requirat accuratorem fibrarum decursum, sciat omnes modice descendere, inferiores autem prope transversas esse, sequentes ut superiores, ita descendere aliquanto rectius. Inferiorum aliquae saepe ad Sphincterem externum se adjungunt, cum eo adscendentes in postiora.

Foeminini <sup>h</sup> autem pars inferior se juxta anum curvat sursum, explicatque, & inter anum coccygemque occurrit pari sui, ad latus etiam coccygis perti-

nens, fibris ob id juxta anum prope transversis, ab

T t 3 iis

<sup>h</sup> Santorin. Tab. II. Fig. 1. M.

iis sequentibus , ut sequuntur , adscendentibus magis , rectiusque ; rectissime illis , quae ad coccygem pertingunt , quae & antequam ei se inferant , in extremum tendineum tenue abeunt. Idem antequam ad rectum perveniat , secundum vaginam inferiore parte sui incedit , eique se tam pertinaciter adnectit , ut inferere putares. Idem aliquando angustior est quam virilis , separatione partis inferioris , quae ab osse pubis circa synchondrosem oritur , diminutus ; quae tunc separatus musculus est , qui quibusdam rursus distinctus in duos , se tamen ad postremum ad Levatorem adjunctes. Idem denique vaginam comprimere posse videtur.

Est *Musculus sedem attollens*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 51. *Latus* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 27. *Levator* , Laurent. Hist. Anat. Lib. V. Cap. 34. *Major levator ani* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 40. *Levator* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 12. Velling. Synt. Cap. 3. *Levator ani* , Cowp. Myot. ann. 1694. Cap. 5. *Levator magnus seu internus* , Dougl. Myogr. Cap. 23. An etiam partes ejus in foemina sunt musculi vaginae , Dougl. Myogr. App. concerning the muscles of the clitoris , &c ? Est *Levator ani* , Morgagn. Adv. an. III. Anim. 44. Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 5. Santorin. Obs. an. Cap. 10. §. 2. Heist. Comp. an. ann. 1727. §. 346. *Le Releveur de l'anus* , Winsl. Exp. an. Trait. du bas-ventre , §. 188. & seq. & 379.

Pars tenuis , quae ad eum accedit , est *Alter ac postre-*

*postremus Spliniferis lacertus*, Santorin. Obs. an. Cap.  
10. S. 3.

## CAPUT XCV.

*De Coccygeo* <sup>a</sup>.

**C**occygeus triangulo assimilatus, medius intercedit inter ischii processus acuti apicem ( à cujus interiore parte acuto initio incipit <sup>b</sup> ) marginemque lateralem coccygis <sup>c</sup>, praeter mucronem extremum, totius, ac finitimum sacri <sup>d</sup>, quorum interiori parti se lato sine inserit. Brevis itaque, tenuis praeterea, praeter extrema carneus, à quorum primo sensim crassior, dein usque ad alterum tenuior, & ex interiore parte saepe cito tendinosus. Ima parte sui incedit secundum summum marginem Levatoris ani, tanquam si transversa scissura ab eo separatus esset: à superiore autem parte in progressu suo adhaeret interiori parti marginis inferioris ligamenti illius, quod ab acuto ischii processu deductum ad sacrum. Coccygem retinet, & in priora flectit, ischii processum versus: retrorsus actum restituit. Imam sacri partem ad coccygem alligat, pariterque retinet. Intestinum rectum, cum valde distentum, premit, reprimitque.

An *Quintus levator ani*, Riolan. Anthr. Lib. V.  
Cap. 40? Est *Coccygaeus*, Dougl. Myogr. Cap. 40.  
*Mus-*

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvi. f. Cowper  
Myot. ann. 1724. Tab. xlv. 106.  
<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvi. f. g.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxvi. f. γ.  
<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxvi. f. β.

<sup>a</sup> Eu-

*Musculus coccygis*, Drake Anthr. Book IV. Chap. 7.  
*Levator coccygis*, Morgagn. Adv. an. III. Anim. 45.  
*Musculus coccygis*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 24.  
*Triangularis coccygis*, Santorin. Obs. an. Cap. 10. §. 2.  
*Le Sacro-coccygien, ou Coccygien postérieur*, Winsl. Exp.  
 an. Trait. des muscl. §. 821. & 1219.

## C A P U T XCVI.

*De Curvatore coccygis.*

**F**uerunt, quibus ab utroque latere musculus parvus, oblongus, angustus, tenuis, majorem partem tendineus, gemino capite incipiebat, altero ab interiore & eadem inferiore & laterali parte corporis imi ossis sacri; altero, quod in alio bifidum, ab interiore eademque laterali coccygis primi; descendensque, tribus extremis desinebat ad eandem partem coccygis ossiculi secundi, tertii, quarti, praecipue quarti, extremo insigniore, tendineo, quo dexter cum sinistro conjunctus erat. Curvatore appellare libuit, quoniam coccygem curvat: curvat autem in priora. Inveni eum in tribus: in alio imperfectiorem, & degenerantem; in aliis non musculo, sed ligamento similem.

## C A P U T XCVII.

*De Sphinctere interno ani<sup>a</sup>.*

**S**phincter internus ani annulus quidam carneus est, latitudinis modicae, satisque crassus & valens, quem

<sup>a</sup> Eustach. Tab. x. Fig. 2.

<sup>a</sup> Santor-

quem natura intestino recto induit, proxime anum.  
Contrahit anum, constringitque.

An est *Musculus cutaneus & circularis in extrema sedis ora collocatus*, Fallopp. Obs. an. in musculis ani? *Sphincter cutaneus*, Laurent. Hist. an. Lib. V. Cap. 34. *Sphincter cutaneus, ac superficialis*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 40. *Sphincter*, Dougl. Myogr. Cap. 23. *internus*, ibid. Append. to the account of human muscles, pag. 10. *Le Sphincter intestinal ou orbiculaire*, Winsl. Exp. an. Trait. du bas-ventre, §. 180.

## CAPUT XCVIII.

*De Compressore prostatae<sup>a</sup>.*

**H**unc fortasse Levatoris ani partem dicendum esse putabit, qui eum, ut nos saepe, invenerit descedenti ab eo portioni similem. Invenimus etiam plane distinctum ab eo, & proxime supra priorem ejus partem orientem ab interiore ossis pubis, loco inter ima synchondrosis finitimamque superiorem foraminis magni partem fere medio; principior tendineo, eoque tenui & angusto, ut ipse totus tenuis est, & angustus. Incurvo ductu retrorsum it, complectiturque prostatam, inter quam rectumque intestinum aliquando visus per inferiora prostatae evanescere tenuitate magna, aliquando pari sui continuari. Agitque in priora, ac comprimit eam inferiorem prostatae

V v

par-

<sup>a</sup> Santorin. Tab. III. Fig. 5. V.

<sup>a</sup> Eu-



partem una cum illa urethrae, cui pars ea prostatae adjecta.

Est *prostatae Levatoris, seu Adductoris*, Santorin. Obs. an. Cap. 10. §. 5. pars unius lateris. *Le Prostatique supérieur*, Winsl. Exp. an. Trait. du bas-ventre, §. 574.

## REGIO XIX. DORSUM CUM LUMBORUM POSTERIORE PARTE ET CERVICE.

### C A P U T XCIX.

#### *De Cucullari* <sup>a</sup>.

**C**ucullaris peramplus, tenuis, trapezio maxime similis. Latissimus ab initio, utpote à tota illa longitudine, quae ab occipitio ad imam dorsi partem pertinet, sua latitudine incipiens. In occipitio <sup>b</sup> à media crassa ossis occipitis parte, ab eaque saepe per transversum à finitima ejusdem ossis, & à mammillarij, usque ad processum mammillarem: in nucha à pare sui, cum eo cohaerens: dein à ligamento <sup>c</sup> lato & tenui, quod spinis colli adnexum, cervicem distinguit, medium inter dextram sinistramque partem: post

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiv. D. & Tab. xxix. P. & Tab. xxviii. C. Vesal. Epit. Fig. musc. ii. E.F. dext. & Fig. 1. K. sin. & de H. C. F. Lib. ii. Tab. 9. ra. & Tab. 1. G. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 14. AAA & BB. & Tab. 16. AAAB.

Bidloo Tab. xxviii. A. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xlii. 81.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxiv. D-a. Vesal. de H. C. F. Lib. ii. Tab. 9. EF.

<sup>c</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xlii. 22.

post ab extremis spinis vertebrarum, colli imae <sup>d</sup>,  
 dorsique modo octo <sup>e</sup> superiorum, modo novem, aut  
 decem, aut undecim, aut omnium <sup>d</sup>; in quarum in-  
 tervallis dexter cum sinistro cohaeret, itemque pone  
 earundem extrema, quae complectuntur, quibusque  
 pertinaciter affixi. Totum hoc principium tendineum;  
 crassius autem, qua parte adhaeret medio occipitis.  
 Ab eo mox carneus evadit, praeterquam quod pla-  
 gam tendineam <sup>f</sup> ampliorem habeat juxta imam cervi-  
 cem summumque dorsum, aliamque <sup>g</sup> in infimo angulo  
 suo, quo ab inferioribus dorsi vertebis oritur. Perque  
 cervicem, dorsumque, procedit ad humerum, coan-  
 gustans se magis magisque, ac sensim crassior, non  
 longe autem à fine rursus tenuior. In humero implet  
 angulum, qui fit ex clavicula & scapulae processu su-  
 periore cum spina: desinitque ad partem superiorem  
 & eandem posteriorem claviculae <sup>h</sup> longitudinis dimi-  
 diae illius, quae juxta scapulae processum superiorem  
 est; continuoque ad exteriorem marginis superioris  
 processus mododisti, spinaeque <sup>i</sup> scapulae longitudinis  
 paullo minus quam totius. Extremum ejus, qua per-  
 tinet ad claviculam & superiorem scapulae proces-  
 sum, crassius; inde secundum spinam scapulae sensim  
 tenuius: estque maximam partem tendinosum, ten-

V v 2 dinc-

d Eustach. Tab. xxxiv. D.

e Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 9.  
 TA.

f Eustach. Tab. xxix. P. & Tab.  
 xxxiv. D-4. Bidloo Tab. xxvii.  
 infra C.

g Eustach. Tab. xxxiv. D-2. & Tab.  
 xxix. P.

h Eustach. Tab. xxviii. C. Cowper  
 Myot. ann. 1724. Tab. xxii. 81.

i Eustach. Tab. xxxiv. D-87.

k Eu-

dineum <sup>k</sup> autem sua inferiore parte , qua spinæ non longe à basi scapulæ insertum. Fibrarum <sup>l</sup> præterea decursus hic : superiores descendunt oblique ad claviculam , inferiores adscendunt ad spinam scapulæ , ex mediis , quæ à confinio cervicis & dorsi , prorsus transversæ sunt ; quibus quo tum superiores , tum inferiores propiores , eo etiam magis sunt decursu similes. Itaque & diversis partibus suis diversimode movet scapulam cum clavicula , easque vel ad caput retrorsum attollit , vel recta retrorsum trahit , vel deprimit , scapulamque vertit : in universum tamen , cum se totus contrahit , agit retrorsus. Diceres autem sua superiore parte caput quoque & collum movere posse , trahereque occiput humerum versus , ac simul convertere in latus , collum eo versus flectendo , torquendoque.

\* Est *Secundus scapulam moventium* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 26. *Cucullaris* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 15. *Trapezus* , Riolan. Anth. Lib. V. Cap. 23. *Cucullaris* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 13. *Cucullaris* , & *Trapezius* , Cowper Myot. Cap. 20. Dougl. Myogr. Cap. 24. *Le Trapeze* , Winsl. Hist. de l'Acad. Roy. des Scienc. ann. 1719. pag. 49. & Exp. an. Trait. des muscl. §. 140. & seq. & 897. & seq.

C A-

<sup>k</sup> Eustach. Tab. xxxiv. D-ζ. & Tab. xxix. P. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. xvi. juxta BG. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XLII.

81. G.

<sup>l</sup> Eustach. Tab. xxxiv. D. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XLII. 81.

a Eui-

## CAPUT C.

*De Latissimo dorso.*

**P**eramplus quoque est Latissimus dorso, quippe cum magnam dorso partem, lumbumque, ex altero corporis nostri latere velet. Per spinæ primum longitudinem oritur, ab extremis spinis dorso vertebrarum inferiorum octo, aut septem<sup>b</sup>, aut sex, aut quinque, aut tantummodo quatuor; omniumque lumborum<sup>b</sup> & ossis sacri<sup>b</sup>; & à sacri processibus obliquis, qui sunt à latere hiatus, in quem spinæ canalis exit: hinc per latus, à principio Glutei magni, cum quo scilicet connexus; dein ab exteriori margine partis mediae cristæ ossis ilium<sup>c</sup>: ab exteriori denique parte costarum<sup>d</sup> quatuor inferiorum, in latere corporis; & quidem prope à mucrone duodecimæ; ab undecima mox supra ortum à præcedente, sed paullo magis à priore parte; sic & à decima, paullo magis à parte priore, quam qua ab undecima; & à nona paullo magis, quam qua à decima. Tanta principii latitudo. Sensum deinde, sensimque angustior fit, ad humeri ossis superiorem partem procedens, ut prope finem latitudinis sit præter propter pollicaris: in fine enim rursus aliquanto latior, latescensque tum

V v 3

in

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiv. G. & Tab. xxxix. R. & Tab. xxxii. L. & Tab. xxxi. S. & Tab. xxx. E. Vesal. Epit. Fig. musc. 11. K. dext. & Fig. 1. R. dext. & de H. G. F. Lib. 11. Tab. 9. O. & Tab. 10. Θ. & Tab. 1. N. & Tab. 2. Γ. Casser. Tab. ap.

Spig. Lib. iv. Tab. 16. CCD. Bidloo Tab. xxvii. K. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. xlviii. 113.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxiv. G.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxiv. G-ζ.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxi. T. T. T.

<sup>e</sup> Ve-

in superiorem, tum in inferiorem partem. Insertus\* priori parti eminentiae, quae sinum ossis humeri, per quem descendit tendo Bicipitis brachii, à posteriore parte terminat, aliquantum infra capitis superioris ossis illius tuber inaequabile minus: inque ipso sinu occurrit tendini Pectoralis, eique se ex parte continuat. A dorso autem ad dictam illam humeri partem procedens, inferiorem scapulae angulum complectitur<sup>f</sup>, posteaque adscendit: & qua angulum illum praeterit, ibi aliquando fasciculum<sup>g</sup> carneum ab ejus posteriore eademque inferiore parte accipit. Margo superior<sup>h</sup> usque ad scapulae angulum prope transversus, leviter lunatus; post se sursum flectit insignius: fibrae<sup>i</sup> sequentes quo inferiores, rectiores; adscenduntque magis: quae à costis, jam fere recte adscendunt: quae à nona, quodammodo etiam retrorsum. Pars principii, quae à spina, Gluteo, osse ilium, tendo<sup>k</sup> est tenuis, à superiore parte non ita valde latus, & primo quidem deorsum versus paulatim angustior, mox latior latiorque, suaeque ampliore parte connexus cum communi tendineo principio Serrati postici inferioris, & Obliqui interni abdominis.<sup>l</sup> Quae à costis, carnea, quadriceps: quorum

c Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 7.

O. Eustach. Tab. xxxiii. 15.

f Eustach. Tab. xxxiv. G. Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 10. Y. Bidloo Tab. xxvii. K.

g Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XLVIII. 113. K.

h Eustach. Tab. xxxiv. G-γδ. Bidloo

Tab. xxvii. K.

i Eustach. Tab. xxxiv. G-β. Bidloo Tab. xxvii. K.

k Eustach. Tab. xxxiv. G-α. Cowper. Myot. ann. 1724. Tab. XLVIII. 113. CDEFGHH.

l Eustach. Tab. xxxvi. k-σβ.

quorum capitum primum, quod à costa duodecima oritur, latius; secundum angustius, hoc rursus angustius tertium, hoc quartum; manentque diu distincta, tum à se invicem, tum à reliquo musculo. Ac superius quodque proximo inferiore tegitur: primum parte musculi illa, quae procedit ab osse ilium. Primum aliquando deest. Caro, & qua à tendine, & qua à costis procedit, tenuis, cundo paulatim crassescit, donec subito, sensim tamen, tenuior, in tendinem<sup>m</sup> vertatur, tenuem, robustum tamen, satis longum, & ad humerum, quo dictum loco, pertinetem. Is vero, una cum extremae carnis parte inferiore, se juxta axillam circum inferiorem marginem Teretis majoris in priora sursum flectit<sup>n</sup>, ad cujus deinde interiorem partem applicatus<sup>o</sup>, pergit ad humerum. Et qua cum Terete illo pergit, ab inferiore parte & carne, & tendinea parte conjunctus est cum eo; in fine autem rursus ab eodem distinctus: aliquando totus distinctus. Interque extremos horum duorum tendines bursa tenuis & parva, utrique pertinacissime accreta, per totam eorum latitudinem; earum scilicet genere, qualem primum descripsimus in historia Iliaci interni. In axilla autem ab inferiore parte tendinis Latissimi procedit aponeurosis ad vaginam illam tendineam, quae statim post communia integumenta corporis brachium circumcirca ambit. Addo quod ligamento similis pars quaedam tendinosa, angu-

m Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XLVIII. 113. L.

n Eustach. Tab. xxxiv. G-f.

o Eustach. Tab. xxxiii. 35.

a Eu-

angustaque , & tenuis , oriens à radice tuberis minoris capitis humeri , proxime sinum , per quem incedit Bicipitis brachii caput ; descendat per priorem partem tendinis Latissimi , ubi is se inserit , adnexa ei firmiter , sensim se extenuans , & infra Latissimi tendinem per priora quoque tendinis Teretis majoris excurrentes . Latissimus os humeri trahit deorsum post tergum : idem cum sublatum , deprimit : idem sua posteriore parte dorsum versus conversum , paululum vertit in contrarium : humerum , scapulam , claviculam trahit deorsum in posteriora , sua inprimis parte inferiore : scapulae angulum inferiorem retinet , & ad truncum corporis admovet propius : costas supradictas , firmato humero , praesertim sublato , attollit : eodem magis , & quantum satis , firmato , truncum corporis adducit ad eum .

Est *Quartus brachium moventium* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 23. *Quartus humeri musculus* , Colymb. de re an. Lib. V. Cap. 16. *Quartus musculus movens humerum* , Fallopp. Obs. an. in illis , qui humerum movent. *Latissimus* , *aniscalptor* , aut *dorsalis maximus* , Laurent. Hist. an. Lib. V. Cap. 24. *Aniscalptor* , *aniterfor* , *latissimus* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 24. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 14. *Latissimus dorsi sive Aniscalptor* , Cowper Myot. Cap. 25. *Latissimus dorsi* , Dougl. Myogr. Cap. 30. Morgagn. Adv. an. II. Anim. 11. *Le grand Dorsal* , Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 193. & seq. & 927. & seq.

C A-

## CAPUT CL.

*De Rhomboïdeo majore <sup>a</sup>.*

**R**homboïdeus à spinis vertebrarum dorfi superiorum quatuor <sup>b</sup>, aliquando & ab illa quintae, ac plerumque etiam imae colli <sup>b</sup>, & à latere quidem extremi mucronis earum, in latus ad scapulae basem oblique descendit, totus tenuis, primo aliquandiu tendineus <sup>c</sup>, dein carneus <sup>d</sup> & paullo crassior, sed juxta scapulae basem subito exilior, rursusque tendineus, statimque deinde illi basi insertus <sup>e</sup>, & vel toti, qua inter primum spinae initium angulumque inferiorem interjacet; vel inferiori dimidia parti longitudinis ejus, vel & minori, mox supra angulum inferiorem. Hujus latitudinem, quam ex originis & partis, cui insertus, latitudine aestimare facile, longitudo aliquantum superat; procedensque fit nonnihil angustior. Ubi solummodo inferiori parti basis insertus erat, totam tamen basem sua attingebat latitudine, sed sua se superiore parte tantum secundum eam curvabat, margine tendineo. Aliquando Latissimi

X x

dorsi

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiv. F. & Tab. xxix. O. Vesal. Epit. Fig. musc. 11. O. fin. & de H. C. F. Lib. 11. Tab. 10. I. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. 1v. Tab. 17. B. & Tab. 3. G. Bidloo Tab. xxviii. A. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xli. 82. infer. & Tab. xlii. 82.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxiv. F-αβ.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxiv. F-αβ. & Tab. xxix. O. Casser. Tab. ap. Spigel.

Lib. 1v. Tab. 17. B. & Tab. 3. bb. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xli. 82. inf. & Tab. xlii. 82. IKL.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxiv. F. & Tab. xxix. O. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. 1v. Tab. 17. B. & Tab. 3. G. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. xli. 82. infer. & Tab. xlii. 82. MM.

<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxxiv. F-γδ. Vesal. Epit. Fig. musc. 11. O. fin. & de H. C. F. Lib. 11. Tab. 10. IK.

<sup>a</sup> Eu-



dorsi marginem superiorem non attingentem modo vidimus, sed cum eo etiam cohaerentem. Aliquando ex interiore parte abeuntem in fasciculos distinctos, scapulae fine tendineo insertos. Scapulae basem oblique retrorsum simulque sursum trahit, quo etiam vertit scapulam, sic ut angulus ejus inferior eat retrorsum sursumque, cervix aliquantum in priora deorsum.

Est pars major *Quarti scapulam moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 26. *Quarti scapulae musculi*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 15. *Rhomboidis*, Laurent. Hist. an. Lib. V. Cap. 23. Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 23. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 13. Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 20. *The inferior part of the Rhomboides*, Dougl. Myogr. Cap. 24. Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 20. *La portion inferieure du Rhomboide*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 148. & seq. & 911. & seq.

## C A P U T CII.

*De Rhomboïdeo minore <sup>a</sup>.*

**M**inor à nobis dictus, mox supra majorem oritur, partim à latere extremæ spinæ colli secundæ <sup>b</sup>, frequenter & primæ <sup>b</sup> à dorso; partim à ligamento cervicis, (quod in Cucullaris historia indi-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiv. E. & Tab. xxix. N. Bidloo Tab. xxviii. F. Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

xl. 82. super.  
<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxiv. E.-s.

<sup>c</sup> Eu-

indicatum) juxta spinam tertiae à dorso, plerumque etiam secundae, aut ab illo ligamento solo, juxta secundam & tertiam à dorso; ubi cohaeret cum principio Cucullaris & Serrati postici superioris. Ad scapulam, ut major, decurrit; sed minus descendit, siquidem illam basis partem <sup>c</sup> attingit, quae est juxta nascentem spinam, ubi angulum basis cum ora superiore efficit. Toto ductu angustus, sensimque modiceque angustatus, in fine saepe subito multo angustior: caeterum majori & tenuitate, & tendineo <sup>d</sup> principio, & carne <sup>e</sup> paullo quam principium crassiore, & extremo tendineo tenui subitoque extenuato similis. Nec fere alia ejus quam majoris actio.

Est pars *Quarti scapulae moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 26. *Quarti scapulae musculi*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 15. *Rhomboidis*, Laurent. Hist. an. Lib. V. Cap. 23. *Octavus omoplatae*, Cabrol. Alphab. an. Tab. musc. omopl. *Rhomboidis portio superior prorsus secreta*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 23. Pars *Rhomboidis*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 13. *Quidam musculus nunquam alias à me visus*, Bidloo Anat. Exp. Tab. xxviii. F. Pars *Rhomboidis*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 20. *The uppermost part of the Rhomboides*, Dougl. Myogr. Cap. 24. Cowp. Myot. ann. 1724. Cap. 20. *La portion superieure du Rhomboide*, Winsl.

XX 2

Exp.

c Eustach. Tab. xxxiv. E-β. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xli. 82. super.

d Eustach. Tab. xxxiv. E-α. & Tab.

xxix. N. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. xli. 82. super.

e Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xli. 82. super.

a Eu-

Exp. an. Trait. des muscl. §. 148. & seq. & 911. & seq.

## C A P U T CIIL

*De Serrato postico superiore \**.

**H**ic à ligamento<sup>b</sup> cervicis circa tertiam secundamque colli à dorso spinam, aliquando ab ipsa secunda<sup>c</sup>, semper à prima<sup>d</sup>, & modo à summa dorsi, modo à superioribus duabus<sup>e</sup>, modo tribus, statim post Rhomboideum utrumque, & Cucullarem, cum iis, cumque Splenio capitis, connexus. In latus procedit, descendens simul, & aliquantum latescens. Diuque tendineus<sup>f</sup> & tenuis, dein carneus<sup>g</sup>, carne primum sensim crassiore, post tenuiore, in totum autem tenui, ad postremum fissà, plerumque autem in extrema quatuor<sup>h</sup>, in fine tendinosa, primumque ex interiore parte; quae affixa costae secundae, tertiae, quartae, quintae, ubi hae primum se in priora incipiunt curvare, ibique secundum superiorem marginem earum, ab exteriori parte. Interdum tantummodo extrema talia tria<sup>i</sup> habuit, eaque modo

costae

a Eustach. Tab. xxxvi. c. Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 11. F. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 3. C. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xli. & xlii. 84.

b Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xli. 84-2.

c Eustach. Tab. xxxvi. c. α.

d Eustach. Tab. xxxvi. c. β.

e Eustach. Tab. xxxvi. c. γ.

f Eustach. Tab. xxxvi. c. Cass. Tab.

ap. Spig. Lib. IV. Tab. 3. dd. Cowp. Myot. a. 1724. Tab. xlii. 84. P.

g Eustach. Tab. xxxvi. c. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 3. Cece. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xlii. 84. 234f.

h Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xlii. 84. 2. 3. 4. 5.

i Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 11. F. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 3. c. c. c.

costae secundae , tertiae , & quartae ; modo tertiae , quartae , & quintae inserta. Costas has attollit. Subiectos musculos , quos ambit , continet , firmatque , fasciae instar.

Est *Tertius in altero latere thoracem hominis moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 35. *Tertius thoracis musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 20. *Musculus ad supremam dorsi partem prope cervicem*, Fabric. de Respir. Lib. II. Cap. 11. *Serratus posticus superior*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 31. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 8. Vesling. Synt. Cap. 12. Riolan. Anim. in Vesling. p. 148. Cowp. Myot. ann. 1694. Cap. 21. Dougl. Myogr. Cap. 25. Verheyen An. ann. 1710. Lib. I. Tract. VI. Cap. 6. Morgagn. Adv. an. II. Anim. 15. Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 21. *Le Dentelé postérieur supérieur*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 681. & seq. & 1155. 1157.

## CAPUT CIV.

*De Serrato postico inferiore .*

**T**enuis quaedam aponeurosis <sup>b</sup> à spinis aut tribus , aut duabus inferioribus dorsi , aut à sola ima , omnibus vero lumborum , & ossis sacri , cum Latissimo dorsi abscedens , cum eodem procedit in latus , anteriorem tendinei principii ejus partem convestiens ,

X x 3 cum

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvi. gh. Vesal. Epit. Fig. musc. 11. Y. fin. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab.

<sup>3</sup> F. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xlii. 85.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvi. g.

<sup>c</sup> Eu-

cum eodemque connexa, in lumborum quidem maiore parte ex toto; in superiore autem, finitimaque dorso, tantum à principio. Huic similis altera eodem versus incedit à processibus transversis vertebrarum lumborum, exteriorem partem tendinei principii Transversi abdominis ita vestiens, ut simul ipsi firmiter se adnectat. Ambiant autem, continentque commune principium Longissimi dorso & Sacrolumbalis, vaginae instar, ultra id coeuntes in aponeurosem unam, quae deinde desinit in Serratum posticum inferiorem <sup>c</sup>, & Obliquum internum abdominis <sup>d</sup>. Superior autem Serratus, qui mox carneus <sup>e</sup> effectus, carnea parte ex interiore tendinae nascente, in latus leviter adscendit, tenuis, paullatim latior, findensque se in portiones quatuor <sup>f</sup>, sensim crassiores, in fine tenuiores. Has vero inserit <sup>g</sup> costis inferioribus quatuor, exteriori scilicet parti marginis earum inferioris, fere ubi se à dorso per latus in priora curvant, atque adeo ipsi fere mucroni duodecimae, id est, confinio partis osseae & cartilagineae; aut non longe à cartilaginea. Aliquando defuit, quod costae nonae est: aliquando & quod duodecimae. Latissimumque quod nonae, quod & aliquando latefcit <sup>h</sup> eundo: hoc angustius, quod decimae, similiter aliquando latefcens: rursusque hoc angustius sequens: rursusque quod duodecimae,

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxvi. h.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxvi. i.

<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxxvi. h. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. 211.

85. 11. 12.

<sup>f</sup> Eustach. Tab. xxxvi. h.  $\alpha$   $\beta$   $\gamma$   $\delta$ .

<sup>g</sup> Bidloo Tab. xxviii. in sinistro latere.

<sup>h</sup> Eu-

mae, quod & crassius, at quibusdam tamen valde exile. Imbricatumque alia aliis insident, superiore quoque tegente inferioris proximi partem superiorem. Costas, quibus insertus, deprimit, trahitque retrorsum. Coërcet quoque, & firmat, quos complectitur musculos. Atque ad hunc musculum quodammodo pertinet musculos similiter continens vagina tendinea, quae superiori ejus parti continuata, & ex fibris fere transversis constans, à reliquis dorsi spinis omnibus oritur, velansque Longissimum dorsi, Sacrolumbalem, principiaque vicinorum musculorum, juxta Sacrolumbalem partim costis affixa, partim per Intercostrales evanescit, inque itinere portionem inter Longissimum & Sacrolumbalem immittit.

Est *Quintus in altero latere thoracem hominis moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 35. *Quartus thoracis musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 20. *Musculus ad infimam dorsi partem*, una cum alio musculo exiguo praedicto superposito, Fabric. de Respir. Lib. II. Cap. 11. *Serratus posticus inferior*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 31. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 8. Vesling. Synt. an. Cap. 12. Riolan. Anim. in Vesling. pag. 148. Verheyen Anat. ann. 1693. Traët. VI. Cap. 5. Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 21. Dougl. Myogr. Cap. 25. Verheyen Anat. ann. 1710. Lib. I. Traët. VI. Cap. 8. Morgagn. Adv. an. II. Anim. 15. Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 21. *Le Dentelé postérieur inférieur*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 683. & 1156. 1157.

C A-

## CAPUT CV.

*De Levatore scapulae <sup>a</sup>.*

**Q**uanquam hujus nomen, quo scapulae adjudicatur, retinuerimus, tamen, quoniam in illo-  
rum numero habendum censemus, qui à supe-  
riore trunci parte ad collum adscendunt, à scapula  
historiam ejus ordiemur. Scapula à posteriore parte,  
mox supra primum initium spinæ suæ, oram habet,  
à qua nascitur <sup>b</sup> Levator, principio fere carneo; ad-  
scenditque oblique in priora, angustus, & crassitudi-  
nis modicæ. Primum autem aliquanto latefcens,  
dein sensim modiceque angustior, & à primo tenuior,  
deinde sensim crassior, post abit in partes quatuor <sup>c</sup>,  
paullatim gracilescentes, & ex interiore parte se in-  
tendineam naturam magis magisque vertentes, atque  
ad extremum tendineas; quibus se inserit. Superior  
reliquis crassior & longior, proxima brevior, rursus-  
que proximâ brevior altera, brevissima inferior. Ali-  
quando diu, alias etiam ab ipso usque principio  
musculi distinctæ. Inseritque eas extremis processi-  
bus transversis <sup>d</sup> quatuor superiorum colli vertebræ-  
rum: atlantis priori eidemque inferiori parti, ubi  
solet

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvi. d. Vesal. E-  
pit. Fig. muscul. 11. G. fin. & Fig.  
111. N. fin. & de H. C. F. Lib.  
II. Tab. 11. C. & Tab. 7. H. Cow-  
per Myot. ann. 1724. Tab. xli.  
& xlii. 81.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvi. d. a.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxvi. d. β. γ. δ. ε.  
Cassier. Tab. ap. Spigel. Lib. IV.  
Tab. 17. 1. 2. 3. 4. Cowp. Myot.  
ann. 1724. Tab. xlii. 83. N. N.  
N. N.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxvi. d. βγδε.

solet cohaerere cum extremo Splenii colli, & Scalenii medii : epistrophiaci inferiori & priori , cohaerens simul cum extremo Splenii colli, ibidem inserto : duarum reliquarum extremo cornu posteriori ; alias quartae imo lunato margini , conjunctus cum tendine Cervicalis descendens , qui ad eundem processum definit. Inveni , qui praeterea dabit aliam graciliorem , pertinentem ad quintam à capite vertebra. Inveni contra , qui tantum habebat partes tres , pertinentes ad vertebrae tres superiores. Ipse ab inferiore parte à Cucullari devinctus , & ob id curvatus : eum cum superavit , ascendit rectius. Cervicem in illud , in quo ipse collocatus , latus , ac simul aliquantum retrorsum inflectit. Scapulam suspensam tenet , attollitque in priora : sed eodem eam tempore vertit , quoniam tantummodo trahit partem ejus superiorem & eandem posteriorem , eo ipso cervicem ejus faciens nutare.

Est *Tertius hominis scapulam moventium* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 26. *Tertius scapulae musculus* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 15. Sunt *Levatores proprii* , Laurent. Hist. an. Lib. V. Cap. 23. Est *Levator* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 23. *Scapulam attollens* , levator , *patientiae musculus* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 13. *Levator scapulae* , Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 20. *Elevator seu musculus patientiae* , Dougl. Myogr. Cap. 20. *Levator scapulae* , Morgagn. Adv. an. II. Anim. 14. *Le Releveur propre de l'omoplate* , Winsl. Hist. de l'Acad. Roy. des Scienc. ann. 1719.



p. 50. *Levator scapulae*, Cowper Myot. ann. 1724.  
 Cap. 20. *L'Angulaire*, dit communement *Releveur propre*, Winfl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 152. & seq. & 914. seq.

## C A P U T CVI.

*De Splenio capitis <sup>a</sup>.*

**P**leraque corpora, quae secuimus, Splenium capitis ab illo colli distinctum habuere; quaedam conjunctos in unum<sup>b</sup>, maxime ab initio. Capitis<sup>a</sup> autem, de quo primum dicitur, oritur à ligamento cervicis<sup>c</sup>, juxta spinam colli à dorso quintam, quartam, tertiam, secundam, aliquando & sextam: dein ab ima colli spina<sup>d</sup>, saepe & à summa dorfi<sup>d</sup>, aut & à proxima ab ea, aut & altera; statim post Serratum posticum superiorem & Cucullarem, ut cum ipsis etiam cohaereat. A ligamento, principio lato, & frequenter diversimode fisso: gracili ab ima colli, similibusque ab illis dorfi. Eaque primo tendinea ac tenuia, sed cito carnea, & per carnem extrinsecus aliquantum tendinosa, confluunt in musculum oblongum, latum, crassum; qui in latus oblique adscendit, eandem prope latitudinem servans, primo crassescens sensim, sed dein extenuatus, tenuior qua nucham spectat,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvi. c.

<sup>b</sup> Vesal. Epit. Fig. musc. 11. E. fin.  
 & de H. C. F. Lib. 11. Tab. 12. f.  
 Casler. Tab. ap. Spigel. Lib. iv.  
 Tab. 4. B. Bidloo Tab. xvi. AA.

Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XLIII. 88.

<sup>c</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XLI. 88-aa.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxvi. c-a. inf.

c. Cowp.

stat, quam ab altero latere; in fine <sup>e</sup> tendinosus, latior, insertusque posteriori & eidem laterali externa parti processus mammillaris <sup>f</sup>, per ejus longitudinem totam; indeque retrorsum ossi mammillari <sup>f</sup>, ac vicino occipitis <sup>g</sup>, fere usque ad locum inter radicem processus mammillaris mediumque occiput medium. Capitis partem, ad quam pertinet, retrorsum inclinat oblique spinam versus, eodemque curvat cervicem. Cum vero rigida cervix, caput collo recte insitens convertit, occiput agens in oppositam illi, cui insertus, partem: conversum, sic ut facies directa sit in oppositum ei, ad quod pertinet, latus, vertit in contrarium.

*Est Primi paris musculorum aut caput, aut primam vertebrae moventium, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 28. pars, quae in occipitium finit. Pars Primi caput moventis, Columb. de re an. Lib. V. 17. Primi moventis caput, in occipitium implantata, Fallopp. Obs. an. in capitis musculis. Pars ejus, qui à recentioribus anatomicis ante alios descriptus, Eustach. de motu cap. Splenii, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 21. Triangularis, Splenii, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 7. Superior Splenii, Cowper Myot. Cap. 22. Splenii, inserta processui mammillari, &c. Dougl. Myogr. Cap. 26. La portion supérieure du Splenius, ou Mastoïdien postérieur, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 710. & seq. & 1179. & seq.*

Y y 2

C A-

c Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. XLIII. 88. EE.

f Eustach. Tab. XXXVI. c-γ.

g Eustach. Tab. XXXVI. c-β.

a Eu-

## CAPUT CVII.

*De Splenio colli <sup>a</sup>.*

**S**plenius colli secundum latus externum praecedentis incedit. Itaque & infra eum oritur <sup>b</sup>, à dorsi spinis superioribus tribus, vel quatuor, vel quinque; aliquando non à summa, neque à proxima: & quidem à quot vertebis, totidem principiis tendineis, planis, & quasi in fibras laxius cohaerentes distinctis. E quibus mox carnis effectis, (superiore autem citius, sequentibus tardius tardiusque; omnibusque ex interiore parte fere citius, quam ab exteriori) paulatim crassioribus, confluentibusque, fit musculus non valde latus, sensimque ac modice angustior, sensim modice crassior primum, dein tenuior; qui extremis, in quae desinit, duobus <sup>c</sup>, iisque longis, gracilescens, versisque in tendines, ex interiore parte primum incipientes, longos, planos, decrecentes, pertingit ad extremos processus transversos duarum superiorum colli vertebrarum; ad extremi sextae inferiorem partem; septimae autem maxime eminentis mucronis priorem partem, quod extremum aliquando in duo aut aequae, aut inaequaliter fissum: accedente aliquando summi tertio, sed multo exiliore, pertinente ad extremam posteriorem partem tuberculi posterioris quintae. Quod ad sextam pertinet, cohaeret

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvii. c.<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvii. c.-e.<sup>c</sup> Casser. Tab. ap. Spiegel. Lib. iv.

Tab. 4. in B. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xliii. 88. D. D.

haeret cum Transversali cervicis , & Levatore scapulae: quod ad septimam , cum eodem Levatore , Scaleno medio , & Intertransversario posteriore sexto. Cervicem in posteriora curvat , torquetque , medium dorsum versus.

Est *Primi paris musculorum aut caput , aut primam vertebam moventium* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 28. pars , quae *in transversos vertebrae processus nexum molitur*. Pars *Primi caput moventis* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 17. *Primi moventis caput , in processus transversos inserta* , Fallopp. Obs. an. in capitis musculis. Pars ejus , qui à recentioribus anatomicis ante alios descriptus , Eustach. de motu cap. *Splenii* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 21. *Triangularis* , *Splenii* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 7. *Inferior Splenii* , Cowp. Myot. ann. 1694. Cap. 22. *Splenii* , inserta vertebrae colli , Dougl. Myogr. Cap. 26. Morgagn. Adv. an. II. Anim. 12. *Inferior Splenii* , Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 22. *La portion inferieure du Splenius , ou Mastoïdien posterieur* , Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 710. & seq. & 1179. & seq.

## CAPUT CVIII.

*De Biventre cervicis<sup>a</sup>.*

**B**iventrem quoque cervicis à Complexo saepe vidimus distinctum , aliquando autem non<sup>b</sup>. Principi-

Y y 3

cipi-

<sup>a</sup> Vesal. Epit. Fig. musc. iv. LM. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 14. AB CD. Caser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 4. CC.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxviii. a. Bidloo Tab. xvi. FF. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XLIII. 89.

c Caf-

cipia <sup>c</sup> vidimus habentem quatuor , quae procedebant à processibus transversis vertebrarum dorsi , sextae à collo , quintae , quartae , tertiae ; aut in aliis à septimae , sextae , quintae , quartae ; à posteriore & eadem superiore parte tuberis , in quod desinunt : oblonga , gracilia , gracillimo inferiore , ab initio tendinea , mox carnea , & per carnem extrinsecus , in primis autem ab interiore parte muscoli , diu tendinosa , sensim crassiora. Vidimus quinque talia habentem , incipientia ab octava , septima , sexta , quinta , quarta à collo ; quorum superius , duoque inferiora , valde erant exilia. Vidimus tria habentem , à quinta , quarta , tertia. Vidimus tantum duo habentem , à sexta & quinta. Eorumque aut unum , aut plura , frequenter cohaerent cum principiis Transversalis cervicis. Directo autem ordine procedunt , coeuntque in ventrem <sup>d</sup> unum , qui praeterea fasciculum gracilem à Longissimo dorsi accipere solet , paulatimque gracilescens , in tendinem <sup>e</sup> juxta cervicis initium vertitur crassum , quique & ipse primo gracilescit , post se dilatat , rursusque in carnem <sup>f</sup> abit crassiorem , seseque , dum pergit , sensim dilatantem , & primo sensim crassiorem , dein tenuiorem , donec extremo tenui , & fere carneo , desinat <sup>g</sup> ad ossis occipitis partem posteri-

<sup>c</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 4. C. inter.

<sup>d</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. ii. Tab. 13. AB.

<sup>e</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. ii. Tab. 13. inter B. & C.

<sup>f</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. ii. Tab. 12. CD.

<sup>g</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. ii. Tab. 13. D. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 4. C. super.

posteriorem, ad latus mediae, paullo infra quam ubi Cucullaris incipit. Quocirca biventer est, & à dorso ad occiput adscendit. Aliquando ventres sua se carne continuant<sup>h</sup>, tantum ibi, ubi in aliis tendo est, ab exteriore parte tendinosa, ibidemque in aliis tantummodo juxta externum latus. Venter secundus plagam amplam tendineam extrinsecus circa medium longitudinis suae habere solet. Ad eundem adjungere se solet portio<sup>i</sup> gracilis, quae oriens à latere spinæ superioris dorsi, aut imae colli, reliquis hujus musculi principiis similis est, magis tamen carnea: se autem ad illam ejus partem adjungit, quæ spectat spinas vertebrarum. Aliquando duæ tales, quarum altera à summa dorsi spina, altera à secunda oritur; aliquando tres, tertia oriente à tertiæ spinæ, se conjungunt in unam, ad eandem ventris ejusdem partem accedentem. Aliquando accedit ad tendinem. Cervice rigida, caput super summam vertebam flectit in posteriora. Cervicem rectam, cum nihil impedit, in eandem partem curvat, sed simul nonnihil oblique in illud latus, ubi situs. Caput in priora pendulum attollit, erigens cervicem.

Est *Secundi parvis caput moventium*, primus musculus, cum secundo, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 28. Pars *Secundi musculi capitis*, Columb. de re an. Lib. V. Cap.

<sup>h</sup> Ut fere in Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 4. CC.

<sup>i</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab.

15. inter B. & C. Eustach. Tab. XXXVII. 2. 3.

Cap. 17. *Secundi moventis caput*, Fallopp. Obs. an. in capitis musculis. Vid. Eustach. de motu cap. *qui bos* (à recentioribus anatomicis ante alios descriptos) *sequuntur*, &c. Pars *Complexi*, Riolan. Anth. Lib. V. Cap. 21. *Primus musculus*, cum *secundo*, *Trigenini*, aut *Compositi*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 7. Pars *Complexi*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 22. Dougl. Myogr. Cap. 26. Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 22. Pars ejus, qui *le Complexus*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 716. & seq. & 1182. & seq.

## C A P U T C I X.

*De Complexo<sup>a</sup>.*

**P**lura autem Complexo capita<sup>b</sup>, qui & latior est, crassiorque. Eaque continua serie vertebra affixa; tria inferiora posteriori & eidem superiori parti extremorum processuum transversorum dorsi à collo tertiae, secundae, primae: quartum eidem imae colli, juxta obliquum adscendentem: reliqua processibus obliquis colli subsequens aliquot; nempe quintum adscendenti secundae à dorso, descendenti tertiae; sextum adscendenti tertiae, descendenti quartae; septimum adscendenti quartae, descendenti quintae: adscendentium autem radice exteriori & eidem posteriori parti, inde usque ab initio transversis; continu-

oque

<sup>a</sup> Vesal. Epit. Fig. musc. iv. N. dext.  
& de H. C. F. Lib. II. Tab. 12.  
GG. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib.

iv. Tab. 6. BB.  
<sup>b</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv.  
Tab. 5. B. infer. & Tab. 6. A.

c Casser.

oque descendantium margini laterali externo , à parte posteriore : integuntque capsas horum articulorum , iisdemque pertinaciter adhaerent. Quibusdam deest caput , quod à tertia dorfi à collo procedit. Quidam contra abundant duobus , procedentibus à quinta , & quarta à collo. Ab initio sunt tendines carne referti , tenues , nec valde lati ; quorum quisque superior subiecto sibi proximo brevior , magis in fasciculos distinctus , magisque carneus , praesertim ex interiore parte. Quibusdam illud , quod ab ima colli , valde exile : iisque etiam aliud caput datum erat , oriens partim à processu obliquo adscendente imae colli , partim à descendente secundae à dorso. Ubi plura praeter solitum accedunt à dorfi vertebrae , haec fere graciles à principio tendines sunt. Adscendunt omnia oblique spinas versus , sed quo quodque longius venit , rectius. Increscunt sensim , & tendineo principio , & carne ex eo nata. Convergent , seseque tandem conjungunt , & efficiunt carnem multo latiore quam crassiore , diuque crassescentem , post se extenuantem , & sensim ex angusta , ut nova accedunt capita , latiore ; acceptoque capite ultimo , sensim ad finem usque angustiore : quae ad caput porro adscendit , ipsa in progressu extrinsecus plagas habens tendinosas <sup>c</sup>. Atque se ad postremum ossi occipitis , mox infra eum locum , ad quem desinere praecedentem diximus , inserit <sup>c</sup> , ibi subtendi-

Z z

nea.

c Casser. Tab. ap. Spiegel. Lib. iv. Tab. 5. B.

a Eu-



nea. Caput & collum flectit ut Biventer praecedens, at obliquius tamen in latus.

Est *Secundi paris caput moventium*, quartus musculus, *moles carnea*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 28. Pars *Secundi musculi capitis*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 17. *Secundi moventis caput*, Fallopp. Obs. an. in capitis musculis. Pars *Complexi*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 21. *Carnea quaedam moles*, quae Trigemino adjungitur, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 7. Pars *Complexi*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 22. Dougl. Myogr. Cap. 26. Cowp. Myot. ann. 1724. Cap. 22. Pars ejus, qui *le Complexus*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 716. & 1182. & seq.

## C A P U T CX.

*De Trachelomastoïdeo<sup>a</sup>.*

Huic quoque capita multa<sup>b</sup>, parum dissimilia. Septem ad summum, oriunda à processibus iisdem, à quibus Complexus, cum ejus etiam capitibus ab initio cohaerentia in collo. Plura habentem nondum vidimus, frequenter autem pauciora, deficientibus vel tribus inferioribus, vel duobus, vel infi-

mo

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxix. h. & Tab. xxxvii. b. Vesal. Epit. Fig. musc. iv. O. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 12. E. F. Casler. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 5. A. Cowper Myot. ann. 1694. Fig. viii. d. &

ann. 1724. Tab. XLIII. par tertium Falloppii.

<sup>b</sup> Ut in Tab. Casler. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 5. aa. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XLIII. par tertium Falloppii.

c Eu-

mo solo, vel eo quod à processibus obliquis secundae & tertiae colli à dorso, vel eo quod proxime supra hoc. In alio quatuor invenimus, eorumque primum oriens à processu transverso dorsi secundae à collo; secundum à primae; tertium ab obliquo adscendente primae colli à dorso, descendenteque secundae; quartum ab adscendente quartae, descendente quintae. Aliorum principium tendineum, aliorum tendinosum, aliorum latius, aliorum angustius, aliorum crassius, tenuius aliorum: nam certa in his non constat ratio. Omnia adscendunt, & paulatim intumescunt. Eo autem quodque brevius, quo superius; eoque in carnem abit tardius, qua se conjungunt. Efficiunt deinde musculum brevem, tenuem, angustum, sensim modiceque latiore, similiterque crassiorem; verum deinde rursus extenuatum, in fine tendinosum. A capitibus autem suis primo rectius adscendit, devinctus Splenio colli: supra quem se modice in latus curvans, pergit ad posteriorem marginem processus mamillaris, ad quem post Splenium capitis desinit <sup>c</sup>. Interdum portionem ab ea parte dimittit, qua Complexum spectat, ab ejus externo latere insertam capiti. Ejus caput superius aliquando insignius, diuque distinctum. Adde quod ejus infimum caput, saepe qua cum secundo jam connexum, ab exteriori parte accipiat portionem tendineam insignem à Longissimo dorsi; aliquando & alteram exiliorem ab eodem. Plerumque etiam cum Transversali cervicis connexus

Z z 2

est,

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxvii. b-a. & Tab. xxxix. b-β.

a Eu.

est, & vel magnam partem, vel tantum portione carnea exigua. Aliquando Transversalis portio quaedam carnea se ad interiorem tendineae Longissimi, quam diximus, adjungit; & cum ea ad caput inferum Trachelomastoidei. Videas & cum Complexo conjunctum, portione exigua. Cervicem in posteriora & simul aliquantum oblique in latus curvat, trahens eo, inclinansque capitis, cui insertus est, partem.

Est *Secundi paris caput moventium*, musculus tertius, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 28. Pars *Secundi musculi capitis*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 17. *Tertius movens caput*, Fallopp. Obs. an. in capitis musculis. Eorum, qui (duos, à recentioribus anatomicis ante alios descriptos) sequuntur, portio, quae externam sedem occupat, Eustach. de motu cap. Pars *Complexi*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 21. *Tertius musculus Trigemini, aut Compositi*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 7. Pars *Complexi*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 22. *Trachelomastoidaeus seu capitis par tertium Fallop.* Dougl. Myogr. Cap. 26. Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 22. *Le petit Complexus, ou Mastoïdien latéral*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 720. & seq. & 1189.

## C A P U T C X I.

*De Transversali cervicis<sup>a</sup>.*

**T**ransversalis cervicis à dorso ad cervicem ascendit. Frequenter sex tendinibus oritur, ab extremis

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvii. d. Vesal. Epit. Fig. muscl. iv. P. dext. & de H.

C. F. Lib. II. Tab. 13. H.

<sup>b</sup> Eu-

tremis processibus transversis <sup>b</sup> vertebrarum dorsi superiorum sex , qua illi dorsum spectant , ibique à parte superiore : aliquando adhuc uno à septimae , alioue ab imae colli. Sed in aliis oriuntur à dorsi superioribus quinque , imaque colli. In aliis ab octava , septima , sexta , quinta , quarta , tertia à collo : in quibus etiam plures ab inferioribus vertebribus accedere vidimus , aliquando unum à nona , aliquando adhuc duos , à decima , & undecima. Quibusdam unus alterve è mediis deest : vidimus orientem à septima , quinta , quarta , tertia , prima à collo , & ab ima colli. Eorum vero inferior longissimus , sequentibus ut superioribus , ita brevioribus : inferiores graciles , superiores aliquando latiores , & quasi in fibras distincti ; aliquando tantum tendinosi. Eundo insigniores , paulatim carnei evadunt , perque carnem illam ex interiore parte diutius excurrunt , efficientes eam tendinosam : ipsa caro paulatim crassior. Capita haec alia aliis incumbunt , ad postremumque conjunguntur carne sua. Ex quo natus venter latefcit , ac modice primum intumescit , dein detumescit : perque eum , alioquin carneum , quinque tenues latique , & aliquando circa imum collum nascentes tendines , quorum superiores insigniores , ab exteriori parte decurrunt ; qui sensim crescentes , divergentesque , & fere ad finem usque carni adhaerentes , inferunt se parti inferiori & eidem posteriori cornu posterioris extremorum processuum transversorum colli à dorso secundae ,

Z z 3

tertiæ ,

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvii. d-a. a. a. a. a.

<sup>a</sup> Eu.

tertia, quarta, quinta; inferiori eidemque posteriori extremi sextae, quo cohaeret cum extremo Splenis colli. Quibusdam tendines illi non prius nascuntur, quam cum jam fere ad processus illos venit: quibusdam tantummodo quatuor sunt, portione, quae ad secundam vertebam pertinet, fere tota carnea. Quartus saepe extrinsecus accipit tendinem à Longissimo dorsi; aliquando & quintus, sed exiliorem: sed in aliis portio illa Longissimi ad ipsum ventrem accedit, majorem partem carnea. Quintum aliqui non habent. At alii contra sex extrema habent, sexto pertinentes ad partem inferiorem & eandem priorem processus transversus atlantis: hoc autem in aliis est Intertransversarius colli posterior sextus. Caro juxta cervicis initium plerumque portionem quandam Trachelomastoïdeo impertit, quae se aliquando primum conjungit cum Longissimi dorsi portione, unaque cum ea effecta portione adjungit ad Trachelomastoïdeum. Ubi se inserit, aliquando plane cum Cervicali descendente connexum invenimus. Fit ut tendinum, quibus incipit, aliqui cum illis Biventris cervicis conjuncti sint. Cervicem in latus simulque in posteriora curvat oblique.

Est *Quintus & Sextus dorsum moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 38. *Tertius cervicis musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 18. *Secundi paris dorsi musculorum principium prius*, Fallopp. Obs. an. in dorsi musculis. *Transversarius*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 22. *Transversalis*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap.

Cap. 7. *Le grand Transversaire du col*, Winfl. Exp.  
an. Trait. des muscl. §. 766. & seq. & 1197.

## CAPUT CXII.

*De Cervicali descendente.*

**A** posteriore inaequabili parte curvaminis insigni-  
oris costarum quatuor, sextae, quintae, quar-  
tae, tertiae; aut trium, & vel sextae, quintae,  
quartae, vel quintae, quartae, tertiae, vel quartae,  
tertiae, secundae; aut tantummodo quartae & ter-  
tiae, aut quintae & quartae, non longe ab ea parte  
earum, qua contingunt processus transversos, incipit  
procedere. Incipit autem tot tendinibus longis &  
gracilibus, (quorum superior brevissimus, gracilli-  
musque; sequentes, ut sequuntur, longiores & cras-  
siores) sensim crassioribus, sensim carneis, carne  
etiam incrementa sensim capiente, & plerumque ab  
exteriore parte diutius tendinosa. Quin & venter,  
quem confluendo in unum efformant, primum mo-  
dice intumescit, post vero se extenuat. Idem pri-  
mum paullo latior, mox angustior, brevis, scin-  
dit se in portiones quatuor; ex quibus brevior, te-  
nuiorque infima; quae supra hanc, ut quaeque ea-  
rum superior, ita longior & crassior. Gracilescent  
autem, inque tendines graciles, ex interiore parte  
earum primum nascentes, versaе, sine suo pertin-  
gunt ad processus transversos vertebrae colli secundae,  
tertiae, quartae, quintae à dorso; seseque imae  
parti extremi cornu eorum posterioris affigunt: quae  
quar-

quartae; ea frequenter conjuncta cum extremo Levatoris scapulae, ad vertebrae eandem pertinente. Aliquando, cum tantummodo duobus aut tribus capitibus incipiebat, tamen in quatuor caudas abibat, ad processus, quos diximus, pertinentes: aliquando tantum in duas, quas inferebat processibus tertiae, & quartae. Capita inferiora saepe cum Sacrolumbali diversimode cohaerent. Ab eo ad infimum saepe accedit portio carnea insignis. Ab ejusdem tendine ad costam secundam pertinente, vidimus tendinem abscedere, inque carnem versum accedere ad caput Cervicalis summum. Qui aliquando adeo se eidem Sacrolumbali implicat, ut pars ejus esse videatur. Ejus certe portionum, quas à costis accipit, continuatio est. Cervicem curvat, fere ut Transversalis, cum quo adscendit. An & costas attollit, quando cervix firmata?

Est *Secundi paris dorsi musculorum secundum principium, à costa, &c.* Fallopp. Obs. an. in dorsi musculis. Pars superior *Cervicalis descendens*, de Diemerbroek Anat. Lib. V. Cap. 6. *Sacrolumbalis* pars superior, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 21. *Cervicalis descendens* Diemerbr. Dougl. Myogr. Cap. 25. *Sacrolumbi ea superior pars, quam Diemerbroekius Cervicalem descendentem musculum vocat, &c.* Morgagn. Adv. an. II. Anim. 15. *Sacrolumbalis* pars superior, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 21. *Le Transversaire grele, ou Transversaire collateral du col*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 768. & 1197.

C A-

## CAPUT CXIII.

*De Longissimo dorſi , & Sacrolumbali.*

**H**i à principio diu in unitatem conjuncti , dein diviſi , contigui tamen , per lumbum dorſumque adſcendunt ; Longiſſimus etiam ulterius per cervicem ad caput uſque. Sic fit ut unum referant <sup>a</sup> , caudas habentem duas , eaſque longas. Craſſior hic ante diviſionem , & paullatim , modiceque latior , caudis in univerſum decreſcit magis magisque. Origo ei à criſtae <sup>b</sup> offis ilium parte eadem & poſteriore & ſuperiore & interiore ; dein à tuberculis duobus ſuperioribus , quae ſunt juxta hiatum extremi canalis offis ſacri ; dein ab ejuſdem offis ſpinis <sup>c</sup> tribus ſuperioribus ; ſpinis denique vertebrarum lumborum <sup>c</sup> , aut omnium , aut inferiorum quatuor , aut trium : interque criſtam ilium & tubercula offis ſacri , ligamento , quod à criſta ad poſticam ſacri partem deductum , pertinaciter adhaeret ; eaque parte cohaeret cum Gluteo magno. Qua ab oſſe ilium incipit , à latere corporis carneus <sup>d</sup> eſt & craſſus , à parte ſacri tendineus <sup>e</sup> & craſſus , ſed carnea parte tenuior ; in confinio partis carnea & tendineae extrinſecus tendineus , intrinſecus carneus : tendineus , tenuiorque , qua cum Gluteo cohaeret : tendineus & craſſus , qua

A a a oriſtur

<sup>a</sup> Eufſtach. Tab. xxxvi. l. Veſal. Epiſt. Fig. muſc. iv. R. S. dext. & de H. C. F. Lib. ii. Tab. 12. K N A. Caſſer. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 4. GLL†. Cowper Myot.

ann. 1724. Tab. viii. 102-86.

<sup>b</sup> Eufſtach. Tab. xxxvi. l. a.

<sup>c</sup> Eufſtach. Tab. xxxvi. l.

<sup>d</sup> Eufſtach. Tab. xxxvi. l. β.

<sup>e</sup> Eufſtach. Tab. xxxvi. l. a.

† Eu-



oritur à tuberculis sacri : tendineus <sup>c</sup> pariter , qua à spinis sacri & lumborum , sed interruptus , constansque ex distinctis tendinibus , longis , crassis , latis , ac mediis fibris tendineis carneisque connexis inter se. Itaque & à parte spinarum quoad oritur , prope totus tendineus <sup>c</sup> est , tenuiorque , quam in latere corporis , ubi carneus <sup>d</sup> , carnea parte & ab ossè ilium oriens <sup>e</sup> , & ex interiore parte tendineae sensim enascente , per cujus deinde exteriorem partem tendinea sensim evanescit. Dum ascendit per lumbum , portiones <sup>f</sup> decem ab ea parte , qua processibus transversis incumbit , exserit , duabus ad unamquamque lumborum vertebrae pertinens , & ex his altera ad totam ferme longitudinem processus transversi , ab inferiore parte ; altera ad imum tuberculum , quod est juxta posteriorem partem radices processus ejusdem ; & plerumque etiam ad finitimam inferiorem eandemque posteriorem processus obliqui ascendentes : omnes ascendentes , carneas , ab initio crassas , paulatim graciliores , extenuatasque in finem tenuem , fatiscens latum , & vel totum tendineum , vel tendinosum. Cum deinde costam ultimam conscensurus est , scindit <sup>h</sup> se in Longissimum & Sacrolumbalem , quorum insignior Longissimus.

Et Longissimus <sup>i</sup> dum pergit , tanquam in multas

f Eustach. Tab. xxxvi. 13-4.

g Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xiv. Fig. 2. b. b. b.

h Eustach. Tab. xxxvi. 1-37. Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 12. L. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab.

4. †.

i Eustach. Tab. xxxvi. 1-8. & Tab. xxxvii. h. Vesal. Epit. Fig. musc. iv. S. dext. & de H. C. F. Lib. 11. Tab. 12. N. & Tab. 13. f. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 4. G. H.

k Eu-

caudas <sup>k</sup> absumitur, quarum <sup>l</sup> duodecim inserit dorſi vertebrarum proceſſibus tranſverſis extremis<sup>l</sup>, unius eorum cujuſque poſteriori & eidem inferiori parti unam: alias <sup>m</sup>, quarum incertus numerus, coſtis aliquot, exteriori ſcilicet earum parti, poſtquam illae non longe à proceſſibus tranſverſis reſeſſere: poſtrema per cervicem adſcendit. Quas vertebriſ inferit, ſenſim gracileſcunt. Earundem quaeque ut ad ſuperiorem vertebraſ pertinet, ita longior: ita & graciliores ple-  
raeque, praeter ſuperiores aliquot, quae plerumque craſſiores. Prima deſinit in extremum craſſum, partim carneum, partim tendineum, & ex interiore parte citius tendinoſum. In ſimile, ſed inſignius, ſecunda, tertia, ſaepe & quarta, & quinta. Reliquae, ut & aliquando quarta & quinta, in longum, anguſtumque, & planiorem tendinem, ex interiore earum parte citius incipientem, & eo longiorem, quo eſt ſuperioris caudae: earumque aliquas, praefertim ſuperiores, vidimus ſe in duas, treſve findere portiones, in tendines abeuntes. Quas inferit coſtis, faſciculi tenues ſunt, paullatimque tenuiores, & primo plerumque anguſtiores, in fine latiores; alias ad finem uſque anguſtiores: omneſque nonnihil oblique in latus adſcendunt, eoque quiſque fere longior, quo ſuperioris coſtae eſt. Maximus earum portionum numerus, quem adhuc videre nobis contigit, fuit undecim, ſola coſta ſumma nullam accipiente: alias tantum

A a a 2

oſto

<sup>k</sup> Eulaſch. Tab. xxxvii. h. Veſal. de H. C. F. Lib. ii. Tab. xiii. M. M. Caſſer. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. f. x. x. x.

<sup>l</sup> Verheycn L. i. Tab. xxxv. Fig. 1. c. c. m Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. xlv. Fig. 1. & 2. C. C. C. C.

n Cowp.

octo adfuere, nullam habentibus costis tribus superioribus, infimaeque; aut duabus superioribus, totidemque inferioribus: alias septem, nullam habentibus quatuor inferioribus, summaeque: alias pauciores. Inferiorum costarum totae carnae, sequentium in fine tendinosae, superiorum in fine tendinae; primumque ex interiore parte, qua nempe costas spectant, tendinea earum pars incipit; raro in una alterave ab exteriori. Postrema, quae circa dorsi superiora abscedit, gracilis est, & prope teres, paullatimque gracilior, se ad postremum plerumque cum quibusdam cervicis musculis conjungit, Trachelomastoïdeo <sup>n</sup>, Transversali cervicis, Splenio colli, Biventre cervicis, Cervicali descendente. Aliquando autem portione eam insigni ad interiora Splenii colli accedere vidimus, aliaque exiliore ad exteriora Biventris, cujus aliquando primum caput efficiebat, & aliquando etiam Cervicalis descendens, portione tertia. Aliquando vidimus se in extrema tendinea duo findentem, quorum alterum accedebat ad primum principium Trachelomastoïdei, per partem ejus exteriorem latescens, evanescensque: alterum ad exteriorem Transversalis cervicis partem, cum ejus quarto extremo pertinens usque ad processum transversum vertebrae colli quintae à dorso. Saepe etiam tertium tendinem emisit, eumque majorem partem ad principium Trachelomastoïdei desinentem, partim quoque cum quinto extremo Transversalis cervicis coalescentem, & cum eo affixum processui transverso vertebrae colli sextae à dorso. Aliquando postrema

<sup>n</sup> Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. XLV. Fig. 1. & 2. F.

• Eu-

trema haec Longissimi portio simplex fuit, adjungens se ad ventrem Transversalis cervicis. Aliquoties tota exilior, tenuique tendine tantum ad secundae à dorso transversum processum pertinens. In haec vero se paullatim consumens Longissimus, novis capitibus augetur, quorum neque certus numerus, neque locus unde veniunt, neque eadem semper magnitudo. Et enim modo unum, idque insigne, invenimus, à superiore & eadem posteriore parte extremi processus transversi vertebrae dorsi à lumbis tertiae, aut quartae, tendine adscendens longo, crasso, sensim incremente, atque in carnem abeunte, sensim crassior, & ad interiorem partem Longissimi, jam ad finem properantis, accedentem. Modo invenimus simile, verum quinque incipiens tendinibus gracilioribus, ab eadem parte processuum transversorum quinque dorsi vertebrarum, à lumbis tertiae, quartae, quintae, sextae, septimae: quorum & inferiores, & superiores duo erant exiliores; omnes paullatim carnei, carnemque, quae paullatim crassior, conjungentes in unum. Alias invenimus tria talia capita, procedentia à secunda, tertia, quinta. Alias duo, à tertia & quarta, aut quarta & quinta. Alias adhuc unum à septima, sed exilius. Aliquando tantummodo unum, & id non valde insigne, oriens à summa lumborum.

Sacrolumbalis<sup>o</sup> definit in caudas<sup>p</sup> tredecim, quas per

A a a 3 totam

<sup>o</sup> Eustach. Tab. xxxvi. 1-7. Vefal. Epit. Fig. musc. iv. R. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 12. A. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 4. L. LL.

<sup>p</sup> Vefal. Epit. Fig. musc. iv. R. b. c. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 12. M. M. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 3. M. k. k. k. Verheyen An. Lib. I. Tab. xxxv. Fig. 1. b. b. q. Cas-

totam longitudinem suam, alias post alias emittit: quanquam primas duas vel tres commune caput Longissimi & Sacrolumbalis dici possit emittere, quoniam à Sacrolumbali, qua is adhuc conjunctus est cum Longissimo, abscedunt. Duodecim ad costas <sup>q</sup> pertinent; postrema, quae aliquando deficit, ad processum transversum vertebrae imae colli. Omnes crescunt paulatim. Prima crassa est, brevis, in fine subtendinea. Secunda longior, tenuis, lata, in fine tendinea, aut tendinosa. Reliquae paulatim gracilescentes, sese in tendinem vertunt, longum, gracilem, planiorem, qui cito ab exteriori earum parte incipit, quemque eo quaeque habet longiorem, quo costa, ad quam pertinet, superior est: longissimum, quae pertinet ad imam colli vertebrae. Eo & quaeque graciliorem habet, praeter costae primae & secundae, aliquando & tertiae, quae plerumque paulo crassiorem, quam costae proximae inferioris: gracillimum habet imae colli cauda; at quibusdam tamen crassiorem proximis. Decem autem inferiores se inferunt imae parti superficiei inaequabilis, quae est in exteriori parte costarum, non longe à spina dorsi, in ipso earum sese in latus flectentium cubito; quanquam prima saepe ante illam superficiem, propius vertebrae: duae superiores fere juxta tuberculum, cui affixum ligamentum alligans costam processui transverso: duodecima autem, aliquando & costae primae,

q Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv.  
Tab. 3. M-k. k. k. etc. Verheyen

Lib. 1. Tab. xxxv. Fig. 1. b. b.

r Caf-

mae, quo diximus loco; & processui transverso vertebrae dorsii summae: tertia & decima mediae longitudini processus colli imae, ab inferiore & eadem posteriore parte; alias processui extremo. Omnes adscendunt fere recta, & tantummodo aliquantum ad latus declinant. Haec igitur Longissimo satis similis. Portiones praeterea alias<sup>r</sup> ad costas inferiores octo, (aut & pauciores) qua eas contingit, demittit, vel ab eis adscendentes accipit: accipere dicemus, ut Longissimum quasdam à vertebrae diximus. Adscendunt à superiore margine costarum, illaque parte ejus, quae est spinae paullo propior, quam illa, cui extrema hujus musculi inferi docuimus, cum quibus etiam quaedam frequenter cohaerent continuatae. Tenuis sunt, oblongae, latitudinis modicae; fiuntque ex tenuiore principio sensim crassiores. Ima vero caeteris crassior, & latior, & longior esse solet; hac proxima exilior, angustiorque, & brevior; hac altera, hac tertia, ac sic sequentium quaeque, ut proxime sequitur. Inferiores sex tantum ubi costas adhaerent, tendineae, ibidemque latae & planae: duae supremae, cum octo sunt, longo & angusto planoque tendine incipiunt. Omnes qua parte costas contingunt, diu tendinosae, eoque insignius, quo incipiunt parte tendinea insigniore. Ima saepe non reperta. Superiores duae, aut sola summa, in plerisque carne sua cohaerent cum principiis duobus inferioribus

<sup>r</sup> Casser. Tab. 27. Spigel. Lib. 19.  
Tab. 3. M.L.L. & Tab. 4. KK.

d. d. d. &c.

a Eu-

rioribus Cervicalis descendens; cui se diversis praeterea modis implicare Sacrolumbalis solet. Accidit ut aberrantem invenerimus, incipientem scilicet à costa quarta, insertamque processui transverso vertebrae dorsae secundae à collo, eamque ex toto distinctam, & ex gracili longoque tendine se vertentem in carnem, ad postremum rursus in tendineum finem.

Longissimus cum Sacrolumbali lumbos & dorsum in priora curvata retinent, erigunt, flectunt retrorsum, & aliquantum simul in latus. Privatim vero caudae utriusque, quae insertae costis, costas agunt deorsum: qua in re Sacrolumbalis à portionibus, quas accipit, etiamsi à costis ipsis oriundis, adjuvatur.

Longissimus est *Undecimus*, & *Duodecimus* dorsum moventium, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 38. *Secundus musculus dorsae*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 19. *Quinti partis dorsae musculorum*, praeter partem spinis vertebrarum thoracis insertam, Fallopp. Obs. an. in dorsae musculis. *Semispinatus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 33. *Dorsae longissimus*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 8. *Dorsae longissimus*, praeter partem quae inserta spinis thoracis, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 24. *Longissimus*, Dougl. Myogr. Cap. 28. *Longissimus dorsae*, Morgagn. Adv. an. II. Anim. 15. *Longissimus dorsae*, praeter partem, quae spinis thoracis inserta, Cowp. Myot. ann. 1724. Cap. 24. *Le Long dorsal*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 789. & seq. & 1211.

Sacro-

Sacrolumbalis est *Quartus in altero latere hominis thoracem moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 35. *Quintus thoracis musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 20. *Quartus thoracis musculus*, Fallopp. Obs. an. in thoracis musculis. *Sacrolumbus*, Laurent. Hist. an. Lib. V. Cap. 30. *Alius praeterea in dorso musculus, qui cum spinalibus musculis pertinacissime commiscetur*, Fabric. de Respir. Lib. II. Cap. 11. *Sacrolumbus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 31. Spigel. de H. C. F. Lib. II. Cap. 8. Stenon. Obs. an. de musc. & gland. pag. 6. & 10. *Sacrolumbus*, una cum inferiore parte *Cervicalis descendens*, de Diemerbroek Anat. Lib. V. Cap. 6. *Sacrolumbus*, Verheyen Anat. ann. 1693. Tract. VI. Cap. 5. & ann. 1710. Lib. I. Tract. VI. Cap. 8. *Sacrolumbalis*, Cowp. Myot. Cap. 21. Dougl. Myogr. Cap. 25. *Sacrolumbus*, Morgagn. Adv. an. II. Anim. 15. *Sacrolumbalis*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 21. *Le Sacrolombaire*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 779. & seq. & 1205. & seq.

C A P U T CXIV.

*De Spinali dorso<sup>a</sup>.*

Possset hic Longissimi pars dici, ad spinas vertebrarum dorfi pertinens: ita cum eo cohaeret, commistusque est, raro omni ex parte distinctus. Quatuor tendines, quorum inferior longissimus inter eos,

B b b crassif-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvii. 1. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 5.

K. & Tab. 6. G. & Tab. 7. F. sin. Bidloo Tab. xxix. KK.

b Cow-



crassissimusque ; proximus brevior & tenuior , hoc brevior & longe tenuior alter , brevissimus gracillimusque superior ; oriuntur à spinis duarum superiorum lumborum , totidemque inferiorum dorsi vertebrarum : acceditque aliquando gracilior , à tertia à lumbis : aliquando deest , qui à secunda dorsi. Qui in carnem versi , tenuem musculum efficiunt , eundemque non valde latum , & modice in progressu latescentem. Saepe tendines illi , qui à vertebis lumborum procedunt , potius ad Longissimum dorsi pertinent , & fibras carneas ab exteriori parte sui dimitunt<sup>b</sup> , quae hunc musculum una cum carne , in quam abeunt tendines à dorsi vertebis incipientes , efficiunt. Plerumque tendines inferiores se carne , in quam abeunt , commiscunt cum Longissimo : frequentissime etiam imus connexus cum proximo Longissimi. In octo autem extrema abit , aut tantummodo septem , aut & pauciora numero , quibus se inserit lateri extremi fere mucronis spinarum dorsi superiorum. Octo superioribus inserentem se vidimus : frequenter autem non summae , sed ejus quasi loco nonae : aliquando tantum septem primis , quae infra summam sunt , uno extremo diminutum. Plus una vice modo quatuor habuit , pertinentia ad sextam , quintam , quartam , tertiam à collo vertebrae. Alias tria , ad septimam , sextam , quintam ; aut ad sextam , quintam , quartam. Quibusdam unum è mediis defuit. Extremorum inferius brevissimum , exile : quae sequuntur , ut sequuntur ,

b Cowper Myot. ann. 1714. Tab. XLV. Fig. 1. K. inf.

tur, longiora, insigniora. Plerumque in fine tendinea; inferiora quibusdam tantum tendinosa; reliqua eo magis tendinea, quo superiora, ut superiora etiam tendinibus longis desinant, iisque planis, tenuibus, angustis, ab exteriori parte extremorum nascentibus citius, & saepe geminis. Superiorum tendines in fine saepissime connexi cum tendinibus Semispinalis. Cum ejusdem carne ipsa Spinalis caro plerumque leviter connexa. Dorsum cum Longissimo retinet, erigit, flectit in posteriora, eodemque tempore nonnihil in latus. Secundum spinas autem leniter eas versus se curvante ductu adscendit, ob id gibbus eo margine, quo spectat trunci latus.

Est *Quinti paris dorsi musculorum*, Fallopp. Obs. an. in dorsi musculis, pars implantata in spinas vertebrarum thoracis. *Semispinati*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 8. pars, ut videtur. *Dorsi longissimi* pars, quae inserta spinis thoracis, Cowper Myot. ann. 1694. & 1724. Cap. 24. *Le grand Epineux du dos*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 801. & seq. & 1212. 1213.

## CAPUT CXV.

*De Semispinali dorsi.*

**S**emispinalis multis portionibus incipit, in multas definit. Neutrarum, sicut in plerisque consimilibus musculis usuvenit, certus semper numerus. Sex alias inceptit, à posteriore & eadem superiore parte extremorum processuum transversorum vertebrarum

B b b 2 dorsi

dorsi à lumbis secundae, tertiae, quartae, quintae, sextae, septimae; idemque in sex quoque desit, ad inferiorem partem lateris spinarum dorsi superiorum quatuor, collique proximarum duarum, non longe à mucrone earum, pertinentes: aliquando tantum quinque incepit, id est, nulla à septima: aliquando tantummodo quatuor, id est, nulla etiam à secunda; & tamen in sex illos desit. Alias tantummodo quatuor incipiens, à processibus tertiae, quartae, quintae, sextae; in quinque desit, deductas ad quinque spinas, earum, quas modo diximus, superiores. Vidi, qui septem incipiebat; à dorsi septem inferioribus, & in octo desinebat, sex superiores dorsi, imasque duas colli. Primae portiones fere breviores, quo superiores: contra longiores extremae. Primarum exiliores superiores, saepe & infima: extremae contra fere crassiores, ut superiores; summa saepe exilior proxima. Primae, quae aliquando bifidae, ab initio tendines sunt, aut tendines carnosus, qui paulatim crassescunt, carnem producunt modice incrementem, & ab exteriori parte diu tendinosam: eaque se inter se conjungentes, ventrem, paulatim tum latiore, tum crassiore, sed mox rursus imminutum, & in caudas scindentem se, quae capitibus plerumque insigniores sunt, praesertim superiores earum; totaeque sensim decrescunt, abeuntque in tendines planiores, extrinsecus citius nascentes, quorum superiores insigniores, & frequenter connexi cum Spinali dorsi. Est etiam cum Multifido plerumque aliquid commistus, qua ei incumbit. Dorsum, finiti-

finitimamque ei cervicis partem, cum in priora curvata sunt, erigit, & curvat deinde oblique in latus: ad spinas enim oblique adscendit.

Est *Semispinalis*, Dougl. Myogr. Cap. 28. An sunt *les vertebraux externes du Demi-epineux, ou Transversaire epineux du dos*, Winsl. Exp. an. Trait. des mûscl. §. 809. & seq. & 1214? Reliqui non distinxerunt vel à Multifido, vel à Spinali colli; aut accensuerunt partem utrique.

## CAPUT CXVI.

*De Spinali cervicis<sup>a</sup>.*

Ejusdem generis est Spinalis cervicis, Semispinalis continuatio quaedam, Nam ab uniuscujusque sex, vel quinque<sup>b</sup>, superiorum dorsi vertebrarum processu transverso, & à posteriore quidem eademque superiore parte eorum, ad tuberum, in quae desinunt, radicem, tendo, saepe bifidus, procedit, in carnem sensim crassiorem abeuns; vel simile caput, tantum ab initio, & dein extrinsecus, diu tendinosum, itaque plerumque, ut à superiore processu, non totum modo, sed tendinea etiam parte, brevius, crassius autem & latius; supremo tamen saepe exiliore, saepe & proximo. In quibusdam sep-

Bb b 3 tem

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxix. f. Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 14. O. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 6. BB. Bidloo Tab. xvii. M. Cow-

per Myot. ann. 1724. Tab. XLIV. 99.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxix. f. 22.

<sup>c</sup> Cow-

tem capita inventa, oriunda à septem vertebrais, quae proxime infra summam sitae: in quibusdam tantummodo quidem sex, aut quinque; at non à sex, quinqueve superioribus vertebrais incipientia, verum à pari numero proxime infra summam sequentium. Venter<sup>c</sup> ex his capitibus<sup>d</sup> sese in unum conjungentibus natus, latior paullatim, itemque crassior; dein angustior & tenuior, inque quatuor<sup>e</sup> se findens extrema, quae pertinent ad spinas quatuor colli vertebrarum, tertiae à dorso, quartae<sup>f</sup>, quintae<sup>g</sup>, sextae<sup>h</sup>. Insignia haec: praecipuum superius<sup>i</sup>, post quod proximum: aliaque aliis incumbunt. Cui septem numero capita erant, ei & extrema quinque; eoque, quo abundabat, pertinebat ad secundam à dorso. Omnia decrescunt, fiuntque ab ea parte, qua inferius quodque spectat proximum superius, magis magisque tendinosa. In fine fere tendinea, tenuia, modicae latitudinis, praeter superius, utpote crassum, & maximam partem carneum. Atque inferunt se lateri imi marginis extremarum spinarum. Totus musculus ea, qua Semispinalis, obliquitate adscendit, cervicemque in eandem, atque ille dorsum, partem erigit & curvat; flectit praeterea retrorsum. Cum quo aliquando ita conjunctus, ut ambiguum habeas, ad quem proxima capita extremaque referenda sint. Aliquando commixtus cum Multifido.

Vidi

c Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XLIV. 99.

d Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 6. BB-aaa.

e Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XLIV. 99. C. C. C. D.

f Eustach. Tab. XXXIX. f-3.

g Eustach. Tab. XXXIX. f-7.

h Eustach. Tab. XXXIX. f-8.

i Eustach. Tab. XXXIX. f-8. Cowper Myot ann. 1724. Tab. XLIV. 99. D.

a Cow-

Vidi ad ventris ejus partem illam , quae spectat spinas , accedentes fasciculos duos carneos , graciles , longos ; alterum à spina summa dorso ; alterum , qui brevior & gracilior , ab extremo cornu spinae colli tertiae à dorso.

Est pars *Septimi* , & *Octavi dorsum moventium* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 38. *Quarti cervicis musculi* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 18. *Tertii parvis dorso musculorum* , Fallopp. Obs. an. in dorso musculis. *Spinati* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 22. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 7. Est *Spinalis colli* , Cowp. Myot. ann. 1694. Cap. 23. *Spinalis* , Dougl. Myogr. Cap. 27. *Spinalis colli* , Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 23. Sunt *les vertebraux externes du Demi-epineux* , ou *Transversaire epineux du col* , Winsl. Exp. an. Trait. des muscul. §. 769. & seq. & 1198. 1199.

## CAPUT CXVII.

*De Interspinalibus cervicis <sup>a</sup>.*

**S**pinis colli vertebrarum inferiorum sex , interjecti quinque parvi musculi , sed pro magnitudine crassi , quodammodo teretes , nisi quod paullo sint latiores quam crassiores , primum tenuiores , paulum deinde incrementum , post rursus decrescunt , suaeque latitudine à posteriore parte ad priorem pertinentes.

<sup>a</sup> Cowper Myot. ref. ann. 1694. Fig. VIII. L. L. & ann. 1724. Tab.

XLIV. Fig. 1. 100.

b Cow-

tes. Primus à latere superioris partis spinae colli imae, juxta ejus tumorem extremum, procedit ad inferiorem & eandem interiorem partem cornu secundae. Secundus à superiore parte cornu secundae, ad inferiorem & eandem interiorem tertiae. Sic tertius à tertia ad quartam: quartus à quarta ad quintam: quintus à quinta ad sextam. Adscendunt itaque: tres autem medii fere recta: infimus modice ad latus declinat: quintus contra ad parem sui inclinatur; quamquam haec aliquantum cum ipsis spinis differant in aliis atque aliis. Spinarum aliam ad aliam adducunt: sic cervicem in priora flexam erigunt, curvant deinde in partem posteriorem. His aliquando additi supernumerarii<sup>b</sup>. Vidimus unum à spina ima colli ad quartam pertinentem: alium à quarta ad sextam. In aliis ab altero latere unum, modo à spina secunda, modo à ligamento cervicis circa eam, oriundum, pertinentemque ad sextam: ab altero, & eum, quem modo diximus, sed graciliorem; & praeterea alium, à cornu tertiae ad sextae.

Sunt *Interspiniales colli*, Cowp. Myot. ann. 1694. Cap. 23. *Interspiniales* Cowp. Dougl. Myogr. Cap. 27. Morgagn. Adv. an. II. Anim. 15. *Interspiniales colli*, Cowp. Myot. ann. 1724. Cap. 23. *Les petits Epineux du col*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 775. & 1200.

Supernumerarii, a round, slender, and long muscle, &c. Cowper Myot. ann. 1724. Explan. Tab. XLIV. Fig.

<sup>b</sup> Cowper Myot. ref. ann. 1724. Tab. XLIV. Fig. 1. OO. & Tab. XLVI. H.

<sup>a</sup> Eu-

Fig. 1. OO. *Musculus Superfipinalis colli*, ibid. Explan.  
Tab. XLVI. H.

## CAPUT CXVIII.

*De Recto capitis postico majore <sup>a</sup>.*

**S**ed à spina sextae<sup>b</sup>, & ab ea quidem parte marginis  
ejus superioris, quae est juxta radicem cornu,  
aut ab ipso etiam cornu, Interspinalis loco Rectus  
capitis posticus major adscendit, praetereunſque at-  
lantem, se affigit<sup>c</sup> ossis occipitis inferiori parti, cir-  
ca medium inter principium additamenti futurae lam-  
bdiformis, lateralemque partem foraminis magni,  
quae est pone processum coronoïdeum; medio loco  
inter finem Complexi, Obliqui superioris, & Recti  
postici minoris: non adscendit autem recta, sed non-  
nihil oblique in latus. A capite pro corpore crasso,  
non admodum lato, tendinoso, lateſcit ad finem uf-  
que, primoque intumescit, mox sensim se extenuat,  
abeuns in tendinosum finem. Capitis atlantisque  
posteriorem partem deprimit; simulque Atlantem una  
cum capite super epistropheum convertit, ad simili-  
tudinem Obliqui inferioris. Ab externo hujus latere  
incedente altero, eoque longiore & exiliore, unum  
alterumque corpus eorum, quae secuimus, abundavit.

C c c

Est

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxix. b. Vesal. E-  
pit. Fig. musc. iv. B. fin. & de H.  
C. F. Lib. 11. Tab. 14. A. B. Caf-  
ſer. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab.  
6. C. C. Bulloo Tab. xvii. B. Cow-

per Myot. ann. 1694. Fig. 8. E. &  
ann. 1724. Tab. XLVI. & XLIII. 90.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxix. b-2.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxix. b-3. Cowp.  
Myo., ann. 1724. Tab. XLVI 90.

<sup>a</sup> Eu-



Est *Tertii paris caput moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 28. *Tertius musculus caput movens*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 17. *Major rectus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 21. *Rectus major*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 7. Cowper Myot. Cap. 22. Dougl. Myogr. Cap. 26. *Le grand Droit*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscles, §. 724. & sequent. & 1184.

## C A P U T CXIX.

*De Recto capitis postico minore<sup>a</sup>.*

**S**ic & ab ea parte atlantis<sup>b</sup>, ubi aliarum spina eminet, quaeque spinae quasi inchoatae similis esse solet, Rectus capitis posticus minor ad os occipitis<sup>c</sup>, eadem prope obliquitate, adscendit; ad illam autem partem ejus, quae est pone foramen magnum, ad scrobem scilicet, quae inter foramen illud finemque Complexi, juxta mediam spinam, à foramine magno in posteriora porrectam. Hic se ex gracili initio insigniter ad suae brevitatis rationem dilatat, modice simul crassescens primum, dein se extenuans; tendinosusque ab ortu, itemque aliquandiu extrinsecus. Caput summamque vertebrae ad se invicem adducit, & quidem

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxix. 2. Vesal. Epit. Fig. musc. iv. 8. 7. in capite cui sinister pes innititur. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 14. G. F. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 7. B. B. Bidloo Tab. xvii. CC. Cowper Myot. ann. 1694. Fig. 8. H. H. &

ann. 1724. Tab. xlvi. & xliii. & xlii. 91.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxix. 2-2. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. xliii. 91. & Tab. xlii. Fig. 1. M.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxix. 2-3. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. xlvi. 91.

<sup>a</sup> Eu-

quidem nonnihil oblique : datusque nobis ad capitis  
posteriorem partem deprimendam.

Est *Quarti parvis caput moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 28. *Quartus musculus caput movens*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 17. *Rectus minor*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 21. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 7. Cowper Myot. Cap. 22. & Philosoph. Transact. ann. 1699. Vol. XXI. n°. 251. & Act. Eruditor. ann. 1699. Septembr. Dougl. Myogr. Cap. 26. *Le petit Droit*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 726. & 1184.

C A P U T CXX.

*De capitis Obliquo inferiore* <sup>a</sup>.

**O**blíquus inferior à spina epistrophæi, à cujus lateris superiore parte, per totam ejus longitudinem, ad extremum cornu usque oritur<sup>b</sup>, versus in latus, posteriorem amplitudinem extremi processus transversî atlantis<sup>c</sup> recta petit, satis primo latus & tenuis, sed deinde modice increfcens, in fine decrefcens, utroque extremo tendinosus. Atlantem, cum eoque caput movet. Rotat autem, atlantis transversum processum ad spinam epistrophæi tra-

$$C^1_{cc2}$$

**hens :**

a Eustach. Tab. xxxix. d. Vesal. Epit. Fig. musc. iv. D. sin. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 14. K. L. Casfer. Tab. 2p. Spiegel. Lib. iv. Tab. 6. F. Bidloo Tab. xvii. F. Cowper

Myot. ann. 1694. Fig. 8. G. & 1724.  
Tab. XLVI. & XLIII. 91.

b Eustach. Tab. xxxix. d-a.

c Eustach. Tab. xxxix. d-β.

hens : eoque eundem atlantem etiam in posteriora parumper detrahit.

Est *Sexti paris caput moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 28. *Quintus caput movens*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 17. *Septimus capitis*, Fallopp. Obs. an. in capitis musculis. *Parvus musculus à secundae vertebrae spina in processum transversum primae oblique infixus*, Eustach. de motu cap. *Obliquus major*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 21. *Paris Obliqui inferioris*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 7. *Obliquus inferior*, Cowper Myot. Cap. 22. Dougl. Myogr. Cap. 26. *L'Oblique inferieur, ou grand Oblique*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 728. & 1186. 1187.

## C A P U T CXXI.

*De Obliquo superiore capitis<sup>a</sup>.*

**I**bi ubi inferior desinit, superior incipit, id est, ab ejusdem processus extremo<sup>b</sup>, à superiore parte. Procedit autem sursum simulque retrorsum, petens inferiorem eandemque posteriorem & lateralem ossis occipitis<sup>c</sup> partem, desinensque inter principium additamenti futurae lambdiformis, partemque illam, cui insertus Rectus posticus major. Caput ei angustum,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxix. c. Vesal. Epit. F. musc. iv. C. sin. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 14. I. Casler. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 6. E. Bidloo Tab. xvii. G. Cowper Myot. ann. 1694. Fig. 8. F. & ann. 1724.

Tab. xlvii. & xliii. 92.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxix. c. α. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xliii. 92.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxix. c. β. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xlvii. 92.

stum, tenue, fere tendineum: post crassescit paul-  
tim, & dilatat se modice: non longe à fine exte-  
nuat se sensim, maxime dum se inserit; extremo an-  
gustat modice: qua se parte inserit, tendinosus est;  
itemque extrinsecus, jam antequam se inserat. Oc-  
ciput oblique deprimit, id est, in posteriora & si-  
mul aliquantum in latus.

Est *Quinti paris caput moventium*, Vesal. de H. C.  
F. Lib. II. Cap. 28. *Sextus caput movens*, Columb. de  
re an. Lib. V. Cap. 17. *Sextus capitis*, Fallopp. Obs.  
an. in capitis musculis. *Obliquus musculus*, qui retro  
à transverso primae vertebrae processu in caput inseritur,  
Eustach. de motu cap. *Obliquus minor*, Riolan. Anthr.  
Lib. V. Cap. 21. *Paris Obliqui superioris*, Spigel. de  
H. C. F. Lib. IV. Cap. 7. *Obliquus superior*, Cowper  
Myot. Cap. 22. & Philosoph. Transact. ann. 1699.  
Vol. XXI. n°. 251. & Aët. Eruditor. ann. 1699. Sep-  
temb. Dougl. Myogr. Cap. 26. *L'Oblique supérieur*,  
*ou petit Oblique*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. S.  
727. & 1184 & 1187.

## CAPUT CXXII.

*De Multifido spinae<sup>a</sup>.*

**P**osteriorem spinae partem tenet, & se implicat  
primum ossi sacro, deinde omnibus vertebis,  
Ccc 3 solq

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxix. mm. Cow-  
per Myot. ann. 1724. Tab. xlv■

& xlv. 105. 104. 101.

b Cow-

solo atlante excepto. Per spinae autem longitudinem multis capitibus <sup>b</sup> oritur, inque multa per eandem extrema <sup>c</sup> definit, ita utrimque intercifus <sup>d</sup>, ut seriem quandam musculorum inter se cohaerentium praesentet. In dorso ossis sacri quatuor tubercula sunt, (quorum superius fit ex concretionem processuum obliquo-  
 quorum, descendens primae vertebrae ejus, ascendens secundae: proximum ex descendens secundae, ascendens tertiae: alterum ex descendens tertiae, ascendens quartae: postremum ex descendens quartae, ascendens quintae) unde quatuor procedunt capita tendinosa. Latum deinde, & subtendineum, majorem partem procedit à superiore parte ligamenti, quod ab eminentia, quam os sacrum in dorso suo ad externum latus foraminis sui secundi habet, ad finitimam ossis ilium partem deductum; partim ab ipsa illa eminentia: partim etiam ab ossis ilium, juxta priorem partem dicti ligamenti. Latum pariter, sed & à principio, & deinde aliquandiu per exteriora insigniter tendinosum, à margine processus obliqui ascendens primae vertebrae ossis sacri, juxta externum latus obliqui descendens, cum quo ascendens ille commissus est. Similia singula à singulis vertebrae lumborum <sup>e</sup> & dorsi <sup>f</sup>, colligunt <sup>g</sup> inferiorio-

b Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XLV. Fig. 2. c. e. e. c. c. c. c. c.

c Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XLV. Fig. 1. & 2. f. f. f. f. d. d. d. d.

d Ut in Callér. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 6. in sinistra parte dorsi.

e Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XLVI. 105.

f Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XLVI. 104.

g Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XLVI. 101.

h Cow-

ferioribus quatuor : à lumborum autem processibus oblique adscendentibus , ut ab illo primæ sacri : à dorso trium inferiorum processus transversī extremi parte superiore : à reliquarum dorso processuum transversorum posteriore & eadem superiore parte , inter radicem eorum , radicemque tumoris , in quem desinunt : à posteriore & eadem superiore parte oblique descendunt colli , simulque sæpe ex parte à proximis adscendentibus : aliquando nullum ab ima colli. Extrema lata sunt , crassa , ab exteriori parte cito tendinosa , & inde ad finem usque magis & magis , insertaque inferiori margini vertebrarum lumborum & dorso omnium , collique inferiorum sex , ab earum processu obliquo inferiore usque ad spinam <sup>a</sup> prope extremam. Sæpe præterea ad sacri spinas pertinent exiliora quaedam , & magis tendinosa. Capita donec confluant , intumescunt : extrema detumescunt. Totus musculus adscendit oblique , spinas versus. Mira autem implicatio ejus. Singula enim capita dum se cum vicinis conjungunt , diffundunt simul , & vel ad duas vertebrae pertinent , vel ad tres , vel ad quatuor , vel ad quinque. Ita vero , ut prima cujusque portio , id est , quae maxime distat à spinis , ad vertebrae proximam superiorem , ( quam tamen aliquando præterit ) juxta processum ejus obliquum pertineat : proxima ad alteram , proxima ( in illis , quae ad plures pertinent ) ad tertiam , proxima ad quar-

<sup>h</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XLVI. 105. 104. 101.

<sup>a</sup> Cas-

quartam , proxima ad quintam , eo quaeque propius extremam spinam , quo ad remotiorem vertebam. Unde prima & brevissima & rectissima , proximae ut sequuntur , & longiores & obliquiores. Itaque & ad unamquamque vertebam vel duorum , vel trium , vel quatuor , vel quinque capitum proxime inferiorum portiones veniunt ; quarum illa , quae à capite proximo , inserta juxta processum obliquum ; juxta hanc sequentes , aliae juxta alias , ita propius spinæ extremum , ut quaeque à capite remotiore : omnesque antequam se inferant , in unam veluti caudam confluunt. Extrinsecus autem solae portiones longae apparent , quibus breviores subjacent : longaeque omnes quidem adscendunt oblique , sed fere eo rectius , quo superiores , eo ipsae simul longiores , donec ad colli initium perventum sit , unde contra quo superiores , magis transversae , brevioresque. Tam multiplici spinam nexu continet , eoque aptissimus est ad eam regendam , in priora flexam retinendam , erigendam , flectendam in posteriora , torquendam modice.

Ad hunc pertinere putamus , quos tanquam distinctos parvos musculos saepe invenimus in cervice , ab una vertebra pertinentes ad proximam , & à posteriore parte juxta processum obliquum orientes , adscendentes inde oblique ad inferiorem radicis spinæ. Ad eundem quoque , nisi quis malit distinctos dicere , referas alios , quos in lumbis invenimus , orientes ab exteriori parte radicis processus obliqui adscendentis , pertinentes ad vertebam proximam superiorem , ad inferiorem partem radicis illius tuberculi , quod inter  
process-

processum transversum & obliquum superiorem ex ea  
eminet.

Pars ejus , quae in lumbis , est *Decimus tertius* , &  
*Decimus quartus dorsum moventium* , Vesal. de H. C. F.  
Lib. II. Cap. 38. *Tertius dorsi musculus* , Columb. de  
re an. Lib. V. Cap. 19.

Quae in dorso , est *Decimus quintus* , & *Decimus  
sextus dorsum moventium* , Vesal. de H. C. F. Lib. II.  
Cap. 38. *Quartus dorsi musculus* , Columb. de re an.  
Lib. V. Cap. 19.

Quae in collo , est pars *Septimi* , & *Octavi dorsum  
moventium* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 38. *Quar-  
ti cervicis musculi* , Columb. de re an. Lib. V. Cap.  
18. Pars *Tertii paris dorsi musculorum* , Fallopp. Obs.  
an. in dorsi musculis.

Quae in lumbis & dorso , est *Quarti paris dorsi mus-  
culorum* , Fallopp. Obs. an. in dorsi musculis. An *Sac-  
cer* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 33 ?

Quae in collo , pars *Spinati* , Riolan. Anthr. Lib.  
V. Cap. 22. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 7.  
*Transversalis colli* , Cowper Myot. Cap. 23. *Transver-  
salis* , Dougl. Myogr. Cap. 27. *Transversalis colli* ,  
Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 23. *Sunt les verte-  
braux internes du Demi-epineux , ou Transversaire epineux  
du col* , Winfl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 769. &  
seq. & 1198. 1199.

Quae in dorso , *Semispinati* , Spigel. de H. C. F.  
Lib. IV. Cap. 8. pars , ut videtur. *Semispinatus* ,  
Cowper Myot. Cap. 24. *Sunt Transversales dorsi inte-  
D d d riores* ,



riores , Dougl. Myogr. Cap. 28. Est le *Demi-epineux*, ou *Transversaire epineux du dos*, aut fortasse ejus tantum partes internae, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 809. & seq. & 1214.

Quae in lumbis, *paris Sacri*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 11. *Sacer*, Cowper Myot. Cap. 24. *Transversalis lumborum*, vulgo *Sacer*, Dougl. Myogr. Cap. 29. *Le Transversaire epineux des lombes*, anciennement le *Sacré*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 812. & seq. & 1214.

Portiones distinctae in cervice, sunt haud dubie *Intervertebrales*, Dougl. Myogr. Cap. 27.

## C A P U T CXXIII.

*De Interspinalibus lumborum.*

**A**b imae lumborum vertebrae spina ad proximam adscendit Interspinalis, qui satis latus, sed tenuis, & tum à principio, tum in fine tendinosus. Similis ei à spina secunda ad tertiam; similis à tertia ad quartam, & à quarta ad quintam, & à quinta ad dorsi imam. In inferiore parte lateris spinae illarum vertebrarum eminentia à processu obliquo inferiore ad spinae extremum porrecta jacet; à qua oriuntur: inseruntur autem parti spinae illi, quae est infra dictam eminentiam. Lumbos in priora curvatos erigunt, post flectunt retrorsum: spinas enim adducunt ad se mutuo.

Sunt les *Epineux des lombes*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 814. & 1212. 1213.

C A-

## CAPUT CXXIV.

*De Interspinalibus dorſi.*

**E**jusdem generis muscoli aliquot repperiuntur in inferiore parte dorſi, illis lumborum ſimiles, reſpondentesque & loco unde oriuntur, & eo ad quem deſinunt, & uſu.

Sunt *les petits Epineux du dos*, Winſl. Exp. an. Trait. des muſcl. §. 806. & 1212. 1213.

## CAPUT CXXV.

*De Intertranſverſariis lumborum.*

**E**x his quatuor primi interſerti, affixique proceſſibus tranſverſis vertebrarum lumborum; quintus ſummae lumborum dorſique imae; breves, lati, craſſi, nonnihil tendinoſi. A ſuperiore parte proceſſus cujuſque inferioris pertinent ad inferiorem proxime ſuperioris: & plerumque duo inferiores fere à tota longitudine ad totam: duo proximi his, fere tantum à dimidia ad dimidiam, & quidem à dimidia illa qua deſinunt, ad illam qua incipiunt: ſupremus ab extremo proceſſu ad tuberculum, quod ad exteriorem partem tranſverſi imae dorſi. Quintum etiam portione quadam vidi praetereuntem imam dorſi, ſeſeque adjungentem ad primum dorſi Intertranſverſarium, ac cum eo pertinentem ad dorſi vertebram ſecundam. Lumbos in latus ſeſtunt: in oppoſitum latus flexos retinent, erigunt.

D d d 2

Sunt

Sunt *Intertransversales*, Dougl. Myogr. Cap. 29.  
*Les Transversaires des lombes*, Winsl. Exp. an. Trait.  
 des muscl. §. 814. & 1212. 1213.

## C A P U T CXXVI.

*De Intertransversariis dorsi.*

**T**ales & inter extremos eisdem processus dorsi  
 vertebrarum, has in eandem partem flectentes.  
 Exiliores autem sunt. Inter eos vero inferiores ali-  
 quot insigniores: qui sequuntur, quo superiores, ex-  
 iliores, minusque carnei: qui inter superiores verte-  
 bras, ita exiles tendincique, ut potius ligamenta re-  
 ferant, quam musculos: inter superiores aliquot saepe  
 nulli reperti. Primum vidi portionem sui adjun-  
 gentem ad secundum, ut quintum lumborum ad dor-  
 si primum vidisse memoravi.

Sunt *les petits Transversaires du dos*, Winsl. Exp.  
 an. Trait. des muscl. §. 808. & 1212. 1213.

## C A P U T CXXVII.

*De Levatoribus brevioribus costarum<sup>a</sup>.*

**L**evatorem unaquaeque costa accipit à processu trans-  
 verso illius vertebrae, quae est statim supra il-  
 lam, cum cujus processu transverso ipsa costa com-  
 missa est, connexave ligamento. Prima igitur ab imae  
 colli,

<sup>a</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv.  
 Tab. 6. in latere sinistro dorsi. Ver-  
 heym Anat. Lib. 1. Tab. xxxv.

Fig. 1. e. e. Cowper Myot. ann.  
 1724. Tab. XLIV. 87.

<sup>a</sup> Ver-

colli , secunda à summae dorsi , ac sic porro à sequentibus dorsi , sequentes. Oriunturque à tota eorum longitudine , ab inferiore parte ejus , principio tendinoso ; quod aliquando etiam ex parte cohaeret cum ligamento , quod ab extremo processu transverso pertinet ad proximam posteriorem costae partem. Unde descendunt , dilatant se , modiceque primum crassescunt , post se extenuant , inseruntque superiori margini costarum , juxta spinam ; nempe acutae eminentiae , quae se ex iis erigit , ubi à corporibus vertebrarum inceperunt recedere : ultraque eam , paulo longius , quam ubi costae processibus transversis aut innituntur , aut juxta extrema eorum incedunt , porrectae scrobi inaequabili : itemque exteriori parti marginis superioris , aliquantum ultra processus eosdem. Sed in primo differentia quaedam in parte , cui se inserit : inserere enim se incipit sinui costae primae , qui est juxta tuberculum , quo illa innixa processui transverso ; de cactero inserere se , ut reliqui , pergens exteriori ejus parti , ultra processum illum. Idem aliquando ita conjunctus cum cauda Scaleni medii ad imam colli vertebrae pertinente , ut partem ejus esse putares. Fibrae eorum , quae proximae corporibus vertebrarum , descendunt rectius ; sequentes ita magis in latus , ut remotiores. Primus insignis , secundus brevissimus , hoc longior insigniorque tertius , hoc quartus , ac sic sequentium quisque proxime praecedente. Costarum principium firmant , & moderantur.

An sunt *Intercostalium externorum initium primum à*  
D d d 3 *transf-*

*transversis vertebrarum processibus*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 8? Sunt *Levatores costarum*, Stenon. Obs. de musc. & gland. pag. 6. & 10. *Costarum Levatores Stenon*. Dougl. Myogr. Cap. 25. quo etiam pertinet *the fourth Scalenus*, ibid. Cap. 21. *Supracostales breves*, Verheyen Anat. ann. 1710. Lib. I. Tract. VI. Cap. 7. *Costarum Levatores*, Morgagn. Adv. an. II. Anim. 15. *Intercostalium externorum partes*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 21. *Les Sur-costaux*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 691. & seq. & 1161.

## C A P U T CXXVIII.

*De Levatoribus longioribus costarum <sup>a</sup>.*

**A**lterum praeterea habent costae tres quatuorve inferiores, eumque longiorem. Nam & longius veniunt, (is nempe, qui costae nonae, procedit à processu transverso septimae dorsi vertebrae: qui decimae, ab eo octavae: qui undecimae, ab eo nonae: qui duodecimae, à decimae) & pertingunt ad exteriorem eandemque superiorem partem costarum, juxta externum praecedentium latus, ubi se costae jam magis deorsum inclinant. Oriuntur autem à posteriore parte extremorum processuum, à primo angusti, tenues, tendinosi; dein sensim latiores, & ab exteriori parte diu tendinosi, primumque crassiores, sed dein se paulatim extenuantes, rursusque in fine tendinosi, & aliquando angustati. In progressu se saepe conjungunt cum Intercostalibus, & cum

<sup>a</sup> Verheyen Anat. Lib. I. Tab. xxxv. Fig. 1. f. f.

a Eu-

cum Levatoribus brevioribus. Et aliquando aut aliqui eorum, aut omnes, ab externo latere suo dimitunt portionem, ad costam, quae proxime supra illam, cujus sunt; id est, primus, qui costae nonae est, ad octavam; secundus ad nonam, tertius ad decimam, quartus ad undecimam: eaque portione cum Levatore longiore, ad eandem, ad quam portio illa, costam pertinente, tres inferiores cohaerentes vidimus. Vidimus aliquem eorum se non costae inferere, sed adjungere ad Longissimum dorsi. Fit ut desit primus & secundus. Frequenter contra Levatores breviores costarum superiorum octo, aut aliqui eorum, portione quadam excurrunt longius; praetereuntesque costam cujus sunt, ad proximam pertinent, ad similitudinem longiorum. Longiorum officium est, attollere costas, duasque inferiores eodem tempore trahere retrorsum.

Sunt *Supra-costales longi*, Verheyen Anat. ann. 1710. Lib. I. Traët. VI. Cap. 7. *Les Sur-costaux*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 691. & seq. & 1161.

## REG. XX. SPATIA INTERCOSTALIA.

## CAPUT CXXIX.

*De Intercostalibus externis* \*.

**S**inguli à duarum quarumque inter se proximarum costarum altera ad alteram procedunt, sese ab

exte-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxix. l. l. etc. & Tab. xxxvii. g. g. etc. & Tab. xxxiii. l. l. etc. Vésal. Epit. musc.

Fig. iv. i. i. dext. etc. & Fig. iii. b. h. dext. & de H. C. F. Lib. ii. Tab. 14. & Tab. 6. V.

<sup>b</sup> Eu-

exteriore & eadem inferiore parte superioris oblique demittentes ad exteriorem eandemque superiorem inferioris. Pro brevitate latissimi sunt : costarum enim longitudinem inde ubi illae ultra processus transversos dorsi incedere incipiunt, alii ad earum cartilagineas usque tenent, alii propemodum <sup>b</sup> : & ubi desinunt, inde aponeurosis tenuis, eorum continuatio quaedam, distincta in fasciculos, eodem modo à costa altera ad alteram deductos. Ipsi Intercostales tennes, & tendinosi, eaque fibras obliquitate demittunt, ut cum progrediente costa superiore angulos acutos efficiant, obtusos cum inferiore. Et fibrae posteriores caeteris obliquiores : sequentes, ut sequuntur, ita minus minusque obliquae. Costas adducunt ad se invicem, pleuram firman.

Sunt *Externi intercostales*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 35. praeter partes, quae inter verarum costarum cartilagineas. *Exteriores*, praeter partes easdem, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 20. *Intercostales exteriores*, Fallopp. Obs. an. in intercostalibus musculis. *Intercostales externi*, Arant. Anat. obs. Cap. 34. Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 31. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 8. *Intercostales exteriores*, Stenon. Obs. de musc. & gland. pag. 5. & 10. *Intercostales externi*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 19. Dougl. Myogr. Cap. 21. Cowper Myot. an. 1724. Cap. 21. Heist. Comp. an. ann. 1717. not. (73\*). *Les Intercostaux externes*, Winsl. Exp.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxiii. l. i. &c.

<sup>a</sup> Eu-

Exp. an. Trait. des muscl. §. 684. & seq. & 1158.  
116a

## CAPUT CXXX.

*De Intercostalibus internis <sup>a</sup>.*

**M**agna est internis cum externis similitudo. Praecipuum inter eos discrimen, ut illi se affigant costarum margini interiori, contrario modo, rectiusque descendant, costarumque longitudinem ab extremis cartilaginibus earum teneant <sup>b</sup> ultra eum locum, ubi se à spina venientes in priora insigniter curvant. Adde quod ille, qui oritur à costa nona, itemque qui ab octava, saepe & qui à septima, & qui à sexta, qua spinæ proximi, longius, ea, qua coeperant, obliquitate descendant <sup>c</sup>, costamque proximam ex interiore parte praeterlapsi, sequenti se inserant <sup>d</sup>, à principio ea parte diu tendinei & tenuiores. Sic & aliquando reliqui costas, inprimis prope spinam, quibusdam portionibus diversimode praetereunt <sup>e</sup>. Qui ad illas costas pertinent, quarum mediae cartilagines latiores factae, inter se junctae sunt, pro duobus haberi possunt, & revera in duos, interjacentibus illis

E c e carti-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxviii. l. l. etc. & Tab. xxxiii. h. h. etc. Vesal. Epit. musc. Fig. v. M. M. sin. & Fig. iii. i. i. dext. & de H. C. F. Lib. ii. Tab. 8. E. E. E. & Tab. 6. X. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxxiii. Fig. 2. C. C. C.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxviii. l. l. &c.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxviii. mn. mn. mn. Verheyen Anat. Lib. i. Tab. xxxv. Fig. 3. d. d. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxxiii. Fig. 2. AB. AB.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxviii. n.

<sup>e</sup> Verheyen Anat. Lib. i. Tab. xxxv. Fig. 3. d. super.

f Eu-



cartilaginum portionibus, distincti sunt; ultra quas parva portio<sup>1</sup> extremis interferta cartilaginibus. Costas pariter ad se mutuo interni adducunt, firmiterque pleuram. Multis undecimus pertenuis, quibusdam & decimus: aut sunt aponeurosi similes, ut deesse videantur.

Sunt *Interni intercostales*, una cum *externorum* partibus, quae inter verarum costarum cartilagines, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 35. *Interiores*, una cum iisdem partibus, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 20. *Intercostales interiores*, Fallopp. Obs. an. in intercostalibus musculis. *Intercostales interni*, Arant. Anat. obs. Cap. 34. Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 31. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 8. *Intercostales interiores*, Stenon. Obs. de musc. & gland. pag. 5. & 10. *Intercostales interni*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 19. Dougl. Myogr. Cap. 21. Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 19. Heist. Comp. an. ann. 1724. not. (73\*). *Les Intercostaux internes*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 684. & seq. & 1159. 1160.

Partes, quae costam proximam praeterlabuntur, sunt *Costarum depressores proprii Cowperi*, Dougl. Myogr. Cap. 21. *Intracostales*, Verheyen Anat. ann. 1710. Lib. I. Traët. VI. Cap. 8. Morgagn. Adv. an. II. Anim. 15. *Intercostalium internorum* partes, Cowper. Myot. ann. 1724. Cap. 19. *Les Sous-costaux*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 694. & seq. & 1163.

R E-

## REGIO XXI. COLLI SCELETI LATUS CUM PARTE PRIORE.

## CAPUT CXXXI.

*De Scaleno priore a.*

**C**ommunia Scalenis, ut à costis adscendant ad collum, principium habeant tenuius & tendinosum, dein paullatim crassiores fiant, plerumque & latiores, ac se scindant in caudas, à ventre magis magisque, sed modice, divergentes, ipsas sensim decrefcentes, tendineamque naturam assumentes, & ad postremum plane tendineas, tenues, angustas, ac transversis vertebrarum colli processibus alias supra alias insertas, eo denique longiores, quo superiores. Communis quoque in universum actio: flectunt vero collum in latus, costas attollunt. Prior autem oritur <sup>b</sup> à summo margine costae primae, non longe ab ejus cartilagine. Findit se in caudas tres, easque inserit imò lunato margini, itemque inferiori parti tuberculi prioris processuum transversorum secundae, tertiae, quartae à dorso. Aliquando bifidae sunt. Aliquando tantummodo caudas habet duas, illam quam secundae inserit, illamque quam tertiae. Ima qua se inserit, caeteris latior. Vidimus ab ipso fere se findentem ortu, eoque quasi distinctum in tres. Collum magis in priora flectit, quam caeteri.

E e c 2

Est

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxviii. i. Cowper  
Myot. ann. 1724. Tab. xxxiii. 74.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxviii. i.-a.

<sup>a</sup> Eu-

Est pars *Tertii*, & *Quarti dorsum moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 38. Pars *Secundi cervicis musculi*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 18. *Septimus thoracis*, Fallopp. Obs. an. in thoracis musculis. Pars *Scaleni*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 22. Pars *paris Triangularis*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 7. *Scalenus primus*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 19. *The first Scalenus*, Dougl. Myogr. Cap. 21. *Scalenus primus*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 19. *La branche ou portion anterieure du premier Scalene*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 675 : vide & §. 1152. & seq.

## C A P U T CXXXII.

*De Scaleno minimo.*

**M**inimus, qui valde parvus, oritur à summo margine costae primae, statim pone priorem. Caudas habet duas, quarum altera inserta inferiori parti spinæ, quæ in vertebra prima colli est juxta priorem partem processus transversî : altera inferiori parti tuberculi prioris processus transversî secundæ. Earum alterutra sæpe caret. Collum flectit, fere ut prior. Interdum deest.

## C A P U T CXXXIII.

*De Scaleno laterali.*

**L**ateralis ab exteriori parte costae secundæ oritur, supra caput Serrati magni, quod ab eadem costa pro-

procedit. Vidimus quatuor caudas emittentem, iisque pertinentem ad processus transversos à dorso secundae, tertiae, quartae, quintae: duabus superioribus ad inferiorem & eandem anteriorem partem cornu posterioris: duabus inferioribus ad imum lunatum marginem. Vidimus modo unam, insertam inferiori parti tuberculi posterioris quintae, aut prioris quartae. Vidimus cum medio à principio connexum. Vidimus totum deficientem. Juvat medium.

Ubi conjunctus cum medio, est *Ostavi thoracis musculi* pars, quae *inseritur in secundam thoracis*, Fallopp. Obs. an. in thoracis musculis. Videtur esse *Scalenus secundus*, Cowper Myot. ann. 1693. Cap. 19. An *Scaleni* pars, à *secunda costa enata*, Morgagn. Adv. an. II. Anim. 14? Videtur esse *Scalenus secundus*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 19. aut pars ejus. *La portion antérieure du second Scalene*, Winll. Exp. an. Trait. des musc. §. 677: vide & §. 1152. & seq.

## CAPUT CXXXIV.

*De Scaleno medio<sup>a</sup>.*

**M**edius, caeteris major, incipit ab exteriori parte costae primae<sup>b</sup>, prope in media ejus longitudine; totamque suo principio tenet costae altitudinem. Huic septem plerumque caudae, pertinentes

E e e 3 ad

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxviii. g. dext. & Tab. xxxix. c.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxviii. g. a. & Tab. xxxix. c. g.

<sup>c</sup> Eu-

ad processus transversos omnium colli vertebrarum: prima <sup>c</sup> aut ad spinam, quae juxta priorem partem processus transversus imae colli eminet; aut ad priorem & eandem inferiorem partem processus ipsius; aut & ad processum, & ad spinam: secunda <sup>d</sup> ad inferiorem partem extremi tuberculi posterioris, aut ad extremum lunatum marginem, secundae: tertia <sup>e</sup> ad eundem marginem tertiae, & aliquando ad imum quoque tuberculum posterius: quarta <sup>f</sup> ad eundem marginem quartae: quinta <sup>g</sup> ad eundem marginem, itemque ad imum tuberculum prius, aliquando & posterius, quintae: sexta <sup>h</sup> ad priorem partem processus prope extremi sextae: septima ad priorem partem marginis inferioris processus transversus atlantis, circa longitudinem ejus mediam; ubi connexa cum Levatore scapulae, & Splenio colli. Cauda ad atlantem pertinens, saepe, contra quam reliquae, ubi à musculo abscedit, gracilior est, mox sensim crassior, in fine rursus gracilescit, & extenuatur. Sexta nonnullis defuit. Incidimus in corpora, in quibus ad hunc musculum duo capita accedebant à processibus transversis duarum inferiorum colli vertebrarum, alterum ab imae extrema priore parte, alterum à secundae extremo tuberculo posteriore: utraque gracilia, primo tendinea, mox carnea, sensim insigniora, & ad posteriorem musculi partem, ad quam adscendebant, se adjun-

c Eustach. Tab. xxxix. c-3.

d Eustach. Tab. xxxix. c-7.

e Eustach. Tab. xxxix. c-2.

f Eustach. Tab. xxxix. c-4.

g Eustach. Tab. xxxix. c-5.

h Eustach. Tab. xxxix. c-6.

a Eu-

adjungentia. In aliud , in quo caput à superiore parte tuberculi prioris secundae à dorso ortum , accedebat ad caudam septimam. Collum flectit rectius in latus , quam praecedentes.

Est pars *Tertii* , & *Quarti dorsum moventium* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 38. Pars *Secundi cervicis musculi* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 18. *Octavus thoracis musculus* , Fallopp. Obs. an. in thoracis musculis. Pars *Scaleni* , Riolan. Anth. Lib. V. Cap. 22. Pars *paris Triangularis* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 7. *Scalenus tertius* , Cowp. Myot. ann. 1694. Cap. 19. ut videtur. *The second Scalenus* , Dougl. Myogr. Cap. 21. An pars ejus est *Scalenus tertius* , Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 19? Est *La portion ou branche postérieure du premier Scalene* , Winsl. Exp. an. Trait. des musc. §. 676. : vide & §. 1152. & seq.

## CAPUT CXXXV.

*De Scaleno postico <sup>a</sup>.*

**P**osticus oritur ab exteriori parte costae secundae<sup>b</sup>, inter illam partem , qua processui transverso inhaeret ; illamque , qua se in priora curvatura est. Caudae ei modo tres , insertae imo tuberculo posteriori processus transversus secundae , tertiae , quartae : modo duae , in quibusdam insertae eidem parti secundae & tertiae , in aliis tertiae & quartae , in aliis quartae

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxix. k.<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxix. k-a.<sup>a</sup> Eu-

quartae & quintae. Vix discrepat actio ejus ab illa medii. Aliquando nullus repertus. Alias musculus parvus, ab initio tenuis, angustus; sensim primo latior & crassior, post tenuior & angustior; qua decurrebat per intervallum costae secundae & primae, commistus cum Intercoastali externo; exili tendine insertus extremo processui transverso colli primae à dorso.

Est *Nonus thoracis musculus*, Fallopp. Obs. an. in thoracis musculis. *The third Scalenus*, Dougl. Myogr. Cap. 21. An *Scaleni pars, à costa secunda enata*, Morgagn. Adv. an. II. Anim. 14? *La portion postérieure du second Scalene*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 678. ut videtur: vide & §. 1152. & seq.

## C A P U T CXXXVI.

*De Recto capitis interno majore <sup>a</sup>.*

**R**ectus capitis internus major in eorum numero est, quibus multifidum principium<sup>b</sup>, extremum simplex. Principii portiones quinque, ex acutis sensim crassiores; prima tota carnea, caeteris ex tendineo initio mox paullatim carnis, sed ea parte, qua spectant vertebrae, aliquandiu tendinosus. Eaque continua serie procedunt aliae supra alias: prima ab interiore parte illius tendinis Longi colli, qui insertus

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 13. π. & Tab. xxxviii. c. Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 8. B. Bidloo Tab.

xviii. L. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xliii. 95.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 13. π. c Eu-





lum gracilem , lenfimque graciliorem , abeuntemque in finem tenuem & tendineum. Invenimus in alio similem , sed uno capite orientem à cauda Scaleni prioris , quae inserta processui transverso tertiae à dorso ; ex acuto crassiore , & se findente in caudas duas graciles , quarum prima brevior , insertaque imo extremo tuberculi prioris processus transversus quintae à dorso : secunda longior & insignior , ad atlantem cum cauda Scaleni medii pertinens , seseque ad postremum cum interno latere caudae illius conjungens. Caeterum actio Recti est , capitis priorem partem deprimere in priora , ac simul nonnihil in latus ; eoque & collum flectere in partem eandem : cum vero collum caputque retrorsum flexa , erigere ea.

Est alterius musculorum , quos fere sub stomacho latitantes veteres appellasse videntur , pars in os occipitis inserta , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 28. Pars eadem Primi , & Secundi dorsum moventium , ibid. Cap. 38. Primi cervicis musculus , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 18. pars occipitio annexa. Nonus musculus capitis , Fallopp. Obs. an. in capitis musculis. Alterius lateris musculus stomacho subjectorum , Eustach. de motu cap. portio in occipitis os inserta. Qui cum mastoideo caput flectit , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 21. Rectus internus major , Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 22. Dougl. Myogr. Cap. 18. Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 22. *Le Droit anterieur long* , Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 729. & seq. *Le grand Droit anterieur* , ibid. §. 1185.

C A-

## CAPUT CXXXVII

*De Longo colli<sup>a</sup>.*

**L**ongus colli constat fere è duobus musculis, inter se nexis. Septem hujus, quibus incipere solet, capita continua per colli altitudinem serie oriuntur à vertebra dorsi superioribus<sup>b</sup> tribus, colli secunda, tertia, quarta, quinta: primum à media laterali parte corporis decimae dorsi à lumbis: secundum ab eadem undecimae: tertium fere ab eadem duodecimae: sequentia à superiore & eadem interiore, id est, corpora vertebrarum spectante parte tuberculi prioris processuum transverforum colli, quas diximus, vertebrarum: accedit aliquando aliud à principio costae secundae, aliudque à latere corporis vertebrae imae colli, aliudque à secundae à dorso: aliquando nullum à decima dorsi. Omnia primo tenuiora & angustiora, dein intumescunt magis magisque, & à principio vel majorem partem, vel tota tendinea, aliquandiu tendinosa manent à priore parte, praesertim quae à corporibus vertebrarum procedunt: quod à transverso quintae à dorso, ex parte tendinosum inveni, qua incumbit vertebrae. Adscendit inde utraque parte, sed in diversa, ipsaeque partes dissimiles inter se. Quippe altera<sup>c</sup>, è qua inferior pars musculi ab externo latere

F f f 2 fit,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 13. 2. & Tab. xxxviii. cf. Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 8. infra B. ad spinam. Bidloo Tab. xviii. A. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xliiv.

98.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxviii. d. & f.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 13. 2. & Tab. xxxviii. f.

d Eu-

fit, nonnihil oblique in latus procedit, & plerumque abit in caudas tres, easque longas, sensim graciliores, sensimque magis tendinosas, inprimis à parte priorē; in fine plerumque totas tendineas, saepe bifidas, deficientes ad tres colli vertebrae, secundam, tertiam, quartam à dorso, ad tuberculum prius processus earum transversī: quibusdam tantum duae tales caudae, eaeque inferiores trium modo dictarum: quibusdam tantum una, eaque inferior earundem, à cuius extremo primum Recti interni majoris caput abscedit; eaque quibusdam gemina, exiliore parte, à qua Recti caput, inserta tuberculo; insigniore juxta illud tuberculum, proximae imae parti processus. Quibusdam contra adhuc alia, exilior, pertinens ad priorem partem radice spinæ, quae est juxta priorem partem processus transversī imae colli. Altera pars<sup>d</sup> longe insignior est, & qua à corporibus adscendit, rectius per priora corporum vertebrarum, immo aliquantum in contrariam partem procedit; ad quam capita, quae à processibus transversis procedunt, se oblique adjungunt: seseque ab ea parte, qua alterius lateris Longum respicit, in caudas<sup>e</sup> aliquot findit; modo autem in plures, modo in pauciores; quas corporibus colli vertebrarum inserit, priori parti eorum, à latere: atlantis autem tuberculi, quod in media priore parte sua habet, parti inferiori; ubi se in fine dexter cum sinistro aliquando conjun-

d Eustach. Tab. xli. Fig. 13. I-ø.  
& Tab. xxxviii. c.

e Eustach. Tab. xli. Fig. 13. Σ-β.  
γ. δ.

a Eu-

conjungit. Et vel ad omnes pertinet, vel ad quinque superiores, vel ad quatuor, vel ad tres; plerumque autem ad quatuor, caudis totidem, quae paullatim decrefcunt, & in finem tendineum planiorem abeunt. Earumque quaeque quo superior, eo quoque insignior: cacteris autem exiliores, quae datae vertebris tribus primis à dorso. Quae fequentibus tribus datae, non raro latiores, latitudinem vertebrarum ad proceffus tranfverfos ufque tenent fine fuo, ea parte tenuiores, magisque carnae, fubjectaeque ipfi mufculo. Nuper & ad os occipitis pertinentem caudam inveni. Collum in pofteriora curvatum erigit; curvat deinde in priora, eodemque tempore modice in latus.

Est alterius mufculorum, quos fere fub ftomacho latitantes veteres appellaffe videntur, pars cervicis vertebrarum corporibus inferta, Vefal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 28. Pars eadem *Primi*, & *Secundi dorfum moventium*, ibid. Cap. 38. *Primi cervicis mufculi*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 18. pars vertebrarum corporibus annexa. Pars alterius lateris *mufculi ftomacho fubjectorum*, Euftach. de motu cap. *Longus*, Riolan. Anth. Lib. V. Cap. 22. *Cervicem flectentium primi paris*, five *Longi*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 7. *Longus colli*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 23. *Longus*, Dougl. Myogr. Cap. 19. *Longus colli*, Morgagn. Adv. an. II. Anim. 14. Cowp. Myot. ann. 1724. Cap. 23. *Le Long du col*, Winfl. Exp. an. Trait. des mufcl. §. 760. & feq. & 1193. & feq.

*De Recto capitis interno minore <sup>a</sup>.*

**H**ic parvus, tenuis, pro longitudine satis latus, qua vero incipit, angustior; deinde se sensim modiceque dilatans, sensimque crassescens, in fine nonnihil tenuior; ab ortu, inque fine, tendinosus. Oritur à priore eademque superiore parte corporis atlantis <sup>b</sup>, juxta radicem processus transversi, & ab ipsa radice. Adscendit oblique introrsum, pertingitque ad inferiorem eandemque posteriorem partem marginis ossis occipitis, qui cum petroso leviter connexus: se autem inserit <sup>c</sup> tuberculo, quod è margine illo, ante processum coronoideum eminet; juxtaque illud se etiam immiscet materici illi quasi cartilagineae, quae implet intervallum imae ossis occipitis & petrosi parti ante fissuram, qua exit nervus octavus capitis, interjectum. Caput in priora simulque nonnihil in latus nutare facit.

*Est Musculus digitalis latitudinis, ab eminente quadam linea occipitis ossis principium sumens, Eustach. de motu cap. Rectus internus minor, Cowper Myot. Cap. 22. Le Rengorgeur oblique, Dupré, Philosoph. Transact. ann. 1699. Vol. XXI. n°. 251. & Act. Eruditor. ann. 1699.*

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 13. E. dext. & Tab. xxxviii. b. dext. Cowper Myot. ann. 1694. Fig. III. i. & ann. 1724. Tab. xxiv. & xliii. 96.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 13. E. aa. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xliii. 96.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 13. E. ββ. a Eu-

1699. Septemb. *Rectus internus minor*, Cowper ibid.  
*Rectus internus minor* Cowp. Dougl. Myogr. Cap. 18.  
*Rectus anticus minor*, Morgagn. Adv. an. II. Anim.  
 19. *Le Droit anterieur court*, Winsl. Exp. an. Trait.  
 des muscl. §. 731. & seq. *Le petit Droit anterieur*,  
 ibid. §. 1185.

## CAPUT CXXXIX.

*De Recto laterali a.*

**N**on absimilis ei lateralis, minor autem, ac sensim nonnihil angustior, sensim crassior, oriensque à parte priore partis superioris processus transversus atlantis <sup>b</sup>, ferme per longitudinem ejus totam; inque exteriora adscendens ad eum ossis occipitis marginem <sup>c</sup>, qui facit posteriorem partem foraminis quo exit vena jugularis interna, ibique se affigens superficiei inaequabili, quae est & juxta posteriorem illius marginis partem, & juxta processum mammillarem. Aliquando unius loco duo inveniuntur, altero, & eo insigniore, procedente à processu supradicto; altero ab ipso corpore vertebrae, juxta processum illum. Caput in latus & simul nonnihil oblique in priora deprimit.

*Est Musculus admodum parvus, qui à processu transverso*

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 13. A. & Tab. xxxviii. 2. Cowp. Myot. ann. 1694. Fig. III. k. & ann. 1724. Tab. xxiv & xliii. 97. & Tab. xlii. Fig. 1. N.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 13. A. a. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xlii. Fig. 1. infra N.  
<sup>c</sup> Eustach. Tab. xli. Fig. 13. A. β.

<sup>a</sup> Cowp.

*verso primae vertebrae ortus*, &c. Fallopp. Obs. an. in capitis musculis. *Alter musculus praedictis brevior & angustior*, &c. Eustach. de motu cap. *Musculus obliquus, qui ante à transverso primae vertebrae processu in caput inscribitur*, ibid. *Rectus lateralis*, Cowper Myot. Cap. 22. *Le Rengorgeur droit*, Dupré, Philosoph. Transact. ann. 1699. Vol. XXI. n°. 251. & Aët. Erudit. ann. 1699. Septemb. *Rectus lateralis*, Cowp. ibid. *Rectus lateralis Fallopp.* Dougl. Myogr. Cap. 18. Morgagn. Adv. an. II. Anim. 19. *Le premier Transversaire antérieur*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 733. & 1185. & 1188.

## C A P U T CXL.

*De Intertransversariis prioribus colli<sup>a</sup>.*

**P**rimus recta ab eminentia vertebrae colli primae à dorso, quam illa habet loco radices prioris processus sui transversi, adscendit ad inferiorem eandemque priorem tum radices tuberculi, tum ipsius tuberculi prioris processus transversi secundae. Secundus à superiore eademque posteriore tuberculi prioris, radicisque processus transversi secundae, ad inferiorem eandemque priorem radices, ipsiusque tuberculi ejusdem tertiae. Tertius à tertia ad quartam, ut secundus à secunda ad tertiam. Sic & quartus à quarta ad quintam. Quintus à quinta, ut secundus à secunda, ad inferiorem partem radices processus transversi sextae,

<sup>a</sup> Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. XXIII. 101. inf. & Tab. XLIV. Fig. 1. In-

tertransversales colli: ubi priores à posterioribus non distinguit.

b Dupré

tac, marginisque prioris illius partis ejus, qua sustinet atlantem; & ad proximam corporis partem, mox infra marginem mododictum. Sextus<sup>b</sup> autem oblique introrsum adscendit à priore parte radices prioris processus transversus sextae, ad imum priorem marginem radices transversus septimae. Hic & à reliquis figura diversus est: incipit enim gracili tendine, paulatimque latefcit, & donec extremum rursus extenuet, crassescit. Quibusdam biceps fuit, accedente capite à superiore parte tuberculi prioris processus transversus quartae, tendineo primum, post carneo, & ex acuto sensim pleniore. Reliqui tumiduli, prope teretes, verumtamen latiores quam crassiores; in principio, inque fine tenuiores, & tendinosi. Aliquando se duo proximi ultra extremum, cui affixi, tuberculum continuant. Ad se invicem adducunt processus, inter quos intercedunt; ac sic collum in latus flectunt, in oppositum latus flexum erigunt. Sextus praeterea atlantem nonnihil vertit, id est, cum is in alterutram partem conversus est, restituit eum.

An sextus est *Secundam vertebrae primae anteriori in se de connectens*, Eustach. de motu capitis? Est *the Flexor of the first vertebra on the second*, Dupré, Philos. Transf. ann. 1699. Vol. XXI. n°. 251. *Flexor vertebrae primae super secundam*, Dupré, Act. Eruditor. ann. 1699. Septemb. *The muscle employed in shaking the head*, Cowper, G g g ibid.

b Dupré, Philosoph. Transf. ann. 1699. Vol. XXI. n°. 251. Fig. 1. of Dupré, 10. sin. & Act. Erudit.

ann. 1699. Septemb. Tab. vii. Fig. 1. 10. sin.



ibid. in Philosoph. Transf. & Aët. Erudit. *Musculus caput concutiens*, Dougl. Myogr. Cap. 18. ut videtur. Unus *Intertransversarium*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 23. *Le second Transversaire antérieur*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 734. & 1185. 1188.

Reliqui, aut posteriores, aut utrorumque partes, sunt *the muscles placed between the transverse processes of the other vertebrae of the neck*, Cowper, Philosoph. Transf. ann. 1699. Vol. XXI. n°. 251. *Musculi transversis processibus reliquarum vertebrae cervicis interjecti*, Cowper Aët. Erudit. ann. 1699. Septemb. *Intertransversales*, Dougl. Myogr. Cap. 27. Sunt partes priores *Intertransversarium*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 23. Aut horum aliqui, aut posteriorum, aut partes utrorumque, sunt *les petits Transversaires du col*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 776. & 1197.

# C A P U T CXLI.

## *De Intertransversariis posterioribus colli 2.*

**R**ecta quoque adscendunt posteriorum primi quinque. Primus à parte eadem & superiore & priore processus transversus primae colli, ad inferiorem, & ad posteriorem tuberculi posterioris, vicinumque marginem extremum lunatum secundae. Secundus à superiore parte tuberculi posterioris processus transversus secundae, ad inferiorem & eandem poste-

<sup>a</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. xxiii. 101. inf. & Tab. xliv. Fig.

<sup>1.</sup> *Intertransversales colli*: ubi posteriores à prioribus non distinguuntur.

<sup>a</sup> Eu-

posteriorem ejusdem tuberculi , marginisque lunati ,  
 tertiae. Nec aliter quam secundus , tertius à tertia  
 ad quartam ; itemque quartus à quarta ad quintam.  
 Quintus eodem modo à quinta , sed ad inferiorem  
 eandemque posteriorem partem processus transversii  
 sextae. Hi similes prioribus ad easdem vertebrae per-  
 tinentibus. Eademque actio eorum. Sextus plane dif-  
 crepat. Adscendit modice extrorsum. Oritur par-  
 tim à superiore parte extremi processus transversii sex-  
 tae , partim abscedit à fine caudae Splenii colli , quae  
 inserta processui eidem ; partim à fine ejusdem caudae  
 Transversalis cervicis : saepe ab his modo , non au-  
 tem à processu : aliquando à solo Transversali cervi-  
 cis , ut ejus accensendus sit caudis. Principia graci-  
 lia , sensim insigniora : è quibus venter quoque graci-  
 lis , qui mox decrefcit paulatim , tendinosusque fit  
 extrinsecus , sic ut finem habeat angustum , tenuem ,  
 valde tendinosum. Atque is se inserit septimae pro-  
 cessus transversii extremi parti inferiori , juxta partem  
 priorem. Eamque vertebrae eo prope modo depri-  
 mit , quo sextus prior.

Hi , praeter sextum , aut fortasse priores , aut par-  
 tes utrorumque , sunt *the muscles placed between the  
 transverse process of the other vertebrae of the neck* ,  
 Cowper , Philosoph. Transact. ann. 1699. Vol. XXI.  
 n°. 251. *Intertransversales* , Dougl. Myogr. Cap. 27.  
 Sunt partes posteriores *Intertransversalium* , Cowper  
 Myot. ann. 1724. Cap. 23. Aut aliqui horum , aut  
 posteriorum , aut partes utrorumque , sunt *les petits Trans-*

G g g 2

*versai-*

*versaires du col*, Winfl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 776. & 1197.

## REGIO XXII. SCAPULA CUM SUPERIORE PARTE HUMERI.

### C A P U T CXLII.

#### *De Deltoïde <sup>a</sup>.*

**D**eltoïdi figura quasi triangularis. Principium latum, oriens à parte priore claviculae <sup>b</sup>, qua pars illa concava est; & à margine inferiore processus superioris <sup>c</sup>, spinaeque <sup>c</sup> paullo minus quam totius: idque totum quidem non valde crassum, tenuius autem qua parte à spina oritur, eaque etiam tendineum <sup>d</sup>; reliqua tendinosum. Paullatim vero crassior fit, & paullatim quoque, sed multo, angustior. Tenditque ad priorem ossis humeri partem, ubi se extremo partim tendineo, partim carneo, inserit e tuberculis oblongis, quae os illud statim supra medium longitudinis suae habet; itemque mediae inter ea parti: & ubi se inserit, deorsum versus extenuat. Constat autem ex septem portionibus <sup>f</sup>, inter se junctis,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiv. V. & Tab. xxxv. z. Vefal. Epit. Fig. muscl. 11. G. dext. & Fig. 1. P. dext. & de H. C. F. Lib. 11. Tab. 10. A. & Tab. 4. B. & Tab. 2. M. & Tab. 11. M. & ABCD. & Tab. 5. 7. Bidloo Tab. LXVI. XX. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. XLIX. Fig. 1. 108. & Tab. XLVII. 108.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxv. z. 22. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. XLIX. Fig.

1. 108.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxiv. V. 28. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. XLIX. Fig. 1. 108.

<sup>d</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XLVII. 108. C.

<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxxiv. V. 7. & Tab. xxxv. z. 28. Vefal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 11. P.

<sup>f</sup> Lower de corde, Tab. iv. Fig. 1. quodammodo.

g Lower

ctis, sed non difficulter distinguendis, inque duos ordines dispositis. Quatuor <sup>a</sup> pertinent ad primum ordinem, à principio latae, majoremque partem carnea-  
e; in extremum autem tendineum, tenue, latum, quaeque abeunt, desinentesque ad ossis humeri, quae diximus, tubera oblonga. His pectinatim interfertae quae supersunt tres <sup>b</sup> ordinis secundi: eaeque, contra atque illae, à principio tendineae sunt, & angustae; dein carnae: atque ita cum illis primi ordinis à principio aliquandiu cohaerent, ut illae carne sua ab harum tendine abscedere videantur: contra autem in fine illae secundi ordinis sua se carne tendinibus primi, qua hi se mutuo spectant, adjungunt ad finem usque. Primi autem ordinis portio prima priorem ipsius musculi marginem efficit, insignis, oriens à clavicula, & à mucrone processus superioris scapulae; inserta priori parti tuberi prioris, ac saepe rursus divisa in duas, in extremum tendineum singulas abeunt, iisque se conjungentes in unum: secunda marginem efficit posteriorem, insignis & ipsa, ac saepe etiam in duas divisa, oriens à spina scapulae, magnaue parte processus superioris; inserta posteriori parti tuberi posterioris: tertia & quarta in media parte musculi, utraque minor; earumque prior, quam tertiam dicimus, oritur ab extremo processus superioris, desinitque ad posteriorem partem tuberi prioris; posterior, id est quarta, incipit ab

G g g 3 angu-

g Lower de corde, Tab. iv. Fig. 1. h Lower de corde, Tab. iv. Fig. 1.  
dd. dd. d. d. c. c. c.

a Eu-

angulo posteriore, sive cubito flectentis se processus superioris; inserit se priori parti tuberis posterioris. Secundi ordinis prior parva, inserta primi ordinis primae & tertiae, inter eas à processu superiore oriens, & ad tuber prius desinens: post hanc media, quae major, inserta primi ordinis tertiae & quartae, pariter inter eas oriens à processu superiore, pertinenſque ad locum inter duo ossis humeri tubera medium: posterior similiter satis insignis, insertaque primi ordinis quartae & secundae, atque inter eas etiam à processu superiore oriens, pertinenſque ad tuber posterius. Portiones primae ubi se inferunt, ab inferiore parte tendinibus suis aliquantum solent cum Brachiali interno cohaerere: magis autem, & fere semper, carne sua cum eodem cohaerent secundae. Deltoïdes os humeri recte attollit in exteriora: oblique autem in priora, si pars ejus prior praevaleat; in posteriora, si posterior. Prior quoque brachium, cum pars ejus prior in exteriora conversa, restituit: posterior, cum pars eadem conversa in interiora. Posterior vero priore latior, ob idque etiam obliquius descendit, & ea re brachium insignius attollit, vertitque. Sed & humerum Deltoïdes attrahit ad brachium. Invenimus, ad cujus posteriorem marginem accedebat portio insignis, oriens ab ora priore scapulae, inter Infraspinatum & Teretem minorem. Caeterum huic musculo circa processum superiorem scapulae subjecta bursa insignis, qualis Iliaco interno cum Psoa magno.

Est

Est *Secundus brachium moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 23. *Secundus humeri musculus epomis deltois & humeralis*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 16. *Secundus movens humerum*, Fallopp. Obs. an. in illis, qui humerum movent. *Deltoides*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 24. *Elevator, Attollens humerum*, δεικνὺς, *Deltiformis*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 14. *Deltoides*, Stenon. Element. myolog. p. 53. *Deltoides*, Lower de cord. Cap. 1. *Deltoides*, Cowper Myot. Cap. 25. Dougl. Myogr. Cap. 30 : qui clarus atque peritissimus Vir, etiam Deltoïdem in portiones, quas dixi, distinctum, nuper, cum in hanc regionem venisset, & de hac re coram inter nos forte conferremus, mihi exhibuit. *Le Deltoide*, Winsl. Exp. an. Trait. des musc. §. 175. & seq. & 923. & seq.

## CAPUT CXLIII.

*De Supraspinato<sup>a</sup>.*

**S**capulae cavum quod supra spinam est, ad cujus figuram formatus, opplet, à posteriore ejus parte incipiens<sup>b</sup>, usque ad lunulam, quae ad radicem processus coracoïdei; procedensque ad ossis humeri caput superius. Ubi primum incipit, tenuis est; dein ut pergit oriri<sup>c</sup>, fit paulatim crassior, & primum latior,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvii. A. & Tab. xxxviii. D. Vesal. Epit. Fig. musc. II. M. sin. & Fig. III. f. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. II. G. & Tab. 6. k. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib.

IV. Tab. 17. F. Cowper. Myot. ann. 1724. Tab. XLVII. 109.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvii. A.-a.

<sup>c</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XLVII. 109. AA.

d Cowper

or, dein angustior; post <sup>d</sup> sensim gracilescit. Se autem vertici tuberis magni & inaequabilis, quod caput ossis humeri ab exteriori parte sua exserit, affigit <sup>e</sup> tendine <sup>f</sup> brevi, eodemque crasso, plano, non valde lato, intus è carne nascente, paulatimque crescente, & in fine aliquando conjunctio cum illo Infraspinati. Eique tendini ad postremum accreta capsula continens humeri articulum, sicuti & tendinibus sequentium aliquot, nempe Infraspinati, Teretis minoris, Subscapularis: itaque fit, ut hi muscoli, aliique in eo similes, cum agunt, non modo flectant articulum, sed etiam capsam, ne remanens corrugaretur, & impedimento esset, retrahant. Supraspinatus autem os humeri attollit in priora, simulque oblique in exteriora: & humerum quoque attrahit ad brachii summum.

Est *Quintus brachium moventium*, Vesal. de. H. C. F. Lib. II. Cap. 23. *Quintus humeri musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 16. *Supraspinatus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 24. *Circumagentium humerum primus, super scapularis superior*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 14. *Supraspinatus*, Cowper Myot. Cap. 25. Dougl. Myogr. Cap. 30. *Le Sus-Epineux*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 214. & seq. *Le Sur-Epineux*, ibid. §. 949. & seq.

C A-

d Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XLVII. 109. inter B. & A. proxim.

e Eustach. Tab. XXXVII. A-β. & Tab. XXXVIII. D-α.

f Eustach. Tab. XXXVIII. D-α. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XLVII. 109. B.

a Eu-

## CAPUT CXLIV.

*De Infra spinato <sup>a</sup>.*

**A**d exemplum Supra spinati occupat quod dorsi scapulae infra ejus spinam est, praeter marginem eundem & priorem & inferiorem, partemque inferiorem anguli inferioris. Oritur & à dorso scapulae, à basi <sup>b</sup> usque ad radicem processus superioris; & ab inferiore parte spinae, & ex illo sinu, qui secundum oram priorem eandemque inferiorem porrectus. Caeterum similis praecedentis, nisi quod major sit, & ab initio longe latior, eundo longe se magis in angustum ad dorsi scapulae figuram cogat, specie trianguli. Tendinem <sup>c</sup> quoque, sed insigniorem, crassum, brevem, satis latum producit; qui procedit ad superiorem & eandem posteriorem partem ejusdem, ad quod idem ille, tuberis. Extus autem circa mediam longitudinem carnis incipit apparere <sup>c</sup>, latus ibi, indeque sensim angustior quidem, sed simul insignior: eique se in progressu tum à superiore parte, tum ab inferiore, caro adjungit <sup>c</sup>; quarum illa procedit à tota maxime spina scapulae; haec, quae insignior, ab angulo inferiore; utraque sensim decrescens. Et inferior quidem sua se carne ad exteriora tendinis adjungit: superior, qua parte insidet tendi-

H h h ni,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvii. B. & Tab. xxxix. u. Vesal. Epit. Fig. musc. ii. N. fin. & de H. C. F. Lib. ii. Tab. ii. f. pars superior & major. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv.

Tab. 17. G. Bidloo Tab. LXVI. F. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XLVII. 110.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvii. B-aa.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxvii. B-β.

<sup>a</sup> Eu-



ni, tendineam partem & ipsa inchoat, sensimque auget, adjungitque tendini, ad postremum carnea quoque ad eum accedens parte. Brachium inprimis convertit hic musculus, priorem partem ejus vertens in exteriora.

Est *Septimus brachium moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 23. *Sextus humeri musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 16. *Infraspinatus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 24. *Circumagentium secundus*, *super scapularis inferior*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 14. *Infraspinatus*, Cowper Myot. Cap. 25. Dougl. Myogr. Cap. 30. *Le Sous-epineux*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 209. & seq. & 958. & seq.

## C A P U T CXLV.

*De Terete minore <sup>a</sup>.*

**M**arginem vero scapulae eundem & priorem & inferiorem, qui ab Infraspinato liber est, tenet Teres minor; ab ejusque marginis exteriori parte tota, ab angulo inferiore scapulae, ad usque cervicem, oritur initio majorem partem carneo, extrinsecus tamen à principio aliquandiu tendinoso ab inferiore parte. Porrectus igitur secundum oram illam, in latus, inque priora adscendit, ex tenui paullatim dum oritur crassior, dein tenuior, & à primo initio acutus,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxviii. C. Casler. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 17.

<sup>a</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XLVII. 111.

b Eus-

tus, dein sensim ad finem usque latior : pertinetque ad inferiorem & eandem posteriorem partem illius tuberis, ad quod praecedens; itemque ad finitimam inferiorem cervicis humeri. His vero praecipue mediocriter crassum tendinem <sup>b</sup> inserit; dein & portionem carnem tenuiorem, ab inferiore parte <sup>c</sup> tendinis: aliquando & alteram, sed minus insignem, à superiore <sup>d</sup>. Tendo enim ejus ex media carne, ut in praecedentibus duobus, natus, ac primum non longe à fine musculi in exteriori ejus parte conspicuus <sup>e</sup>, angustusque, ad extremum usque carnem ab inferiore parte, aliquando & à superiore, insertam <sup>e</sup> sibi habet, sic ut ad ipsum etiam os, ut dictum est, cum eo perveniat. Cum Infraspinato à principio aliquantum solet esse connexus. Eademque utriusque actio.

Est *Octavus movens humerum*, Fallop. Obs. an. in illis, qui humerum movent: vid. quae respondit Vesal. in Exam. *Rotundus minor*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 24. *Musculus peculiaris*, à nemine adhuc annotatus, cujus inventionem Placentinus sibi tribuebat, Declar. Tab. Casser. ap. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Tab. 17. a. *Teres minor*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 25: Dougl. Myogr. Cap. 30. *Le petit Rond*, Winsl. Hist. de l'Acad. Roy. des Scienc. ann. 1720. p. 91. *Teres minor*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 25. *Le petit Rond*,  
Hhh 2

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvii. C-β.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxvii. C-δ.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxvii. C-γ.

<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxxvii. C-α.

a Eu-

*Rond*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. s. 206. & seq. & 964. & seq.

## C A P U T CXLVI.

*De Terete majore* <sup>a</sup>.

**N**on multum infra Subscapularem eminentiae oblongae humeri, quae est aliquantum infra tuber capitis ejus superioris inaequabile minus, infer-tus <sup>b</sup>, qui incipit <sup>c</sup> ab exteriori parte anguli inferioris, ac finitimae partis orae prioris scapulae; eodemque ac minor modo adscendit, Teres major: longus, crassus, quasi teres, at multo tamen latior, quam crassior; in ortu tenuior, subtendineus, & dum oritur, sensim latior & crassior; ubi à scapula abscedit crassior, & dein sibi satis similis, sed haud procul ab humero extenuatus, modiceque angustatus, ac dein in tendinem <sup>d</sup> latum tenuemque abeuns, qui paulatim crassior, & in fine latefcens, maxime autem in partem inferiorem <sup>e</sup>, à sua posteriore parte carne, paulatim exiliore, diu, & aliquando ad finem usque, instructus apparet, ita tamen, ut ipsa etiam illa caro in fine suo extrinsecus tendinosa fiat, praesertim à parte

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvi. V. & Tab. xxxvii. D. & Tab. xxxviii. F. Vesal. Epit. Fig. musc. II. P. fin. & Fig. III. y. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. II. L. & Tab. 13. S. & Tab. 7. M. Casser. Tab. ap. Spiegel. de H. C. F. Lib. IV. Tab. 17. E. Bidloo Tab. LXV. d. Cowper

Myot. ann. 1724. Tab. XLVIII. 112.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxviii. F.-a. Bidloo Tab. LXV. d.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxvi. V.-a. & Tab. xxxvii. D.-a.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxviii. F.-a.

<sup>e</sup> Bidloo Tab. LXV. d.

<sup>a</sup> Eu-

parte inferiore ; videaturque tendo tum è parte priore carnis , tum è posteriore , potissimum tamen è posteriore , enasci. Se autem ad postremum in duas quasi dividit portiones , quarum prior praecipua , maximeque tendinea , seseque inferit eminentiae supradictae : posterior angusta , sed crassior , & fere carnea , inferens se juxta posteriorem partem partis superioris eminentiae ejusdem. Et prior inferiore parte sua se ad similitudinem Latissimi dorsi continuat extremo Pectoralis , in sinu humeri , per quem delabitur caput Bicipitis brachii. Eidemque prioris parti inferiori firmiter accreta bursula , inter partem illam humerique os interjecta. Quomodo vero extremum hujus musculi ab inferiore parte junctum sit cum Latissimo dorsi , in hujus historia jam diximus. A principio autem aliquantum cum Subscapulari cohaeret , cumque Infra-spinato , & Terete minore : & qua contingit Subscapularem , aliquandiu tendinosus est ab ortu suo ab ora priore scapulae. Os humeri attollit pone tergum ; idemque extrorsum sua priore parte conversum , vertit modice in contrarium.

Est *Tertius brachium moventium* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 23. *Tertius humeri musculus* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 16. *Rotundus major* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 24. *Deprimens humerum Rotundus* , Spiegel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 14. *Teres major* , Cowper-Myot. ann. 1694. Cap. 25. Dougl. Myogr. Cap. 30. *Le grand Rond* , Winsl. Hist. de l'Acad. Roy. des Scienc. ann. 1720. p. 91. *Teres major* , Cowper  
Hhh 3 Myot.

Myot. ann. 1724. Cap. 25. *Le grand Rond*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 200. & seq. & 491. & seq.

## C A P U T CXLVII.

*De Subscapulari <sup>a</sup>.*

**S**ubscapularis internae amplitudini scapulae, qua ea concava est, infidet, oriturque à posteriore parte ejus <sup>b</sup>, fere usque cervicem; & prope à tota inferiore marginis rotunduli orae prioris ejusdemque inferioris: & qua ab ora illa juxta angulum scapulae inferiorem, ibi extrinsecus à posteriore parte aliquandiu tendinosus. Decurrit ad superiorem humeri partem <sup>c</sup>. Juxta basem scapulae latior, tenuisque est; inde se maxime ut ipsa scapula coangustat, & donec oritur, increfcit; post decrefcit, abitque in finem latum, majorem partem tendineum & crassum, ab inferiore carneum & tenuiorem; cujus pars tendinea inserta tuberi inaequabili minori capitis superioris humeri, à summo ad imum; carnea infra tuber illud ipsi humero. Os humeri hic musculus admovet ad latus corporis, ac simul introrsum insigniter vertit, contrario modo atque Infraspinatus & Teres minor. Idem os, cum sublatus est, deprimat. Est vero in fasciculos notabiles certo quodam modo distinctus, qui ad

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxviii. E. Vesal. Epit. Fig. musc. iii. t. dext. & de H. C. F. Lib. ii. Tab. 7. r. Bidloo Tab. Lxv. E. Cowper Myot.

ann. 1724. Tab. xlvi. & xlix. 115.

<sup>b</sup> Bidloo Tab. Lxv. E.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxviii. E-a.

<sup>a</sup> Eu-

ad tres ordines referri possunt. Ad primum quinque plerumque pertinent, oriundi ab eminentiis, quae in cava scapulae parte juxta basem ejus sunt: prima mox infra angulum superiorem, quinta ad radicem anguli inferioris, tres reliquae medio inter has loco: omnes primum tendinei, & graciles; dein sensim carnei, sensimque latiores, & insigniores; converguntque sensim, donec ubi ad humerum accedunt, coeant. Par numerus secundi ordinis fasciculorum, quorum quatuor inferiores interjecti primi ordinis quinque; superior supra eorundem superiorem. Hi carnei, primum latiores & tenuiores, dein angustiores & crassiores, abeuntque singuli in tendinem insignem: converguntque ad humerum incedentes, partim subjecti illis primi ordinis, cum iisque cohaerentes, maxime tendinibus suis. Atque in horum intervallis tertius ordo, subjectus primo. Constat is ex carne tenuiore, sensim tamen crassescente, juncta & fasciculis secundi ordinis, quibus interferta; & primi, qua iis subjacet. Ex his tribus ordinibus inter se ad postremum commistis, extremum efficitur unum, crassum, latum, quod ex interiore parte tendineum fieri primum incipit, ab inferiore carneum permanet.

Est *Sextus brachium moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 23. *Septimus humeri musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 16. *Immersus*, sive *subscapularis*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 24. *Circumagentium tertius*, *subscapularis*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 14. *Subscapularis*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap.

25. Dougl. Myogr. Cap. 30. *Le Souſcapulaire*, Winſl. Hiſt. de l'Acad. Roy. des Scienc. ann. 1720. p. 91. *Subſcapularis*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 25. *Le Souſ-capulaire*, Winſl. Exp. an. Trait. des muſcl. §. 219. & ſeq. & 961. & ſeq.

## REGIO XXIII. HUMERUS.

## CAPUT CXLVIII.

*De Bicipite brachii<sup>a</sup>.*

**D**uo muſculi, qui tantummodo in ſine conjuncti, Bicipitem efficiunt. Prior<sup>b</sup> ab initio tendo<sup>c</sup> longus eſt, craſſuſque, & planus. Is autem naſcitur<sup>d</sup> à parte eadem & ſuperiore & exteriore marginis ſinus illius ſcapulae, cum quo caput humeri commiſſum; ubi & continuus tendo ille ligamento, quo augetur ora ſinus. Inde primum per capsam, quae articulum modo dictum complectitur, ſuper caput oſſis humeri procedit<sup>e</sup> in priora introrſum ad ſinum, qui eſt inter duo capituli illius tubera inaequabilia; per eumque<sup>f</sup> deinde deſcendit, retentus in eo ligamento<sup>g</sup> tendineo lato tenui, quo obductus, ſic ut nunquam, in quacun-

<sup>a</sup> Euiſtach. Tab. xxxv. TV. Veſal. Epit. Fig. muſcl. 1. r. ſin. & de H.C.F. Lib. II. Tab. 6. ⑥. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. L. 116.

<sup>b</sup> Euiſtach. Tab. xxxv. T. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. L. 116. A.

<sup>c</sup> Euiſtach. Tab. xxxv. T-88. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. L. 116. A.

<sup>d</sup> Caſſer. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 20. Fig. 1. G.

<sup>e</sup> Euiſtach. Tab. xxxv. T-2. Veſal. Epit. Fig. muſcl. 1. b. ſin.

<sup>f</sup> Euiſtach. Tab. xxxv. T-3. Veſal. Epit. Fig. muſcl. 1. b. ſin.

<sup>g</sup> Caſſer. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 19. cc.

cunque etiam humeri positura, elabi ex canali, qui è sinu illo ligamentoque fit, possit, neque nimis ab humeri capite deflectere: & cum ex hoc canali exiit, descendit ulterius, paullatimque latior, in ventrem<sup>b</sup> intumescit. Primum ejus tendinis initium crassius est, & latius: inde angustior fit, & paullo tenuior; qua vero super caput humeri incedit, latior est, crassiorque, & durior. Posterior musculus<sup>i</sup> à principio tendineus est, tenuis, latus, cohaerensque<sup>k</sup> cum Coracobrachiali, ac cum eo se demittens ab extremo processu coracoideo<sup>l</sup>. Mox autem in ventrem prioris similem abit, sensim crassescens, & latefcens. Utriusque venter oblongus est, crassus, sensimque crassior, manetque extrinsecus diu, itemque aliquantum intrinsecus, minus autem minusque, tendinosus. Qui posterioris est, paullo citius incipit, quam qui prioris, eoque etiam à principio crassior est<sup>m</sup>: at contra extremum prioris crassius est, posteriori ex parte subiectum<sup>n</sup>. Et jam cito alter alterum contingit, donec deinde, postquam incepterunt gracilefcere, confluant in commune extremum<sup>o</sup>, paullatim angustius & tenuius, seseque mox in tendinem<sup>p</sup> crassum, longumque, & ex utroque ventre principii sui partem habentem, vertens. Quibusdam tantum tendine illo,

Iii

nulla

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxv. T. Cowper  
Myot. ann. 1724. Tab. L. 116. A.

<sup>i</sup> Eustach. Tab. xxxv. V. Cowper  
Myot. ann. 1724. Tab. L. 116. B.

<sup>k</sup> Eustach. Tab. xxxv. R.

<sup>l</sup> Eustach. Tab. xxxiii. 31.

<sup>m</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. L.  
116. A. B.

<sup>n</sup> Eustach. Tab. xxxv. TV-γ. Cowp.  
Myot. ann. 1724. Tab. L. 116.

<sup>o</sup> Eustach. Tab. xxxv. TV-δ. Cowp.  
Myot. ann. 1724. Tab. L. 116. C.

<sup>p</sup> Eu-



nulla carne, cohaerent. Sic cubitum petunt, in quo tendinem affigunt<sup>p</sup> tuberculo, quod è radio infra cervicem ejus eminet : affigunt autem ejus parti posteriori, per longitudinem totam : prior enim pars laevis est, ad eamque se tendo, cum prona manus, inflectit; interjectaque bursa tenuis & parva, vestiens ab una parte tuberculum, ab altera tendinem, accreta firmiter utrique, & laxè etiam finitimae parti Supinatoris brevis, cui aequè ac Bicipitis tendini parte sui subjacet. Tendo non longe à flexu cubiti incipit, aliquanto citius ab exteriorè parte carnis. Multo insignior pars illa ejus, quae nascitur è ventre priore, quam quae ex posteriore : & quamvis conjunctae inter se, & connexae, tamen aliquandiu distinctae, maxime qua parte spectant Brachialem internum. Primum autem tendo se angustat : manet deinde fere ejusdem latitudinis & crassitudinis ; sed extremo dilatat se modice, & crassescit satis insigniter. Lata praeterea, eaque tenuis, aponeurosis i mox supra flexum cubiti tum ab exteriorè parte tota principii tendinis, tum ab ima proximae carnis, quae est à posteriore parte tendinis, abscedit : eaque retrorsum se flectit, dilatatque paulatim, primo crassior, ubi se insignius dilatare incipit, inde inprimis extenuans ; partemque facit tendineae vaginae, quae cubitum sub tegumentis ambit. Biceps radium circa ulnam conversum vertit in contrarium, supinare dicunt. Cubiti articulum flectit;

p Eustach. Tab. xxxv. TV-s. Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 8. Q. Casfer. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab.

20. Fig. 1. L. Bidloo Tab. LXVIII. q Cowper Myot. ann. 1724. Tab. 1. 115. D. & Tab. 1. & XLIX. Fig. 1. 115. a Eu-

flectit, cum radius vel juxta ulnam rectus est, vel circa eam conversus retinetur, ne ab eo convertatur. Brachium, praesertim cum cubitus extensus, firmatusque, movere posse videtur, trahereque latus corporis versus, & simul in priora: idem extrorsum conversum, suo priore capite vertere introrsum: scapulam autem attrahere ad brachium.

Est *Primus flectentium cubitum*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 46. praeter *carnosam partem interioris principii*, &c. *Primus cubitum flectens*, vulgo ab *Italis dictus il Pescetto*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 32. praeter *alterius initii carnosam partem. Biceps*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 25. *Cubitum flectentium primus*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 15. praeter *carnosam portionem in humeri medium insertam. Biceps manus*, Stenon. Elem. myol. spec. p. 51. *Biceps*, Cowper Myot. Cap. 26. *Biceps internus*, Dougl. Myogr. Cap. 31. *Le Biceps du bras*, Winsl. Hist. de l'Acad. Roy. des Scienc. ann. 1720. p. 91. *Le Biceps, ou Coraco-radial*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 227. & seq. & 966. & seq.

## CAPUT CXLIX.

*De Coracobrachiali<sup>a</sup>.*

**C**oracobrachialis ita cohaeret<sup>b</sup> cum Bicipitis capite posteriore, ut pars ejus haberi possit. Commun-

I i i 2

mu-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiii. 36. Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 1. R. & Tab. 4. Casler. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 20. Fig. 1. PP. & Fig. 3. Cow-

per Myot. a. 1724. Tab. XLVIII. II. 4.  
<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxv. R. Bidloo Tab. LXV. F.

c Eu-

munem enim non modo cum eo à processu coracoideo originem habet <sup>c</sup>, sed etiam cum principio tendineo ejus, qua id humerum spectat, diu conjunctus est: à priore quidem parte, tendinea principii sui portione; à posteriore, carne multa, quae & una cum Bicipitis capite à coracoideo procedit, & continuo deinde ab illo ipso capite per longitudinem abscedit. Pertingit <sup>d</sup> ad posteriorem partem amplitudinis interioris ossis humeri, circa mediam ejus ossis longitudinem, se nonnihil oblique retrorsum demittens. Ejus à coracoideo initium tenuius, angustius, &, ut indicatum, partim tendineum, partim carneum: ut deinde à Bicipitis capite paullatim nascitur, ita quoque paullatim crescit: idem cum deseruit, decrescit, tantum qua id contingit, aliquandiu à tendinea principii sui parte tendinosus. Nec carneus permanet, sed ante medium longitudinis suae tendinem <sup>e</sup> efficere incipit, qui carnem à priore parte sua usque ad finem accipit forma pennata, eoque augetur magis magisque, sed ipso fine se extenuat: non raro autem ipsa cum eo caro, eaque aliquando valde insignis, ad humerum pertinet. Tendo saepe fine suo cohaeret cum Brachiali externo. Humeri os ad latus corporis rectius, quam Biceps, Coracobrachialis admoveat: introrsus conversum, vertit simul extrorsum. Os humeri scapulamque attrahit ad se mutuo. Aliquoties visus ex duobus constare, communem tendinem efficientibus. Alias

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxiii. 31.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxiii. 36-4. Casser.  
Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 20.

Fig. 1. P. inf.

<sup>e</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. XLVIII. 114. N.

f. Casser.

lias ante longitudinis medium in duas partes fissus <sup>f</sup>; penetratque <sup>g</sup> ibi per eum insignis nervus.

Est *Carnosa pars interioris principii cubitum flectentium primi*, Vetal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 46. *Carnosa pars alterius initii primi cubitum flectentis*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 32. *Primi cubitum flectentis insignis musculosa portio*, quam inter *humeri motores jamdiu recenseo*, Arant. Anat. obs. Cap. 42. *Coracoideus*, sive *Coracobrachieus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 24. *Portio carnosa*, quam *Placentinus pro peculiari musculo habuit*, *Perforatum appellans*, Explan. Casser. Tab. ap. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Tab. 19. N. *Coracobrachialis*, Cowper Myot. Cap. 25. Dougl. Myogr. Cap. 30. *Le Coraco-brachial*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 216. & seq. & 947. & seq.

## C A P U T CL.

*De Brachiali interno <sup>a</sup>.*

**B**rachialis internus ossis humeri interiore parte demissus, ad interiorem quoque capitis superioris ulnae pertingit <sup>b</sup>, flectitque cubitum, movendo ulnam, aut & firmata ea quantum satis, humeri os:

Lii 3.

Qua

<sup>f</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 20. Fig. 3. B. & Fig. 1. inter P. P.

<sup>g</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 20. Fig. 1. inter P. P. Eustach. Tab. xix.

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxviii. G. & Tab.

xxxvii. EE. Vetal. Epit. Fig. muscl. iii. 7. dext. & de H. C. F. Lib. ii. Tab. 7. P. & Tab. 8. r. Bidloo Tab. LXV. Cowper. Myot. ann. 1724. Tab. ii. & L. 117.

<sup>b</sup> Vetal. de H. C. F. Lib. ii. Tab. 8. N. Bidloo Tab. LXV.

Qua primum incipit, lunato, & velut bicorni, eo-  
 que cornua aliquantum tendinosa habente, margine <sup>c</sup>  
 ambit inferiorem partem tuberum, quibus Deltoïdes  
 insertus, cum quo & ibi frequentissime cohaeret:  
 multaque carne oritur <sup>d</sup> ab amplitudine humeri, quae  
 infra tubera illa, inde fere usque ad condylos, im-  
 mo ad priorem usque. Ipse crassius, nec tamen aequè  
 omni ex parte: siquidem à superiore tenuior & an-  
 gustior, post continuo fibrarum accessu intumescit  
 sensim, iterumque, ubi nullis amplius admodum  
 augetur, jamque ad cubiti articulum appropin-  
 quat, detumescit; unde quoque extrinsecus ten-  
 dineus fieri incipit, citius autem, qua subjectus Supi-  
 natori longo; post magis magisque tendineus, & qui-  
 dem ad finem usque, qui crassius, & majorem par-  
 tem tendineus, maxime extrinsecus. Et totus latior  
 quam crassior est. Qua ei Supinator longus incum-  
 bit, incumbit autem à priore parte, ibi totus longe  
 tenuior est, tanquam si sinum ei profundum Supina-  
 tor ille imprimeret. Antequam se inserat, juxta con-  
 dylum priorem, aponeurosem, ut Biceps, dimittit,  
 sed tenuiorem, similiter autem latescentem, perque  
 interiora cubiti, maxime secundum Supinatorem lon-  
 gum, descendantem, accedentemque ad tendineam  
 cubiti vaginam. Ejus partem posteriorem, quae in-  
 cipit juxta posteriora Deltoïdis, diu à reliquo musculo  
 distinctam aliquando invenimus. Ibidemque ab eo  
 porti-

c Eustach. Tab. xxxviii. G-aa, Vc-  
 sal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 8.

LM.

d Bidloo Tab. LXVI. B.

c Eu-

portionem <sup>c</sup> insignem abscedere vidimus, descendereque sub Bicipite, ad eumque, qua is Brachiali interno incumbit, se non longe à tendine, in quem Biceps ille abit, adjungere.

Est *Secundus*, seu *cubitus flectentium posterior*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 46. *Secundus cubitus flectens*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 32. *Brachieus internus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 25. *Cubitus flectentium secundus*, *Brachieus vocatus*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 15. De Marchett. Anat. Cap. 18. *Brachieus internus*, Cowp. Myot. Cap. 26. *Brachialis internus*, Dougl. Myogr. Cap. 31. *Le Brachial*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 234. & seq. & 976. & seq.

## CAPUT CLI.

*De Tricipite brachii <sup>a</sup>.*

**T**rina Tricipiti, ut nomen indicat, capita; unum Longum <sup>b</sup> vocant, alterum Brevem <sup>c</sup>, tertium Brachialem externum <sup>d</sup>. Longus oritur <sup>e</sup> ab imo cervicis

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxiii. 41. ut videtur.

<sup>a</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. L. 118. 119.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvi. N. Vesal. Epit. Fig. musc. II. h. fin. & Fig. iv. m. dext. & Fig. III. X. fin. & de H. C. F. Lib. II. Tab. II. f. Bidloo Tab. LXVI. C. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. L. 119. A.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxvi. M. Vesal. E-

pit. Fig. musc. II. i. fin. & de H. C. F. Lib. II. Tab. II. f. Bidloo Tab. LXVI. D. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. L. 118. B.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxvi. W. Vesal. Epit. Fig. musc. IV. o. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. II. X. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. L. 118. C.

<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxxvi. N. a.

f Cowp.

vicis scapulae , finitimaeque partis orae , quae infra cervicem est. Tendineus <sup>f</sup> primo , aut tendinosus , modiceque latus & crassus , post paullatim latior crassiorque , non longe ab extremo suo iterum extenuatur , & angustatur. Et jam prope à capite carneus <sup>f</sup> fit , extrinsecus tamen ab ea parte , qua spectat Teretem minorem , aliquantum tendinosus , & magis etiam ab altera , qua spectat majorem , indeque diu per posteriorem partem. Brevis & Brachialis externus ab ossè humeri procedunt , uterque à superiore parte tenuis & angustus , dein quanto magis procedit , eo latior. Ille vero oritur <sup>s</sup> ab exteriori parte ossis humeri , per longitudinem ejus , à radice cervicis caput superius sustentis , primum leniter incurvo ductu usque ad posteriorem partem finis Deltoïdis , ( aliquando tantum uno alterove tendine infra cervicem , inde usque ad finem Deltoïdis non adhaerens ossi , rursus deinde oriri pergens : aliquando à summo ortu , usque qua secundum Deltoïdis extremum incedit , totus interruptus , & aliquot portionibus tendineis , modicis disjunctis intervallis , per longitudinem humeri oriens ) dein secundum eum , secundumque posteriorem partem cornu prioris Brachialis interni , ipsiusque deinde Brachialis , usque ad humeri marginem priorem , relictoque in medio longitudinis humeri intervallo , ( per quod insignis nervus cum arteria & vena procedit ) rursus deinde aliquandiu secundum margi-

<sup>f</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. L. 118. A. <sup>g</sup> Eustach. Tab. xxxvi. M-a.

h Eu-

marginem eundem ; principio lato , tenui , tendinoso , à quo & extrinsecus primum tendinosus , maxime à parte superiore ; & à cujus latitudine tota primum crassescit , dein se extenuat. Hic , id est , Brachialis externus , ab exteriori similiter parte humeri , sed eo modo , quo ab averfa Brachialis internus : summo quidem initio suo <sup>h</sup> juxta inferiorem partem ejus , cui Teres major insertus ; inde lateribus suis primum obliquo ductu usque ad marginem priorem posterioreque humeri , quos attingit circa mediam humeri longitudinem ; post à marginibus illis , à posteriore prope usque ad condylum ; à priore usque ad radicem condyli , porroque ab exteriori parte radice illius , per altitudinem ejus totam ; atque ab amplitudine ossis , quae his , quos modo memoravimus , continetur terminis : estque ab ortu tendinosus à posteriore parte ; & dum oritur , sensim à summo initio deorsum versus crassior fit. Brachiali Longus & Brevis incumbunt ab exteriori parte , à quibus tamen liber tum à priore parte , tum à posteriore <sup>i</sup>. Brevis prior est , Longus posterior. Horum fibrae convergunt <sup>k</sup> ad angulos acutos , Brachialis descendunt rectius <sup>l</sup>. Una tandem ex iis fit cauda , & fere hoc modo. Brevis extrinsecus jam cito in tendinem latum abit <sup>m</sup> , & juxta Longum , quam alibi , citius : huic se Longi fibrae carnaeae continua per longitudinem serie ad-

K k k

jun-

<sup>h</sup> Eustach. Tab. xxxvi. W- $\alpha$ .

<sup>i</sup> Eustach. Tab. xxxii. 27.

<sup>k</sup> Eustach. Tab. xxxvi. MN- $\beta$ .

<sup>l</sup> Eustach. Tab. xxxvi. W.

<sup>m</sup> Eustach. Tab. xxxvi. M- $\gamma$ .



jungunt, & ab inferiore quoque parte extrinsecus tendineae. At ex interiore parte contra fit: ibi enim Longus tendinem latum crassumque à parte Brevis efficit, ad quem hujus fibrae, ut extrinsecus Longi ad Brevem, accedunt. Amboque, quos diximus, tendines abeunt in unum <sup>n</sup>, qui latus & tenuis. Post hos Brachialis sua se carne partim jungit carni Brevis Longique, partim tendinibus eorum, partique interiori communis <sup>o</sup>, fere ad finem ejus usque: quin & à posteriore parte extrinsecus magis magisque tendineus fit; & partim quidem qua subjacet tendini Longi, ei se non diu post adjungit; partim ab ejus posteriore parte conjungit cum communi tendine, ejusque partem facit: à priore ad ipsum cum communi olecranon pertingit, portione carnea, exigua, tenui, cumque Anconeo cohaerente: interdum autem ad postremum, qua sub tendine communi incedit, deferit eum, extremoque singulari, tendineo, tenui, brevi, ulnae se post communem inserit. Communis caeterum cauda sensim decrescit. Communisque tendo quo longius progressus, eo & angustior, seseque praecipue affigit <sup>p</sup> exteriori parti verticis olecrani, extremo crasso & valente: à cujus priore parte in acutum tenuioremque mucronem <sup>q</sup> angustatus, decurrit longius, ad olecrani partem priorem, & ad spinam, quae continuo ab ea ex ulna eminet, definens <sup>q</sup>; sic tamen, ut & aponeurosem ad vaginam tendi-

<sup>n</sup> Eustach. Tab. xxxvi. MN-v.

<sup>o</sup> Eustach. Tab. xxxvi. W-βββ.

<sup>p</sup> Eustach. Tab. xxxvi. MN-δ.

<sup>q</sup> Eustach. Tab. xxxvi. MN-ε.

<sup>a</sup> Eustach.

tendineam cubiti dimittat , qualem eidem à posteriore quoque parte sua largitur. Totus caeterum Tri-ceps recta descendit , cubitumque extendit , movens ulnam , eaque satis firmata , os humeri. Longus in-super brachium ad corporis latus , modiceque ad ter-gum trahit : scapulae partem , à qua procedit , ad bra-chium.

Longus est *cubitum extendentium primus*, Vefal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 46. *Tertius cubiti*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 32. *Longus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 25.

Brachialis externus , *Carnosa pars , qua primus exten-dentium augetur , quem secundum constituere licet* , Vefal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 46.

Brevis , *Tertius cubitum extendentium* , Vefal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 46.

Brevis cum Brachiali externo , *Quartus cubiti* , Co-lumb. de re an. Lib. V. Cap. 32.

Brachialis externus , *Brachieus externus* , Riolan. Anthr. Lib. V. 25.

Brevis est *Brevis* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 25. *Os cubiti Extendentium secundus*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 15.

Longus una cum Brachiali externo , est *os cubiti Extendentium primus* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 15.

Longus una cum Brevi , *Gemellus* , Cowper Myot. Cap. 26. *Biceps externus*, Dougl. Myogr. Cap. 31.

Brachialis externus , *Brachiacus externus* , Cowper  
K k k 2 Myot.

# 444 HISTORIAE MUSCULORUM

Myot. Cap. 26. *Brachialis externus*, Dougl. Myogr. Cap. 31.

*Triceps totus*, *Triceps cubiti*, *Extensor cubiti magnus triplici principio natus*, Dougl. Myogr. Cap. 31. Vide *cubiti Extensores*, Morgagn. Adv. an. II. Anim. 16.

*Longus*, *le grand Anconé*, Winsl. Exp. an. Trait. des musc. §. 239. & seq. & 979. & seq.

*Brevis*, *l'Anconé externe*, ibid. §. 242. & seq. & 982.

*Brachialis externus*, *l'Anconé interne*, ibid. §. 242. & seq. & 982.

## REGIO XXIV. CUBITUS.

### C A P U T CLII.

#### *De Supinatore longo .*

**H**ic, quantum experiundo assequi potui, radium circa ulnam in utramque partem convertit, eoquē manum non modo ex prona facit supinam, quae vis nominis; sed etiam ex supina pronam, & magis quidem, ut saepe ne convertere quidem in supinum posse visus sit. Flectit quoque articulum cubiti, quem praeterit, ab inferiore parte marginis prioris ossis humeri <sup>b</sup>, mox supra ortum Radialis externi lon-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxv. W. & Tab. xxviii. 30. Vesal. Epit. musc. Fig. 1. x. fin. & i. dext. & Fig. iii. 7. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 6. A. & Tab. 2. S. Bidloo Tab.

lxix. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LIV. 145.

<sup>b</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 12. a.

longioris, ad extremum descendens cubitum. Satis latus est unde oritur, tenuisque, & ex interiore parte à principio aliquantum tendinosus: dein minus & minus latus, verum diu modice crassior, post extenuatus: quanquam ita se flexui cubiti accommodet, ut quoad incedit ad eum, primum angustior fieri videatur <sup>c</sup>, crassiorque esse in ipso flexu, post primum latescere <sup>c</sup>, mox rursus angustari. Inque media fere cubiti longitudine abit in tendinem <sup>d</sup> tenuem, ab ea parte, qua adjacet Radiali externo, citius incipientem, sensimque angustiolem, & crassiorem, verum ad postremum dilatatum & extenuatum. Insertus <sup>e</sup> autem priori parti capitis inferioris radii, ad principium illius sinus, per quem se à cubito ad manum demittunt tendines pollicis Abductoris longi & Extensoris parvi.

Est *Quatuor radium peculiariter agentium secundus*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 45. *Octavus manus exterior musculus longissimus nuncupatus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 34. *Longus supinator*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 26. *Supinatorum primus, sive Longior*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 16. *Supinator radii longus*, Cowper Myot. Cap. 31. *Supinator longus*, Dougl. Myogr. Cap. 38. *Le long ou grand Supinateur*, Winth. Exp. an. Trait. des muscl. §. 254. & seq. & 984. & seq.

K k k 3

C A-

c Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LIV. 145-

d Eustach. Tab. xxxv. W-α.  
e Eustach. Tab. xxxv. W-β.

a Eu-

## CAPUT CLIII.

*De Radiali externo longiore, & brevior.*

**R**adiales externos adhuc inveni duos, longiorem<sup>a</sup> & brevior<sup>b</sup>. Uterque oritur ab inferiore parte ossis humeri: hic à condylo prior<sup>c</sup>, cum Extensore digitorum communi, auricularis proprio, Ulnarique externo, capite tendineo; ille statim supra eum, à margine prior<sup>e</sup>, principio subtendineo, à quo subtus aliquantum tendinosus. Uterque per cubitum descendit ad dorsum manus, ubi ille se affigit<sup>d</sup> parti eidem & exteriori & priori radice capitis superioris ossis metacarpi, cum quo index commissus: hic, & ejusdem ossis capiti, & illi secundi; praecipue priori eidemque exteriori parti radice secundi<sup>e</sup>, posteriori autem eidemque exteriori primi<sup>e</sup>. Quibusdam brevioris tendo in duos in fine divisus, quorum alter ad primum metacarpi manus os, alter ad secundum pertinet: interdum solummodo<sup>f</sup> ad secundum pertinet. Uterque carpum extrorsum simulque oblique in priora flectit, brevior vero magis in exteriora, quam longior; in priora minus:

- a Eustach. Tab. xxxvi. Z. & Tab. xxxiii. 52. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 27. Fig. 2. bdd. Bidloo Tab. LXXI. F. & Tab. LXIX. F. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LIII. 141. A.  
b Eustach. Tab. xxxvii. F. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 27.

- Fig. 2. BBcc. Bidloo Tab. LXXI. I. & Tab. LXIX. D. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LIII. 141. B.  
c Eustach. Tab. xxxvii. F. a.  
d Eustach. Tab. xxxvi. Z-γ.  
e Bidloo Tab. LXXI. I.  
f Eustach. Tab. xxxvii. F-γ.

g Casser.

minus : longior cubitum quoque flectit, praesertim si is non sit, quantum potest, extensus : utrumque si trahas suum principium versus, manus, cum quantum potest supina est, modice in pronum vertitur ; cum prona, in supinum. Uterque ex tenui principio intumescit, rursusque deinde detumescit : sed longior ex ampliore fit primo modice latior, dein minus & minus latus ; brevior primo ex acutiore sensim latior, dein angustior. In tendinem uterque abit, longior tamen citius <sup>g</sup>, multoque antequam ad mediam cubiti longitudinem venerit : brevior <sup>h</sup> circa mediam. Tendo longioris primum plerumque ab ea parte incipit, quae incumbit breviori ; principio tenuis & latus, in progressu sensim crassior, diuque angustior, post, ubi è sinu radii exit, iterum modice latior. Brevioris extrinsecus cito paullatimque editus, qua primum nascitur, se ex angustiore dilatat, angustat postea, ac modice sensimque crassescit, insignior illo longioris. Utrique se in fine nonnihil dilatant, extenuantque. Ambo ubi à cubito ad manum decursuri sunt, procedunt per sinum secundum capitis inferioris radii, qui prior exteriorum ; in eoque retinentur ligamento<sup>i</sup>, quo obducti ; eidemque laxè adnexi subtendineis, sed sequacibus, lubricisque membranis. Inveni aliquando portionem gracilem, quae à longioris

ris

g Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 27. Fig. 2. bd. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LIII. 141. AC.  
 h Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 27. Fig. 2. BBc. Cowper

Myot. ann. 1724. Tab. LIII. 141. BC.  
 i Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 1. & 2. f. Eustach. Tab. XXVIII. f. 4.

ris posteriore margine abscedebat , sensim gracilior , abeunſque in tendinem tenuem , & anguſtum , decurrentem ſecundum ventrem tendinemque brevioris , uſque ad finem cubiti , inde ſub tendine ejus , cum eo cohaerentem , inprimis in fine , diſtinctum tamen , & inferſum oſſi metacarpi manus ſecundo , mox ſupra eum locum , ad quem pertinet brevior.

Longior una cum brevior , *Quartus brachiale moventium* , Veſal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 44. *Septimus manus exterior muſculus* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 34.

Longior eſt *Radiuſ externuſ* , qui ab acumine oſſeo brachii enaſcitur , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 27.

Brevior eſt *Radiuſ externuſ* , qui à condylo externo brachii oritur , ibid.

Longior una cum brevior , eſt *Extendentium* ( carpum ) *exterior* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 17.

Longior eſt *the outermoſt muſcle* , Cowp. Myot. Cap. 30. in *Extenſore carpi radiali*. *Extenſor carpi radialis longuſ or ſuperior* , Dougl. Myogr. Cap. 33. *Le Radial externe premier* , Winſl. Exp. an. Trait. des muſcl. §. 278. & ſeq. & 1013. & ſeq.

Brevior eſt *the other beginning* , &c. Cowper Myot. Cap. 30. in *Extenſore carpi radiali*. *Extenſor carpi radialis brevis or inferior* , Dougl. Myogr. Cap. 33. *Le Radial externe ſecond* , Winſl. Exp. an. Trait. des muſcl. §. 278. & ſeq. & 1013. & ſeq.

## CAPUT CLIV.

*De Extensore communi digitorum manus <sup>a</sup>.*

**I**n superiore capite meminimus de communi tendineo principio Radialis externi brevioris, Extensoris communis digitorum manus, Extensoris proprii auricularis, Ulnaris externi; quod non alibi melius, quam hic loci, videmur descripturi. Crassus itaque tendo ab osse humeri oritur, partim mox supra condylum priorem, partim, & potissimum quidem, ab illius ipsius condyli priore parte tota: ad quem tendinem accedit pars tenuior, incipiens à priore parte partis superioris olecrani, juxta partem externam finis Anconei. Descendit, à principio cohaerens cum tendineo principio Supinatoris brevis, quo is à condylo incipit; cum eoque adhaerens capsulae radii articulum in cubito continenti: mox autem ab exteriori parte abit in vaginam quandam tendineam, crassam, constantem è fasciculis tendineis descendantibus insignibus, tensam praeterea, arteque complectentem musculos, qui in exteriori cubiti parte, à Radiali externo breviori, usque ad posteriora ulnae, donec spinæ ejus illi, quae infra olecranium porrecta, adhaereat. Intus autem tendo ille abit in propaggines notabiles, quae sepimentorum instar se interferunt musculis; unam, quae Radiali breviori & Extensori communi di-

LII

gito-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxix. 28. & Tab. xxxiv. WXY. Vesal. Epit. musc. Fig. 11. S. dext. & de H. C. F. Lib.

11. Tab. 9. Z. Bidloo Tab. LXX. D. & Tab. LXIX. G.

b Bid-



gitorum manus : aliam , quae Extensori mododicto & Ulnari externo : aliam , quae Ulnari huic & Ancone. Illaque , quae interfert se Extensori communi & Ulnari , postquam aliquantum progressa , findit se in duas partes , continentes Extensorem proprium auricularis. Atque à sepimentis illis , & ab ea etiam parte , quam vaginam vocavimus , procedit caro eorum musculorum , quibus caput illud tendineum commune esse diximus. Sepimenta ut descendunt , latefcunt , & extenuant se : illudque , quod se demittit inter Radialem externum breviorē & Extensorem communem , ubi hi non amplius oriuntur ab eo , per utriusque superficiem aliquantum excurrit , efficiens eas tendinosas : quod inter Ulnarem & Anconeum , per Anconei exteriora decurrit , ad os pertinens cum eo. Nunc dici poterit de musculis , ad commune hoc caput cum Radiali externo breviori pertinentibus. Et primo de proximo à Radiali , Extensore communi digitorum manus , qui eodem atque ille modo , sed ad medios digitos usque , incedit. Caro ejus mox infra condylum humeri à communi tendineo capite incipit , dein modice , prout pergit , intumescit , & cum non multum progressa , se in tres <sup>b</sup> portiones dividit , graciles , paulatimque graciliores , & in gracilem eundemque fere teretem quamque tendinem <sup>c</sup> abeuntem ; mediam quidem citius , saepe circa medium cubiti ; tardissime vel posteriorem , vel priorem , vel utramque aequae cito : posteriori carnem usque

<sup>b</sup> Bidloo Tab. LXX. DD.<sup>c</sup> Bidloo Tab. LXX. infra D. infer.<sup>d</sup> Bid-

usque ad ligamentum armillare adhaerentem vidimus. Tendo mediae ex illa ejus parte primum nascitur, quae incumbit subjectis musculis: duarum reliquarum ex ea, qua mediae obversae. Prioris gracillimus <sup>d</sup>, posterioris fere crassissimus, cui tamen aliquando aequalis medius <sup>d</sup>, qui & aliquando crassissimus, prioris & posterioris aequalibus inter se. Tres hi tendines, sicuti & portiones, è quibus nascuntur, juxta se invicem per cubiti longitudinem porrecti; ad cujus finem sub ligamento <sup>e</sup>, quo principium dorsi manus ex transverso obductum, per canalem, ex illo ligamento & ex sinu, qui in media exteriori parte capitis inferioris radii, effectum, incedunt, ea parte & inter se, & cum canali illo laxè membranis lubricis conjuncti: & cum ex eo canali egressi, divergunt, perque dorsum manus lati & plani, sensimque latiores, ac frequenter, primo excepto, fissi <sup>f</sup>, & quasi in fibras distincti, rursusque connexi <sup>f</sup>, ac juxta digitos diversimode emissis portionibus <sup>f</sup> tendineis, tenuibus, aliis latis, aliis angustis, obliquis aliis, aliis rectioribus, inter se cohaerentes, incedunt ad digitos primores tres; ad quos antequam pertingant, fiunt sensim angustiores & crassiores, dein per dorsum sui quisque digiti rursus latefcens, ac simul tenuior, pergit <sup>g</sup>, ossis primi ordinis partem anteriorem fere ex toto integens, (quod tendo indicis cum Indicato-

L 11 2

ris

<sup>d</sup> Bidloo Tab. LXX. DD.

<sup>e</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 2.

3. Eustach. Tab. XXVIII. 54.

<sup>f</sup> Eustach. Tab. XXIX. 28.

<sup>g</sup> Hist. huj. Icon. IV. II. & o. & p.

<sup>h</sup> Hist.

ris tendine facit <sup>h)</sup> & ad postremum affigit se <sup>i</sup> tuberculo oblongo transversoque, quod in superiore capite ossis ordinis secundi, à parte externa. Ubi per os primi ordinis incedunt, accipiunt Interosseorum & Lumbricalium tendines: à posteriore parte <sup>k</sup> tendinem Interossei; à priore autem <sup>l</sup> primus tendinem Lumbricalis; secundus & tertius communem <sup>m</sup> Lumbricalis & Interossei. Dat autem quisque ab utroque latere, ubi articulum digiti cum metacarpo praeterlabitur, tenuem latamque aponeurosem <sup>n</sup>, quae conjunctae cum tendinibus, quos hos Extensoris tendines accipere dixi, ambiunt capsam articuli illius, per ejus latera introrsum euntes, eique se innectentes. Dant & utrimque ab ea parte, qua incumbunt ossi primo, fibras insignes, divergentes, seseque adjuvantes interiori parti tendinum ad os tertium pertinentium, quorum alios è solis fieri Interosseis, alios ex Interosseis Lumbricalibusque, alium ex solo Lumbricali, in iis deinceps docebimus. Interdum praeter tres illos tendines, quartus repperitur, qui ad minimum digitum vadit, juxtaque eum se conjungit cum tendine Extensoris ejus proprii. Qui quartus se in quibusdam in principio dorsi manus findebat in duos: quorum alter gracilior erat, pertinens ad digitum minimum, propter ejus radicem adjungens se tendini Extensoris ejus proprii: alter insignior, sensim

<sup>h</sup> Histor. huj. Icon. iv. k.

<sup>i</sup> Histor. huj. Icon. iv. z. in tribus primis digitis.

<sup>k</sup> Histor. huj. Icon. iv. fs. gs. ps.

<sup>l</sup> Histor. huj. Icon. iv. gr.

<sup>m</sup> Histor. huj. Icon. iv. st. dt.

<sup>n</sup> Histor. huj. Icon. iv. q.

sim modiceque latescens decurrebat ad intervallum capitum inferiorum tertii & quarti metacarpi ossium, ibi se dividens in duos sensim angustiores & crassiores; alteroque juxta radicem digiti minimi accedens ad tendinem superiorem, quem ad digitum minimum pertinuisse diximus, cum eoque se conjungens; altero ad tendinem digiti tertii, circa locum eundem. Ossa digitorum, ad quos hic musculus pertinet, secundi ordinis extendit. Extendit etiam illa primi ordinis, ac dein in exteriora flectit: cumque totus agit, diducit digitos. Interosseis quoque & Lumbricalibus adjutor est, ad extendenda ossa tertii ordinis. Quin etiam carpum, ni obfirmetur, in exteriorem partem flectit. Aliquando quatuor portiones ejus, vel earum aliquae, jam cito distinctae; aliquando fere ab ipso principio musculi °.

Est *Decimus septimus digitus moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 43. *Primus manus externus musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 34. Vide Laurent. Hist. an. Lib. V. Cap. 28. in *Digitum tensore*. Est *Magnus extensor digitorum*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 29. *Digitorum extensor primus*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 20. *Extensor digitorum communis*, seu *digitorum tensor*, Cowper Myot. Cap. 28. *Extensor digitorum communis*, Dougl. Myogr. Cap. 34. *L'Extenseur des quatre doigts*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 326. & seq. & 1032. & seq.

LII 3

C A-

o Ut Eustach. Tab. xxxiv. W. X. Y.

a Eu.

*De Extensore proprio auricularis <sup>a</sup>.*

**A**uricularis Extensor proprius communi cum praecedente capite, quo dictum modo, oritur, proceditque cum eodem, longe gracilior, multoque tardius carnem inchoans, & notabili quidem à cubiti articulo distantia; ex acuto usque ad medium sensim modiceque crassior, dehinc rursus gracilior, inque unum tendinem <sup>b</sup>, à posteriore parte sua incipientem, abeuns, pariter sub ligamento <sup>c</sup>, sub quo communis digitorum, sed per singularem in eo, sibi que proprium canalem, ubi cum ulna radius commissus, se demittentem, cum quo canali laxè membranis cohaeret obsequiosis; posteaque flectentem se per dorsum manus ad digitum minimum; quoad per manum decurrit, fissum, plerumque autem in duos <sup>d</sup> planiores, sensimque permodice latiores, ac juxta radicem digiti rursus coalescentes, & cum tendine communis ad tertium digitum deducto, intermedia portione tendinea non longè à digitis connexum, ulteriusque per dorsum <sup>e</sup> auricularis eo prorsus modo, quo communis tendines, accepto etiam ab una parte communi tendine Interossei & Lumbricalis <sup>f</sup>, ab altera Abductoris

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxix. 27. & Tab. xxxiv. a. Vesal. Epit. Fig. musc. II. T. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. p. 6. Bidloo Tab. lxx. K. & Tab. lxxix. inter G. & E.  
<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxiv. 2-2.

<sup>c</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 2. inter 2. & 3. Eustach. Tab. xxviii. 54.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxix. 27.

<sup>e</sup> Histor. huj. Icon. IV. pp.

<sup>f</sup> Histor. huj. Icon. IV. bt.

g Histor.

etoris auricularis <sup>g</sup>, decurrentem, similiterque desinentem <sup>h</sup>. Et praeestat eadem auriculari, quae communis digitis reliquis, abducitque eum ab iis. Similiter & carpum, si is non firmaretur, flecteret, sed simul magis retrorsum.

Est *Decimus octavus digitos moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 43. *Secundus manus exterior musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 34. Vide Laurent. Hist. an. Lib. V. Cap. 28. in *Digitum tensore*. Est *Extensor proprius auricularis digiti*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 29. *Extendentium secundus*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 20. Vide *Extensorem digitorum manus*, de Marchett. An. Cap. 18. Est *Extensor minimi digiti*, Cowper Myot. Cap. 28. Dougl. Myogr. Cap. 36. *L'Extenseur propre du petit doigt*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 333. & seq. & 1038. & seq.

## CAPUT CLVI.

*De Ulnari externo <sup>a</sup>.*

**U**lnaris externi, qui pariter ad commune caput tendineum supra dictum pertinet, caro mox infra cubiti articulum incipit, à principio gracilis: descendens

<sup>g</sup> Hist. huj. Icon. iv. w.

<sup>h</sup> Hist. huj. Icon. iv. z. in digito minimo.

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxix. 26. & Tab. xxxiv. Z. Vesal. Epit. Fig. muscl. II. X. dext. & de H. C. F. Lib. II.

Tab. 9. A. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 24. Fig. 2. LL. & Tab. 27. Fig. 1. DD. Bidloo Tab. LXIX. E. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LIII. 142

scendensque secundum ulnam , primo sensim modiceque crescit in latitudinem , inque crassitudinem ; post eodem modo , verum lentius , decrescit. In quo decursu accipit partem tenuem satisque latam , quae se circa mediam ulnae longitudinem , infra finem Anconei , à margine ulnae eodem & priore & exteriore demittit. Ubi ulnae longitudinis medium superavit , in tendinem <sup>b</sup> migrare ab exteriore parte sua incipit , qui ex lato primum angustior , se porro demittit ad canalem , qui fit è sinu eodem & priore & exteriore extremae ulnae , ligamentoque , quo is obductus ; hucusque plerumque carnem paulatim exiliorem ex interiore parte sua accipiens , & ob id paulatim crassior : planior deinde , decurrit per dictum canalem , post sub carpi ligamento armillari exteriore <sup>c</sup> , ad superiorem partem eminentiae , quae ad posticam partem capitis superioris ossis metacarpi quarti ; cui dum se inserit <sup>d</sup> , latefcit , & extenuat se. Aliquando praeterea dat tendinem exilem , decurrentem ad digitum auricularem , seseque circa ejus radicem adjungentem posteriori parti tendinis Extensoris ejus proprii. Carpum in posteriorem simul & aliquantum in exteriorem partem flectit , in quam iccirco manum attollit : manum quoque ex supina aliquantum cogit in pronom , ex prona in supinum ; ut certe fieri videmus , cum hunc musculum ad principium suum recte attrahimus.

Est

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxiv. Z-β.

2. Eustach. Tab. xxviii. γ4.

<sup>c</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 2.<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxiv. Z-γ.<sup>a</sup> Eu-

Est *Tertius brachiale moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 44. *Sextus manus exterior musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 34. *Cubiteus externus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 27. *Extendentium* (carpum) *interior*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 17. *Extensor carpi ulnaris*, Cowper Myot. Cap. 30. Dougl. Myogr. Cap. 34. *Le Cubital externe*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 275. & seq. & 1006. & seq.

## CAPUT CLVII.

*De Ancone<sup>a</sup>.*

**A**nconeus, qui cubitum extendit, tendine angusto, satisque crasso, quo incipit, adnexus<sup>b</sup> exteriori eidemque inferiori parti condyli prioris humeri, mox pone caput tendineum commune proxime praecedentium, ad ulnam pergit, mox & quo magis procedit latior, ac deorsum vergens in mucronis faciem. Decurrens intumescit, non statim carneus, sed aliquandiu tendineus<sup>c</sup>, maxime à priore, & ex interiori parte: in fine se supra infraque extenuat, totusque modice angustat. Brevissimasque habet fibras<sup>d</sup> superiores; ac fere transversas: sequentes, ut sequuntur, & paullatim longiores, & deorsum magis inclinatas. Ulnae priori parti se inserit<sup>e</sup>, secundum marginem anteriorem, statim infra Brachialem externum,

M m

num,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvii. G. Bidloo Tab. Lxix. infra B. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. vii. & l. 120.  
<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvii. G-a.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxvii. G-β.  
<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxvii. G.  
<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxxvii. G-γγ.



num, immo cum eo; continuatus enim est ei, aliquando in fine, aliquando jam cito, aliquando fere ex toto.

Est *Angoneus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 25. *Anconaeus*, Cowper Myot. Cap. 26. *Angonaeus vel Cubitalis* Riol. Dougl. Myogr. Cap. 31. *Le petit Anconé*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 247. & seq. & 983.

## C A P U T CLVIII.

*De Supinatore brevis<sup>a</sup>.*

**C**ontinua huic origo partim à parte inferiore condyli prioris<sup>b</sup> humeri, mox infra ortum capitis tendineae communis supradicti; partim ab exteriori parte capsae, quae articulum radii cum humero & ulna continet: praecipua<sup>c</sup> ab eminentia, quae in priore parte ulnae infra sinum ejus, cum quo radii caput commissum, incipens, deorsum aliquantum exporrecta. Tendinea crassiorque pars principii illa, quae à condylo oritur, mox ab ortu pertinaciter connexa cum capsâ articuli cubiti: quae à capsâ, similiter tendinea, tenuior autem, latiorque: quae ab ulna, prope tota carnea, superioribus crassior, multoque latior:

<sup>a</sup> Faustach. Tab. xxxix. Fig. 1. w. dext. & w w. sin. Vesal. Epit. Fig. musc. iv. r. dext. & de H. C. F. Lib. 11. Tab. 12. A. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 28. Fig. 2. E. Bidloo

Tab. lxxi. G. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. liv. 146.

<sup>b</sup> Bidloo Tab. lxxi. G.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. w. aa.

d Eu-

latior : & pars tendinea vix prius quam radii caput praetergressura est , carnea sit , perque exteriorem carnis partem fibrae tendineae à tota principii latitudine excurrunt diu. Tendit in priora deorsum , recta primum petens radium , & cum attingit eum , se circum eum flectens , inprimis superiore parte sua , qua se ei lunato ducto inserit , primum juxta superiora eminentiae , cui insertus Biceps brachii ; deinde secundum ambitum tuberculi , quod est proxime ante dictam eminentiam , à superiore ejus parte per priorem ad inferiorem : inde enim fere usque ad mediam radii longitudinem , termino se rectiore inserit <sup>d</sup> , per internam radii partem oblique in priorem , perque hanc in exteriorem. Frequenter pars superior , quae ad superiora eminentiae supradictae desinit , jam cito à reliquo musculo distincta est , angusta , tenuior , ac primo sensum crassior , in fine extenuata. Sed reliquum hujus musculi sensim crassescit , & tantum dum se inserit , extenuat , atque ex interiore parte aliquantum tendinosum fit. Radium circa ulnam conversum , in contrarium vertit ; quo simul manum pronam reddit supinam.

Est *Quartus radium peculiariter agentium* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 45. *Nonus manus exterior musculus* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 34. *Brevis supinator* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 26. *Supinatorum secundus* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 16.  
M m m 2 *Supina-*

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxix. Fig. 1. w-yy. Bidloo Tab. lxxviii. D.

a Eu-

*Supinator radii brevis*, Cowper Myot. Cap. 31. *Supinator brevis*, Dougl. Myogr. Cap. 38. *Le court, ou petit Supinateur*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 256. & seq. & 988.

## C A P U T CLIX.

*De Abductore longo pollicis manus* <sup>a</sup>.

**P**ollicis manus Abductor longus à principio satis latus est, & tenuis; proceditque & ab ulna <sup>b</sup>, & à radio, & à ligamento inter ulnam radiumque interjecto intermedio: ab ulnae quidem spina, statim supra ulnae medium, ab exteriori parte, juxta inferiorem partem Supinatoris brevis, ea parte principii tendinosus, & ab eadem extrinsecus diu tendinosus: à radii amplitudine exteriori, pariter juxta inferiorem partem Supinatoris brevis, è regione ortus sui ab ulna, ea parte carneus: à ligamenti parte exteriori inter duas illas ab ossibus origines media, ea quoque parte carneus; fibraeque ex ossibus venientes conveniunt ad angulos acutos. Descendit, seseque simul circum radium circumflectit <sup>c</sup>, usque ad radicem metacarpi pollicis. Modo autem simplex manet, modo partitur se, & non eadem in omnibus ratione. Cum simplex manet, fit sensim ad finem usque

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvi. O. & Tab. xxix. 32. & Tab. xxxiii. 59. Vesal. Epit. Fig. muscl. n. f. ab. fin. & de H. C. F. Lib. ii. Tab. 10. g-k m. Casser. Tab. ap Spiegel. Lib. iv.

Tab. 27. Fig. 1. H. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LIII. 136.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvi. O-aa.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxix. 32. & Tab. xxxiii. 59.

d Eu-

usque angustior , tantum vero à primo crassior , dein tenuior ; abitque in tendinem , quem ex interiore parte sua primum producit , planiorem , ab initio latiore , inde paulatim angustiore , post fere eandem servantem latitudinem , dilatato denique & extenuato fine pertinentem ad tuberculum , quod est in priore & eadem interna parte capitis superioris metacarpi pollicis , supra marginem ejus internum ; ac mox ante finem suum dimittentem portionem exilem , eaque accedentem ad principium Abductoris brevis pollicis. Cum se partitur , fit paulatim crassior & angustior , ac non longe ab initio suo findit se in duas partes <sup>d</sup> , easque sensim angustiores & tenuiores , ac mox se vertentes in planos tenuisque tendines <sup>e</sup> , ex interiore earum parte primum incipientes ; quales alias etiam venter simplex produxit ex interiore parte sui. Inferior insignior <sup>f</sup> plerumque est ventre & tendine ; interdum aequalis tendine , quo ad postremum quasi in fibras fisso , extenuatoque , & dilatato , se affigit metacarpi pollicis parti supradictae : ab eoque vidimus aliquando abscedentem tendinem exilem , adjungentem se tendini superioris. Superior tendinem in quibusdam inserit eidem metacarpo , ab interna parte praecedentis , extenuato pariter , ac dilatato fine : in aliis internae parti ossis multanguli majoris , juxta pollicem : portionem <sup>g</sup>

M m m 3

prae-

d Eustach. Tab. xxix. 33. 24. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LIII. 136.

LIII. 136. B.

f Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LIII. 136.

e Eustach. Tab. xxxiii. 58. a. B. Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

g Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LIII. 136. C.

h Vcāl.

praeterea illam dat , quae accedit ad Abductorem brevem pollicis. At aliquando hujus superioris partis tendo , fere ut natus est , aut à fine cubiti , se in crassiorem gracilioremque dividit , una incedentes ad easdem partes : pertinetque crassior , qui situ superior , ad os multangulum , Abductoremque brevem : gracilior ad metacarpum. Tendines hi in fine cubiti delabuntur per sinum priorem capitis inferioris radii , sub ligamento <sup>h</sup> coërcente , ubi membranis obsequiosis laxè connexi sunt. Pollicis metacarpum , si is in volam flexus fuerit , primo extendit , trahitque modice introrsum , atque adeo pollicem à manu in priora simul & interiora abducit : tum si pergat , eundem metacarpum flectit rectius in priora , post in priora extrorsum. Carpum , nisi is firmaretur , flecteret , in priora autem modiceque introrsum. Abductorem brevem , cum tendinis partem ei impertit , juvat.

Est *Vigessimus secundus digitos moventium* , una cum *Vigesimotertii portione* , cujus tendo in primi pollicis ossis radicem implantatur , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 43. *Quinti manus exterioris musculi* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 34. pars , quae ad primum pollicis articulum procedit , una cum ea , quae ad os brachialis , quo pollex fulcitur. *Secundi & tertii pollicis internodii extensoris* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 20. *superior portio* , una cum inferioris portione , cujus tendo radici primi pollicis internodii adnascitur. *Extensor primi*

<sup>h</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 1. 6. sin. & Tab. 2. 6. dext.

*mi internodii pollicis*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 29. Dougl. Myogr. Cap. 37. Cowp. Myot. ann. 1724. Cap. 29. Pars ejus, qui *le premier Extenseur du pouce*, Winfl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 302. & seq. & 1045. & seq. pars autem illa, qui *s'attache au bord de la base de la premiere phalange*, &c. §. 305.

## CAPUT CLX.

*De Extensore minore pollicis manus<sup>a</sup>.*

Quo Abductorem longum diximus modo, eo mox infra eum ab exteriori parte spinae ulnae<sup>b</sup>, cui adnexum ligamentum, quod inter cubiti ossa intercedit, vicinaque illius ipsius ligamenti, (interdum supra à spina, infra à ligamento; interdum non ab ulna, sed à dicto ligamento, juxta radium, & à finitima radii parte) natus Extensor minor, ad sinum priorem capitis inferioris radii incedit, per eumque tendinem suum sub eodem ligamento<sup>c</sup>, & aliquando per eundem etiam canalem, alias per singularem sibi que proprium, ex ligamento illo & ex radii sinu effectum, qui est juxta dorsum radii, demittit, porro per pollicis dorsum pergentem<sup>d</sup>; & in canali illo membranis obsequiosis ei adnexum. Qua parte oritur,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvi. P. & Tab. xxxix. 35. & Tab. xxxiii. 60. Vesal. Epit. Fig. musc. ii. f-c. sin. & de H. C. F. Lib. ii. Tab. 10. E-n. G-sler. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 27. Fig. 1. inter H. & I. Cow-

per Myot. ann. 1724. Tab. l.iii. 137.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvi. P-aa.

<sup>c</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. ii. Tab. i. 6. sin. & Tab. 2. 6. dext.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxiii. 60.

<sup>c</sup> Eu-

oritur, satis angustus, tenuis, tendineus: minus dein; minusque latus, contra autem primo crassior, jam cito, cum rursus sensim gracilior factus, in tendinem<sup>e</sup> abit, ex interiore carnis parte primum exorientem, & dein à posteriore, & ab exteriori parte carnem forma accipientem pennata, longum, tenue, planum: cujus extremum se dilatat, extenuatque, & cum interiore margine tendinis Extensoris majoris, cum ad finem metacarpi pollicis venit, conjungit<sup>f</sup>. Alias extremum ejus se dilatat insigniter, extenuatque aliquantum, atque inferit eminentiae transversae, quae est in priore parte capitis superioris primi ossis pollicis. A tendine illo, qua per metacarpum pollicis incedit, vidimus portionem gracilem abscedere, quae se adjungebat tendini Extensoris majoris, & cum eo abibat in unum. Aliquando totus hic musculus solito exilior fuit, & veluti pars Abductoris longi pollicis. Utrumque os pollicis extendit, flectitque in priora: solummodo autem primum, ad id cum pertinet. Metacarpum pollicis flectit primum in priora, dein in priora extrorsum: carpum fere in priora, si non retineant, qui ejus proprii sunt.

*Est Vigessim tertii digiti moventium portio, cujus tendo in secundi ossis pollicis radicem inferitur, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 43. Quinti manus exterioris musculi,*

<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxxiii. 60. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LIII. 137. B.

<sup>f</sup> Eustach. Tab. xxxiii. 60-65. Hist. huj. Icon. IV. GH.

*musculi*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 34. pars, quae ad secundum pollicis articulum procedit. Secundi & tertii pollicis internodii extensoris, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 20. *portionis inferioris portio*, cujus tendo secundo & tertio pollicis ossi adnascitur. *Extensor secundi internodii ossis pollicis*, Cowper Myot. Cap. 29. *Extensor secundi internodii*, Dougl. Myogr. Cap. 37. Pars ejus, qui le premier Extenseur du pouce, Winfl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 302. & seq. & 1045. & seq. illa autem, qui s'attache sur la partie convexe de la base de la seconde phalange, &c. §. 305.

## CAPUT CLXI.

*De Extensore majore pollicis manus<sup>a</sup>.*

**E**xtenfor major ad pollicem cum minore pertinet, & , sicut ille, oritur ab exteriori parte ulnae<sup>b</sup>, fere in medio longitudinis ejus, primum juxta posteriorem partem Abductoris longi, dein Extensoris minoris, infraque cum à ligamento, quod ab ulna ad radium deductum: & oritur principio latiore eodemque tenui & subtendineo, aut fere toto carneo. Cum modicum descendit, ipse magis magisque angustatus, ac primo crassior, post tenuior, sit tendo<sup>c</sup> satis crassus,

N n

fus,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiv. q. 8. & Tab. xxix. 36. Vesal. Epit. Fig. muscl. 11. t. sin. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 10. II-o. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 27. Fig. 1. G. Bidloo Tab. LXXI. L. Cowper Myot. ann. 1724.

Tab. LIII. 138.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxiv. q. 8.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxiv. q. 8. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LIII. 138. B.

d Cow-



sus , & fere teres. Nascitur hic è priore & eadem  
exteriore parte ventris , cujus fibrae sic ad eum per  
longitudinem accedunt , ut ad pennam plumae <sup>a</sup> ;  
continuoque earum accessu sensim increfcit : & ple-  
rumque caro ad eum accedit usque qua sub ligamento  
armillari incedit. Ad finem cubiti usque nonnihil ob-  
lique in priora descendit, ubi sub carpi ligamento ar-  
millari exteriore <sup>e</sup> , per singularem in eo canalem,  
perque eum parvum radii sinum , qui est mox pone  
illum , per quem Radialis externi tendines , incedit :  
pergit deinde planior , ad dorsum pollicis se flectens,  
& per hoc quoque , sed paullatim latior & tenuior ,  
ac nonnunquam in fibras distinctus , & modo in iti-  
nere cum tendine Extensoris minoris confluens , sic  
ut unus ex iis latior tendo <sup>f</sup> fiat , idemque tenuior ,  
sensimque se dilatans , pertinenſque <sup>g</sup> ad tubercu-  
lum oblongum & transversum , è priore eademque  
superiore parte pollicis ultimi ossis eminens : modo  
distinctus ab eo , solusque ad idem pertinens tuber-  
culum. Aponeurosem <sup>h</sup> hic tendo , sive communis  
sit ambobus , sive solius majoris , ab Abductore bre-  
vi pollicis circa finem metacarpi pollicis accipit ab eo  
latere , quo remotior ab indice : ab altero primum  
dat insignem <sup>i</sup> , ambientem articulum pollicis cum me-  
tacarpo suo , innexamque capsae ejus , circa os sesa-  
moï-

d Cowper Myot. ann. 1724. Tab.  
1. III. 138.

e Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab.  
1. & 2. 4. Eustach. Tab. xxviii.  
f 4.

f Eustach. Tab. xxxiv. r. & Tab.

xxxiii. 68. Hist. huj. Icon. IV. I.

g Eustach. Tab. xxxiv. r. a. Hist.  
huj. Icon. IV. K.

h Hist. huj. Icon. 1. k.

i Hist. huj. Icon. IV. L.

moideum ; infraque eam accipit aliquam <sup>k</sup> à Flexore pollicis brevi, continuam superiori. Et ad extremum accreta est tendini illi capsula articuli ultimi pollicis. Extendit, inque priora flectit utrumque os pollicis : primum etiam modice flectit in exteriora. Metacarpum pollicis, & carpum, flectit ut Extensor minor, minus autem in priora, magis in exteriora.

Est *Vigessimus primus digitos moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 43. *Quartus manus exterior musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 34. *Pollicis tertium os extendens*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 20. *Extensor tertii internodii ossis pollicis*, Cowper Myot. Cap. 29. *Extensor tertii internodii*, Dougl. Myogr. Cap. 37. *Le second Extenseur du pouce*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 306. & 1045. & seq.

## CAPUT CLXII.

De Indicatore <sup>a</sup>.

**I**ndicator ad indicem vadit, procedens ab exteriori parte ulnae <sup>b</sup>, ut pollicis Extensor major. Ejus etiam modo incipit, progrediturque, tendinemque producit, nisi quod omni ex parte minor sit, vix differens. Et oritur primo juxta ejus posteriorem partem,

N n n 2

<sup>k</sup> Eustach. Tab. xxxiii. 66. Hist. huj. Icon. iv. M.

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiv. r. & Tab. xxix. 17. Vesal. Epit. Fig. muscl. 11. u. sin. & de H. C. F. Lib. II.

Tab. 10. n-p. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 27. Fig. 1. F. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LII. 128.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxiv. r.-s.

<sup>c</sup> Eu-

partem , à spina ulnae , circa mediam ulnae incipiens longitudinem : post & infra ejus ab ulna ortum , à ligamento cubiti ossibus interjecto , juxta ulnam. Tendo <sup>c</sup> ejus cum Extensore digitorum communi sub ligamento <sup>d</sup> manus armillari exteriori , per communem sibi cum eo radii sinum decurrit ; comes <sup>e</sup> deinde tendini ejus indicem petenti , juxtaque indicis principium , latum cum eo tendinem <sup>f</sup> , quem ad os secundi ordinis pertinere diximus , efficit. Juvat Extensoris communis portionem indici datam ; eadem enim praestat , praeterquam quod indicis primum os in exteriora quidem flectat , sed simul etiam modice retrorsum , medium digitum versus. Tendo ejus in manus dorso in duos <sup>g</sup> divisus observatus à nobis est , altero procedente ad indicem , altero ad medium. Observatus ipse musculus jam supra ligamentum armillare in duas caudas <sup>h</sup> abeuns , dein versas in tenues tendines , non longe ab indice confluentes in unum.

Est *Decimusnonus digitos moventium* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 43. *Tertius manus exterior musculus* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 34. *Indicatorius* , Arant. Anat. obs. Cap. 42. *Indicator* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 29. *Indicem abduccens* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 21. *Indicis abductor* , Vesling. Synt. Cap. 18.

*Extens-*

c Eustach. Tab. xxxiv. r. β. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LII. 128.

d Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 2. 3.

e Eustach. Tab. xxix. 37. 37

f Bidloo Tab. Lxx. E. indic. Hist. buj. Icon. iv. k

g Vesal. Epit. Fig. musc. II u. sin. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 10.

h-p

h Ut fere Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LII. 128.

*Extensor indicis seu Indicator*, Cowper Myot. Cap. 28.  
*Extensor secundi internodii indicis proprius*, vulgo *Indicator*,  
 Dougl. Myogr. Cap. 35. *L'Extenseur propre de l'index*,  
 Winll. Exp. an. Trait. des muscl. §. 331. & seq. &  
 1038. 1039.

## CAPUT CLXIII.

*De Ulnari interno<sup>a</sup>.*

Qui à condylo humeri posteriore se demittunt  
 quinque sequentes, communi capite tendineo  
 incipiunt, ut plerique eorum, qui à condylo  
 priore. Crassum est, oriturque tum ab extremo con-  
 dyli posterioris, tum ab inferiore parte, tum à pro-  
 xima interiore; atque ad similitudinem ejus, quod  
 à condylo priore, & ab exteriori parte in aponeurosem  
 abit, qua musculi extrinsecus obducti; & portiones  
 inter musculos demittit. Aponeurosis crassa est, sen-  
 simque dum descendit, se dilatat, descendantibus  
 fibris ejus, ac divergentibus. Ad eamque accedit  
 alia, quae primum à posteriore parte olecrani, poste-  
 aequè à spina ulnae, quae continuo ab ea olecrani  
 parte eminet, per longitudinem oriens, dilatat se  
 qua ab olecrano oritur, posteaque cum praecedente  
 conjungit, à spina ulnae oblique in priora fibras suas  
 demittens. Ita ex duabus hisce fit vagina una, quae

N n n 3 • • • conti-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxv. O. & Tab.  
 xxxvii. H. & Tab. xxx. F. Ve-  
 sal. Epit. Fig. muscl. 1. n. dext. &  
 Fig. 11. Y. dext. & de H. C. F.  
 Lib. 11. Tab. 4. Z. & Tab. 9.

Z. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib.  
 iv. Tab. 21. Fig. 1. RR. & Tab.  
 24 Fig. 2. P. Bidloo Tab. Lxviii.  
 Cowper Myot. ann. 1724. Tab.  
 Liii. 149.

b Eu-

continet superiorem partem Pronatoris teretis , Radialis interni , Palmaris longi , Sublimis , Ulnaris interni ; sensim ut descendit , extenuata ; & eo se demittens longius , quo propior Ulnari ; juxtaque eum ad inferiora cubiti usque , complectens quoque Profundum , qua is ponit Ulnarem nudus. Crassae quoque sunt portiones , quas caput tendineum inter musculos demittit , eademque latae , descenduntque fibris suis. Demittit autem unam inter Pronatorem teretem & Radialem internum , aliam inter hunc Radialem & Palmarem longum , aliam inter hunc & Sublimem , aliam inter hunc & Ulnarem internum , aliam tenuiorem inter capita duo Ulnaris hujus , aliam inter ejus posteriorem partem & Profundum , aliam inter hunc & Sublimem. Quin & tendineum Sublimis principium à condylo , ad caput illud tendineum pertinet ; eique per exteriora Sublimis satis diu decurrenti , continuata pleraque ex sepimentis supradictis. Jam vero partim à capite tendineo communi , partim à vagina supradicta , partim à sepimentis procedit caro Pronatoris teretis , Radialis interni , Palmaris longi , Ulnaris externi , Sublimis , Profundi : & sepimenta per quosdam , infra ortum ab iis eorum , decurrunt , efficiuntque eos tendinosos ; quod inter Pronatorem teretem & Radialem internum , per utrumque , & per Sublimem ; quod inter Sublimem & Ulnarem internum , per horum utrumque. Ulnaris autem per totam cubiti longitudinem jacet , rectaque descendit ad manus initium , tribus primum principiiis ortus , uno ad caput tendineum commune pertinen-  
te,

te, altero à parte eadem & inferiore & posteriore extremi condyli posterioris humeri, gracili, brevi, fere carneo; tertio à posteriore margine olecrani, non multum infra finem tendinis Tricipitis, carneo, latiore: quae omnia ab initio angusta & tenuia, dein sensim latescunt, & intumescunt. Mox autem se conjungunt duo prima, post iis se tertium adjungit; unde nata caro sensim intumescit in musculum conspicuum, rursus deinde paulatim detumescens, donec in tendinem <sup>b</sup> mutetur, qui ex interiore parte ejus primum emergit. Accedit & ejus principii, quod ab olecrano procedit, continuatio quaedam <sup>c</sup>; infra quod sua superiore parte abscedit à vagina tendinea cubiti, inferiore autem oritur <sup>c</sup> ab exteriori ulnae spina, infra caput ejus superius eminente; carnea, tenuis, lata, fibrasque in priora demittens & ad imam partem ventris <sup>c</sup>, & ad tendinis <sup>d</sup> posteriorem interioremque, fere ad finem ejus usque; ex quo crescit tendo: aliquando autem à sola vagina cubiti abscedere visa. Ipse caeterum musculus latior est quam crassior. Sic & tendo ejus, cujus extremum crassum, desinens <sup>e</sup> ad gibbam partem ossis subrotundi carpi, qua parte illud maxime in interiora eminet: à quo osse cum ligamentum <sup>f</sup> crassum & breve ad interiorem & eandem superiorem partem capitis superioris ossis metacarpi quarti

b Eustach. Tab. xxxv. Θ-β. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LIII. 140. C.

c Cowper Myot. ann. 1724. Tab. III. 140.

d Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 21. Fig. 1. R.Rgh.

e Eustach. Tab. xxxv. Θ-γ.

f Hist. huj. Icon. 11. C.

quarti deducatur, ad hoc ipsum ultimo hic musculus, verum interveniente ossiculo subrotundo, pertinere dicendus est. Itaque proprie quidem os subrotundum sursum trahit, sed carpum eo inflectit. Et manum primo introrsum simulque oblique retrorsum attollit, dein cum pergit, convertit in pronum. Nec praetereundum, quod tendo ejus, ubi se inserit, validam ab utroque latere det, inque fasciculos distinctam aponeurosem, ad manus ligamenta armillaria accedentes.

Est *Primus brachiale moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 44. *Secundus musculus interior manus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 33. *Cubiteus internus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 27. *Flectentium* (carpum) *interior*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 17. *Flexor carpi ulnaris*, Cowper Myot. Cap. 30. Dougl. Myogr. Cap. 33. *Le Cubital interne*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 269. & seq. & 1003. & seq.

## CAPUT CLXIV.

*De Palmari longo* <sup>a</sup>.

**P**almaris hic communi capite, quod in superiore musculo descripsimus, condylo posteriori humeri affixus, mox in ventrem <sup>b</sup> modice tumidulum, ac deinde

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxv. A. Vesal. Epit. Fig. musc. 1. m. dext. & de H. C. F. Lib. 11. Tab. 1. Y. & Tab. 3. II. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. 1v. Tab. 21. Fig. 1. D.

& Tab. 12. Fig. 1. CCC. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LI. 121.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxv. A. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LI. 121. A.

c Eu-

deinde ex ventre illo , primum acutiore , sensimque crassiore , dein lentius decrescente , brevique , in tendinem <sup>c</sup> longum , planum , tenuem , angustum , à posteriore parte ejus , qua incumbit subjectis , abit. Descendit oblique in priora ad medium volae initium. Ad finem cubiti tendo latescere incipit : ubi vero ad ligamentum carpi interius pervenit , accrescit ei , saepeque partem dat , inde inprimis latescens , partemque ab eodem ligamento accipiens. Post per volam procedit , seseque magis ac magis dilatat <sup>d</sup> , ea parte tenuis , passimque interruptus , & tanquam in fasciculos distinctus , ac pingui , quod cuti volae substratum , pertinaciter adnexus. Ea autem aponeurosis <sup>d</sup> proprie constat ex quatuor latis portionibus <sup>e</sup> , singulis ad singulos manus digitorum procedentibus , iisque latis , & quo digitis propiores fiunt , eo tenuioribus , eoque magis divergentibus , ac toto decursu inter se , verum portionibus tenuioribus , & juxta digitos non nisi fibris tendineis transversis <sup>f</sup> , cohacrentibus. Ad postremum autem bicornes <sup>g</sup> fiunt , sibi-que subjectum Sublimis & Profundi tendinem quaeque ambiens <sup>h</sup> , post se adnectit ligamento transverso ,

O o o

quod

c Eustach. Tab. xxxv. Δ-β. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LI. 121.

d Eustach. Tab. xxxv. Δ-γ. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 21. Fig. 1. b. & Tab. 22. Fig. 1. C. super. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LI. 121. B.

e Eustach. Tab. xxxv. Δ-δ. 1. ζ. η. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab.

21. Fig. 1. G. G. G. & Tab. 22. Fig. 1. C. super.

f Casser. Pent. Tab. 1. org. tact. Fig. 2. CCC. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 21. Fig. 1. b. & Tab. 22. Fig. 1. C. super. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LI. 121. B.

g Eustach. Tab. xxxv. Δ-δ. 1. ζ. η.

h Eustach. Tab. xxxii. 47.



quod est ad radices digitorum , cujusque tum illam partem , quae subjecta tendinibus modo dictis ; tum illam , quae inter eos , vestit : quin & ad superiorem ejus ligamenti partem exigua se portione affigit mediae latitudini partis internae ossium metacarpi. Eadem quoque aponeurosis in principio volae emittit portionem <sup>i</sup> , tenuem , angustam , brevem ; quae ad principium Abductoris brevis pollicis accedit. Saepe autem fit , ut ventre <sup>k</sup> hic Palmaris careat , ac tendine <sup>k</sup> ; solaque adsit aponeurosis <sup>l</sup> , procedens <sup>m</sup> à ligamento carpi interiore. Memorandum praeterea , inventum Palmarem , cui venter longe major fuerit , ad carpum fere usque decurrens , priusquam in tendinem abiret , ex angusto sensim latior & crassior , rursusque , cum circa mediam cubiti longitudinem venisset , angustior & tenuior ; in totum crassitudinis modicae , latitudinis notabilis. Aponeurosis per volam incedentes tendines , musculosque , ac vasa , & nervos , defendit. Ventrem cum habet , contractione ejus tenditur , ac cutis volae leniter contrahitur , percutiturque : quin & carpus flectitur in partem internam .

*Est Musculus , nervosa sua exilitate mediae volae , & internae digitorum sedis cuti subnatus , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 41. Primus musculus manus interior , Columb.*

<sup>i</sup> Eustach. Tab. xxxv. A-4.

<sup>k</sup> Eustach. Tab. xxx in brachio dextro. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 21. Fig. 2.

<sup>l</sup> Eustach. Tab. xxx. 12. Casser. Tab.

ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 21. Fig. 2. b.

<sup>m</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 21. Fig. 2. F.

Columb. de re añ. Lib. V. Cap. 33. *Latescentis chor-  
dae musculus*, Fallopp. Obs. an. in musculis, qui cu-  
bitum, atque manum movent, &c. *Palmaris*, Rio-  
lan. Anthr. Lib. V. Cap. 28. Spigel. de H. C. F.  
Lib. IV. Cap. 18. De Marchett. Anat. Cap. 18. *Pal-  
maris longus*, Cowp. Myot. Cap. 27. Dougl. Myogr.  
Cap. 32. *Palmaris*, Morgagn. Adv. an. II. Anim.  
16. *Le Cubital gresle, communément nommé long Pal-  
maire*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 283. &  
seq. & 1017.

## CAPUT CLXV.

*De Radiali interno<sup>a</sup>.*

**S**tatim ante Palmarem longum Radialis internus,  
à communi illo capite, ut dictum, procedens:  
ad eumque aliquando etiam aliud accedit principium,  
tenue, tendineum, satis latum, interdum in aliquot  
partes sectum, à radio cum Sublimi oriens. Perque  
cubitum oblique descendit ad mediam internam ean-  
demque superiorem partem capitis primi metacarpi<sup>b</sup>  
indicis, ventre primum, post tendine. Venter<sup>c</sup> ob-  
longus, & aliorum multorum modo, cum primum  
increvit, rursus deinde imminuitur, paullatimque ex

O o o 2

co

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxv. f. Vefal. E-  
pit. musc. Fig. 1. l. dext. & de H.  
C. F. Lib. II. Tab. 3. A. Casser.  
Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 22.  
Fig. 1. L. Bidloo Tab. LXVIII. E.  
Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

LIII. 139.

<sup>b</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV.  
Tab. 23. Fig. 2. c. & Tab. 24. Fig.  
1. d. Bidloo Tab. LXVIII. E.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxv. f. Cowper  
Myot. ann. 1724. Tab. LIII. 139. A.  
d Eu.

eo extrinsecus, jam ante mediam cubiti longitudinem, tendo <sup>d</sup> longus nascitur; primum, qua nascitur, ex angusto latior, tenuisque; deinde angustior & multo crassior, tandem quasi teres; attamen latior quam crassior. Ventri quoque major latitudo, quam crassitudo. Tendo juxta carpum transit per singularem canalem <sup>e</sup> membranaceum, qui est ad priorem partem ligamenti, quo tendines à cubito ad manum decurrentes ab interiore carpi parte obducti; ac deinde per sinum oblongum <sup>f</sup>, qui est in interna parte ossis multanguli majoris, in quo & à ligamento sibi obducto, & cum illo sinu canalem faciente, retinetur. Aliquanto crassior est, duriorque, qua se ad multangulum applicat: latior autem, & tenuior, ubi se inserit. Frequenter portionem quandam ipsi ossi multangulo inserit: cujus sinui pertinaciter plerumque adhaeret nexu membranaceo. Hic Radialis carpum flectit; radium cum manu convertit. Et manum quidem retrorsum flexam, retento interim radio, primo modicum attollit in priora introrsum, deinde in internam partem fere recta, post introrsum in posteriora surgere facit: radio autem libero, eum simul convertit per priora introrsum, cum eoque manum in pronum.

Est *Secundus brachiale morventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 44. *Tertius interior manus musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 33. *Radiceus internus*,

d Eustach. Tab. xxxv. r-β. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LIII. 139. B.

e Hist. huj. Icon. 1. & II. B. f Bidloo Tab. LXVIII. E.

a Eu-

*mus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 27. *Flectentium* (carpum) *exterior*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 17. *Flexor carpi radialis*, Cowper Myot. Cap. 30. Dougl. Myogr. Cap. 33. *Le Radial interne*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 272. & seq. & 1009. & seq.

## CAPUT CLXVI.

*De Pronatore terete<sup>a</sup>.*

**P**ronator autem teres partim ab interiore & eadem superiore parte condyli posterioris ossis humeri, proxime ante caput tendineum commune; partim à sepimento, quod caput illud inter eum Radialemque internum interfert; partim à tendinea parte, quae per exteriora Sublimis decurrit. Descendit & ipse per cubitum, verum obliquius, longe brevior, mediumque recta petens radium. Nec admodum crassus ab initio, aliquanto autem latior, ut primum natus est, fit sensim crassior, non tamen diu, post rursus paulatim gracilior, in totum minus crassus quam latus. Tendinem<sup>b</sup> circa medium longitudinis suae à priore parte ejus, qua incumbit subjectis, efficere incipit; qui dein per priorem partem decurrens, ab

O o o 3

eaque

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxii. 29. & Tab. xxxiii. 51. Vesal. Epit. musc. Fig. 111. J. dext. & Y. sin. & de H. C. F. Lib. 11. Tab. 6. x. & Tab. 7. Q. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. 14. Tab. 24. Fig. 1. C

C. Bidloo Tab. Lxviii. A. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LIV. 143.

<sup>b</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LIV. 143. C.

eaque incrementa fere ad finem usque accipiens, novissime in latam tenuitatem desinit, insertam<sup>c</sup> superficiei inaequabili, quae ejus causa in media gibba parte radii est. Ad eum accedit aliquando portio<sup>d</sup> quaedam, orta ab ulna<sup>c</sup>, juxta posteriorem partem superficiei inaequabilis, quae excipit finem Brachialis interni: eaque primum tendinea tenuis lata, dein carnea & sensim insignior, accedit ad anteriorem partem hujus musculi. Qui aliquando duos tendines, qualem unum descripsimus, efficit, altero à superiore alterius parte decurrente, & inserto. Radium convertit circum ulnam, unde radius sequens manus prona fit. Radius sic converso, aut ne convertatur retento, cubitum flectere potest, imprimis si is jam sit modice flexus.

Est *Tertius radius peculiariter agentium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 45. *Septimus manus interior musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 33. *Superior pronator, rotundus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 26. *Pronatorum secundus, sive Teres*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 16. *Pronator radii teres*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 31. *Pronator teres*, Dougl. Myogr. Cap. 38. *Pronator radii teres*, Cowp. Myot. ann. 1724. Cap. 31. *Le Pronateur rond, ou l'oblique*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 259. & seq. & 989.

C A-

c Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab.

LIV. 143. B.

8. R. &amp; Tab. 12. c. Bidloo Tab.

c Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

LXVIII A.

111. 143.

d Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

a Eu-

## CAPUT CLXVII.

*De Sublimi<sup>a</sup>.*

**P**ars quoque capitis communis tendinei, quod affixum condylo posteriori, abit in primum praecipuumque initium Sublimis, praeterea à ligamento, quod ab inferiore ejusdem condyli parte ad posticam capitis superioris ulnae, juxta imam sinus ejus lunati pertinet, procedentis; & à superiore eademque posteriore parte eminentiae inaequabilis, cui Brachialis internus infertus. Capite inde latiore & tenui, (ad quod portionem tendineam angustam accedere à priorē parte ulnae eminentiae supradictae vidimus) ab eoque capite, ventre primum paullatim tumidiore, ac deinde fere à medio cubiti iterum imminuto, crasso autem, & latiore quam crassiore, per cubitum recedit manum versus: atque in hoc itinere recipit caput alterum<sup>b</sup>, amplum & tenue, primo subtendineum, & aliquandiu extrinsecus tendinosum, quod ab interna parte longitudinis radii fere mediae, juxta finem Supinatoris brevis & Pronatoris teretis, incipiens, retrorsum se demittit ad ventrem hujus musculi. Venter hic circa medium longitudinis cubiti manifeste partitur in portiones quatuor<sup>c</sup>, quae sensim exiliores,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiii. f. 3. Vesal. Epit. musc. Fig. 1. a. sin. & de H. C. F. Lib. ii. Tab. 5. e. Casler. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 22. Fig. 1. DD. & Fig. 2. BB. Bidloo Tab. LXVII. A. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LI. 123. Hunauld, Hist. de

l'Acad. Roy. des Scienc. ann. 1719. Pl. 18. & 19.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxiii. f. 3-B.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxiii. f. 3. Vesal. de H. C. F. Lib. ii. Tab. 5. μ. Bidloo Tab. LXVII. A.

res , pergunt ut inceperat venter , ac singulae mox in crassum ovatum tendinem <sup>d</sup> migrant. Et fere citissime secundus è carne prodit , prodiens è parte posteriore illius ejus partis , quae respicit musculos subiectos : post prodit tertius , & primum quidem è parte posteriore : post primus , ex illa plerumque parte , quae spectat incumbentia : tardissime quartus , & modo è priore , modo è posteriore. Sed tertium caro citissime deserit ; dein secundum : itaque longiores sunt , fiuntque primum paullatim angustiores & crassiores : reliqui carne fere usque ad ligamentum armillare instructi. Omnesque junctim pergunt , & per canalem ex interiore concava carpi parte , & è ligamento <sup>e</sup> carpi interiore factum , ad volam transeunt : per quam deinde divergunt <sup>f</sup> , figura magis ovati , singulique ad singulos quatuor manus digitorum , ac deinde per internam eorum partem <sup>g</sup> ad medium eorum os secundi ordinis incedunt. Magnitudini autem digiti quisque respondet sui , crassissimo ob id secundo , deinde tertio , post primo , his denique longe graciliore quarto : fit tamen ut primus tertio crassior sit. In canali carpi , & inter se , & cum illis Profundi Flexorisque pollicis longi , & cum ipso canali juncti sunt natura quadam membranæ , tendinosa , laxa , obsequiosa , lubrica : adhaeret autem iis jam à principio , posteaque etiam in vola , ea parte subtilior , con-

d Bidloo Tab. LXVII. C. C. C. C.

e Eustach. Tab. XXXIII. 70. Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 4. f.

f Eustach. Tab. XXXIII. 73. 73. 73. 73.

Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 5. g.

g Hist. huj. Icon. I. ΠΣΘ. & Icon. II. VWX. & Icon. III. MNOPQR.

h Hist.

connectens eos cum tendinibus Profundi , tum in cubito , tum in vola , & in vola etiam cum Lumbricalibus , specie vaginarum laxarum. Qua incedunt secundum articulos digitorum cum metacarpo , perque ipsos deinde digitos , vaginas sibi quisque una cum Profundi tendine obductas habet <sup>h</sup> , quibus retinentur , ut in Profundo exponetur. Itaque & accommodant se tendinibus ejus qua per vaginas illas communes una decurrunt , latescentes magis & magis , seseque extenuantes , donec per longitudinem fissi <sup>i</sup> , pertransire eos sinant. Prius autem quam se findant , futurae divisionis nota <sup>k</sup> incipit , sensimque insignior fit. Finditque se quisque in caudas duas <sup>l</sup> , angustas , tenues , quae amplectuntur <sup>l</sup> Profundi tendinem , ab ejus lateribus procedentes , eundemque continent , emissâ fere in medio progressu suo parte <sup>m</sup> , qua cohaerent inter se , tenuiore , in fibras distincta , satis lata , facta è fibris tendineis , quae ab altera cauda ad alteram oblique descendunt <sup>n</sup> , seseque decussant ; subiectaque tendini Profundi , & ad ejus figuram concava , factaque : post modice divergentes <sup>o</sup> , angustioresque , pertinentesque ad interiorem partem mediae longitudinis

P p p

<sup>h</sup> Hist. huj. Icon. 1. A. & Y.

<sup>i</sup> Eustach. Tab. xxxii. 55. 55. 55. 55. Vesal. de H. C. F. Lib. iii. Tab. 5. & Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 25. Fig. 1. e. e. e. e. Bidloo Tab. LXVII. D. E. D. E. Hist. huj. Icon. 11. WX.

<sup>k</sup> Hist. huj. Icon. 11. z.

<sup>l</sup> Hist. huj. Icon. 11. W. X.

<sup>m</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 25. Fig. 3. E. E. E. E. Hist. huj. Icon. 111. P.

<sup>n</sup> Hist. huj. Icon. 111. P.

<sup>o</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 25. Fig. 3. juxta E. E. E. E. Bidloo Tab. LXVII. post E. indicis. Hist. huj. Icon. 111. Q. R.

p Hist.



dinis marginum ossis secundi ordinis , altera ad prioris <sup>p</sup> , altera ad posterioris <sup>q</sup>. Crassescunt , & duriores sunt , qua accedunt ad articulum ossis primi cum secundo : extenuantur , qua praetereunt eum. Ubi sub Profundo quasi coeunt , angulum <sup>r</sup> , qui ex eo fit , implet membrana quaedam tendinosa , proximae quoque Profundi parti adnexa : ubi jam coierunt , accedit membrana similis , quae oritur à media latitudine partis internae ossis primi ordinis , mox supra caput ejus inferius : haec autem illi saepe continuata. Eaedem caudae , non longe post ortum suum , ab ea parte , qua incumbunt ossi primi ordinis , plerumque accipiunt tendinibus similes chordulas <sup>s</sup> , tenues , angustas , planas , per vaginam , quae ab utroque ossis primi ordinis margine orta , tendinem continet , descendentes ab illa parte capitis superioris primi ordinis ossis , quae est juxta vaginae illius ortum ; partimque se adjungentes membranae tendinosae supradictae , extremo dilatato & extenuato. Plerumque alterutra tantummodo cauda talem tendinem accipit , aliquando duos , vel tres ; aut unus ad extremum bicornis ad utramque pertinet ; aut membranae tendinosae sunt eorum loco. Ubi caudae rursus secedunt , & ultra os primi ordinis sunt progressae , ibi inter se , & cum ossis secundi ordinis parte illa , quae est infra ejus caput superius , cohaerent membrana simili , tenui , saepe ex parte continuata eidem supradictae.

<sup>p</sup> Hist. huj. Icon. II. β. & Icon. III. u.

<sup>q</sup> Hist. huj. Icon. II. α. & Icon. III. t.

<sup>r</sup> Hist. huj. Icon. III. supra P.

<sup>s</sup> Bidloo Tab. LXVII. in tendine D. digiti secundi , & E. primi. & Tab. LXVIII. juxta e.

t Cow-

dictae. Aliquando Sublimis, qua parte incumbit Profundo, dimittit portionem unam, alteramve, eamque in gracilem versam tendinem adjungit tendini Profundi. Digitorum ossa tum secundi, tum primi ordinis flectit in partem internam: & dum flectit digitos, adducit eos ad se mutuo. Quod si manus eo tempore non firmaretur, eam quoque in internam partem flecteret, & converteret in primum.

Est *Primus digitorum moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 43. *Quartus manus interior musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 33. *Primus musculus*, A-rant. An. obs. Cap. 42. *Sublimis*, Laurent. Hist. an. Lib. V. Cap. 28. Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 29. *Digitorum secundi internodii flexor*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 19. *Perforatus*, Cowper Myot. Cap. 28. Dougl. Myogr. Cap. 34. *Le Sublime*, Hunauld, Hist. de l'Acad. Roy. des Scienc. ann. 1729. pag. 245. *Le Perforé, communément le Sublime*, Winfl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 315. & seq. & 1019. & seq.

## CAPUT CLXVIII.

*De Profundo.*

**P**rofundus à tota illa ulnae amplitudine, quae infra radicem olecrani, infraque superficiem inae-

P p p 2

qua-

t Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LI. 123. B.

a Eustach. Tab. xxxviii. L. Vesal. Epit. musc. Fig. 111. 7. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 6. 2. Cas-

scr. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 23. Fig. 1. D.D. Bidloo Tab. LXVII. F. & Tab. LXVIII. b. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LI. 124.

b Cowp.

quabilem, cui affixus Brachialis internus, incipiens, efficit partem plusquam dimidiam superiorem partis ejus tum posticae, tum internae; & à vicina parte ligamenti, quod intercedit ulnam inter radiumque, maxime tamen ab ulnae parte interiore, oritur, seseque demittit, ut ab humero Brachialis internus. Itaque & à superiore parte tenuis est, & angustus; sensimque dein crassior fit, latiorque; post rursus gracilior, & angustior. Ex parte etiam nascitur tum è vagina tendinea, tum è sepimentis, descriptis in Ulnari interno. Extrinsecus autem <sup>b</sup> multos in fibras distinctos tendines jam non valde longe à primo initio suo, aut certe supra cubiti medium, efficere incipit; qui dein ab exteriori parte unum latum, & quasi ex multis exilioribus collectum referunt <sup>b</sup>; ab interiore autem se in quatuor crassos colligunt magis magisque, ex toto tandem circa ligamentum carpi interius distinctos <sup>c</sup>. Ad hoc enim recte hactenus procedit, sub eoque <sup>d</sup> tendines per carpi sinum interiorem trajicit, post in diversa tendentes, ac per volam singulos ad singulos manus digitos decurrentes <sup>e</sup>, perque eorum deinde internam partem <sup>f</sup>, usque ad asperam superficiem, quae in interiore parte ossium tertii ordinis, ad radicem capitis eorum superioris. Singulari autem in hoc decursu

<sup>b</sup> Cowp. Myot. a. 1724. Tab. LI. 124.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxviii. L. α. β. γ. δ.  
Bidloo Tab. LXVII. H. H. H. H.  
Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LI.  
124. E. E. E. E.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxii. 16.

<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxxviii. L. α. β. γ. δ.

in vola. Vesal. de H. C. F. Lib. II.  
Tab. 6. ε. in vola.

<sup>f</sup> Eustach. Tab. xxxviii. L. α. β. γ. δ.  
in digitis. Vesal. de H. C. F. Lib.  
II. Tab. 6. ε. in digitis. Hist. huj.  
Icon. II. YY.

<sup>g</sup> Hist. huj. Icon. I. γ. & Icon. II. δ.  
h Hist.

decurſu coërcentur artificio, unaque cum iis tendines Sublimis. Primum enim coërcet, & flexo int' interiora carpo, retinet ligamentum carpi interius, ne in hoc flexu à carpo recedant. Deinde qua ſecundum os primi ordinis incedunt, obducti vagina<sup>h</sup> ſemiorbiculata, craſſa, dura, naturae quaſi inter tendineam & cartilagineam mediae, ab utroque oſſis margine orta, cumque ipſo oſſe canaleſcente, qui à tendine Profundi una cum illo Sublimis impletur; ita autem, ut liberrime mobiles ſint in eo, nec tamen flexendo digitos recedere quicquam poſſint. Poſt qua incedunt ſecundum os ſecundi ordinis, ſimili quoque, ejuſdemque uſus vagina<sup>i</sup> Profundi tendo obductus, Sublimis non niſi extremis caudis ſubeuntibus<sup>k</sup> eam. Circa articulos autem, tum digitorum cum metacarpo, tum ipſorum digitorum, vaginae quaedam membranaceae tenuiores, molliores, laxiores, ſupradictis quodam modo continuatae; quae & continent, & nullo tamen modo impediunt, quo minus curvari articuli facillime queant. Mirificeque juvat celeritatem motus, praeſervetque ne quid attritus vitiet, humor lubricans, quo intus perſuſae vaginae, tendineſque. Revertamur autem ad tendines Profundi. Qui ad digitos medios pertinent, craſſiores duobus reliquis, quorum gracillimus qui ad minimum. Omnes ubi per volam incedunt, teretes: ubi capita metacarpi praetereunt, lateſcunt: ubi per Sublimis tendines

P p 3

<sup>h</sup> Hiſt. huj. Icon. 1. A.

<sup>i</sup> Hiſt. huj. Icon. 1. F.

<sup>k</sup> Hiſt. huj. Icon. 1. I & F.

1 Hiſt.

dines transitori, inde se angustant: ubi ex fissura eorum exeunt, circa initium articuli primi digitorum, lateſcunt, ibi & craſſiores, & quaſi compreſſi per latera: ubi articulum illum praetereunt, anguſtant ſe, dein magis & magis: antequam è ſecundi offis vagina egreſſuri ſunt, lateſcunt<sup>l</sup>, poſteaſque ad finem uſque<sup>l</sup>, maxime<sup>m</sup> non longe ab ipſo fine, id eſt, ubi praetereunt articulum ſecundum digitorum. Ubi à vola ad digitos incedunt, inde quaſi è duobus inter ſe connexis conſtructi, nota<sup>n</sup> cundo magis magiſque inſigni. Natura autem membranacea conjuncti ſunt cum canali carpi, & cum tendinibus Sublimis, illoque Flexoris pollicis longi, ac Lumbricalibus, ut jam dictum in Sublimi. Ubi deinde per Sublimis tendines tranſeunt, ab ea parte, qua adjacent offi primi ordinis, in medio longitudinis vaginae primi offis, ibi ubi quaſi fiſſi ſunt, aliquando chordam tendineam tenuem, aut tendinoſam membranam, dimittunt, quae lateſcit, & adjungit ſe tendinoſae membranae, quae implet angulum caudarum Sublimis, factum ex coitu eorum. Qua incumbunt primo digitorum articulo, aut circa eum locum, & quidem qua ibi quaſi fiſſi ſunt, accipiunt gracilem chordulam, abſcedentem à membrana, qua Sublimis caudae adnexae offi primi ordinis, aut ab ipſo illo offe; deſcendentem deinde, perforantemque continuitatem caudarum Sublimis, aut incedentem inter caudas infra continuitatem. Saepe duae aut tres tales chordulae ibi ad eum penetrant: ſaepe

<sup>l</sup> Hiſt. huj. Icon. II. YY. conf. cum  
Icon. I. Y.

<sup>m</sup> Hiſt. huj. Icon. I. E. inter β. & γ.  
<sup>n</sup> Hiſt. huj. Icon. II. γγ.

o Bid-

saepe & portio membranae tendinosae ipsius, qua Sublimis caudae adnexae ossi primi ordinis. Accipiunt & membranam tendinosam à medio latitudinis ossis secundi ordinis, juxta ejus caput, quo commissum cum tertii ordinis osse; latam, tenuem, lato se fine eis adjungentem, qua incumbunt ossi illi, quaque fissi quasi sunt. Quibusdam à reliquo musculi jam cito distincta portio ad indicem vadens<sup>o</sup>, abscedente ab eo portione carnea, sensim graciliore, atque in indicis tendinem abeunte, ab ea parte, qua & posteriora spectat, & incumbentem sibi Sublimem: aliquando haec ab ipso usque principio plane distincta, tunc ex angustiore sensim crassior, post gracilior. Aliis & medii digiti portio satis cito distincta<sup>p</sup>; aliquando ab ipso initio, aut distinguenda facile. Sic & magnam quibusdam partem quarta distincta. Et cum distinctae, tendinem ab ea parte producant, à qua illam indicis diximus: eique carnem fere ad ligamentum armillare usque adjungunt, praeterquam quae digiti minimi est, cujus tendo longe citius sine carne; quod & aliquando in illo indicis observatum. A tertii digiti portione vidi tendinem perexilem abscedere, seseque adjungere illi quarti, cum eoque decurrere, distinctum diu. In internam partem Profundus flectit ossa tertii ordinis, secundi, primi. Dumque digitos flectit, eos ad se invicem, ut Sublimis, adducit. Eademque ratione manum flectit, & convertit. De ortu autem Lumbricalium à tendinibus ejus dicetur in Lumbricalibus illis.

Est

• Bidloo Tab. LXVII. F. indicis.

p Bidloo Tab. LXVII. H. medii.

a Eu.

Est *Secundus digitos moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 43. *Quintus manus musculus interior*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 33. *Secundus*, Arant. Anat. obs. Cap. 42. *Profundus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 29. *Flexor tertii digitorum internodii*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 19. *Perforans*, Cowper Myot. Cap. 28. Dougl. Myogr. Cap. 34. *Le Profond*, Hunauld, Hist. de l'Acad. Roy. des Scienc. ann. 1729. p. 251. *Le Perforant, communement le Profond*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 322. & seq. & 1026. & seq.

## C A P U T CLXIX.

*De Flexore longo pollicis manus<sup>a</sup>.*

**P**ollex sibi proprium Flexorem longum habet, Profundo digitorum respondentem. Nam se à radio<sup>b</sup>, sicut ille ab ulna, & sicut idem, à ligamento interjecto ulnae radioque, demittit, amplitudinem internam radii prope à tuberculo, cui insertus Biceps brachii, fere ad Pronatorem quadratum usque suo occupans initio; tenuis quoque à parte summa, sed acutus, ac deinde paulatim crassior, & simul latior, donec praecipue oriri desinat; inde deminutus: aliquando & à margine radii, juxta finem Pronatoris qua-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxviii. K. & Tab. xxxiii. 55. Vesal. Epit. musc. Fig. iii. 8. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 6. 28. Casier. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 22. Fig. 2. HH. Bid-

loo Tab. LXVIII. L. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. LIII. 112.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxviii. K. & Tab. xxxiii. 55. *ad.*





tem metacarpi ejus, ossisque primi & ultimi, procedit <sup>g</sup>, atque hujus se denique parti posticae fere mediae, quae eminet asperula, affigit <sup>h</sup>. Ubi metacarpum pollicis praetergressurus est, incedit inter ossa sesamoidea, quae ad articulum pollicis cum metacarpo apposita. Ubi dein secundum primum os pollicis incedit, à ligamento marginibus ossis illius affixo, ut Profundi tendines, coërcetur. Qua se in canali carpi ad carpum flectit, tenuior est, sitque primo latior, post angustior: qua canalem, quem ligamentum supradictum cum osse primo facit, intravit, extenuat se lente, primumque modice latefcit, dein se angustat; circa caput inferius ossis primi pollicis rursus latefcens magis magisque, & in fine se extenuans. Qua descendit secundum os primum, ab ea parte, qua spectat os illud, & qua ibi quodammodo fissus est, accipit membranae latae speciem, descendantem à media latitudine ossis primi, fere per totam ejus longitudinem. Similique adnexus est superiori parti ossis ultimi. Accrescit quoque capsulae articuli pollicis. In volam flectit pollicis os ultimum, primumque. Et si eo tempore, quo agit, non firmaretur metacarpus pollicis, eum quoque flecteret, traheretque secundum volam manus, simulque & in interiora attolleret, & volae partem ejus posteriorem obverteret: si neque carpus, flecteret eum in partem internam.

Est

g Eustach. Tab. xxxiii. 74. & Tab. xxxviii. K-γ. Bidloo Tab. LXVII.

h Eustach. Tab. xxxviii. K-γ. Bidloo Tab. LXVIII. L.

a Eu-

Est *Tertius digito moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 43. *Sextus manus interior musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 33. *Tertius musculus, polici dicatus*, Arant. Anat. obs. Cap. 42. *Musculus, a quo flectitur pollex*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 30. *Tertii internodii pollicis flexor*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 19. *Flexor tertii internodii seu Longissimus pollicis*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 29. *Flexor tertii internodii*, Dougl. Myogr. Cap. 37. *Flexor tertii internodii, seu Longissimus pollicis*, Cowper Myotom. ann. 1724. Cap. 29. *Le long Flechisseur du pouce*, Winsl. Exposit. anatom. Trait. des muscl. §. 300. & seq. & 1043. & seq.

## CAPUT CLXX.

*De Pronatore quadrato<sup>a</sup>.*

**P**er transversum Pronator quadratus incedit, brevis, sumtoque ab oblonga eminentia, quae in interiore & eadem posteriore ulnae parte, non multum supra caput ejus inferius, initio<sup>b</sup>, mox desinens<sup>c</sup> ad proximam inferiorem partem radii, tum ad amplitudinem ejus interiorem, tum ad marginem, qui ex adverso ulnae est. Latus est, eundo modo aliquantum latior fit, modo angustior, modo ejusdem ubi-

Qq q 2 que

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxviii. V. Vesal. Epit. musc. Fig. 111. f. sin. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 7. X. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 24. Fig. 1. K. Bidloo Tab.

LXVIII. B. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LIV. 144.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxviii. V. aa.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxviii. V. 3.

que manet latitudinis : insigniter autem crassescit , sed dum se inserit superficiei internae radii , extenuat , carneus praeter extimam principii sui , & plerumque etiam extremi partem. Fibrae autem ejus non eodem omnes , neque eodem in omnibus decurrunt modo. Quibusdam exteriores ab ulna nonnihil oblique descendunt : interiores , quarum etiam pars juxta ulnam à superiore exteriorum parte non tecta ab iis , longe obliquius. Aliis exteriorum superiores adscendunt , mediarum quaedam transversae sunt , inferiores descendunt. Aliis superiores transversae , inferiorum quaedam descendunt. Aliis descendunt superiores ; quae sequuntur , ut sequuntur , minus minusque ; inferiores prope transversae. Manum convertit in pronum , radium convertens circum ulnam.

Est *Primus radium peculiariter agentium* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 45. *Octavus manus interior musculus* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 33. *Inferior pronator quadratus* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 26. *Pronatorum primus , sive Quadratus* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 16. *Pronator radii quadratus* , Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 31. *Pronator quadratus* , Dougl. Myogr. Cap. 38. *Pronator radii quadratus , or inferior quadratus* , Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 31. *Le Pronateur quarré , ou transverse* , Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 262. & seq. & 990. & seq.

R·E-

## REGIO XXV. MANUS.

## CAPUT CLXXI.

*De Lumbricalibus manus<sup>a</sup>.*

**E** Profundi tendinibus statim in volae principio, alias jam in canali carpi, quatuor muscoli enascuntur<sup>b</sup>, parvi, oblongi, graciles, primo tenues planique & angusti, post sensim latiores, rursusque deinde angustiores; itemque primum crassiores, post rursus tenuiores; toti autem multo minus crassi quam lati; Lumbricales vocant. Cum iisdem tendinibus per volam descendunt<sup>c</sup> ad radices digitorum, ubi tendine<sup>d</sup>, in quem desinunt, tenui, paullatimque latiore, confluit<sup>e</sup> quisque trium posteriorum cum tendine lato Interossei prioris, ad quem pertinet, digiti: primus<sup>f</sup> cum tendine<sup>g</sup> Extensorum indi-

Qq q 3 cis.

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxviii. M. N. O. P. Vesal. Epit. musc. Fig. iii. A.  $\mu$ . v. & dext. & de H. C. F. Lib. ii. Tab. 6.  $\zeta$ .  $\zeta$ . Casler. Pent. Tab. ii. org. tact. Fig. 1. C. C. C. C. Casler. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 25. Fig. 1. & 1. F. F. F. F. & Tab. 26. Fig. 1. H. H. H. H. Bidloo Tab. LXVII. M. M. M. M. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LI. 125.  
<sup>b</sup> Casler. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 25. Fig. 1. a. a. a. a. & Tab. 26. Fig. 2. H. H. H. H. Bidloo Tab. LXVII. M. M. M. M. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LI. 125.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxviii. M. N. O. P. Casler. Pent. Tab. ii. org. tact. Fig. 1. C. C. C. C. Casler. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 25. Fig. 1. F. F. F. F.

<sup>d</sup> Casler. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 25. Fig. 1. g. g. g. g. & Fig. 3. b. b. b. b. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. I. II. O.

<sup>e</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LI. O. Hist. huj. Icon. 1. XY. Z. r.  $\Delta$   $\Theta$ .

<sup>f</sup> Hist. huj. Icon. 1. W.

<sup>g</sup> Hist. huj. Icon. iv. u.

<sup>h</sup> Casler.

cis. Oriturque primus <sup>h</sup>, qui secundo & tertio plerumque exilior, à tendine indicis, qua spectat is pollicem: secundus, qui maximus, à primo & secundo, qua se invicem respiciunt, quaque primo secedunt; insigniore tamen parte à secundo: tertius, secundo cedens, similiter à secundo & tertio, insigniore etiam parte à tertio: simillimeque quartus, prioribus longe minor, à tertio, & inprimis à quarto. Et primus quidem ab ea parte tendinis, qui indicis est, oritur <sup>i</sup>, quae obversa aponeurosi Palmaris longi: reliqui ab eadem <sup>i</sup> tendinis posterioris eorum, à quibus abscedunt; sed à prioris illa, quae spectat profunda volae. Cum Profundi portio ad indicem pertinens, à reliquo musculo cito distincta esset, Lumbricalis secundus tantum à secundo tendine oriebatur <sup>k</sup>, ut à primo primus. Sic aliquando & tertius tantum à tertio <sup>l</sup>, quartus à quarto. Aliquando Profundi tendines à se ante Lumbricalium ortum dimittunt portionem tendineam exilem, quae ipsis tamen in decursu juncta, & in quibusdam abit in Lumbricalem, ejusque principii partem facit. In decursu sineque eorum hanc notabilem varietatem vidimus, tertium non longe à radicibus digitorum findentem se in duos aequales, eorumque altero pertinentem ad medii digiti latus, quod

<sup>h</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 25. Fig. 3. a. indicis. & Tab. 26. Fig. 2. H. indicis. Bidloo Tab. LXVII. M. indicis. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LI. 125. indicis.

<sup>i</sup> Bidloo Tab. LXVII. M. indicis & proximi.

<sup>k</sup> Bidloo Tab. LXVII. M. medii.

<sup>l</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 26. Fig. 2. H. tertii.

quod spectat tertium ; altèro , quem & in alio inveni præcedente exiliorem , ad tertii , spectans secundum : quartum vero pertinentem ad tertii latus , quartum spectans. Aliis defuit quartus. Ossa primi ordinis in volam flectunt , ac simul oblique in priora , digitorumque interiorem partem aliquantum in posteriora convertunt. Ossa autem secundi & tertii ordinis videri possunt extendere : sed quoniam agere nequeunt , nisi principia eorum firmentur , aut ad cubitum actione Profundi attrahantur , ille autem digitorum ossa flectit ; extendere certe non poterunt , nisi eodem tempore Extensores digitorum Profundo , quantum requiritur , obnitantur. Et fortasse non male dicerentur partes esse Profundi.

Sunt *Musculi quatuor digitos pollicis adducentes* , Vefal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 43. *Quatuor extremæ manus musculi* , post primum , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 35. *Quatuor , qui parvi admodum in vola hærent bordis secundi* , &c. Fallopp. Obs. an. in musculis , qui in summa & extrema manu continentur. *Lumbricales* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 29. *Flectentes primum internodium* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 19. *Lumbricales* , Cowper Myot. Cap. 28. Dougl. Myogr. Cap. 34. *Les muscles Lombricaux* , Hunauld , Histoir. de l'Academ. Roy. des Scienc. ann. 1729. pag. 252. *Les muscles Lumbricaux* , Winfl. Exposit. an. Trait. des muscl. §. 335. & seq. & 1066. & seq.

## CAPUT CLXXII.

*De Abductore brevi pollicis manus<sup>a</sup>.*

**B**revis Abductor pollicis à radice volae, ubi supra pollicem oritur à ligamento carpi interiore<sup>b</sup>, & plerumque etiam ab interiore parte ossis multanguli majoris, ad pollicem pertinens est. Portionem praeterea à principio recipit ab aponeurosi Palmaris longi: aliquando & tendinem<sup>c</sup> ab Abductore longo pollicis, ut supra diximus. Recta decurrit ad caput superius primi ossis pollicis, à primo sensim latior, dein quo propior pollici, hoc angustior; tendineus quoque à primo, tenuisque; dein carneus, paullatimque crassior, ac rursus non longe ab extremo tenuior, rursusque ad postremum tendineus, tendineo extremo<sup>d</sup> ex ea parte, quae incumbit OppONENTI, primum prodeunte. Duobus modis desinit: nam partim se inferit<sup>e</sup> internae eidemque priori parti dicti capitis, extremo angustiore & crassiore, eoque praecipuo: partim priusquam se inferat, latescit magis magisque<sup>f</sup>, ambiensque commissuram primi ossis pollicis cum metacarpo suo, tendit ad dorsum pollicis, coitque<sup>f</sup> cum priore parte tendinum Extensorum pollicis, porroque se tenuitate quadam per exteriora

corun-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxii. 43. dext.

Vesal. de H. C. F. Lib. ii. Tab.

3. p. Casser. Tab. ap. Spiegel. Lib.

iv. Tab. 25. Fig. 2. A. Cowper

Myot. ann. 1724. Tab. LIII. 133.

Hist. huj. Icon. i. F.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxii. 43. dext.

Hist. huj. Icon. i. h.

<sup>c</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

LIII. 136. C.

<sup>d</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

LIII. 133. B. Hist. huj. Icon. i. k.

<sup>e</sup> Hist. huj. Icon. i. i.<sup>f</sup> Hist. huj. Icon. i. k.

eorundem tendinum continuat simili aponeurosi illius caudae Flexoris brevis pollicis, quae propior indici. Totum pollicem à reliqua manu abducit in interiora simul & aliquantum in posteriora. In eandem partem nonnihil flectit primum pollicis os. Cum vero eo tempore, quo firmatus articulus metacarpi pollicis cum multangulo majore, aut pollex quantumpote abductus, attrahimus hunc musculum ad principium suum, extenditur os primum, dein & secundum, maxime cum primum jam rectum.

Est *Qui pollicem maxime abducit*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 43. *Septimus extremæ manus musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 35. ut videtur. *Septimus*, Fallopp. Obs. an. in pollicem moventibus. Pars *Thenaris*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 30. *Abducens pollicem*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 21. *Abductor pollicis*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 29. *Abductor*, *Thenar Riola.* Dougl. Myogr. Cap. 37. *Abductor pollicis*, Cowp. Myot. ann. 1724. Cap. 29. Pars ejus, qui *le Thenar*, Winfl. Exp. an. Trait. des muscles. §. 307. & seq. & 1051. & seq.

## CAPUT CLXXIII.

*De Opponente pollicis manus<sup>a</sup>.*

**I**nfra Abductorem brevem, ab iisdem partibus, (id est à ligamento carpi<sup>b</sup>, & ab ossis multanguli majoris

R r

majoris

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiii. 69. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 25. Fig. 2. C. Hist. huj. Icon. ii. E.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxiii. 69. Hist. huj. Icon. ii. ii.

<sup>c</sup> Eu-



majoris eminentia priore <sup>c</sup> earum, quae faciunt sinum, per quem decurrit tendo Radialis interni) Opponens oritur, verum principio latiore, tendinoso, subrotundi ambitus, caeterum pariter tenui. Ad pollicis metacarpum vix latior quam inceperat, crassior tamen, sed in fine rursus extenuatus, & à principio extrinsecus, itemque intrinsecus, aliquandiu tendinosus, procedit; & ad ejus internae amplitudinis marginem priorem totum extremo tendinoso desinit <sup>d</sup>. Eumque ita flectit, ut primo pollicem introrsum simulque retrorsum abducat à manu, dein convertat, internamque ejus partem volae manus, digitisque opponat, fere directo.

Est *Illorum duorum, qui pollicis primo offi famulantur, primus*, aut pars ejus, una cum *secundo*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 43. *Decimus*, una cum *Undecimo*, Fallopp. Obs. an. in pollicem moventibus. An & hic pars *Thenaris*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 30? Est *Primi internodii pollicis flexor secundus*, cum *primo*, aut parte ejus, ut videtur, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 19. *Pars Flexoris primi & secundi offis pollicis*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 29. *Flexor primi internodii pollicis*, Dougl. Myogr. Cap. 37. *Pars Flexoris primi & secundi offis pollicis*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 29. *Pars ejus, qui le Thenar*, Winfl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 307. & seq. & 1051. & seq.

C A-

c Hist. huj. Icon. 11. k.

d Hist. huj. Icon. 11. m.

## CAPUT CLXXIV.

*De Flexore brevi pollicis manus \*.*

**H**ic à principio simplex, post bifidus. Quanquam & principium, quoniam à multis partibus incipit, qua incipit, leviter incisum sit. Nam singulis tenuibus tendineis, aut tendinosiis, portionibus oritur ab interiore parte inferioris partis ossis carpi cuneiformis <sup>b</sup>, capitati <sup>c</sup>, multanguli minoris <sup>d</sup>, eminentiae internae majoris <sup>e</sup>, (aut tantum è ligamentis, quibus haec ossa ex interiore parte obducta sunt) inferiore denique eademque exteriori ligamenti carpi interioris <sup>f</sup>, juxta multangulum majus, quae portio caeteris latior, & aliquando diu, aliquando ad finem usque, quem ossi sesamoideo ab indice remotiori inserit, distincta. Infraque originem à carpi ossibus, etiam oritur à capitibus vicinis ossium metacarpi, saepe ab illo digiti annularis, semper ab illo medii, indicisque; aliquando & ab illo pollicis: ab annularis interiore & eadem priore parte, portione tenui tendinosa: à medii partis interioris latitudine prope tota, portione crassiore, fere carnea: ab indicis interiore eademque posteriore parte, portione simili graciliore, saepe diu distincta: à pollicis parte spectan-

R r 2 te

a Eustach. Tab. xxxviii. ΠΣ. Vesal. Epit. musc. Fig. iii. lm. sin. & de H. C. F. Lib. ii. Tab. 7. 1. 2. Hist. huj. Icon. 1. KL.

b Eustach. Tab. xxxviii. ΠΣ-α.

c Eustach. Tab. xxxviii. ΠΣ-β.

d Eustach. Tab. xxxviii. ΠΣ-γ.

e Eustach. Tab. xxxviii. ΠΣ-δ.

f Hist. huj. Icon. 1. l.

g Hist.

te indicem volamque, aut mox infra caput superius, ab interna marginis illius, quo respicit indicem, portione exigua. Principium latum, à parte volae ex transverso concavum, ab initio extrinsecus tendinosum, sensim crassius: ab eo caudae <sup>g</sup> sensim graciliores, in fine tendinosae <sup>h</sup>, & adhuc satis crassae. Caudae ad ossa sesamoidea <sup>i</sup>, quae apposita ad articulum pollicis cum metacarpo ejus, & ad eam quidem partem eorum, quae ex adverso illius, qua se mutuo respiciunt, pertinent: itemque infra ea, mox juxta priorem eorum partem, ad latera capitis superioris ossis primi <sup>k</sup>, portione tenuiore: adnexaeque ligamentis, quibus sesamoidea alligata ossi primo. Dat & illa, quae indici propior <sup>l</sup>, aponeurosem <sup>m</sup> tenuem, eamque partim continuat illi <sup>n</sup>, quae nata è tendine aut Extensoris majoris pollicis, aut communis majori cum minori, ambit capsam articuli pollicis cum metacarpo: partim infra eam eidem adjungit tendini <sup>m</sup>, continuatque simili Abductoris brevis pollicis aponeurosi. Et cum extremo caudae posterioris, qua id affixum ossi primi ordinis, conjunctus Adductor pollicis. Pollicis primum os, ad quod recta tendit, cuique partim ipse, ut dictum, insertus; partim intervenientibus sesamoideis, in volam flectit. Ejusdem metacarpum in posteriorem partem, ac simul pro vario ejus situ, vel ad volam, vel secundum eam, vel

ab

g Hist. huj. Icon. 1. K. L.

h Hist. huj. Icon. 1. o. m.

i Hist. huj. Icon. 1. n.

k Hist. huj. Icon. 1. o. m.

l Hist. huj. Icon. 1v. N.

m Hist. huj. Icon. 1v. M.

n Hist. huj. Icon. 1v. M. continuat.  
L.

ab ea modice introrsum. An & juvat Extensorem magnum, ad extendendum os ultimum? id certe extendit attractus ad principium suum.

Est *Trium*, qui *secundo pollicis ossi famulantur*, *secundus* una cum *tertio*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 43: an eo etiam pertinet *Illorum duorum*, qui *pollicis primo ossi famulantur*, *primi pars secundum pollicis contingens internodium*, ibidem? *Octavus extremæ manus musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 35. una cum parte *musculi pollicem flectentis volam versus*, ibid. *Tertius*, cum *quarto*, & *quinto*, & *sexto*, & *nono*, forte & *octavo*, Fallopp. Obs. an. in pollicem moventibus. Haud dubie pars *Thenaris* cum parte *Hypothenaris pollicis*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 30. Est *Secundi internodii pollicis flexor secundus*, cum *tertio*, & *quarto*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 19. quo & pars *Primi internodii flexoris primi*, ibidem, pertinere videtur. Pars *Flexoris primi & secundi ossis pollicis*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 29. *Flexor secundi internodii pollicis*, Dougl. Myogr. Cap. 37. an pars etiam est *Adductor (pollicis) ad indicem*, *Antithenar Riol.* ibidem? Pars *Flexoris primi & secundi ossis pollicis*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 29. Pars ejus, qui *le Thenar*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 307. & seq. & 1051. & seq. & huc quoque pertinet pars ejus, qui *le Mesothenar*, ibid. §. 310. & seq. & 1054. &, ut videtur, *l'Antithenar*, ou *Demi-interosseux du ponce*, ibid. §. 313. & seq. & 1055.

## CAPUT CLXXV.

*De Adductore pollicis manus <sup>a</sup>.*

**A**dductor è latiore rectoque initio paullatim adeo strictior fit, ut in fine perangustus sit. In progressu etiam paullo quam in principio, & sensim quidem, crassior, rursusque in fine tenuior, postremo tendineus <sup>b</sup>. Oritur <sup>c</sup> à media interna amplitudine ossis metacarpi digiti medii, mox supra caput ejus inferius; in multis à tota ossis illius longitudine, inter capita ejus intercedente; ac saepe medius à principio incisus est: rectaque ad pollicem procedens, pertingit ad eam capitis superioris ossis ejus primi partem <sup>d</sup>, quae spectat indicem, extremo suo se conjungens cum cauda Flexoris brevis pollicis, quae propior indici. Metacarpum pollicis flectit in partem posteriorem, pollicem ad mediam adducens volam. Eodem & primum os flectit, exigua differentia. Cum vero pollex volae oppositus, adducit eum ad digitum medium.

*Est Trium, qui secundo pollicis ossi famulantur, primus, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 43. Pars Musculi pollicem flectentis volam versus, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 35. Secundus, Fallopp. Obs. an. in pollicem moven-*

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxviii. E. Vesal. Epit. musc. Fig. III. n. fin. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 7. 3. Casler. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 26. Fig. 2. C. Bidloo Tab. LXVII. Hist. huj.

Icon. I. M.

<sup>b</sup> Hist. huj. Icon. IV. P.

<sup>c</sup> Hist. huj. Icon. I. P.

<sup>d</sup> Hist. huj. Icon. IV. P.

moventibus. Pars *Hypothenaris pollicis*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 30. Est haud dubie *Secundi internodii pollicis flexor primus*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 19. Pars *Flexoris primi & secundi ossis pollicis*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 29. *Adductor* (pollicis) *ad minimum digitum*, Dougl. Myogr. Cap. 37. Pars *Flexoris primi & secundi ossis pollicis*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 29. Pars ejus, qui *Le Mesothenar*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 310. & seq. & 1054.

## CAPUT CLXXVI.

*De Palmari brevi* <sup>a</sup>.

**H**oc principii volae, sub ejus tegumentis explicatum, tegumen quoddam, sensim, tenuisque, satisque lata, aponeurosi exoritur tum ab exteriori parte ligamenti carpi interioris <sup>b</sup> juxta pollicem, tum à principio aponeurosis Palmaris longi <sup>c</sup>: paulatimque insignius, & latius, retrorsum prope ex transverso incedit, aliquantum descendens. Non ita autem longe ab ortu suo abit in fasciculos carneos <sup>d</sup>, tenues, tres quatuorve, aut quinque, aut & plures, disjunctos inter se, laxaque conjunctos intercedente pingui,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxv. Z. & Tab. xxxii. 49. Valverd. Anat. Tav. 3. del Lib. II. q; Cassér. Pent. Tab. II. org. tact. Fig. 1. CC. & Fig. 2. C. Cassér. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 21. Fig. 1. & 2. P. & Tab. 22. Fig. 1. H. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. XLIX. Fig. 2. & 3. 122. &

Tab. LI. 122.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxv. Z. Cassér. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 22. Fig. 1. H.

<sup>c</sup> Cassér. Pent. Tab. II. org. tact. Fig. 1. CC. & Fig. 2. C. Cassér. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 21. Fig. 1. & 2. P.

<sup>d</sup> Cowp. Myot. a. 1724. Tab. LI. 122.   
 <sup>c</sup> Cowp.

pingui; quibus panniculo adiposo adhaeret: rursumque ex his in <sup>e</sup> tendineum manus post integumenta sequens, & ad os metacarpi quartum pertinens, involucrum. Ejus actione principium volae, quod occupat, ex transverso contrahitur, eoque simul in interiora idem surgit.

Est Un' altro muscolo, che distende questa tela, Valverd. Anat. Lib. II. Cap. 27. *Primus extremæ manus musculus scriptoribus ignotus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 35. *Caro quaedam, quæ musculorum effigiem habet*, Fallopp. Obs. an. in illis musculis, qui in summa & extrema manu continentur. *Carpieus, vel Palmaris brevis*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 28. *Caro quaedam quadrata*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 18. *Palmaris brevis*, Cowp. Myot. Cap. 27. *Palmaris brevis Jo-an. Bapt. Cannan. vel Caro quadrata*, Dougl. Myogr. Cap. 32. *Le Palmaire cutané*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 289. & seq.

## C A P U T CLXXVII.

*De Abductore digiti minimi manus<sup>a</sup>.*

**H**ic uno plerumque principio, extrinsecus aliquantum tendinoso, raro duobus, incipit ab inter-

<sup>a</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LI. 122. AA.

<sup>2</sup> Eustach. Tab. xxxiii. 72. & Tab. xxxvi. Q. & Tab. xxxviii. W. ut videtur. Vcsal. Epit. musc. Fig. 1. A. fin. & Fig. 11. k. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 3. r. Casier. Tab. ap.

Spigel. Lib. iv. Tab. 21. Fig. 2. K. exterior. & Tab. 26. Fig. 2. D. Bidloo Tab. LXIX. K. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LI. 131. M H. & Tab. LII. 131. F. Hist. huj. Icon. 1. C. & Icon. IV. a.

b Eu-

interiore & à posteriore parte eminentis rotundae part<sup>s</sup> ossis subrotundi <sup>b</sup>, & à proxima ligamenti carpi interioris ; descendit rectius ; sit primo sensim aliquantum & latior & crassior , dein angustior & tenuior , inque sine se primum tendineo extremo affigit posteriori parti capitis superioris ossis primi digiti minimi , mox infra summum ejus marginem : dein cum sequente commune extremum efficit , quod similiter tendineum , sed crassius , statim infra supradictum , eidem capiti , ubi id inaequaliter eminet , insertum ; & praeterea se adjungit <sup>d</sup> tendini Extensoris proprii auricularis , desinitque <sup>e</sup> ut Interossei. Tendo ex ea primum incipit parte , quae adjacet subjectis. Os primi ordinis digiti minimi primum hic musculus abducit ab annulari , post flectit in volam. Extendit os secundi ordinis , illudque tertii , attractus ad principium : tunc & introrsum flectit os metacarpi quartum.

Est *Vigesimus manus digitos moventium* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 43. *Sextus extremæ manus musculus* , Columb. de ro an. Lib. V. Cap. 35. *Pars Hypothenaris parvi digiti* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 29. *Minimum digitum abducens* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 21. *Pars Abductoris minimi digiti* , Cowper Myot. Cap. 28. *Extensor tertii internodii minimi digiti* , Dougl. Myogr. Cap. 36. *L'Hypothenar du petit doigt* , S f f Winfl.

b Eustach. Tab. xxxviii. W.-a. Hist. huj. Icon. I. d.

c Hist. huj. Icon. I. c.

d Eustach. Tab. xxxvi. Q.-a. Hist. huj. Icon. I. g. & Icon. IV. x.

e Hist. huj. Icon. IV. DEF.

a Casser.



Winfl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 449. & seq. *Le petit Hypothenar*, ibid. §. 1057.

## C A P U T CLXXVIII.

*De Flexore parvo digiti minimi manus<sup>a</sup>.*

**E**odem, atque praecedens, modo, secundi, tertiique ordinis os extendit, & introrsum flectit os metacarpi quartum: sed os primi ordinis, totumque adeo digitum, tantummodo flectit, magis etiam in volam pollicem versus, eo digitum totum nonnihil convertens. Origo ei à media parte extremi processus incurvi ossis cuneiformis carpi, & statim infra eam ab exteriori ligamenti<sup>b</sup> carpi. Modicae ab initio latitudinis, primum aliquantulum latefcit, tum se paullatim angustat, sed diu perquam modice, in fine magis: ab initio tenuis & tendinosus, diu sensim crassior, in fine tenuior. Commune ei cum parte Abductoris praecedentis extremum, cum eodem insertus. Frequenter deest. Inveni & valde gracilem, ex acuto tendineo initio sensim crassiorem, rursusque fere à medio sensim graciliorem.

An *Sexti extremae manus musculi*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 35. pars, quae exit à *ligamento brachialis*? An pars *Hypothenaris parvi digiti*, Riolan. Anthr. Lib.

<sup>a</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 25. Fig. 2. B. extra situm. & Tab. 23. Fig. 2. K. inter. Cowp. Myor. ann. 1724. Tab. LI. 131. M. super-

rior extra situm. Hist. huj. Icon. 1. D.

<sup>b</sup> Hist. huj. Icon. 1. f.

Lib. V. Cap. 29 ? Pars *Abductoris minimi digiti*, Cowper Myot. Cap. 28. *Abductor minimi digiti*, *Hypothenar Riol.* Dougl. Myogr. Cap. 36.

## CAPUT CLXXIX.

*De Adductore ossis metacarpi digiti minimi <sup>a</sup>.*

**A**dductor ossis metacarpi digiti minimi persimilis pollicem Opponentis, sed initium rectius habet, & ad ejus rationem latescit magis, extrinsecus à principio tendinosus, intrinsecus in fine. Inserit se posteriori & eidem interiori parti ossis metacarpi quarti, per totam ejus longitudinem inter duo capita mediam <sup>b</sup>, eo procedens à posteriore eademque paullo infra mediam parte extremi fere processus incurvi ossis cuneiformis <sup>c</sup> carpi, & à proxima exteriori ligamenti carpi interioris <sup>d</sup>, infra processum illum. Os metacarpi auricularis attollit in internam manus partem, trahitque simul aliquantum pollicem versus, sequente etiam metacarpi tertio; quo volam facit ab ea parte magis concavam, dorsum manus rotundum.

*Est Illorum octo, qui quatuor subserviunt digitis, parvum digitum flectentium primus, Vesal. de H. C. F. Lib.*

S f f 2

II.

<sup>a</sup> An Eustach. Tab. xxxviii. Q. & Tab. xxxix. Fig. 1. E? Vesal. de H. C. F. Lib. ii. Tab. 4. ζ. Casser. Pentæst. Tab. ii. org. tact. Fig. 2. G. & Fig. 3. K. Casser. Tab. ap. Spiegel. Lib. iv. Tab. 25. Fig. 2. B. superior in manu. & Tab. 26. Fig.

1. E. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. 11. M. in manu. Hist. huj. Icon. ii. D. & Icon. 1. EE.

<sup>b</sup> Hist. huj. Icon. ii. hh. & Icon. iv. γ.

<sup>c</sup> Hist. huj. Icon. ii. f.

<sup>d</sup> Hist. huj. Icon. ii. g.

II. Cap. 43. *Unus Octo aliorum muscutorum*, &c. Columb. de re an. Lib. V. Cap. 35. *Unus illorum octo, qui inter ossa metacarpi continentur*, Fallopp. Obs. an. in illis musculis, qui in summa & extrema manu continentur. An pars *Hypothenaris parvi digiti*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 29? *Interosseus ultimo ossi metacarpii parte manus externa adhaerens*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 21. *Pars Abductoris minimi digiti*, Cowper Myot. Cap. 28. *Flexor primi internodii minimi digiti*, Dougl. Myogr. Cap. 36. *L'Adducteur oblique du quatrieme os du metacarpe*, Winsl. Hist. de l'Acad. Roy. des Scienc. ann. 1720. p. 92. *Le Metacarpien*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 295. & seq. & 1018. & 1056.

## C A P U T CLXXX.

*De Interosseis internis manus<sup>a</sup>, qui sunt indicis prior<sup>b</sup>, & posterior<sup>c</sup>, prior annularis<sup>d</sup>, & auricularis<sup>e</sup>.*

**I**nterosseii interni habent maximam similitudinem inter se. Priori indicis in fine cum reliquis diffimi-

<sup>a</sup> Vesal. Epit. musc. Fig. III. in vo-  
la sinistra: & de H. C. F. Lib. II.  
Tab. 8. infra A. Bidl. Tab. LXVIII.  
d. d. Cowper Myot. ann. 1724.  
Tab. LII. 127.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. XXXIX. Fig. 1. x.  
Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 8.  
Y. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib.  
IV. Tab. 26. Fig. 1. F. Cowp. Myot.  
ann. 1724. Tab. LI. P. Hist. huj.  
Icon. III. & II. G. & Icon. IV. A.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. XXXIX. Fig. 1. y.  
Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV.

Tab. 26. Fig. 1. G. indicis. Cowp.  
Myot. ann. 1724. Tab. LI. 127.  
Hist. huj. Icon. II. H.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. XXXIX. Fig. 1. B.  
Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV.  
Tab. 26. Fig. 1. H. annularis. Cow-  
per Myot. ann. 1724. Tab. LI. 127.  
Hist. huj. Icon. 1. P. & Icon. II. L.

<sup>e</sup> Eustach. Tab. XXXIX. Fig. 1. D.  
Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV.  
Tab. 26. Fig. 2. E. auricularis. Hist.  
huj. Icon. III. A. & Icon. 1. & II. N.

f Hist.

diffimilitudo. Omnes descendunt à metacarpi ossibus, à quorum longitudinis superiore plus quam dimidia parte, mox à radicibus capitum superiorum oriuntur: prior indicis ab amplitudine priore metacarpi indicis<sup>f</sup>: posterior ab ejusdem amplitudine posteriore<sup>g</sup>, praeter amplitudinis illius marginem, qui est propter dorsum manus: prior annularis ab eadem parte amplitudinis prioris metacarpi ejus ipsius digiti<sup>h</sup>: ille auricularis ab eadem ejusdem amplitudinis metacarpi auricularis<sup>i</sup>. Omnes extrinsecus à principio aliquantum tendinosi: ubi autem primum incipiunt, ibi angustiores, & tenuiores; dein quamdiu oriuntur, paullatim modice latiores, & crassiores; post paullatim graciliores: & non longe à digitis in tendinem<sup>k</sup> abeunt, quem prior indicis citius facere, qua priora spectat, incipit; sicut & ille auricularis; posterior autem indicis, priorque annularis, ab ea parte, qua spectant posteriora. Tendo prioris indicis insertus priori parti capitis superioris<sup>l</sup> primi ossis indicis. Tendo posterioris tenuis, angustus, planus: procedit multo longius<sup>m</sup>, praetergressusque articulum indicis cum metacarpo, pergit per posteriorem partem dorsi ossis primi<sup>n</sup>, dein secundum posteriorem eandemque exteriorem articuli ossis primi cum secundo,

Sff 3 post

f Hist. huj. Icon. III. no. & Icon. IV. 87.

g Hist. huj. Icon. II. p.

h Hist. huj. Icon. II. w.

i Hist. huj. Icon. III. ab.

k Hist. huj. Icon. III. p. c. Icon. II.

q. x.

l Hist. huj. Icon. III. q.

m Casler. Tab. ap. Spiegel. Lib. IV.

Tab. 26. Fig. 1. b. indicis. Hist.

huj. Icon. II. q.

n Hist. huj. Icon. IV. f.

o Hist.

post dorsum ossis secundi magis magisque conscendit<sup>o</sup>, donec in medio ejus, juxta caput inferius, cum simili tendine<sup>p</sup> Lumbricalis indicis ad acutum angulum conveniat, confluatque in unum<sup>q</sup> latiore; qui sensim modice angustior, descendit ulterius, usque ad eminentem mediam anteriorem partem capitis superioris tertii<sup>t</sup>. Circa mediam vero ossis primi longitudinem, immo plerumque paullo ante, se cum lato Extensorum tendine conjungit in unum<sup>r</sup>, ab eoque rursus, paullo prius quam is desinat, secedit<sup>t</sup>. Et ante conjunctionem, à radice digiti ad eam conjunctionem usque, aponeurosem<sup>u</sup> tenuiorem emittit, eadem se jungentem tendini, & à superiore parte cum ejusdem tendinis aponeurosi, qua capsam articuli indicis cum metacarpo ambit, continuatam<sup>w</sup>, fibrasque superiores prope transversas habentem, ut sequuntur, reliquas magis descendentes; iisque fibris per dorsum tendinis illius evanescit; talesque etiam per idem dorsum dispergit<sup>r</sup>, qua conjunctus. Ex interiore autem parte accipit fibras insignes ab ea parte lati tendinis Extensorum, qua is incumbit ossi primi ordinis. Tendo prioris annularis ab ejus priora parte decurrit<sup>x</sup>, ut posterior indicis à posteriore: in fine confluit cum tendine posterioris<sup>y</sup> annularis ejusdem

o Hist. huj. Icon. iv. B. indicis.

p Hist. huj. Icon. iv. A.

q Hist. huj. Icon. iv. E. indicis.

r Hist. huj. Icon. iv. F. indicis.

s Hist. huj. Icon. iv. v. indicis.

t Ibid.

u Ut Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

z H. m. Hist. huj. Icon. iv. f. indicis.

w Hist. huj. Icon. iv. f. indicis contin. q.

x Hist. huj. Icon. ii. x. & Icon. iv. d w C t. annularis.

y Hist. huj. Icon. iv. B. annularis.

z Hist.

jusdem, cujus tertio ossi communis prioris & posterioris tendo <sup>z</sup> insertus \*, ut communem indici inseri docuimus. Sic & decurrit <sup>a</sup>, & cum simili Abductoris digiti minimi, aut communi ei cum Flexore ejusdem digiti parvo, extremo <sup>v</sup> definit <sup>z</sup> Interosseus auricularis. Adde quod tendines subtilibus se fibris innectant capsis, quae continent articulos digitorum cum metacarpo, qua secundum eas à parte volae incedunt. Adde praeterea, quod ad principium tendinis prioris annularis accedat tendo Lumbricalis tertii, eodemque modo quarti <sup>z</sup> ad illum auricularis: ex quorum conjunctione, & accedentibus fibris ab Extensoris tendine, fit tendo ad os tertium pertinens <sup>v</sup>. Interosseus auricularis, itemque prior annularis, & posterior indicis, ab initio extrinsecus aliquandiu tendinosi sunt. Supereft actio eorum, quam externorum historiae subnectemus.

Sunt quatuor *Illorum octo*, qui quatuor subserviunt digitis, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 43. *Octo aliorum musculorum*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 35. *Illorum octo*, qui inter ossa metacarpi continentur, Fallopp. Obs. an. in illis musculis, qui in summa & extrema manu continentur. *Interossci interni*, Riolan. Anthr. Lib. V.

<sup>z</sup> Hist. huj. Icon. iv. E. annularis.

<sup>a</sup> Hist. huj. Icon. iv. F. annularis.

<sup>β</sup> Hist. huj. Icon. iii. c. & Icon. iv. b & c. auricularis.

<sup>γ</sup> Hist. huj. Icon. iv. E. auricularis.

<sup>δ</sup> Hist. huj. Icon. iv. F. auricularis.

<sup>ε</sup> Hist. huj. Icon. ii. Q. & Icon. i. Z.

<sup>ζ</sup> Hist. huj. Icon. ii. O. & Icon. i. Δ. & Icon. iii. K.

<sup>η</sup> Hist. huj. Icon. ii. R. P. & Icon. i. Γ. Θ. & Icon. iii. L.

<sup>α</sup> Vc.

V. Cap. 29. praeter priorem indicis. *Interossei*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 21. Vide Habcot Semain. anat. *Interossei manus*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 28: prior indicis est *Abductor indicis*, ibid. *The internal Interossei*, Dougl. Myogr. Cap. 35: prior indicis est *Extensor tertii internodii indicis*, ibid. Sunt *les Interosseux internes*, Winsl. Hist. de l'Acad. Roy. des Scienc. ann. 1720. p. 92. praeter priorem indicis. *Interossei manus*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 28. Vide Heist. Comp. an. ann. 1727. not. (74\*). Sunt *les Interosseux internes*, Winsl. Exp. an. Trait. des musc. §. 338. 344. & seq. & 1058. & seq. praeter priorem indicis.

## C A P U T CLXXXI.

*De Interosseis externis manus<sup>a</sup>, qui sunt uterque medii<sup>b</sup>, posterior annularis<sup>c</sup>.*

**S**imiles hi inter se, maximam partem differunt ab illis, praeterquam decursu, & tendine. Quare unum

<sup>a</sup> Vesal. Epit. musc. Fig. III. in vola sin. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 8. infra A. Bidloo Tab. LXXIII. d. d. & Tab. LXXI. inter ossa metacarpi. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LII. 127.

<sup>b</sup> Prior, Eustach. Tab. XXXIX. Fig. 1. z. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 26. Fig. 1. H. medii. Cowper Myot. 2. 1724. Tab. 11. 127. Hist. huj. Icon. III. EF. & Icon. IV. ΘΛ.

Posterior, Eustach. Tab. XXXIX. Fig. 1. A. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 26. Fig. 1. G. medii. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. 11. 127. Hist. huj. Icon. III. CD. & Icon. IV. ΞΠ.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. XXXIX. Fig. 1. C. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 26. Fig. 1. G. annularis. Hist. huj. Icon. III. B. & Icon. IV. ΞΘ.

d Hist.

unum modo describemus, nempe priorem medii. Biceps est, alteroque capite<sup>d</sup> oritur à longitudine paullo plus quam dimidia superiore amplitudinis prioris metacarpi medii<sup>e</sup>: altero<sup>f</sup> ab exteriori margine illius lateris ossis metacarpi primi<sup>g</sup>, quo spectat secundum, à radice capitis ejus superioris, fere usque ad inferius. Illud satis simile Interosseis internis; hoc multo tenuius, & planius. Utriusque fibrae oblique ad se invicem descendunt, conveniuntque ad angulos acutos<sup>h</sup>. Posterior medii crassiore capite<sup>i</sup> oritur ab eadem parte superiore ejus lateris ossis ejusdem metacarpi secundi<sup>k</sup>, quo tertium respicit: tenuiore<sup>l</sup>, ab exteriori parte amplitudinis ossis metacarpi tertii<sup>m</sup>, quae obversa secundo. Posterior annularis eodem modo capite crassiore<sup>n</sup>, ab illo ossis metacarpi tertii latere<sup>o</sup>, quod spectat quartum: tenuiore<sup>p</sup>, ab exteriori parte illius quarti<sup>q</sup>, quod spectat tertium. Omnium capita ab initio subtendinea: prioris ad medium pertinentium caput crassius aliquandiu tendinosum extrinsecus, quemadmodum & idem posterioris annularis, aliquantum etiam posterioris medii. Tendinem ex utroque

T t t                      capite

d Hist. huj. Icon. 111. E. & Icon. 1v. A.

e Hist. huj. Icon. 111. k. l. & Icon. 1v. g.

f Hist. huj. Icon. 1v. θ. & Icon. 111. F.

g Hist. huj. Icon. 1v. δ.

h Hist. huj. Icon. 1v. θ.

i Hist. huj. Icon. 111. D. & Icon. 1v. E.

k Hist. huj. Icon. 111. gh. & Icon.

1v. λμ.

l Hist. huj. Icon. 1v. π. & Icon. 111. C.

m Hist. huj. Icon. 1v. ς.

n Hist. huj. Icon. 111. B. & Icon. 1v. Σ.

o Hist. huj. Icon. 111. dc. & Icon. 1v. ςς.

p Hist. huj. Icon. 1v. φ.

q Hist. huj. Icon. 1v. τν.

r Hist.



capite inchoant, qui dein in communi cauda citius in priore medii apparet ab ea parte, qua adjacet ossi metacarpi secundo: in posteriore tertii, qua is ossi tertio: in posteriore medii, qua respicit tertium. Tendo prioris medii <sup>r</sup> ab hujus priore parte, posterioris <sup>t</sup> à posteriore incedit, mutuaque conjunctione communem <sup>u</sup>, ad os tertium pertinentem <sup>v</sup>, tendinem efformant. Tendo posterioris annularis <sup>w</sup>, à posteriore ejus parte incedens, commune extremum <sup>x</sup> efficit cum priore digiti ejusdem <sup>y</sup>, quod similiter ad os <sup>z</sup> ejus tertium pertinet. Ad prioris medii tendinem accedit Lumbricalis secundus <sup>a</sup>. Omnes plerumque aliud praeterea extremum <sup>β</sup> exigunt, praecedenti subjacens, & in tendinem abeuns crassiolem, sed angustiolem, quem affigunt eminentiae, quae est mox infra caput primum ossis primi, ab eo digiti, ad quem pertinent, latere, quod tenent. Omnes, tum externi, tum interni, digitum suum flectunt, priores in priora pollicem versus, posteriores in posteriora, simulque modice in interiora, in oppositum sibi latus simul aliquantum convertentes partem ejus inter-

<sup>r</sup> Hist. huj. Icon. 111. m. & Icon. 1v. x w C. medii.

<sup>f</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. 1v. Tab. 26. Fig. 1. b. medii. Hist. huj. Icon. 111. i. & Icon. 1v. g v B. medii.

<sup>t</sup> Hist. huj. Icon. 1v. E. medii.

<sup>u</sup> Hist. huj. Icon. 1v. F. medii.

<sup>w</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. 1v. Tab. 26. Fig. 1. b. annularis. Hist.

huj. Icon. 111. f. & Icon. 1v. g v B. annularis.

<sup>x</sup> Hist. huj. Icon. 1v. E. annularis.

<sup>y</sup> Hist. huj. Icon. 1v. C. annularis.

<sup>z</sup> Hist. huj. Icon. 1v. F. annularis.

<sup>a</sup> Hist. huj. Icon. 111. H. & Icon. 11. S.

<sup>β</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. 111. l.

internam : digitum in volam flexum , in eandem magis flectunt , sed oblique in suum latus. Omnes , praeter priorem indicis , extendunt os secundum & tertium , si attrahas eos ad principium suum.

Sunt tres *Illorum octo* , qui quatuor subserviunt digitis , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 43. *Octo aliorum muscularum* , &c. Columb. de re an. Lib. V. Cap. 35. *Illorum octo* , qui inter ossa metacarpi continentur , Fallopp. Obs. an. in illis musculis , qui in summa & extrema manu continentur. *Interossei externi* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 29. *Interossei* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 21. Vide Habicot Semain. anat. *Interossei manus* , Cowper Myot. Cap. 28. *The external Interossei* , Dougl. Myogr. Cap. 34. *Les Interosseux externes* , Winsl. Hist. de l'Acad. Roy. des Scienc. ann. 1724. p. 92. Vide Heist. Comp. an. ann. 1727. not. (74\*). *Les Interosseux externes* , Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 338. 339. & seq. & 1058.

## CAPUT CLXXXII.

*De Abductore indicis manus <sup>a</sup>.*

**I**ndicis Abductor è modica latitudine primo aliquanto lator , mox strictior , progrediens crassior , in fine tenuior. Verum principium in aliis bipertitum  
T t t 2 habet,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvi. f. & Tab. xxxvii. 64. Vesal. de H. C. F. Lib. 11. Tab. 9. g. Caſſer. Tab. ap. Spigel. Lib. 1v. Tab. 24. Fig. 2. H.

& Tab. 27. Fig. 1. L. Bidloo Tab. lxxi. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LI. O. Histo. huj. Icon. 1v. r. & Icon. 11. F.

b Eu-

habet, ejusque superior pars ( quae extrinsecus permodice tendinosa esse solet ) oritur à capite superiore metacarpi pollicis, qua is indicem respicit: inferior, quae latior, statim infra superiorem, à superiore parte marginis ossis ejusdem. Aliis haec principia conjuncta in unum <sup>b</sup>. Quibusdam accedit aliud à dorso ossis multanguli majoris, estque angustum, tenue, diuque tendineum. Aliquando portio accedit, orta ab interiore & eadem superiore parte ossis metacarpi indicis, aberrans quasi ab Interosseo priore indicis, cum quo se hic Abductor in progressu solet conjungere. Ad indicis priorem partem procedit, ubi se praecipue extremo tendineo <sup>c</sup> planiore, quod ex interiore parte primum nascitur, inserit <sup>d</sup> capiti superiori ossis primi: ab exteriori autem parte in tenuem aponeurosem dilatescit, dorsum ejusdem ossis, capsamque articuli ejus cum metacarpo, conscendentem, seseque conjungentem cum tendine Lumbricalis primi, cum eoque adjungentem <sup>e</sup> communi tendini Extensorum indicis. A reliquis digitis indicem ad pollicem ducit, vicissimque pollicis metacarpum ad indicem. Indicem modice simul in volam flectit. Et si efficere in nobis valet, quod attractus ad principium suum, etiam inter adjuutores Extensorum indicis numerandus.

*Est Alter musculus, lateralibus pollicis motibus inserviens,*  
Vesal.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvi. γ. α. Hist. huj. Icon. iv. γ. α.

<sup>d</sup> Hist. huj. Icon. ii. ο.

<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxxvi. γ. β.

<sup>c</sup> Hist. huj. Icon. ii. η.

Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 43. *Septimus pollicis musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 35. *Primus*, Fallopp. Obs. an. in pollicem moventibus. *Abductor indicis*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 29. *Adducens pollicem*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 21. *Adductor pollicis*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 29. *Abductor indicis*, Dougl. Myogr. Cap. 35. *Adductor pollicis*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 29. *Le Demi-interosseux de l'index*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 447. & seq. & 1065.

## REGIO XXVI. NATIS.

## CAPUT CLXXXIII.

*De Gluteo magno<sup>a</sup>.*

**N**unc primum summatim exponenda vagina tendinea, de qua & in hoc capite, & aliquot sequentium mentio facienda erit, memorabilis & ipsa. Ea se continuo per ambitum ductu demittit à crista ilium, secundum ortum Gluteorum; osse sacro & coccyge, secundum ortum magni; osse ischii & pubis, secundum ortum Semitendinosi, Adductoris magni, Gracilis, Adductoris longi, Pectinei; imo tendineo margine Obliqui externi abdominis; tendine Psoae

T t t 3 parvi:

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiv. I. & Tab. xxix. X. Vesal. Epit. Fig. muscl. 11. o. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 9. II. & Tab. 10. a. fin. Caser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab.

29. CCC. & HHHIIKK. Bidloo Tab. LXXII. A. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LVII. 151. & Tab. LV. Fig. 2. & 3. 151.

b Eu-

parvi : complectiturque cum nate femur ; statim post tegumenta communia , \* majorem partem ex fasciculis transversis rectisque constans. Qua Gluteum magnum integit , valde tenuis : qua <sup>b</sup> medium ante magnum , crassior , eoque crassior , quo remotior à magno : ab externo femoris latere <sup>c</sup> valde crassa , de caetero tenuis. Ejusque crassa pars inserta externo lateri capitis superioris tibiae , & à priore parte conjuncta cum tendine Vasti externi. Tenuiore autem parte sui etiam genu laxè ambit , & ad crus procurrit. Propaginem insignem interfert Gluteo magno & medio : tenues femur occupantibus , eosque vaginarum instar laxè continentés ; nisi quod insigniore ambiat Vasti externi posteriorem partem , distinguens eum à Bicipitis cruris capite breviorè ; ejusque propaginis priori parti adjungit se aponeurosis tenuis , orta ab imo Glutei magni tendine , & dein à spina femoris juxta ortum Vasti externi , suisque fasciculis descendens oblique extrorsum. Conjunctus autem cum hac vagina tendo Glutei magni , de quo nunc opportunum erit dicere. Is igitur rotundi qua oritur ambitus , rectoribus deinde lateribus , rotundis tamen , incedit , sic ut primo latescens , dein magis lentiusque angustetur. Est vero magnus & crassus , verum ab initio tenuis , à quo

b Eustach. Tab. xxx. K. & Tab. xxxi. Z. super. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. lvii. A A D.  
c Eustach. Tab. xxx. S. & Tab. xxxi. Z. inf. & Tab. xxix. u. Vesal. Epit. Fig. musc. 1. u. dext. & de H.

C. F. Lib. II. Tab. 3. 9. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 34. O O O O. & S S S. Bidloo Tab. LXXVI. B. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. lvii. 159 E E.

d Casser.

quo sensim increfcit aliquandiu , post decrefcit. Continuoque ductu oritur , ab offe ilium ad anteriorem marginem partis posterioris cristae <sup>d</sup> , qua hoc os ultra sacrum retrorfus porrectum : dein à ligamento , quod à postica cristae illius parte ad posticam sacri deductum ; continuatus ibi tendineo principio Latissimi dorsi , communisque capitis Longissimi & Sacrolumbalis : tum à margine externo ossis sacri , juxta foramen ejus imum : post à tuberculo primo eorum , qui sunt à latere hiatus , in quem spinae dorsi canalis , medullam spinalem continens , exit ; & ab articulo processuum obliquorum ossis sacri coccygisque : à latere denique coccygis. Quin & tam pertinaciter adhaeret ligamento , quod ab offe sacro ad cristam ilium ; eique , quod ab eodem offe ad ischion deductum ; itemque vaginae tendinosae , qua extrinsecus obductus , ut ab iis etiam oriri videatur. In ipso ortu ferè tendineus est ; magis tamen carnosa , itemque crassior , pars illa , quae ab offe ilium procedit. Oblique in latus descendit , carne in fasciculos <sup>e</sup> inter se laxius cohaerentes extrinsecus congesta ; ex interiore autem parte magis compacta , & ad postremum abeunte in tendinem <sup>f</sup> crassum , satisque latum , qui inferiore eademque posteriore parte <sup>g</sup> sui , quae praecipua

d Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 20. a.

e Eustach. Tab. xxxix. X. Vesal. Ept. Fig. musc. II. o. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 9. II. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LV. Fig. 2.

& 3. 151.

f Eustach. Tab. xxxiv. I. a. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LVII. DCC.

g Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LVII. CC.

h Eu-

cipua crassissimaque , se ab externo latere innectit interiori parti vaginæ tendineæ, quæ femori adjacentes musculos complectitur ; & ad postremum ad femur pertinet<sup>h</sup>, in portiones aliquot fissus : prætereque ab externo latere se portione tenuiore, per longitudinem dimissa , adjungit<sup>i</sup> eidem ejusdem vaginæ parti. Notissima femoris eminentia est , quæ per posteriorem ejus partem à radice trochanteris majoris deorsum porrecta : hujus superiori parti se inferit, quoad illa maxime eminere , & inaequabilis esse solet. Ima parte sui se præterea & carne , & fibris tendineis conjungit cum Vasto externo. Integit autem trochanterem majorem , ad cujus dorsum suo se tendine flectit : qui ut facilius ad trochanterem illum ire & redire possit , interjecta bursa tenuis , magna , parva parte sui stricte adnexa trochanteris dorso , statim infra finem Glutei medii ; reliquo autem trochanteris , & Glutei magni tendini , laxæ. Coxæ articulum in posteriorem simul & exteriorem partem oblique flectit , & vel attollit femur spinam versus , vel in latus simul & in posteriora coxam deprimit : sed simul etiam femur aliquantum per exteriorem partem retrorsum convertit , coxam per eandem partem in priora. Flexum in priora femur abducit à femore altero. Qua denique parte oritur à coccyge , trahit eum in latus , inque priora.

Est *Primus femur moventium* , Vesal. de H. C. F. Lib.

<sup>h</sup> Eustach. Tab. xxxiv. I. s. Vesal. de i Cowper Myot. Tab. LVII.  
H. C. F. Lib. II. Tab. 10. x.

<sup>i</sup> Eq.

Lib. II. Cap. 56. *Primus musculus femur movens*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 28. *Primus omnium maximus*, sui lateris clunem efformans, Arant. Anat. obs. Cap. 44. *Maximus & extimus Gloutius*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 41. *Extendentium primus*, *Glutaeus major*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 22. *Glutaeus major*, Cowp. Myot. Cap. 32. *Glutaeus maximus*, Dougl. Myogr. Cap. 39. *Le grand Fessier*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 477. & seq. & 1069. & seq. & 1074. & seq.

## CAPUT CLXXXIV.

*De Gluteo medio <sup>a</sup>.*

**H**oc multo minor medius, carne etiam constans compactiore. Similiter autem rotundi ambitus principium habet, sed crassius, & maxime carneum; quodque oritur <sup>b</sup> à dorsi ossis ilium latitudine tota, juxta cristam ejus; & ab aponeurosi, qua hic Gluteus extrinsecus obductus. Inde ad trochanterem majorem tendens, se paullatim angustat, donec ea ejus in fine praeter propter latitudo sit, quae altitudo trochanteris, cui se à radice ejus ad summum verticem oblique affigit <sup>c</sup>,

V v v                      extre-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiv. H. & Tab. xxxii. W. Vesal. Epit. Fig. musc. II. <sup>a</sup>. fin. & Fig. I. v. fin. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 10. 2. & Tab. 2. y. & Tab. 4.  $\mu$ . Casler. Tab. 29. Spigel. Lib. IV. Tab. 29. LL. & Tab. 30. BB. & DDDE. Bidl.

Tab. LXXII. D. & Tab. LXXXIII. B. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LVIII. 152.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxiv. H- $\alpha\beta\gamma$ . & Tab. xxxii. W.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxiv. H- $\delta$ . Bidloo Tab. LXXII. EE.

d Eu.



extremo autem tendineo <sup>d</sup>, quod crassius, qua parte vertici affixum. A priore parte, ab extremo cristae ilium ad finem suum usque, cum minore conjunctus in unum: atque adeo cum eo se etiam inserit lateri externo radice trochanteris majoris; inde autem ipse solus oblique posteriori parti lateris ejusdem, usque ad summi verticis partem posticam. Pars ejus prior brevior est, magisque è transverso incedit, quam posterior. Pars prior ubi oritur, tenuior; inde aliquantum crassior: posterior dum oritur, crassior: post totus musculus sensim se extenuat. Per interiora tendinis ex transverso decurrunt fasciculi tendinei, specie ligamenti lati, longitudinem tendinis tenentis. Interque finem tendinis, illumque, quo Pyriformis desinit, interjecta bursa parva, utrique accreta. In latus articulum coxae hic medius flectit, abducens femur alterum ab altero, compagem autem ossium coxarum cum sacro, si ab interno femoris latere inclinata sit, erigens, post inclinans in latus externum. Ad hoc sua priore parte femur convertit per exteriora in priora; posteriore in posteriora: coxam contrariis modis. Sublato in priora femore, id convertit; ita autem, ut partem ejus, quae tunc est superior, aliquantum dirigat ad alterum femur.

Est *Secundus femur moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 56. *Secundus femoris musculus*, Columb. de

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxiv. H. J. Bidloo Tab. LXXII. E. E. Cowper Myot.

ann. 1724. Tab. LVIII. 152. B.

a Eu-

de re an. Lib. V. Cap. 28. *Secundus & medius Glou-  
rius*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 41. *Extendentium  
secundus*, *Glutacus medius*, Spigel. de H. C. F. Lib.  
IV. Cap. 22. *Glutacus medius*, Cowper Myot. Cap.  
32. Dougl. Myogr. Cap. 39. *Le moyen Fessier*, Winfl.  
Exp. an. Trait. des muscl. §. 483. & seq. & 1071.  
& seq. & 1074. & seq.

## CAPUT CLXXXV.

*De Gluteo minore<sup>a</sup>.*

**R**ursus minor medio Gluteus minor, ad cujus ex-  
emplum & è dorso ossis ilium venit, & tro-  
chanteri majori se inserit, & à principio rotundi am-  
bitus est, latiorque; post sensim angustior, extremo  
tendineus. Ab ilium amplitudine illa tota<sup>b</sup>, quae  
est inter ortum praecedentis, ischiique principium;  
& ab ipsius ischii orae posterioris superiore parte, se  
demittit; à primo quidem initio tenuis, sed paulla-  
tim, ut pluribus fibris ab osse oriri pergit, crassior;  
ita deinde detumescens, ut extremum ejus tendine-  
um<sup>c</sup>, ad quod efformandum jam circa medium ab  
exteriore parte tendinosus fieri incipit<sup>d</sup>, non valde  
crassum sit. Desinit<sup>e</sup> ad eam prioris partis trochan-  
teris

V V V 2

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvi. u. & Tab.  
xxxiii. y. Vesal. Epit. Fig. musc.  
iv. a. dext. & Fig. iii. f. dext. & de  
H. C. F. Lib. II. Tab. II. 2. & Tab.  
6. v. Casler. Tab. ap. Spigel. Lib.  
iv. Tab. 30. GG. Bidl. Tab. lxxiii.  
& lxxiv. C. Cowper Myot. ann.

1724. Tab. lviii. 153.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvi. u. aa.

<sup>c</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab.  
lviii. 153. E.

<sup>d</sup> Bidloo Tab. lxxiii. C.

<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxxiii. y. s. & Tab.  
xxxvi. u. β.

<sup>a</sup> Eu-

teris partem, quae est juxta latus ejus externum, à radice ejus usque ad partem superiorem. Pars ejus posterior descendit insigniter in priora, media rectius, prior modice retrorsum. Ante finem, suum adhaerit se capsulae articuli coxae; posteaque juxta finem bursa parva & tenuis interjecta, accretaque tendini & trochanteri majori, ubi ille se ad priorem hujus partem flectit. Femur, coxamque movere valet ut medius.

Est *Tertius femur moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 56. *Tertius femoris musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 28. *Tertius & intimus Gloutius*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 41. *Extendentium tertius*, *Glutaeus minor*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 22. *Glutaeus minor*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 32. *Glutaeus minimus*, Dougl. Myogr. Cap. 39. *Glutaeus minor*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 32. *Le petit Fessier*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 490. & seq. & 1073. & 1074. & seq.

## C A P U T CLXXXVI.

*De Pyriformi<sup>a</sup>.*

**L**onge magis per transversum incedit, tantum modice descendens, Pyriformis; qui ab osse sacro, eique

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvi. m. & Tab. xxxviii. w. Vesal. Epit. Fig. musc. II. β. fin. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 11. e. Casser. Tab. 2p. Spigel. Lib. IV. Tab. 29. M. & Tab. 30.

KLM. Bidloo Tab. LXXIII. & LXXIV. D. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. LVIII. 154.

b Eustach. Tab. xxxviii. w-aa.

eique proxima parte orae posterioris ejusdemque inferioris ossis ilium procedens, exeunſque ex intervallo quod inter os ſacrum atque iſchion interjeſtum; poſteaue decurrens pone iſchion<sup>c</sup>, tendine ſuo pertinet<sup>d</sup> ad internam partem medii cacuminis trochantæris majoris. Ab initio in tres quatuorve partes inciuſus eſt, quarum una oritur à priore parte illius proceſſus, qui inter oſſis ſacri foramen tertium & quartum eſt: altera ab eadem parte illius, qui inter foramen ſecundum & tertium: tertia, quæ exilior, & ſæpe deſt, à priore parte corporis ſecundi ſacri, mox ſupra foramen ſecundum: quarta ab oſſis ilium parte ſupradicta. Eſt & latior ab initio, ſatiſque craſſus: poſt ut procedit, ita ſe in anguſtum cõgit, ac primo quidem modice craſſior fit, dein gracileſcit. Extremum ejus tendo<sup>e</sup> ſatis longus eſt, gracilis, ovatus, latior quam craſſior; quem ab ea parte, qui iſchio adjacet, inchoat, & ad poſtremum conjungit cum communi cauda Obturatoris interni & Geminorum. Os femoris in priora converſum vertit per exteriora retrorſum: coxam contraria ratione. Femur præterea ſpinam dorſi verſus nonnihil attollit: coxam in latus deprimit oblique. Femur autem cum flexum in priora, abducit ab altero.

Eſt *Quartus femur moventium*, Veſal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 56. *Quartus femoris muſculus*, Columb.

V v v 3 de

c Eufſtach. Tab. xxxvi. m.

d Eufſtach. Tab. xxxvi. m-ß.

e Eufſtach. Tab. xxxvi. m-a. Caſſer.

Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 30.

M. Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

LVIII. 154-G.

a Eufſ-

de re an. Lib. V. Cap. 28. *Primus & superior Quadrigeminus*, *Iliacus externus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 41. *Circumagentium primus*, *Iliacus externus*, *Pyriformis*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 22. *Pyriformis seu Iliacus externus*, Cowper Myot. Cap. 32. Dougl. Myogr. Cap. 39. *Le Pyriforme, ou Pyramidal*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 503. & seq. & 1084. & seq.

## C A P U T CLXXXVII.

*De Geminis.*

**G**emini quorundam distincti sunt <sup>a</sup>, aliorum unum <sup>b</sup> referunt, conjuncti à principio. Itaque vel uno communi principio, vel uterque distincto incipiunt à lunato termino illius sinus ischii, per quem Obturator internus se flectit. Aliquando inferioris ima principii pars separata est, procedens ab imo margine sinus ischii, mox supra ligamentum ab ischio ad sacrum deductum. Modicae ab initio latitudinis sunt, nec valde crassi: hinc sensim angustiores, sed primum aliquandiu crassiores, dein toti gracilescunt. Et ab initio modice tendinosi sunt, in fine tendinei, quo se conjungunt <sup>c</sup> cum cauda Obturatoris interni, quam qua ab ischii sinu ad femur pergit, comitantur, & ex parte quasi continent <sup>d</sup>, ad ejus figuram cavati,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvii. f. t. "

<sup>b</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. ii. Tab. 13.

xvz. Cowper Myot. ann. 1724.

Tab. lviii. K K.

<sup>c</sup> Vesal. Epit. Fig. musc. iv. n. sin.

Cowper Myot. ann. 1724. Tab. lviii. K K I.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxix. hik. Vesal. Epit. Fig. musc. 11. 371. & de H. C. F. Lib. 11. Tab. 12. 377.

<sup>a</sup> Eu-

cavati, donec cum ea confluant in commune extremum, quod ubi insertum sit, in historia Obturatoris illius mox indicabimus, quem Gemini juvant, similia praestantes. Atque inter Geminos caudamque Obturatoris bursa parva, adhaerens utriusque, interque Geminos capsulae articuli coxae.

Sunt *Carneae portiones*, decimo *femur moventium musculo attentae*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 56. *Marsupium carneum*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 28. *Secundus & tertius Quadrigeminus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 41. *Carneum marsupium*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 22. *Marsupium*, Cowper Myot. Cap. 32. in Marsupiali. *Gemini*, Dougl. Myogr. Cap. 39. *Les petits Jumeaux*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 512. & seq. & 1084. & seq.

## CAPUT CLXXXVIII.

*De Obturatore interno.*

**H**ujus, quo ad femoris, coxaeve conversionem, abductionemque sublatis femoris indigebamus, maximam partem natura, cum nequiret alibi, in pelve reposuit<sup>b</sup>, ubi à priore parte, eaque plus quam dimidia, ambitus foraminis magni ossis coxarum oritur principio tendinoso, cujus latitudo & rotunditas intelligi

\* Eustach. Tab. xxxvii. w. & Tab. xxix. i. Vesal. Epit. Fig. muscl. 1v. n. fin. & 7. dext. & de H. C. F. Lib. 11. Tab. 13. rstu. & Tab. 16. EFGH. & Tab. 12. a. Casser. Tab.

ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 33. DDE. & GG. & Tab. 30. O. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. lvi. 11. 155. b Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 16. EFGH.

telligi ex eo possunt. Id vero ad superiorem partem foraminis illius, ibi ubi sinus in eo, aliquantum intercisum est, ne impediat nervorum & valorum femoralium è pelvi egressum: & pars posterior angustior est, & tenuior. Per latus inde pelvis procedit retrorsum ad sinum, qui in margine ischii inter ejus acutum processum imumque tuber est, ex illa amplitudine ita se paulatim coangustans, & postquam à primo crassior effectus erat, extenuans, ut tantummodo sinum illum impleat. In ipso sinu se circum ischion flectit<sup>c</sup>, egressusque ex pelvi, pergit decrescere, decurritque<sup>d</sup> fere per transversum, usque ad internam eandemque priorem partem cacuminis trochanteris majoris<sup>e</sup>. Ejus quoque extremum, non secus atque illud Pyriformis, tendo<sup>f</sup> est, qui ex interiore parte carnis, ubi ad ischion accedit, minimis initiis oritur<sup>g</sup>, quae primo in aliquot insigniores, easque planiores, & sensim crassiores, angustioresque radices<sup>h</sup>, aliasque exiliores, in eadem interiore carnis parte colliguntur, ac deinde confluunt in truncum planiorem, sensimque decrecentem, cui ipsi caro aliquandiu extrinsecus adhaeret, maxime ab inferiore parte: eminentque dictae illae tendinae radices, qua in sinu ischii continentur; ac totidem eis sinus, in quos major ille sinus ischii ob id distin-

c Vefal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 16. H.

d Eustach. Tab. XXIX. i. Vefal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 12. a.

e Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LVI. Fig. 3. 155.

f Eustach. Tab. XXXVII. w-β. Cow-

per Myot. a. 1724. Tab. LVIII. I. Eustach. Tab. XXXVII. w-αα.

g Eustach. Tab. XXXVII. w-αα. Vefal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 13. stu. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LVIII. 155-I.

i Vefal.

distinctus, respondent. Ipse tendo in fine cohaeret i cum Geminis: communeque extremum pertinaciter adhaeret capsae articulum coxae continenti. Eodem modo vertit femur coxamque, quo Pyriformis, sed re-ctius. Et abducit quoque flexum in priora femur.

Est *Decimus femur moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 56. *Decimus femoris musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 28. *Obturator internus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 41. *Circumagentium tertius, obturator internus*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 22. *Marsupialis seu bursalis*, Cowp. Myot. ann. 1694. Cap. 32. *Marsupialis seu Obturator internus*, Dougl. Myogr. Cap. 39. *Obturator internus*, Morgagn. Adv. an. II. Anim. 18. *Marsupialis, seu Bursalis*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 32. *L'Obturateur interne*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 507. & seq. & 1087. & seq.

## CAPUT CLXXXIX.

*De Quadrato femoris.*

**Q**uadratum quem vocant, minime certe quadratus est: multo enim longior est, quam lator, & in progressu se modice dilatat, in fine nonnihil angustat. Caeterum simplex est, principio tendinoso, modicaeque latitudinis, incipiens ab exteriori margine tuberis ischii, & ex transverso procedens ad ob-

X x x longam

i Vesal. Epit. Fig. musc. iv. n. fin.  
Cowper Myot. ann. 1724. Tab.  
LVIII. 1KK.

Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 32.  
H. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab.  
LVIII. 156.

a Eustach. Tab. xxxvii. u. Casser.

b Eu-



longam eminentiam, quae partim è posteriore parte radice trochanteris majoris, partim infra eam ex femore eminet<sup>b</sup>. Ab initio aliquandiu tendinosus est, praesertim extrinsecus; in fine intrinsecus: à primo sensim crassior, mox modice tenuior. Vertit femur & coxam ut Obturator internus & Gemini. Femur in latus sublatum deprimit, & ad alterum adducit: coxam in latus depressam erigit, inclinatur deinde in oppositum. Aliquando defuit.

An est pars *Quinti femur moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 56? Pars *Octavi femoris musculi*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 28? Est *Undecimus movens femur*, Fallopp. Obs. an. in moventibus femur. *Undecimus*, Arant. Anat. obs. Cap. 43. *Quartus Quadrigeminus quadratus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 41. *Circumagentium quartus*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 22. *Quadratus femoris*, Cowper Myot. Cap. 32. Dougl. Myogr. Cap. 39. *Le Quarre*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 520. & seq. & 1084. & seq.

## REGIO XXVII. FEMUR.

## CAPUT CXC.

*De Bicipite cruris<sup>a</sup>.*

**H**ic non modo biceps est, sed etiam bicorpor: ex duobus enim constat musculis, non nisi in fine ad

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvii. u. a.

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxi. ba. Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. II. 78. Casler. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 33. V

XYZ. Bidloo Tab. Lxxvii. AA. & Tab. Lxxviii. BB. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LX. 162.

<sup>b</sup> Eu-



tendinei extremi, quod longus efficit, parti illi, quae priora spectat, per longitudinem <sup>h</sup>, fere ad finem ejus usque, adjungit, ex eo sensim incrementis. Sic ortus tendo <sup>i</sup> crassus est, planior, brevis. Brevior longiori subjacet <sup>k</sup>. Uterque descendit nonnihil extrorsum. Eodem modo tendo communis primum pergit, usque ad posteriorem partem lateris externi condyli externi femoris; unde se secundum latus illud modice in priora curvat, simul descendens; inque fine accrescit <sup>l</sup> exteriori parti capitis superioris fibulae: portionem quoque à priore parte, antequam se inferat, exigit, pertinentem ad exteriorem partem tibiae, ante caput fibulae. Extremitate tendinis subiecta bursa, inter eum, & ligamentum genu laterale externum intercepta, & utrique accreta. Genu in posteriorem partem flectit. Flectit quoque coxae articulum, ni is firmetur; & fere in partem internam: simul autem in posteriorem, cum is flexus in priora. Flexo genu, crus, introrsum sua priorē parte conversum, vertit extrorsum. Tendo autem ejus firmatur aponeurosi tenui, lata, sensimque latiore; quam juxta condylum à posteriore parte sua, ubi se in priora curvat, emittit, descendantem per posteriora cruris, & ad ejus vaginam accedentem. Adde quod à priore etiam parte juxta genu aliam producat, ad vaginam femoris accedentem; ac portionem det vaginae tendinae, quae externam cruris partem

<sup>h</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LX. 162. BC.

<sup>i</sup> Eustach. Tab. xxxvi. I. Cowper

Myot. ann. 1724. Tab. LX. 162. C.

<sup>k</sup> Eustach. Tab. xxxi. a. sub b.

<sup>l</sup> Eustach. Tab. xxxvi. I. a.

a Eu-

partem ambit; ibidemque aliquando & portionem inferat tibiae, ante caput fibulae.

Est *Quartus tibiae moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 53. *Quintus tibiae musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 29. *Biceps*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 42. *Flectentium tibiae quintus*, *biceps*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 23. *Biceps*, Cowper Myot. Cap. 33. Dougl. Myogr. Cap. 41. *Le Biceps de la jambe*, Winsl. Hist. de l'Acad. Roy. des Scienc. ann. 1720. p. 94. *Le Biceps*, Exp. an. Trait. des muscl. §. 553. & seq. & 1112. & seq.

## CAPUT CXCI.

*De Semitendinoso<sup>a</sup>.*

Cum Bicipitis parte longiore, cum qua & à principio in plerisque cohaeret, sic ut aliquando carne sua ab illa parte tendinis ejus, qua spectat femur alterum, abscedat, Semitendinosus à dorso tuberis ischii incipit<sup>b</sup>; capitis similiter tendinei<sup>b</sup>, angustius, crassius, & per ventris initium tendinea tenuitate aliquantum excurrentis, sed ab ea parte, qua spectat latus externum, quaque adjacet parti longiori Bicipitis, itemque qua Semimembranoso: ventris quoque

X x x 3 per-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiv. L. & Tab. xxxv. MN. & Tab. xxx. V. Vesal. Epit. Fig. musc. II. p. fin. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 10. <sup>c</sup> Casler. Tab. 2p. Spigel. Lib. IV. Tab.

31. L. Bidloo Tab. LXXXVIII. D DD. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LX. 163.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxiv. L. s. & Tab. xxxvi. o.

<sup>c</sup> En-

persimilis, citius autem incrementis; & jam ante medium lente decrementis. In tendinem <sup>c</sup> longum, crassum, planiorem, & in ea parte ventris extremi, quae obversa femori alteri, primum conspicuum, exit. Per posteriorem femoris partem recte descendit usque ad posteriorem condyli ejus interni <sup>d</sup>; ultraque pone caput superius tibiae <sup>d</sup>, ad cujus radicem cum tendo pervenit, se in priora secundum tibiam flectit <sup>d</sup>, indeque extenuat, dilatatque <sup>e</sup>, latiore denique fine inserit <sup>f</sup> lateri interno tibiae, mox infra Gracilem. Hujus Semitendinosi extremus tendo, ne à condylo femoris in priora deflectat, à posteriore parte retinetur aponeurosi, quam juxta poplitem à posteriore parte sua exigit, & ad vaginam cruris retrorsum demittit. Nisi quod in contrarium crus, cum genu in posteriora flexum, convertat, similia praestat ac Biceps.

Est *Tertius tibiam moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 53. *Tertius tibiae musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 29. *Seminervosus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 42. *Flectentium tibiam tertius*, *seminervosus*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 23. *Seminervosus*, Stenon. Elem. myol. spec. p. 52. *Seminervosus seu Semitendinosus*, Cowper Myot. Cap. 33. *Seminervosus*, Dougl. Myogr. Cap. 41. *Le Demi-nerveux*, Winsl. Exp.

c Eustach. Tab. xxxiv. L. β. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LX. 163. E.

d Eustach. Tab. xxxiv. L.

e Eustach. Tab. xxx. V. & Tab. xxxv. N

f Eustach. Tab. xxxv. N. α.

Exp. an. Trait. des muscl. §. 557. & seq. & 1110.

## CAPUT CXCII.

*De Semimembrano<sup>a</sup>.*

**H**ujus & caput, & cauda tendo insignis est, ad quorum rationem ventrem habet admodum crassum. Caput affigit superiori parti dorsi tuberis ischii, juxta externum latus, proxime ortum partis longioris Bicipitis, illumque Semitendinosi: caudam<sup>b</sup>, capiti superiori tibiae, mox sub summo rotundulo margine ejus, ab interno latere, juxta partem posteriorem. Caput tendo<sup>c</sup> longus est, ab initio crassius & prope teres, inde primum gracilior, mox latescens magis magisque, & se extenuans, inprimis ab illa parte, qua femur alterum respicit, à qua ex eo venter obliquo longoque ductu nascitur<sup>d</sup>; qui ut procedit, ita primum ventriosior, medius rursus detumescit, & similiter à parte alterius femoris, obliquo pariter & longo ductu, tendineam caudam<sup>e</sup> producit: ea autem jam ante medium ventris extrinsecus tenui orlu incipit, ac sensim insignior, denique tendo fit, brevior quam quem diximus caput, crassus, planus,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvi. D. & Tab. xxx. W. Vesal. Épir. Fig. musc. II. v. fin. & de H. C. F. Lib. II. Tab. II. Y. Casler. Tab. ap. Spiegel. Lib. IV. Tab. 33. K. Bidloo Tab. LXXVIII. CC. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LX. 164.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvi. D-γ.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxvi. D-α. Bidloo Tab. LXXVIII. CC. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LX. 164. F.

<sup>d</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LX. 164.

<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxxvi. D-γ. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LX. 164. H.

f Vesal.

planus , latitudinis modicae , extremo se dilatans. Capiti ejus , superiorique ventris parti , Semitendinosus , qua adjacet , sinum <sup>f</sup> inprimit. Actio hujus musculi respondet illi Semitendinosi , quem comitatur usque ad condylum internum , pone quem cauda sua descendit rectius <sup>g</sup> , dein curvat se in priora. Qua vero haec cauda pone condylum incedit , aponeurosem à parte poplitis emittit , in fibras distinctam , valentemque ; quae in poplite per exteriora capsae articuli genu excurrit condylum externum versus , sensim latior , fibrasque dispergens , donec partim se inserat femori , statim supra condylum externum , alias ipsi condylo ; partim in capsam genu juxta eundem condylum paulatim evanescat : haec tendinem illum retinet ; capsam , cum agit musculus , retrahit ; robur capsae addit. Qua eadem cauda curvare se incipit , id est , non longe ab extremo , tum à parte posteriore , qua respicit fibulam ; tum à priore , portionem insignem emittit , utramque descendentem , & latescentem ; quarum illam , qua retinetur , ne in priora cedat , inserit eminentiae obliquae & inaequali , quae infra posteriorem partem radices capitis superioris tibiae , qua id sustinet condylum internum femoris : hanc ( quae tenuior , latefcitque insignius ) margini interno tibiae , ab ea parte , cui ipsa se cauda affigit , per notabilem longitudinem deorsum. Qua denique eadem illa cauda pone caput superius tibiae incedit ,

f Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. g Eustach. Tab. xxxvi. D-7.

II. 5.

a Eu-

incedit, ibi inter eam & capsam genu bursa parva.

Est *Quintus tibiae moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 53. *Quartus tibiae musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 29. *Semimembranosus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 42. *Flectentium tibiae quartus, semimembraneus*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 23. *Semimembranosus*, Stenon. Elem. myol. spec. p. 52. Cowper Myot. Cap. 33. Dougl. Myogr. Cap. 41. *Le Demi-membraneux*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 561. & seq. & 1111.

## CAPUT CXCI.

*De Tenfore vaginae femoris<sup>a</sup>.*

**V**agina tendinea femoris, qua parte crassissima est, hoc est, ab externo femoris latere, musculum quandam, quo tendatur, accepit, ut ex eo arctius compressi musculi, quos vagina continet, plus habeant roboris, & in contractione constantiae. Is ab exteriori parte extremi prioris cristae ilium<sup>b</sup> descendit, descendendo tendens modice retrorsum. Et ex principio tendineo, angusto, tenui, fit carneus, modice sensimque ad finem usque latior, & primo crassior, non diu post tenuior tenuiorque, ad postremum tenuitate tendinea se cum interiore parte vagi-

Y y y nae

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxviii. R. & Tab. xxx. M. Vesal. Epit. Fig. muscl. 1. u-a. dext. & Fig. 11. n. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 3. xy. & Tab. 2. r. Casser. Tab. ap. Spigel.

Lib. IV. Tab. 34. MM. & QR. Biddloo Tab. Lxxvi. A. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LV. Fig. 2. 159. & Tab. LVII. 159. <sup>b</sup> Eustach. Tab. xxviii. R.

c Eu-



nae femoris, longe ante mediam femoris longitudinem, commiscens <sup>c</sup>. Cum vero vagina illa affixa sit superiori cruris parti, ab externo latere, ejus interventu musculus hic quasi ad ipsum crus pertinet, eoque & coxam in latus simulque in priora deprimeret, femur attollere potest. Vertit quoque femur introrsum, eo versus dirigens partem ejus priorem: coxam extrorsum.

Est pars carnea *Sexti tibiae moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 53. Eadem *Sexti tibiae musculi*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 29. *Membranosus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 42. *Extendentium tibiae primi*, *Membranosus*, *musculi lati tendinis*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 23. *Membranosus*, Cowp. Myot. Cap. 33. Dougl. Myogr. Cap. 41. *Le Muscle aponeurotique, ou muscle du fascia lata*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 522. & seq. & *Le Muscle de la bande large, ou du fascia lata*, ibid. §. 1090. & seq.

## C A P U T CXCIV.

*De Recto cruris<sup>a</sup>.*

**P**raecipuum Recti hujus principium <sup>b</sup> incipit <sup>c</sup> ab interiore parte tuberculi, quod in ora prioris ossis

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxx. N. Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 2. r. & Tab. 3. y. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 34. R. Bidloo Tab. LXXVI. A. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LVII. 159.

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxv. D. Vesal. Epit. Fig. musc. 1. w. sin. & de H. C. F.

Lib. II. Tab. 4. q. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 35. AA. & D. EE. F. Bidloo Tab. LXXV. G. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. LXI. 166.

<sup>b</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXI. 166. B.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxv. D-8.

d Eu-

ossis ilium : estque tendo <sup>d</sup> crassus & planior , ab initio tamen forma teres , quoniam lunato ductu adhaeret radici dicti tuberculi , quae illa parte gibba est ; dein paullatim latior. Ad hoc , posteaquam non multum processit , accedit alterum <sup>e</sup> , quod pariter tendineum , sed latius & tenuius , oriturque à superiore & eadem posteriore parte marginis acetabuli , & à vicina parte capsae articulum coxae continentis : unde sensim angustius , crassiusque , se supra acetabulum in priora curvat , modice simul descendens , donec cum altero se jungat. Ab his venter paullatim habitior , habitissimus circa medium longitudinis suae , inde gracilescens ; minusque crassus quam latus. Ab hoc tendo <sup>f</sup> tenuis , nec ita valde longus , sed satis latus , & paullatim latior , & tenuior ; quo ad superiorem & eandem priorem patellae partem definit , ad quam se totus musculus recte demittit. Venter ejus extrinsecus ab initio aliquandiu tendinosus <sup>g</sup> , longe magis tendinosus ex interiore parte , ubi tendo extremus jam cito , aliorum ad similitudinem , nasci incipit <sup>h</sup> , sensimque augetur. Idem à priore parte fibras , quae in superficie sunt , per longitudinem suam à latitudine media in utrumque latus oblique deorsum vergentes habet <sup>i</sup> : superiores à tendinosa par-

Y y 2 te

d Eustach. Tab. xxxv. D-a. Casser.  
Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 35.  
B.

e Cowper Myot. ann. 1724. Tab.  
LXI. 166. A.

f Eustach. Tab. xxxv. D-y.

g Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv.

Tab. 35. BA.

h Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv.  
Tab. 35. EE.

i Eustach. Tab. xxxv. D. Casser.  
Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab.  
35. AA.

k Casser.

te. sua <sup>k</sup>; sequentes quasi à se mutuo <sup>k</sup>. Tendo se cum Vastis solet conjungere : ubi autem patellae insertus, tanquam aponeurosem quandam dimittit, qua per priora patellae excurrit, eam integens ; posteaque se adjungit priori parti ligamenti, quo patella tibiae alligata. Patellam sursum trahit, itaque genu, si flexum sit, extendit, quia patellam tibia, ob ligamentum ad eam à patella pertinens, sequitur. Firmato crure, femur super tibiam erigit. Coxæ quoque articulum in priorem partem flectit, atque adeo femur eam in partem attollit, aut contra deprimit fundamentum illud trunci nostri corporis, quod subjectum lumbis, in summis femoribus innititur.

Est *Nonus tibiam moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 53. *Nonus tibiae musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 29. *Rectus Gracilis*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 42. *Extendentium tibiam secundus*, *Rectus*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 23. *Rectus femoris*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 33. *Rectus*, Dougl. Myogr. Cap. 41. *Le Droit ou Grêle antérieur*, Winsl. Hist. de l'Acad. Roy. des Scienc. ann. 1720. p. 93. *Rectus femoris*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 33. *Le Droit antérieur, ou Gresse antérieur*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 529. & seq. & 1098. & seq.

C A-

<sup>k</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 35. AA.

<sup>a</sup> Eu-

## CAPUT CXCV.

*De Sartorio a.*

**N**otabilis Sartorio longitudo : se enim ab extremo priore cristae ilium <sup>b</sup>, proximaque parte orae prioris, ad internam partem principii cruris demittit, caput superius tibiae etiam praeteriens. Ad tantae longitudinis rationem perangustus est, & crassitudinis permodicae : qua incipit acutus, post sensim latior & crassior, sed ante medium longitudinis suae rursus sensim angustior, & cum ad genu appropinquat, exinde insignius gracilescens, seseque extenuans. Sic per femur primum oblique introrsum, tum rectius, modiceque retrorsum descendit ad internam genu partem, ubi primum ab ea parte, qua condylo femoris adjacet, tendo <sup>c</sup> fit ; qui planior, & paulatim latior & tenuior, pergit secundum posteriorem partem lateris condyli ejusdem <sup>d</sup>, post nonnihil in priora se flectit, ac tibiae interno lateri juxta inferiorem partem tuberis, cui adnexum ligamentum à patella procedens, inserit <sup>e</sup>, extremo satis lato. Genu curvat in posteriora; coxam oblique in priora simul & in latus, id est, vel in priora femur attollit, simulque extrorsum vertit, vel coxam deprimit in eandem

Y y 3                      partem,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxv. O. Vesal. Epit. Fig. musc. 1. t. dext. & de H. C. F. Lab. 11. Tab. 3. S. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 34. A. A. Bidloo Tab. lxxv. A. Cowper Myot ann. 1724. Tab. lxx.

160.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxv. O. a.<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxv. O. β. Cowper

Myot. ann. 1724. Tab. lxx. 160. G.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxv. O. β.<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxxv. O. γ.<sup>a</sup> Eu-

partem , vertit autem introrsum. Tibiam , flexo genu , vertit introrsus , sic ut prior pars pedis extremi ad alterum pedem convertatur. Ne verò tendo ejus à condylo in priora recedat , impedit aponeurosis lata & valens , quam , priusquam tibiam attingat , à posteriore parte sua exigit , paullatim latescentem , & in latus externum per posteriorem cruris partem se demittentem , abeuntemque in tendineam cruris vaginam.

Est *Primus tibiae moventium* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 53. *Primus tibiae masculus* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 29. *Longus* , sive *Sutorius* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 42. *Flectentium tibiae primus* , *Sartorius* , *fascialis* , *fascia* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 23. *Sartorius* , Cowper Myot. Cap. 33. Dougl. Myogr. Cap. 41. *Le Couturier* , Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 545. & seq. & 1101. & seq.

## C A P U T CXCVI.

*De Vasso externo <sup>a</sup>.*

**M**agni sunt Vasti, quibus una cum Crurali os femoris circumdatum est. Externus oritur à priore ; itemque ab externa parte radices trochanteris majores

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiii. 7. & Tab. xxxvi. F. Vesal. Epit. Fig. musc. iii. 4. dext. & Fig. iv. 2. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 5. A. & Tab. 4. 2. & Tab. 12. 4. Caller.

Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 35. GG. sin. Bidloo Tab. Lxxv. I. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. Lxi. 167.

majoris<sup>b</sup>, & secundum exteriorem spinae<sup>c</sup> totius, quae à trochantere majore fere usque ad condylum externum eminet; ab initio connexus cum extremo Glutei magni, & deinde ex parte quoque abscedens à sepi-mento tendineo, quo distinguitur à Bicipitis parte brevior. Ad patellam, ipsumque crus descendit; ad quae ut appropinquat magis, angustat se à tota principii sui latitudine; caeterum à summo initio ex angustiore latior, post angustior. Descendit oblique in priora, fere dimidium femoris ab externo latere complexus; latoque tandem, eodemque crasso, & brevi tendine<sup>d</sup> se praecipue affigit margini patellae, à parte externa, eique finitima superiore; tum & priori parti capitis superioris tibiae<sup>d</sup>, inter fibulae caput & ligamentum patellae; huic etiam ipsi ligamento ab ea parte per longitudinem adhaerens: praetereaque posteriore parte sua se vaginae femoris continuat. Crassissimus fere in medio suae longitudinis est: ad quam partem usque ex tenui principio sensim crassior fit, ab ea tenuior. Extrinsecus pars ejus posterior à principio, maxime à trochantere, & ab ea parte spinae, quae finitima ei est, fere ad finem usque tendinosa est, sed minus & minus. Intrinsecus pars prior ante mediam longitudinem suam tendinem inchoat<sup>e</sup>, cui se deinde reliqua caro, è posteriore parte veniens, adjungit. Qua incumbit Crurali, cum eo conjungere se solet, praeterquam parte sua prio-

b Eustach. Tab. xxxiii. F-z. & Tab. xxxvi F-a. sup.

c Eustach. Tab. xxxvi F-aa.

d Eustach. Tab. xxxiii. F.

e Casler. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 36. M.

a Eu-

priore. Tendinem cum posteriore parte tendinis Recti connectit primo pertinaciter, post conjungit in unum: conjungit & cum illo Vasti interni, pone Rectum. Extendit genu, movens vel crus, vel femur, vel utrumque. Crus, curvato genu, una cum Tensore vaginae femoris, quodammodo convertit extrorsus, priorem partem pedis extremi vertens in latus externum.

Est *Septimus tibiae moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 53. *Septimus tibiae musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 29. *Vastus externus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 42. *Extendentium tibiae tertius*, *Vastus externus*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 23. *Vastus externus*, Cowper Myot. Cap. 33. Dougl. Myogr. Cap. 41. *Le Vaste externe*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 534. & seq. & 1093. & seq.

## C A P U T CXC VII.

*De Vasto interno<sup>a</sup>.*

Ut ille ab exteriori parte femoris oritur, ita hic ab interiori<sup>b</sup>, hoc est, ab obliqua eminentia, quae infra trochanterem minorem porrecta, ab ima radice colli femoris ad longam illam posteriorem femoris

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiii. E. & Tab. xxxvi EE Vesal. Epit. Fig. musc. iii. a-f. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 5. E & Tab. 13. J. inter. Casier. Tab. ap. Spigel. Lib.

iv. Tab. 35. LL. Bidl. Tab. lxxv. H. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. lxi. 168.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvi. E-aa.

<sup>c</sup> Eu-

moris spinam pertinet ; & deinde secundum hujus longitudinem totam , à parte ejus interiore. Descendit ut externus , eodem modo se angustans ; sed totus per transversum multo angustior , & aliquantum brevior ; à summo initio diu latior , in fine tantum angustior. Lato quoque tendine <sup>c</sup> se praecipue affigit margini patellae , sed à parte interna ; commiscetque cum posteriore parte tendinis Recti : affigit & capiti superiori tibiae <sup>d</sup> , juxta ligamentum patellae , sed similiter à parte interna ; & cohaeret ibi quoque cum dicto ligamento : verum cum illius tendo vaginae femoris continuatus sit , hic tantummodo aponeurosem retrorsum mittit ad cruris vaginam. Eadem aliquin crassitudinis ratio : ventris autem tenuioris est. Pars quoque posterior ejus extrinsecus à tota principii sui latitudine diu tendinosa. Tendo quoque ex interiore parte , verum non tam cito , incipit , minusque insignis est , eique caro usque ad genu adjuncta. Est denique & genu extensor. Carne autem sua à superiore parte cum Crurali commistus <sup>e</sup> : & ubi ille extrinsecus tendinosus fit , inde diu tenuem tendineae illi parti carnem à priore parte per longitudinem adjungit <sup>e</sup>.

Est pars *Ostavi tibiam moventium* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 53. Pars *Ostavi tibiae musculi* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 29. *Vastus internus* , Ri-  
Z z z
olan.

c Eustach. Tab. xxxiii. Σ.  
d Eustach. Tab. xxxiii. Σ-a.

e Casser. Tab. ap. Spiegel. Lib. iv.  
Tab. 35. MLKKK.  
a Eu-



olan. Anthr. Lib. V. Cap. 42. Pars *Extendentium* tibiam *quarti*, *Vastus interni*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 23. *Vastus internus*, Cowper Myot. Cap. 33. Dougl. Myogr. Cap. 41. *Le Vaste interne*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 538. & seq. & 1093. & seq.

## C A P U T CXCVIII.

*De Crurali<sup>a</sup>.*

**C**ruralis priorem exterioremque ossis femoris partem quasi continet, ibi à superiore plusquam dimidia parte longitudinis ejus oriens<sup>b</sup>, oriri que mox sub summo initio Vastorum incipiens, descendensque ad patellam, cui se statim post communem Vastorum Rectique finem inferit. Cum Vastis, ut diximus in capitibus proxime superioribus, plerumque connexus est, cum interno per totam saepe longitudinem à priore parte, ut ab eo separabilis ibi non sit. A primo initio angustus & tenuis, fit deinde primo sensim latior, circa medium angustior; itemque crassior primo, post tenuior. Caro ejus extrinsecus, plerumque jam ante medium longitudinis, magis magisque tendinosa fit<sup>c</sup>, postremo tota in tendinem vertitur.

Tend.

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiii. f. & Tab. xxxvi. x. Vesal. Epit. Fig. musc. iii. a dext. & de H. C. F. Lib. ii. Tab. 5. II. & Tab. 13. *d. extern.* Casler. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 35. MKK. Bidloo Tab.

LXXVI. C. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXXI. 169.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxiii. f. & Tab. xxxvi. x. aa.

<sup>c</sup> Casler. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 35. KK.

<sup>a</sup> Eu-

Tendo non multum supra genu Vastorum se tendini communi adjungit, primoque pertinaciter cum eo connectit, post commiscet, à posteriore tamen parte distinctus, ad postremum latefcens, de caetero brevis, latitudinis modicae, non valde crassus. Post tendines autem Vastorum & Cruralis bursa tenuis, sed magna, repofita; priore parte sua accreta tendinibus illis, antequam se conjungant, & postquam conjungere, ad patellam usque; posteriore, capsae articuli genu, supra patellam. Cruralis extendit genu.

Est pars *Octavi tibiae moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 53. Pars *Octavi tibiae musculi*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 29. *Crureus*, Jac. Sylv. Ifagog. Lib. II. Cap. 7. Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 42. Pars *Extendentium tibiae quarti*, *Vassi interni*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 23. *Femoreus*, de Marchett. An. Cap. 19. *Crureus seu Femoreus*, Cowper Myot. Cap. 33. *Cruræus*, Dougl. Myogr. Cap. 41. *Le Crural*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 541. & seq. & 1093. & seq.

## CAPUT CXCI.

De Pectineo <sup>a</sup>.

**P**ectineus ab oblonga eminentia, quam superior pars ossis pubis per longitudinem suam usque ad

Zzz 2

tuber-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiii. A. Vesal. Epit. Fig. muscl. iii. v. dext. pars: & de H. C. F. Lib. II. Tab. 7. e. pars: & Tab. 8. z. pars. Caeser. Tab. ap.

Spigel. Lib. IV. Tab. 34. juxta externum latus Z. Bidloo Tab. LXXV. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LIV. 150.

b Cow-

tuberculum , quod in priore parte juxta synchondrosem habet , exigit , recte deducitur ad asperam ossis femoris lineam , à trochantere minore aliquantum deorsum ductam. Itaque deorsum & simul extrorsum , itemque aliquantum retrorsum incedit , se ex modica latitudine modice angustans. Nec admodum crassus est : qua pubis ossi affixus , valde tenuis , & fere tendineus ; mox autem insigniter crassior fit , sed cito se rursus , ac deinde lente sensimque extenuat , definitque in extremum tendineum <sup>b</sup> , quod tenue , breveque , & à priore parte carnis primum incipit , seseque ad postremum plerumque conjungit cum Adductore brevi. Femur alterum ad alterum adducit , simulque in priora attollit , & convertit quoque , sic ut priorem ejus partem vertat in exteriora : trunci nostri fundamentum , quo is femoribus innitur , ad internam partem illius femoris , cujus est , eodemque tempore nonnihil in priora deorsum inclinat .

Est pars *Octavi femur moventium* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 56. *Septimus femoris musculus* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 28. aut ejus pars. *Pectineus* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 41. *Flectentium quartus* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 22. *Pectineus* , Cowper Myot. Cap. 32. *Pectinalis* , Dougl. Myogr. Cap. 39. *Le Pectiné* , Winl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 474. & seq. & 1079.

C A-

<sup>b</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LIV. 150. B.

## CAPUT CC.

*De Adductore longo femoris <sup>a</sup>.*

**A**dductor longus majore capitis sui parte à ligamento, quo pubis ossium synchondrosis ab exteriori parte constricta, oritur, statim juxta internam partem tuberculi, quod in pubis ossis priore eademque superiore parte; & ab ipso hoc tuberculo. Quare caput ei non valde latum est, crassum autem, & tendineum; ab eoque extrinsecus aliquantum tendinosus manet. Hinc dilatat se paulatim modiceque, & ad mediam sui plus minus longitudinem paulatim crassior fit, post tenuior, extremum habens tendineum, tenue; ante quod à priore, & plerumque etiam à posteriore parte aliquantum tendinosus. Descendit usque ad mediam fere longitudinem femoris, desinens ad asperam eminentiam, quae longitudinem illam à posteriore parte discernit: eoque recta procedit. Ex quo intelligitur, decursum ejus vix differre ab illo Pectinei: qua de causa femur eandem, atque ille, in partem adducit, attollit, convertit; fundamentum trunci inclinat. Ab inferiore parte extremi ejus aliquando procurrit portio tendinea tenuis, quae se adjungit tendini Adductoris magni, & cum eo pertinet ad condylum femoris. Idemque etiam extremum se aliquantum cum Vasto interno solet conjungere.

Z z z 3 Est

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiii. s. Vefal. Epit. Fig. muscul. iii. v. dext. pars: & de H.C.F. Lib. ii. Tab. 7. a. pars:

& Tab. 8. s. pars. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 34. Z. Bidloo Tab. lxxv.

<sup>a</sup> Eu-

Est pars *Ostavi femur moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 56. Fortasse pars *Septimi femoris musculi*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 28. Est *Pars prima quinti femur moventium*, Fallopp. Obs. in moventibus femur. *Primum caput Tricipitis*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 41. Pars *Flectentium tertii*, *Tricipitis*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 22. Pars *Tricipitis*, Cowper Myot. Cap. 32. *Adductor femoris primus*, Dougl. Myogr. Cap. 39. *Le premier muscle du Triceps*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 495. & seq. & 1080. & seq.

## C A P U T CCL.

De Gracili<sup>a</sup>.

**H**ic mox ab interno praecedentis latere, & infra eum, partim juxta synchondrosen pubis, à ligamento eam constringente; partim infra eam à margine ossis pubis<sup>b</sup> ortus, descendit multo longius: nam ad superiorem tibiae interni lateris partem usque pertingit. Totus tenuis est, & angustus; à principio & latior quam alibi, & valde tenuis, & tendineus<sup>c</sup>; non multo post carneus, carnemque ex interiore inprimis parte principii sui tendinei primum inchoans; sensim

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiv. K. & Tab. xxxv. L. Vesal. Epit. Fig. muscl. 1. β. dext. & τ. sin. & Fig. 11. α. sin. & de H. C. F. Lib. 11. Tab. 16. Δ. & Tab. 9. γ. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 34. FF. Bidloo

Tab. LXXV. D. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. LIX. 161.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxv. L-α.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxv. L-α. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LIX. 161. HH.

<sup>d</sup> Eu-

sensim angustior , primum crassior , post tenuior , & in ipso fine , cum ibi simul valde angustus sit , quasi teres. Per anteriorem femoris partem descendit , tendinemque<sup>d</sup> in posteriore parte sua inchoat , & de-  
 in augeat magis & magis , donec is non ita longe ab interna parte genu à carne recedat. A qua cum recessit , gracilis est , planiorque ; pergitque ad posteriorem partem lateris interni condyli interioris femoris , inde se modice in priora curvans , sensimque aliquantum dilatans , & extenuans , & ad postremum desinens<sup>e</sup> mox infra tendinem Sartorii , in fine aliquantum connexus cum fine Semitendinosi. Genu flectit in partem posteriorem , coxae articulum in internam , id est , & adducit femur alterum ad alterum , & fundamentum , quo truncus nostri corporis nititur , constans ex conjunctis inter se ossibus coxarum & sacro , inclinat ad internum latus femoris illius , secundum quod ipse porrectus. Flexo genu , crus convertit ut Sartorius. Quin etiam ad Sartorii exemplum tendo ejus juxta cruris principium aponeurosem in vaginam tendineam cruris abeuntem , sed exiliorem , emittit , qua similiter retinetur. Atque extremo hujus tendinis , itemque Sartorii & Semitendinosi , subjecta bursa magna , eis à parte una , ab altera ligamento laterali interno genu , quo tibiae latus internum , cui tendines illi adjacent , obductum , accre-

13;

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxv. L-3. Cowp. <sup>e</sup> Eustach. Tab. xxxv. L-7.  
 Myot. ann. 1724. Tab. LIX. 161. I.

ta ; quam nunc demum memoramus , ne idem saepius diceretur.

Est *Secundus tibiae moventium* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 53. *Secundus tibiae musculus* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 29. *Posticus gracilis* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 42. *Flectentium tibiae secundus* , *Gracilis* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 23. *Gracilis* , Cowper Myot. Cap. 33. Dougl. Myogr. Cap. 41. *Le Gresse interne , ou Droit interne* , Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 549. & seq. & 1107. & seq.

## C A P U T CCII.

*De Adductore brevi femoris <sup>a</sup>.*

**A**dductor brevis , quemadmodum longus , in pube natus , ad femur pertinet , verum magis ex transverso incedit. Quippe oritur infra eum , à priore parte ossis pubis <sup>b</sup> , juxta inferiorem partem synchondrosis ; parva portione etiam nascens è ligamento hanc commissuram continente : altiori autem , quam ille , femoris parti inseritur , hoc est , juxta trochanterem minorem , caeterum eidem asperae lineae. Est vero illi capite , extremoque , & crassitudinis modo persimilis ; figura quoque , nisi quod se ad principii sui rationem insignius dilatat , citiusque extenuet , capitique sit tenuioris. Praestat eadem. In fine se aliquantum cum Pectineo & Adductore magno commiscet ,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxviii. y. Casser.

T. ut videtur.

<sup>b</sup> Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 37.

b Eustach. Tab. xxxviii. y.-a.

c Eu-

miscet, & aliquando etiam cum Vasto interno. Saep<sup>e</sup> in duos<sup>c</sup> per longitudinem suam divisus est.

Est pars *Quinti femur moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 56. Pars *Octavi femoris musculi*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 28. *Secunda pars quinti femur moventium*, Fallopp. Obs. an. in moventibus femur. *Alterum caput Tricipitis*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 41. Pars *Flectentium tertii*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 22. Pars *Tricipitis*, Cowper Myot. Cap. 32. *Adductor femoris secundus*, Dougl. Myogr. Cap. 39. *Le second muscle du Triceps*, Winfl. Exp. an. Trait. des muscul. §. 497. & seq. & 1080. & seq.

## CAPUT CCIII.

*De Obturatore externo<sup>a</sup>.*

**O**bturator externus amplior primo, & principii per ambitum rotundi, paullatim & insigniter angustatur, per latera rectior: idemque in crassitudinem primum ex tenuiore modice crescit, dein se extenuat, & à principio tendinosus est, in fine tendo<sup>b</sup> satis longus, angustus, planus, citius è posteriore carnis parte, quam è priore nascens, & ante finem suum se capsae articuli coxae adnectens. Inserit<sup>c</sup> se autem posteriori parti lateris interni radice trochanteris

A a 2 a ris

<sup>c</sup> Eustach. Tab. XIX.

<sup>a</sup> Eustach. Tab. XXXVIII. x. Vesal. Epit. Fig. musculi III. f. fin. & Fig. IV. m. fin. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 8. y. & Tab. 13. a. Cowper

Myot. ann. 1724. Tab. LVIII. 157.

<sup>b</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LVIII. 157. P.

<sup>c</sup> Vesal. Epit. Fig. musculi IV. m. fin.

<sup>d</sup> Eu-



ris majoris, ad quam prope ex transverso, leviter ascendens, incedit, procedens à priore parte ossis pubis <sup>d</sup> & ischii <sup>e</sup>, à quibus, qua dimidiam, eamque priorem, partem ambitus foraminis magni ossis coxae faciunt, ab ortu Adductoris brevis ad ima foraminis usque, oritur, infra etiam ex parte oriens ab interiore margine ejusdem foraminis. Femur adducit ad alterum, simulque convertit extrorsum: fundamentum trunci corporis nostri inclinatur ad latus internum femoris illius, cui insertus.

Est *Nonus femur moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 56. *Nonus femoris musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 28. *Duodecimus*, Arant. Anat. obs. Cap. 43. *Externus obturator*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 41. *Circumagentium secundus, externus obturator*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 22. *Obturator externus*, Cowper Myot. Cap. 32. Dougl. Myogr. Cap. 39. *L'Obturateur externe*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 517. & seq. & 1089.

## C A P U T CCIY.

*De Adductore magno femoris <sup>a</sup>.*

**M**ox infra principium Adductoris brevis, ab exteriori parte marginis extremi ossis pubis <sup>b</sup>,  
à

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxviii. x-s. dext.

<sup>e</sup> Vesal. Epit. Fig. musc. iii. f. sin.

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxviii. ZA. dext. & Tab. xxxvi. w. Vesal. Epit. Fig. musc. iv. s-s. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 8. 9c. & Tab. 12. EΣΠ.

Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 37. XXXXY. & Tab. 32. AAA. & DDDEFG.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxviii. z-s. dext. & Tab. xxxvi. w-s.

<sup>c</sup> Eu-

à synchondrosi usque ad tuber ischii, & ab hujus etiam ipsius tuberis <sup>c</sup> exteriori margine, ad imum ejus usque, lato principio oritur musculus magnus, in latitudinem magis magisque se effundens, crassitudinis notabilis, ad femur recta pertinens, quod cum praecipue ad alterum adducat, Adductorem ejus, & ab insigni magnitudine magnum vocavimus. Saepè pars illa, quae ab osse pubis incipit, ab illa, quae ab ischii tubere, à priore parte quasi distincta est ad finem usque: facitque illa superiorem musculi partem, haec inferiorem. Extrema habet duo <sup>d</sup>, non longe à fine suo findens se. Superius definit <sup>e</sup> ad asperam lineam, quae in postica parte ossis femoris; tantaeque illud latitudinis est, ut totam dictae lineae teneat longitudinem: idemque in fine aliquid, praesertim à priore parte, tendinosum, ac frequenter cohaerens cum Bicipitis parte brevior; à superiore praeterea parte interdum aliquandiu ante finem incisum. Inferius minus est, formam habet quodammodo teretem, gracilique tendine <sup>f</sup>, in quem abit, se inserit <sup>g</sup> mediae superiori parti lateris interni condyli interni femoris. Crassior est, quae à tubere ischii, & à proxima parte pubis ossis oritur, quam quae à reliquo osse pubis: eundo fit primo sensim crassior, sed non diu, dein tenuior ad finem usque;

A a a a 2                      diutius

c Eustach. Tab. xxxvi. w-β.

d Eustach. Tab. xxxviii. z A. & Tab.

xxxvi. w-γ. inf. w-δ.

e Eustach. Tab. xxxvi. w-γγ.

f Eustach. Tab. xxxviii. A-α. & Tab.

xxxvi. w-ε.

g Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 13.

II. Casser. Tab. 20. Spigel. Lib. IV.

Tab. 37. Y.

a Eu-

diutius autem , insigniusque increfcit ea parte , qua extremum fuum inferius efficit ; tardiusque decrefcit : ipfum hoc extremum paullo latius eft quam craffius , procedens gracilefcit , & à priore parte fua tendinem producit , qui fimiliter gracilefcit , planiorque eft , & fe ad poftremum dilatat , & extenuat ; accipit praeterea portionem ab Adductore longo , & dum descendit , cohaeret cum Vasto interno. Praeterquam quod femur adducat , ut in principio hujus capitis diximus , attollit quoque , & convertit , fic ut partem ejus priorem vertat in externum latus ; truncique corporis noftri fundamentum , quod factum ex offibus coxarum & facro , in proxime fuperioribus capitibus faepe memoravimus , inclinat , fere ut Pectineus , imprimis illa parte fui , qua ab offe pubis oritur : reliqua enim rectius & adducit femur , & fundamentum modicè inclinat.

Est pars *Quinti femur moventium* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 56. Pars *Oftavi femoris musculi* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 28. *Tertia pars* , cum *quarta quinti moventium femur* , Fallopp. Obs. an. in moventibus femur. *Tertium caput Tricipitis* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 41. Pars *Flectentium tertii* , *Tricipitis* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 22. Pars *Tricipitis* , Cowper Myot. Cap. 32. *Adductor femoris tertius cum quarto* , Dougl. Myogr. Cap. 39. *Le troisieme muscle du Triceps* , Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 499. & seq. & 1080. & seq.

R E-

## REGIO XXVIII. CRUS.

## CAPUT CCV.

*De Gemello <sup>a</sup>.*

**G**emellum duae partes constituunt , poene gemellae , à principio diu discretæ , in fine , quo dicemus modo , conjunctæ. Veniunt ex ossis femoris lateribus , à quibus oriuntur <sup>b</sup> paullo supra quam à condylis : exterior <sup>c</sup> quidem ab eminentia oblonga , quæ in latere externo femoris , juxta partem posteriorem , mox supra sinum , è quo nascitur Popliteus : interior <sup>d</sup> à margine partis posterioris , juxta latus internum , & , ut dictum , mox supra condylum. A principio latitudinis modicæ , crassæ ab inferiore parte , tenuiores à superiore , & aut totæ , aut prope totæ tendineæ , insignius à parte inferiore , pertinaciterque accretæ caplæ genu continenti : interioris autem principium plerumque in duo divisum , quorum inferius crassus tendo est , superius tenue. Juxta se invicem hæ partes descendunt per posteriorem cruris partem , mox carneæ , sed extrinsecus ex adverso ejus partis , qua se mutuo respiciunt , à tendineo principio aliquandiu tendinosæ ; quibusdam fere ad finem us-

A a a a 3 que.

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiv. QR. & Tab. xxxi. ik. Vesal. Epit. Fig. musc. ii. ux. dext. & de H. C. F. Lib. ii. Tab. 12. ex. & Tab. 9. eç. & Tab. 2. aμ. & Tab. 13. ττ. Casler. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 28. Fig. 1. DEF GGH. & Fig. 2. OOP Q.

Bidloo Tab. lxxxiii. E. & Tab. lxxxv. DDE. & Tab. lxxxiv. E. E. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. lxii. 171. ABDD.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxiv. Q-a. R-z.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxiv. Q.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxiv. R.

<sup>e</sup> Casler.

que. Primumque fiunt paulatim latiores, aliquanto post medium latissimae sunt, post rursus, sed citius quam increverant, decrescunt: estque illa, quae cruri alteri propior, insignior, & deorsum porrecta longius <sup>c</sup>. Quia vero primum paulatim lateſcunt, sensim, qua se mutuo spectant, convergant, donec se contingant, & fibras etiam commisceant <sup>d</sup>, ad postremum tamen in duos distinctos, eosque ovatos, fines <sup>e</sup> excurrentes. Nec semper sua se carne, ubi se contingunt, commiscunt; sed in plerisque tantum communi tendine, in quem desinunt, cohaerent. Hic <sup>g</sup> ex utriusque partis superficie interiore cito incipiens nasci, eas facit esse tendinosas <sup>h</sup>: ubi ab earum extremis ovatis abscedit, latus est; abscedit autem circa mediam longitudinem cruris: deinde descendit, & quo descendit longius, angustior fit, totus tenuis: non multum vero progressus, id est, aliquantum infra medium cruris, se posteriori tendinosae superficiei Solei obliquo ductu adjungit <sup>i</sup>, citius ab exteriori parte pedis; accrescitque Soleo magis magisque, communemque cum eo tendinem <sup>k</sup> efficit. Soleum juvat, eadem quippe functio ejus, quam Solei historiae adnectemus, postquam locum, cui insertus tendo Solei, ad quem accedit suo tendine, tradiderimus: hoc tamen praeter Soleum praeceipui habet, quod

c Casſer. Tab. ap. Spigel. Lib. iv.

Tab. 38. Fig. 1. G. G.

f Casſer. Tab. ap. Spigel. Lib. iv.

Tab. 38. Fig. 1. F.

g Eustach. Tab. xxxiv. S. Casſer.

Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 38.

Fig. 1. H.

h Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

lxii. 171. D. D.

i Bidloo Tab. lxxxv. E.

k Eustach. Tab. xxxiv. T. & Tab.

xxx. 7.

a Eu-

quod etiam genu curvare possit in posteriora. Capiti ejus interiori subjacet bursa magna, accreta firmiter tendineae parti illius capitis, extremoque Semitendinosi, & capsulae genu juxta condylum anteriorem.

Est *Primus pedem moventium*, cum *Secundo*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 59. *Primus pedis extremi musculus* cum *Secundo*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 30. *Primus movens pedem cum Secundo*, Fallopp. Obs. in pedem moventibus. Sunt *Gemelli*, *Gastrocnemii*, *internus* & *externus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 43. Est *Extendentium pedem primus*, *Gastrocnemius externus*, *Gemellus externus*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 24. *Gastrocnemius*, de Marchet. An. Cap. 19. Stenon. Elem. myol. spec. p. 51. *Gastrocnemius externus*, it. *Gemellus*, Cowp. Myot. Cap. 34. Sunt *The two outermost heads Extensoris tarfi suralis, vel Extensoris magni*, Dougl. Myogr. Cap. 42. *Gastrocnemii*, Heist. Comp. an. ann. 1719. & 1727. in nota. *Les Jumeaux*, Winsl. Hist. de l'Acad. Roy. des Scienc. ann. 1720. p. 94. *Les grands Jumeaux, ou Gastrocnemiens*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 579. & seq. & 1126. & seq. & 1129.

## CAPUT CCVI.

## De Plantari 2.

**N**on est dubium, quin Plantarem dixerint, eo quod ad plantam, eo modo, quo ad volam Palma-

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiv. N. Vesal. Epit. Fig. musc. II. c. fin. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 13. f. & Tab. 2 r. Cass. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab.

38. Fig. 2. IKKK. Bidloo Tab. LXXXIV. G.G. & Tab. LXXXV. F.F. Cowp. Myot. a. 1724. Tab. LXII 172. b Cass.

Palmarem longum videmus , pertinere eum existima-  
verint. Sed ad plantam certe non pertingit , & ne  
quidem in foetu ; ne quis forte putet compressionem  
calceorum , aut quae à statu , incessuque fit , aliquid  
hic mutasse in adultiore : definit <sup>b</sup> enim ad internum  
latus calcanei , juxta finem tendinis achillis. Eo au-  
tem se demittit à radice condyli externi femoris , ab  
ea mox juxta internam partem ortus Gemelli nascens,  
ac pertinaciter adeo adhaerens capsae genu , ut ex ea  
etiam nasci videatur. Gracilis est , habetque ventrem  
brevem , verum tendinem perlongum. Ab initio te-  
nuis , angustus , tendinosus , abit dein in ventrem  
tumidulum , latiore quam crassiore ; qui cum pri-  
mum modice intumuit , dein detumescit , vertitque  
se in tendinem <sup>c</sup> , è posteriore carnis parte tendinosa  
tenuitate primum nascentem : is perangustus , tenuis ,  
planus , calcaneo insertus , extremo extenuato , ac di-  
latato magis magisque , & aliquando in duas , aut  
plures partes fisso. Actio Plantaris similis est actionis  
Gemelli.

Est *Tertius pedem moventium* , Vesal. de H. C. F.  
Lib. II. Cap. 59. *Tertius tibiae musculus* , Columb. de  
re an. Lib. V. Cap. 30. *Plantaris* , Riolan. Anthr.  
Lib. V. Cap. 43. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap.  
25. Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 34. *Extensor tar-  
si minor* , vulgo *Plantaris* , Dougl. Myogr. Cap. 42.  
Plan-

<sup>b</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 38. Fig. 2. K. infer.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxiv. N. a. Bidloo  
Tab. lxxxv. F. infer.

<sup>a</sup> Eu-

*Plantaris*; Morgagn. Adv. an. II. Anim. 19. Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 34. *Le Jambier gresle, dit vulgairement Plantaire*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 589. & seq. & 1131. & seq.

## CAPUT CCVII.

*De Solco<sup>a</sup>.*

**M**aximus surae musculus, eamque praecipue efficiens, Solcus. Cui origo tum à fibula, tum à tibia: à fibulae capitis superioris posteriore parte<sup>b</sup>, magnaue portione spinae, quae infra caput illud ab eadem posteriore parte eminet: à tibiae<sup>c</sup> eminentia, quae in ejus posteriore parte, non longe à capite superiore, obliqua jacet; & ubi illa desinit, continuo à margine posteriore spinae interioris tibiae, ultra mediam ossis hujus longitudinem. Geminum itaque principium habet, quorum utrumque latum, tendinosum ubi oritur, tenueque; quod à fibula oritur, ea parte, qua à capite ejus oritur, crassius: eaque cito se inter se conjungunt. A summo initio acutus est, inde sensim insigniter intumescit, seseque longe magis dilatat, sed jam ante medium detumescit, & angustat se, per ambitum laterum quasi ovatus. Tandem fit tendo<sup>d</sup> brevis, crassus, quodammodo teres;

B b b b à

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiv. O. Vefal. Epit. Fig. musc. II. v. fin. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 13. 7. & Tab. 14. 9. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 38. Fig. 2. MN. & Tab. xli. Fig. 1. PP. Bidl. Tab. LXXXIV.

F. & Tab. LXXXV. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXII. 173.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxiv. O. a.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxiv. O. 3.

<sup>d</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 38. Fig. 2. N.

<sup>e</sup> Casser.



à priorè tamen , & à posteriore parte planior , in progressu sensim gracilescens , in fine latefcens , seseque magis extenuans , maxime dum se inserit. Memorabilis est modus , quo hic tendo ex ventre nascitur. Primum venter à posteriore parte sua jam fere ab ipso initio tendinosus , & dein magis magisque , ab ea parte tendinem , ut in aliis multis hactenus commemoravimus , producit , cui accrescit <sup>e</sup> Gemelli tendo. Deinde intus in carne alia pars tendinea <sup>f</sup> insignis , adjuncta praecedenti. Eaque pariter fere in ipso summo initio musculi incipit , seseque circa mediam ejus latitudinem per longitudinem demittit , circa imum ejus mucronem desinens : lataque est , latitudine in latera directa , & ad carnis maxime comparata crassitudinem , ejusque ad similitudinem à summo angustiore , ut crassescit eadem , latiore ; utque dein extenuatur , angustiore. Itaque carnem bifariam septi tendinei modo distinguit , & qua posteriori tendinosae musculi parti continuata est , ibi per ejus etiam longitudinem extrinsecus nota quaedam , incisurae similis. Accipitque ab utraque parte carnem multam , ex utroque latere descendendo convergentem ; ejusque continua accessione sensim crassescit. Caro autem ad postremum ab utroque latere in mucronem desinit , ab externo latere citius , ab interno crassiore & insigniore excurrrens multo longius : neque enim tendinco septo

<sup>e</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 38. Fig. 2. NQ. Bidloo Tab. LXXXV. E.

<sup>f</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv.

Tab. xli. Fig. 1. P. infer. Bidl. Tab. LXXXIV. F. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXII. 173.

g Cow-

septo simile illud in media prorsus latitudine musculi est, sed aliquantum ultra mediam, à parte fibulae; angustiore idcirco, minusque insigni parte carnis illa, quae à parte fibulae, quam quae à tibiae. Jam & à principio hic musculus, tum qua à tibia, tum qua à fibula oritur, extrinsecus à priore parte tendinosus<sup>g</sup>; manetque inde in eadem parte ab utroque latere aliquandiu: & à tendinosis illis superficiebus, maxime à medio longitudinis musculi, caro tenuis se ad medium tendineum septum oblique demittit<sup>h</sup>. Pars quoque illa tendinosa, quae à fibula procedit, per summum musculi marginem, qui à fibula ad tibiam porrectus, excurrit, efficitque eum tendinosum. Caeterum Soleus recta descendit ad calcem, ubi tendo<sup>i</sup>, quem cum Gemello efficit, quemque achillis appellant, se affigit<sup>i</sup> posticae eidemque inferiori parti prominentis tuberis calcanei: praeterit enim superiorem, ad quam se applicat, quoties in priora pes extremus flectitur; eoque aequabilis effecta est, & inter eam tendinemque interjecta burfa notabilis, accreta utrique; eminetque intra eam glandulosi quid, implens intervallum, quod inter tendinem superioremque tuberis partem eo tempore intercedit, quo crus in pede extremo recte insistit; pressum autem, cum pes in priora flectitur, exsudansque humorem lubricum, unde liberior mobilitas. Functio autem Solei est, commissuram pedis extremi cum

Bb bb 2 crure

g Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXII. 173.

h Eustach. Tab. xxxiv. T. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 38.

Fig. 1. K. & Fig. 2. Q. infer. Bidloo Tab. LXXXIV. & LXXXV. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXII. L.

i Eustach. Tab. xxxiv. T.

a Eu-

crure recte flectere in partem posteriorem : itaque attollere calcem , plantamque in posteriora dirigere ; crus inclinare in posteriora.

Est *Quartus pedem moventium* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 59. *Quartus tibiae musculus* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 30. *Soleus* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 43. *Extendentium pedem secundus* , *Gastrocnemius internus* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 24. *Gastrocnemius internus* , Cowper Myot. Cap. 34. Sunt *The two innermost heads Extensoris tarfi suralis* , vel *Extensoris magni* , Dougl. Myogr. Cap. 42. *Le Soleaire* , Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 584. & seq. & 1126. & seq. & 1130.

## C A P U T CCVIII.

*De Popliteo<sup>a</sup>.*

**P**oplitei decursus obliquus , à condylo exteriori femoris ad illam partem amplitudinis posterioris tibiae , quae est inter radicem capitis ejus superioris , eminentiamque obliquam , unde Solei origo. Principium quodammodo geminum , cujus praecipua pars tendo<sup>b</sup> crassus , planior , brevis , veniens<sup>c</sup> è sinu , qui

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvi. y. Vesal. Epit. Fig. musc. iv. µ. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 14. f. Cassi. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 38. Fig. 2. G.H. & Tab. xli. Fig. 1. FG. Bidloo Tab. LXXXIV. C. Cowper

Myot. ann. 1724. Tab. LX. 165. <sup>b</sup> Ciffer. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 41. Fig. 1. F. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LX. 165. I. <sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxvi. y-a.

d Eu-

qui est in medio partis inferioris lateris externi condyli supradicti, mox supra marginem, quo is in tibia innititur: pars altera non tam longe venit, sed à medio partis posterioris genu cartilaginis semilunaris exterioris, aut circa illum locum è ligamento lato genu articuli; latior, tenuior, primo tendinea, mox carnea, & jam fere ab ipso initio alteri conjuncta. Ab hoc dilatat se insigniter ad finem usque, totaque ultimi extremi sui latitudine pertinet<sup>d</sup> ad internum marginem tibiae, qui nempe spectat alterum crus; diu sensim crassior, dein tenuior, & fere à medio longitudinis suae tendinosus. Ab ortu autem se tendine suo ad imum condyli inflectit; deinde ubi praeterit cartilaginem semilunarem anteriorem, in carnem abit: post se inflectit ad proximam posteriorem partem capitis superioris tibiae, dein per posteriora cruris procedens. Tendini pertinaciter accreta capsula articuli genu. Crus, flexo genu, sic convertit, ut priorem pedis extremi partem dirigat ad pedem alterum. Cartilaginem semilunarem anteriorem trahit retrorsum, deorsumque. Juvare quoque videtur inflexionem genu.

Est *Musculus in poplite occultatus*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 55. *Decimus tibiae musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 29. *Popliteus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 42. *Oblique movens tibiam, suppopliteus*,  
Bb bb 3 Spi.

d Eustach. Tab. xxxvi. γ-β. Vesal.  
de H. C. F. Lib. II. Tab. 15. C.

Bidloo Tab. LXXXIV. C.

Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 23. *Popliteus*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 33. *Popliteus*, Dougl. Myogr. Cap. 41. *Popliteus*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 33. *Le Poplité ; ou Jarretier*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 564. & seq. & 1119. & seq.

## C A P U T CCIX.

*De Flexore longo digitorum pedis* <sup>a</sup>.

**H**ic posteriori tibiae parti proxime adjacens, ab ea <sup>b</sup>, & à ligamenti, quod inter tibiam & fibulam intermedium, parte proxima, per longitudinem, perque longum tractum oritur, primum incipiens infra longitudinem prope mediam illius eminentiae, à qua Soleus oritur. Ubi primum incipit, acutus & tenuis; post paulatim latior & crassior, donec totam tibiae partis posterioris latitudinem teneat: inde simili fere modo decrescit, oblique per latitudinem illam ortu suo deflectens ad marginem tibiae, qui spectat fibulam; ac deinde etiam à margine illo oriri pergens. Quin & per latera, dum oritur, ex tenui initio medium versus magis magisque intumescit, & ab ortu ea parte, qua spectat fibulam, tendinosus est. Extrinsecus fibrae ejus ab utroque latere descendentes convergunt leviter,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvi. L. Vefal. E. pit. Fig. musc. iv. w. dext. & Fig. iii. a. dext. & de H. C. F. Lib. ii. Tab. 14. E. & Tab. 16. c. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 41.

Fig. 1. HIK. Bidloo Tab. LXXXIV. 1. & Tab. LXXXV. H. Cowp Myot. ann. 1724. Tab. LXIII. 186.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvi. L-aa.

c Casser.

ter, abeuntque in medium tendinem, qui intus jam fere in summo mucrone musculi incipit. Ita tendo paulatim crescit, primum per exteriora carnis <sup>c</sup>, dein per illum ejus marginem <sup>d</sup>, qui respicit pedem alterum, oblique in latus, quod ad pedem alterum vergit, deflectens, eodemque etiam modo pergens postquam carnem non amplius accipit, aliquanto autem post pertingens ad ima tibiae: dein eadem prope obliquitate pergit pone <sup>e</sup> tibiam extremam, juxta malleolum internum; post sub ea, quae tali caput sustinet, calcanei eminentia, ea re laevi & sinuata; ad quam tibiae calcaneique partem ligamento <sup>f</sup>, quo, ubi secundum eas incedit, obductus, retinetur; ex eoque cum exiit, flectit se in priora ad plantam <sup>g</sup>, per quam oblique in priora extrorsum ad ejus medium decurrit <sup>h</sup>, donec circa ejus longitudinis medium pervenerit. Totus gracilis est, à ventre usque ad calcanei eminentiam ovatus, qua sub eminentia illa incedit, paullo crassior, latior, durior, ab attritu; post rursus gracilior. Circa medium plantae modice latefcit <sup>i</sup>, ac mox se in quatuor tendines dividit <sup>j</sup>, qui tanquam radii divergunt, & ad digitos quatuor minores prorepunt <sup>k</sup>, ac porro, prorsus ut de

c Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 41. Fig. 1. l. Bidloo Tab. LXXXIV. I.

d Eustach. Tab. xxxvi. L-β. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 41. Fig. 1. IK. Bidloo Tab. LXXXIV. I.

e Eustach. Tab. xxxvi. L-β.

f Eustach. Tab. xxx. g. Vesal. de H. C. F. I. lib. ii. Tab. 2. f.

g Eustach. Tab. xxxvi. L. ultra γ.

h Vesal. Epit. Fig. musc. iv. e. in pede humi prostrato; & de H. C. F. Lib. ii. Tab. 14. et f. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 42. Fig. 2. B. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXV. Fig. 2. 186.

i Vesal. de H. C. F. Lib. ii. Tab. 14. f. Bidloo Tab. LXXXV. H.

k Bidloo

de Profundo manus dictum, secundum interiorem partem ossium eorum primorum <sup>k</sup> sub ligamento orbiculato simili, ibidemque per fissuram <sup>k</sup> tendinis Flexoris brevis; post secundum ossa secunda <sup>k</sup>, similiter sub ligamento retinente; tandemque ossi tertio pari se modo inferunt <sup>l</sup>: ipsi graciles, prope teretes, & sibi ipsis pares, donec ad capita priora ossium metatarsi venerint; sub his cum incedunt, primo latiores, planiores, crassiores, & duriores; post rursus tenuiores, & angustiores, mollioresque; in capsula prima graciliores; post ubi ex ea exeunt, inde latiores & tenuiores; sed, ubi secundum articulum ossis primi ordinis cum secundo incedunt, crassiores, latiores, duriores; inde rursus angustiores, & molliores; rursusque graciliores in capsula secunda; rursusque, ubi ad articulum ossis secundi ordinis cum tertio appropinquant, latiores; ab eo angustiores, sed mox rursus dilatati, in fine extenuati; & antequam per tendines Flexoris brevis transeant, indeque ad finem usque, quasi incisi, tanquam si è duobus inter se cohaerentibus constarent. Caeterum ad similitudinem tendinum Profundi manus, & dimittunt chordam, aut membranam tendinosam, adjungentem se tendinosae membranae, quae implet angulum caudarum tendinum Flexoris brevis: & accipiunt tum chordulam à membrana tendinosa, qua Flexoris brevis caudae adnexae ossi primi ordinis, aut portionem ipsius membranae;

<sup>k</sup> Bidloo Tab. LXXXV. H. Cowper  
Myot. ann. 1724. Tab. LXV. Fig. 2.

<sup>l</sup> Bidloo Tab. LXXXVI. Fig. 2.

<sup>m</sup> Bidloo

branae ; tum membranam tendinosam ab osse ordinis secundi. Aliquando inde ubi per fissuram tendinum Flexoris brevis transeunt , prorsus cum illis conjuncti sunt <sup>m</sup> ; quod maxime observatum in eo , qui ad digitum minimum pertinet , potissimumque ubi tertii secundique ordinis ossa cohaerebant inter se , & continuata erant. Nunc cum hunc musculum , ut à tibia ad ultima digitorum decurrit , secuti sumus , opportunum erit , de alio ejus capite <sup>n</sup> , quod prae Profundo manus , cui respondet , praecipuum habet , dicere. Situm est in planta , magnitudinis conspicuae , à margine inferiore , & à latere interno toto tuberis calcanei , quod calcem facit , procedens in priora per mediam plantae latitudinem , donec praetergredienti tendini supradicto in plantae fere medio occurrat ; primo paullatim latius , post angustius ; primo subtendineum & tenue , dein totum carneum & diu sensim crassius , post tenuius , suoque fine confluens <sup>a</sup> cum superiore parte , & aliquantum etiam cum externo latere tendinis , paullo antequam is se dividat , itemque ubi dividit , ipsique principio ramorum in quos dividit , aut omnium , aut eorum aliquot. Aliquando paullo post quam se cum tendine conjunxerat , exhibat in quatuor portiones tendineas , primam ad ramum tendinis , qui ad digitum primum parvorum vadit , accedentem : secundam , eamque graciliorem , ad eum ,

C c c c                      qui

<sup>m</sup> Bidloo Tab. LXXXVI. Fig. 1.

<sup>n</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 14.

A. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV.

Tab. 42. Fig. 3. DDD. & Tab.

42. Fig. 1. M. Bidloo Tab. LXXXVI.

Fig. 1. A. Cowp. Myot. ann. 1724.

Tab. LXV. Fig. 2. 187. & Tab.

LXIII. H. & Tab. LXVI. Fig. 1. r.

<sup>a</sup> Eu-



qui ad digitum secundum : duas reliquas valde breves, earumque unam ad ramum digiti tertii; alteram, & eam exilissimam, ad illum quarti. In alio quodam producebat tendinem insignem, qui per eam ejus partem, quae spectat latus internum pedis, decurrens, primo adjungebat portionem insignem tendini, qui à tendine Flexoris longi pollicis accedit ad Flexorem longum digitorum; & cum eo conjunctus accedebat ad tendinem digiti primi minorum: dein non longe ab eo loco, ubi se adjungit Flexori longo, abibat in tendines duos insignes, breves tamen; quorum alter accedebat ad tendinem digiti secundi, alter ad tertii: post dabat exilem portionem Lumbricali quarto: atque ita finiebat. Aliis atque aliis hic natura modis ludit. Superest, ut adscribatur functio Flexoris hujus, Tertii ordinis ossa digitorum minorum flectit in terram: in eandem partem & illa secundi, primique: itaque digitos totos curvat. Si autem non obstarent alii muscoli, partes illas, quas dicemus, eodem tempore firmantes, posset etiam articulum cruris cum talo flectere, in posteriora autem: illosque pedis extremi cum talo, retrorsum simul & modice introrsum, plantam conversurus in interiora simulque in posteriora: dimovere quoque connexum ossis navicularis cum cubiformi, & cubiformis cum calcaneo commissuram.

Est *Secundus pedis digitos moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 60. *Sextus tibiae musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 30. *Longus Digitorum flexor*, *se*

*ve Perodactyleus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 44. *Digitum tertii internodii flexor*, *perforans*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 26. *Perforans*, Cowper Myot. Cap. 36. *Perforans seu Flexor profundus*, Dougl. Myogr. Cap. 43. *Le long Flechisseur commun des orteils*, ou *le Perforant du pied*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscul. §. 629. & seq. una cum eo, qui *P'Acceffoire du long Flechisseur des orteils*, ibid. §. 633. & seq. *Le Perforant*, ibid. §. 1143. una cum eo, qui *P'Acceffoire du Perforant*, ibid. §. 1144.

## CAPUT CCX.

*De Flexore longo pollicis pedis<sup>a</sup>.*

**N**on secus, atque ut praecedentem à tibia scripsimus, hic à fibula oritur<sup>b</sup>, nempe à planitie ejus posteriore, circa tertiam partem longitudinis ejus incipiens, indeque à duabus sequentibus fere ad malleolum usque, pergens. A principio utrimque aliquandiu tendinosus est, omnesque fibrae ejus se demittunt nonnihil oblique tibiam versus, facientes musculum summa parte sui tenuem, inde sensim crassiores, post rursus detumescens: sic & ex acuto paulatim latiore, post medium longitudinis rursus paullo angustiore, deinde ejusdem prope latitudinis,

Cccc 2 nis,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvi. K. Vcsl. Epit. Fig. muscul. iv. s. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 14. A. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 41. Fig. 1. MN. & Fig. 2. 11K. Bid-

loo Tab. Lxxxiv. KK. & Tab. Lxxxv. K. Cowp Myot. ann. 1714. Tab. LXIII. 179.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvi. K-ss.

<sup>c</sup> Eu-

nis, in fine sensim insigniterque angustatum. Ex eoque, qua parte ad posteriora versus, ibique juxta eum marginem, quo spectat crus alterum, tendo<sup>c</sup> satis cito nascitur; qui eodem modo, quo ille Flexoris digitorum longi, descendit; eodemque maxime modo per carnem decurrit, paullatim emergens, incrementaque capiens. Circa cruris imum carnem plane deferit, ac porro eadem, qua coeperat, obliquitate descendit<sup>d</sup>, primo pone tibiam extremam, dein per sinum laevem, qui ejus caussa in parte posteriore tali est; dein per calcanei internum latus, ob id etiam sinuatum, & laeve, infra illum ejus sinum, qui sub sustentaculo tali, tendini Flexoris longi digitorum paratus est: totoque hoc decursu in loco suo retinetur ligamento<sup>e</sup>, quod à marginibus tali sinus supradicti, & à calcaneo procedens, cum iis canalem efficit, per quem delabitur tendo ille, cuique membranis obsequiosis laxè adnexus, ipse aliquanto latior, crassiorque, & durior, qua se parte flectit ad talum, & qua ad calcaneum. Post pergit<sup>f</sup> ad plantam, per eamque recta incedit<sup>g</sup> ad pollicem, & per hujus porro inferiorem partem<sup>h</sup> ad os ejus secundum, cui se denique inserit<sup>i</sup>, & asperae quidem eminentiae, quam

c Eustach. Tab. xxxvi. K-β. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 41. Fig. 2. II. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXIII. 179. F.

d Eustach. Tab. xxxvi. K-β.

e Eustach. Tab. xxx. g. Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 2. c.

f Eustach. Tab. xxxvi. K-β.

g Vesal. Epit. Fig. musc. iv. g & de H. C. F. Lib. II. Tab. 14. j. Cass. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 42. Fig. 3. C. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXV. Fig. 2. 4. 4.

h Bidloo Tab. LXXXV. K.

i Cow-

quam ab inferiore parte juxta caput primum habet. Ad pollicis radicem usque gracilis est, & ovatus: inde inter ossa sesamoidea articuli pollicis cum metatarsi osse procedit <sup>i</sup>, ubi crassior, & latior, duriorque: post planior est, & qua decurrit secundum os primum pollicis, vagina tendinea, ex osse illo nata, ut Flexor longus pollicis manus, continetur: per plantam jam cito quasi bifidus, nota insigniore insignioreque; inde ubi ad caput primum ossis primi pollicis accedit, latescens magis magisque, sed modice, magis in fine <sup>h</sup>; ipsoque extremo veluti in fibras distinctus, & tenuior: antequam caput prius ossis primi pollicis praetereat, membranacea quadam productione mox pone caput illud latitudini ossis mediae adnexus. Ubi primum ad plantam pervenit, aut paullo post, portionem <sup>k</sup> gracilem emittit, quae aliquantum progressa coit cum tendine Flexoris longi digitorum <sup>l</sup>, priusquam is se findat: aliquando partim cum capite ejusdem musculi, quod in planta accipit; partim cum illo <sup>m</sup> tendine ejus, qui ad digitorum minorum primum tendit, ut etiam portionem det origini Lumbricalis primi. Alias eadem illa portio se tota conjungebat cum insigni tendine, quem dictum caput ad Flexorem digitorum longum in-

C c c c 3.      planta

i Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

LXV. Fig. 2. 4. juxta E.

k Vesal. Epit. Fig. musc. IV. a. fin. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 15. Q. Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

LXIII. c. & Tab. LXVI. Fig. 1. F.

l Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

LXIII. c. & Tab. LXVI. Fig. 1. F.

m Vesal. Epit. Fig. musc. IV. a. fin. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 15. Q.

planta accedens, producebat : ex qua conjunctione natus tendo adjungebat se tendini digiti primi. Inventus aliquando tendo Flexoris digitorum longi, dans ramum gracilem, paullo antequam caput suum alterum accipiat, in priora procedentem, & se cum tendine Flexoris pollicis longi, postquam hic portionem illi impertiit, conjungentem. Pollicem totum curvat deorsum, flectens tum articulum, qui ex ossibus ejus fit; tum qui ex osse ejus primo cum illo metatarfi. Articulum cruris cum talo flecteret ut Flexor digitorum longus, ni impedirent muscoli alii. Sic & articulos pedis extremi cum talo, sed paullo magis retrorsum, minus in partem internam; eoque plantam rectius in posteriora dirigeret. Quin & connexum ossis navicularis cum cubiformi, hujusque commissuram cum talo dimoveret. Juvat praeterea eundem digitorum Flexorem, ab eo vicissim adjutus. Juvat & Lumbricalem primum, aut certe firmat principium ejus, cum dat ei portionem.

Est *Tertius pedis digitos moventium*, Vefal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 60. *Septimus tibiae musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 30. *Pollicis Flexor*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 45. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 26. *Flexor pollicis longus*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 35. *Flexor longus*, Dougl. Myogr. Cap. 44. *Flexor pollicis longus*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 35. *Le long Flechisseur du ponce*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 606. & seq. & 1138.

C A-

## CAPUT CCXI.

*De Tibiali postico <sup>a</sup>.*

**P**osteriori cruris ossum parti interjectus, ab utroque incipit, praecipue tamen à fibula <sup>b</sup>: ab hujus autem planitie illa tota, quae qua tibiae obversa, à superiore capite ejus per ejusdem plus quam duas tertias partes longitudinis se extendit: à tibiae planitie, mox à radice illius partis, cui fibula innixa, deorsum per eam partem, qua fibulam spectat, aliquantum porrecta: eaque principia modice à primo initio suo disjuncta, mox confluant. Quin & ex parte à ligamento incipit, quod inter cruris ossa, qua dehiscunt, medium. Descendit inde, extrinsecus ab utraque origine aliquandiu tendinosus, caetero carneus, totus in planum quasi compressus à posteriore parte, oblique autem, supra à Soleo, infra à Flexore longo pollicis; suaeque latitudine majorem partem respondens intervallo ossium cruris, id est, summa parte angustus, inde sensim latior, mox sensim angustior; ubi fibula se à tibia recurvat, inde rursus sensim latior; ubi vero oriri à fibula desinit, inde se angustans, angustoque ad postremum sine ad tendinem desinens. Tendinem <sup>c</sup> autem cito exorditur, fibraeque ejus ab utroque osse oblique descendunt,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvii. x. Vefal. Epit. Fig. musc. iv. r. fin. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 15. DE. & cd. Cassr. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 39. Fig. 1. EEF. & Tab. 41.

Fig. 2. L.L. Bidloo Tab. Lxxxiv. I. & Tab. Lxxxv. G. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. LXII. 176.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvii. x-22.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxvii. x-3.

d Cassr.

dunt , & ex contrariis partibus venientes convergunt , abeuntque in medium tendinem <sup>d</sup> , qui inter eas tenui radice , aut jam in utroque capite una , mox confluentibus , ortus , paullatim & latior evadit , & crassior : & non multum progressus , nullas amplius à tibia fibras accipit , inde tamen aliis atque aliis à fibula , dum descendit , continuo , diuque , usque non longe à malleolo , ad cujus posteriorem partem oblique descendit , nutritus ; ab ea autem parte , qua spectat exterius cruris latus <sup>d</sup> . Ut ad malleolum venit <sup>e</sup> , intrat canalem , qui partim fit è sinu quodam ipsius malleoli , partim è ligamento <sup>f</sup> lato , ex sinus marginibus , & infra eum ex imo malleolo , nato : per eum deinde , sibi uni proprium , delabitur , exitque ex eo , porro per latus internum extremi pedis plantam versus pergens <sup>g</sup> , modico in priora flexu ; ubi alio ligamento <sup>h</sup> retinetur , à vicinis ossibus deducto super eum . Extremo multiplici definit : namque crassiore praecipuaque parte <sup>i</sup> , eaque sensim latefcente , se inserit in inferiora maxime eminenti parti tuberis crassi & inaequabilis , quo os naviculare ab interno pedis latere eminet ; ulteriusque etiam tuberis , quod in ossis cuneiformis primi <sup>k</sup> parte inferiore , juxta posteriora , eo dimissa portione tenuiore .

Et

d Caffer. Tab. ap. Spigel. Lib. 1v. Tab. 41. Fig. 2. L.L.M. Bidloo Tab. LXXXIV. I. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. LXII. 176.

e Eustach. Tab. XXXVII. x-y.

f Eustach. Tab. xxx. g. Vesal. de H.

C. F. Lib. II. Tab. 2. c.

g Eustach. Tab. XXXIII. 22. 23.

h Eustach. Tab. XXXIII. 24.

i Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXII. 176. X.

k Eustach. Tab. XXXIII. 23.

l Qualcs

Et paullo ante hunc finem, portionem <sup>l</sup> à parte plantae emittit tenuiorem, distinctam in fibras, per sinum ossis navicularis, quem id subtus, juxta tuber, quod diximus, habet, prorepentem; quae se majorem quidem partem, & in plerisque, affigit parti imae deorsum protuberanti ossis cuneiformis tertii; sed post in multis in priora pergit, & aliquanto etiam ulterius, pertingens in aliquibus ad partem inferiorem illius lateris capitis ossis metatarsi tertii, quo spectat quartum; in aliis ad illius secundi, quo respicit tertium: eadem etiam frequenter partem gracilem, aliquando duas, inserit inferiori parti ossis cubiformis, frequenter & exilem imae parti cuneiformis medii: eadem denique & partem tendini tenuiori similem, aliquando quasi in minores distinctam, promit, in principium Flexoris pollicis brevis abeuntem. Haec portio ubi ab ipso tendine abscedit, ibi tendo se ad priorem partem ligamenti, quod à calcaneo ad naviculare per plantam deductum, sustinet tali caput, inflectit; & ad inferiorem quoque & eandem posteriorem partem tuberis navicularis; nodumque <sup>m</sup> ibi, mox antequam naviculari se inserat, habet, crassum, durum, per ambitum ovatum, caeterum planiorem, & qua os naviculare & ligamentum sustinens tali caput contingit, laeviolem. Quin & alias aliquando spargit portiones: vidi ab eodem nodo procedentem portionem gracilem, prope trans-

D d d d                      versam,

<sup>l</sup> Quales ap. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. LXII. 176. T. V.

<sup>m</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXII. 176. S.

<sup>a</sup> Eu-



versam , calcanei interno lateri , juxta partem priorem , qua sustinet cubiforme , insertam ; quae & ipsa dimittebat exiliorem , pertinentem ad proximam partem interni lateris cubiformis. Crassior quoque tendo est , & latior , & planior , duriorque , ea parte , qua malleolo adjacet ; de caetero ovatus , planior tamen. Hic Tibialis articulum cruris cum pede extremo , cum is flexus in priora , extendit , deinde aliquantulum flectit retrorsum : quare in priora sublatum pedem extremum deprimat terram versus , dein plantam dirigit in posteriora : crus in priora inclinatum erigit , post inclinatum in posteriora. Articulum pedis extremi cum talo flectit oblique in internam partem retrorsum , ac sic eam in partem attollit pedem extremum , in interiora posterioraque sursum convertens plantam : crus contra in internam partem inclinatum. Simul etiam dimovet connexum ossis navicularis cum cubiformi , commissuramque cubiformis cum calcaneo : quin & reliqua , quibus insertus , ossa , quantum sinunt commissurae eorum , dimovet.

Est *Quintus pedem moventium* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 59. *Quintus tibiae musculus* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 30. *Quintus movens pedem* , Fallopp. Obs. an. in pedem moventibus. *Tibicus posticus* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 43. *Oblique moventium pedem primus* , *adducens pedem* , *nauticus* , *tibiacus posticus* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 24. *Tibialis posticus* , Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 34. Dougl. Myogr. Cap. 42. Heist. Comp. an. ann. 1719. &

& 1727. in nota. Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 34.  
*Le Tambier postérieur*, Winfl. Exp. an. Trait. des mus-  
 cl. §. 593. & seq. & 1133.

## CAPUT CCXII.

*De Peroneo longo* <sup>a</sup>.

**E**xternam cruris partem, inter priorem tibiae spi-  
 nam & fibulam, vagina quaedam tendinea sub  
 tegumentis communibus ambit, à qua cum aliquot  
 sequentium muscutorum oriantur, necesse est de ea  
 in antecessum dicere. Incipit & ab exteriori parte  
 partis inferioris capitis superioris fibulae, & à tibia,  
 mox supra ortum Extensoris longi digitorum & Ti-  
 bialis antici; praetereaque accipit portionem tum à  
 vagina femur complectente, tum à tendine Bicipitis  
 cruris: ac postea etiam per longitudinem fibulae tibiae-  
 que pergit oriri, à fibulae spina exteriori, à capite  
 superiore usque ad extremum fibulae; à tibiae prio-  
 re, ad malleolum usque. Constat ex fasciculis ten-  
 dineis conspicuis, qui qua à tibia supra ortum Tibia-  
 lis antici, perque spinae prioris longitudinem proce-  
 dunt, descendunt oblique retrorsum: reliqui oblique  
 in priora, per exteriora praecedentium; praeter il-  
 los, qui ab exteriori parte capitis superioris fibulae,  
 utpote descendentes rectius. Ipsa crassa est, tenuior

D d d d 2

ab

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvi. z. Vefal. E-  
 pit. Fig. musc. iii. 7. fin. & Fig. iv.  
 f. fin. & v. dext. & de H. C. F. Lib.  
 ii. Tab. 6. 9. & Tab. 15. VXY.

Cassér. Tab. ap. Spiegel. Lib. iv.  
 Tab. 40. Fig. 2. BCDD. Bidloo  
 Tab. LXXXII. C. Cowper Myot.  
 ann. 1724. Tab. LXII. 174.

b Eu-

ab externa parte cruris, qua ambit Peroneos; totaque deorsum versus se extenuat. Ejus quoque propagines quaedam interfertae musculis, ut in cubito: duae autem, quarum altera interferta Peroneo longo & brevi ab una parte, ab altera Extensori longo digitorum & Peroneo tertio; altera Extensori longo digitorum & Tibiali antico. Haec tenuis, & per Tibialem sensim evanida. Illa insignior, adnexaque fibulae spinae priori, usque ad plagam triangularem, quae ad malleolum externum desinit, nuda à musculis; dein utrique hujus plagae margini, infraque eos, malleolo: & qua spinae adhaeret, constat è fasciculis tendineis decussantibus sese, quorum alii descendunt, seseque spinae inserunt; alii adscendunt, orti ab ea. A vagina autem, & ab ejus propaginibus, oriuntur Peroneus longus & brevis, Extensor longus digitorum, Tibialis anticus: à propagine insigniore Peroneus tertius. Ac de vagina quidem satis dictum videtur. Nunc, ut series historiae postulat, ad Peroneum longum pergemus. Is à superiore cruris parte incipiens, totoque ejus latere decurrens, delabitur ad plantam, per eamque pollicem versus incedit, usque ad initium metatarsi. Principium ei geminum, quorum alterum superius est, crassius, angustius, subtendineum ab initio, affixum tum laterali externae parti partis prioris radice capitis superioris<sup>b</sup> fibulae, tum vicinae à priori parte tibiae; quanquam pars tibiae affixa aliquando distincta sit, aliquando desit: alterum

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvi. 2-c.



nentiam, quae in latere extetno calcanei est, ea parte laevem, leviterque sinuatam. Ut ad ima cubiformis pervenit, ibi, se circum illud inflectit <sup>k</sup>, posteaque per plantam <sup>l</sup>, eo, quo supra diximus, incedit: primum autem incedit sub cubiformi, per sinum ejus, qui ante oblongam eminentiam, quam ab inferiore parte habet; sinusque ille aequabilis est, & laevis, ut facilius in eo ire redireque tendo possit. Et quae per plantam incedit, obductus vagina quadam, quae est ligamentum crassum & valens, quod ab imo calcanei tubere, juxta ejus priorem partem eminente, in priora procedit, seseque cubiformi inserit, praesertim eminentiae supradictae; ab eaque accessione quadam auctum, procedit ulterius, paulatim latefcens, tenuiusque, donec se inserat imis capitibus posterioribus ossium metatarsi, quinti, quarti, tertii, potissimum vero secundi, & extremo quidem latiore & valentiore. Caeterum tendo frequenter ad finem usque simplex manet, seseque modice dilatato sine affigit <sup>m</sup> imae deorsum maxime eminenti parti ossis metatarsi primi, ulterius etiam in priora tenuiore aponeurosi per idem os excurrrens: aliquando partim huic se affigit ossi, partim vicinae imae parti ossis cuneiformis primi: plerumque etiam circa metatarsi initium ab illo latere, quod spectat latus pedis externum, gracilem portionem dimittit, quae transit inter ligamenti,

k Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab.

15. X. Cowper Myot. ann. 1724.  
Tab. LXV. Fig. 2. 13.

l Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab.

15. XY.

m Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab.  
15. Y. Cowper Myot. ann. 1724.

Tab. LXVI. Fig. 2. 174

n Vesal.

menti, quod à calcaneo ad metatarsi ossa pertinere diximus, extrema illa, quae inserta ossi metatarsi primo & secundo; abitque in unum de principiis Interossei primi digiti secundi. Dat aliquando & ab altero latere tenuem & angustam, quae in priora cum eo procedens, sese juxta eum, & ab ea quidem parte, qua spectat latus internum pedis, ossi metatarsi primo inserit, pertinaciter quoque adnexa ligamento, quod ab osse cuneiformi magno ad metatarsi primum in planta deductum. Dat & aliquando, ubi cuneiformi primo non insertus, tertiam, ex multis tenuibus tendinibus constantem, quae se circum tuber ossis cubiformis flectens, ad ossis cuneiformis primi partem supradictam pertingit. Cruris cum talo commissuram recte in posteriora flectit, id est, calcem attollit, crus inclinatur retrorsum: cubiformis cum calcaneo, navicularisque cum talo, extrorsum simul & modice retrorsum: calcanei cum talo, extrorsum modice in priora. Et primo quidem simul flectit articulos cubiformis cum calcaneo, navicularis cum talo, calcanei cum talo; ac sic plantam vertit extrorsum modice in posteriora: dein illum pedis extremum cum crure, quo eandem magis ad posteriorem partem dirigit. Eodem ordine easdem in partes crus inclinatur. Ad haec os metatarsi primum in terram simulque nonnihil extrorsum dirigit. Quoniam vero tendo ejus, cum venter agit, valide inprimis atteritur ad Peronei brevis tendinem, qua se cum eo pone malleolum inflectit; itemque ad tuberculum calcanei, & ad os cubiforme; idque toties per vitae decursum

cursum fit, intumescit ibi, & fit aliquanto latior, evaditque durior, osseum putares, vel os continere: suntque hi nodi, qua parte atteruntur, duriores, & ad figuram ejus partis, ad quam atteruntur, facti; laeves denique, unde faciliior mobilitas. Omnes ovati: maximus <sup>n</sup>, qua ad os cubiforme se atterit, duriorque, & sinuatus, qua atterit parte; minor, qua ad tuberculum calcanei; minimus, & vix ullus, qua ad malleolum. Habet etiam aliquando nodum alium parvum, qua ultra cubiforme per plantam procedit. Et ne tendo à malleolo, & à tuberculo calcanei recedat, ligamentis retinetur, quorum alterum <sup>o</sup> cum malleoli sinu, alterum <sup>p</sup> cum tuberculo canalem efficit: eorumque ille communis est tendini Peronei hujus atque brevis; hic unius longi proprius, crassitudini ejus respondens. Cohæretque cum utroque canali; & in eo, qui juxta malleolum, cum tendine Peronei brevis, nexu membranaceo, laxo, obsequioso.

Est *Septimus pedem moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 59. *Quartus anterioris pedis musculus*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 30. *Peroneus posticus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 43. *Oblique moventium pedem secundus, abducens, Peroneus primus, fibulæus*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 24. *Peroneus primus*,

<sup>n</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab.

15. X. Cowper Myot. ann. 1724.

Tab. LXII. 174. N. & Tab. LXVI.

Fig. 2. 174. \*. & Tab. LXV. Fig.

2. 13.

<sup>o</sup> Eustach. Tab. XXXI. u. Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 2. Σ.

<sup>p</sup> Eustach. Tab. XXXI. w.

a Eu-

*mus*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 34. *Peronaeus primus seu posticus*, Dougl. Myogr. Cap. 42. *Peronaeus primus*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 34. *Le long Peronier*, communement dit *Peronier postérieur*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 598. & seq. & 1134. & seq.

## CAPUT CCXIII.

*De Peroneo brevi <sup>a</sup>.*

**B**revis. praeterquam quod à vagina tendinea cruris, & à propagine ejus insigniore, de quibus dictum in capite superiore, abscedat, tantummodo à fibula oritur <sup>b</sup>, neque multum ante mediam longitudinem ejus, principio simplici: caeterum eodem modo usque ad malleolum descendit. Ejus pars superior crassior est, & ex acutiore sensim crassior, latiorque; dein rursus gracilescens, intrinsecus à principio aliquantum tendinosa: quae inde sequitur pars principii inferior, superiori autem prorsus continuata, tenuis est, planior, lata, deorsum versus paullatim tenuior, conflata ex fibris se à fibula oblique in priora continua serie demittentibus. Crassior à latere externo fibulae procedit, cujus, praeterquam sua superiore  
E e e parte,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvii. y. & Tab. xxxviii. B. & Tab. xxxiii. R. Vesal. Epit. Fig. musc. iii. 3. fin. & de H. C. F. Lib. ii. Tab. 6. Y. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 39. Fig. 1. HH. & Tab. 40.

Fig. 2. EEF. Bidloo Tab. lxxxi. B. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. lxii. 175.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvii. y-aa. & Tab. xxxiii. 8-aa.

c Eu-



parte , latitudinem totam tenet : tenuior deinde à spina , quae à posteriore parte latitudinem illam terminat , haud ita procul à malleolo oriri à spina illa desinens ; in aliis tamen citius. E crassa parte intus , non multum infra summum ejus initium , tendo principio tenui nascitur , quod paullatim insignius , non diu post emergit <sup>c</sup> ab exteriori parte carnis , paullatimque crassescit accessione fibrarum partis tenuioris , quas deinde & à postica parte , & à posteriore illius , qua incumbit fibulae , accipit forma pennata. Ab initio autem , qua extrinsecus apparet , angustus , sensim latefcit , deindeque rursus angustior , ut porro descendit , se modice angustat , toto decursu latus. Adjacet autem fibulae parti illi , quae à posteriore parte , statim supra malleolum , leviter sinuata : & ubi carnem deseruit , mox se flectit <sup>d</sup> pone malleolum externum , decurritque ibi per sinum ejus , in eoque continetur ligamento <sup>e</sup> , quod cum tendine longi habet commune : dehinc per latus externum pedis descendens , curvat se in priora <sup>f</sup> , atque infra malleolum , juxta superiorem partem eminentiae calcanei , secundum quam procedit Peronei longi tendo , incedit sub ligamento <sup>g</sup> altero , sibi pariter cum tendine longi communi , sed per singularem ac sibi proprium canalem

c Eustach. Tab. xxxvii. y. β. & Tab. xxxviii. B. β. Caser. Tab. ap. Spiegel. Lib. iv. Tab. 39. Fig. 1. h. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. lxii. 175. Q.

d Eustach. Tab. xxxvii. y. γ.

e Eustach. Tab. xxxi. u. Vefal. de H. C. F. Lib. ii. Tab. 1. 2.

f Eustach. Tab. xxxvii. y. infra γ.

g Eustach. Tab. xxxi. w.

canalem ejus : ad postremumque pertingit <sup>b</sup> ad superiorem eandemque posteriorem partem radicis illius tuberis , quod est in osse metatarsi quinto , ab exteriori parte capitis ejus primi. Extremum ejus dilatatum , extenuatum , aliquando in fasciculos distinctum , aliquando veluti bicorni. Ipse & latior , & crassior , & durior , ubi ad malleolum applicatus : sic & ubi incedit sub ligamento secundo ; è quo cum elapsus , angustior , formaeque magis ovatae. Eodem quo praecedens modo , eodemque ordine , flectit articulum cruris cum talo , cubiformis cum calcaneo , navicularis cum talo , calcanei cum talo ; ob idque eodem modo movet pedem extremum , crusque. Insuper autem ossis metatarsi quinti caput primum nonnihil trahit retrorsum fursumque , quo capita priora ossium metatarsi deducit à se mutuo , maxime quintum à quarto , ac sic plantam aliquantum dilatat , facitque planiorem.

Est *Octavus pedem moventium* , Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 59. *Quintus anterioris pedis musculus* , Columb. de re an. Lib. V. Cap. 30. *Peroneus anticus* , Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 43. *Flectentium pedem secundus* , *peronaeus secundus* , *semifibulaeus* , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 24. *Peroneus secundus* , Cowper Myot. Cap. 34. *Peronaeus secundus seu anticus* , Dougl. Myogr. Cap. 42. *Le moyen Peronier* , communement

E e e e 2

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvii. y. 3. & Tab. xxxiii. 19. Vesal. de H. C. F. Lib.

ii. Tab. 15. b.

a Eu-

nement dit Peronier antérieur , Winsl. Exp. an. Trait. des muscul. §. 571. & seq. & 1123.

## C A P U T CCXIV.

*De Extensore longo digitorum pedis <sup>a</sup>.*

**E**xtenfor longus digitorum pedis longe maxima parte sui in crure jacens, ab ejus superiore parte descendit ad dorsum pedis extremi, per quod tendines ad digitos minores transmittit. Altera autem principii parte incipit à radice capitis superioris tibiae <sup>b</sup>, mox ante fibulae caput, & ab hujus capitis <sup>c</sup> spina priore: altera, primum à fibulae <sup>c</sup> spina priore, & quidem à margine ejus, qui spectat tibiam; dein à planitie, in quam spina illa ab inferiore parte abit: utraque etiam abscedit à vagina tendinea cruris, ut tradidimus in illo capite, quod de Peroneo longo scripsimus. Illa <sup>d</sup> primum non admodum lata est, eademque tenuis: haec <sup>e</sup> lata, utpote per magnam partem longitudinis fibulae oriens, tenuior, carnea. Illa <sup>d</sup> primum sensim increscit, post decrescit, tendinemque producit priusquam venerit ad cruris longitudinem mediam; aliquando etiam jam in superiore parte

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxv. H. & Tab. xxxii. f. Vesal. Epit. Fig. muscul. 1. a. fin. & de H. C. F. Lib. ii. Tab. 4. Y. Casler. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 40. Fig. 2. G. Bidl. Tab. lxxxii. F. & Tab. lxxxiii. D. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXIII. 183.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxv. H.-a.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxv. H.-23.

<sup>d</sup> Bidloo Tab. lxxxii. C. pars superior. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXIII. 183. LL. pars superior.

<sup>e</sup> Bidloo Tab. lxxxii. C. pars inferior. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXIII. 183. LL. pars inferior.

f Eu-

parte cruris : haec <sup>e</sup> ad inferiorem illius partem , antequam tendinis appareat initium , & deinde ad ipsum tendinem , & ad posteriorem quidem partem illius ejus partis , qua adjacet Extensori proprio pollicis , se in priora oblique , prope ad pedem extremum usque , demittit , efficiens longiorem quam illa carnis partem , latioreque , & tenuiorem. Ex quibus carnea pars satis longa , & non valde crassa , eaque in priorem partem prominula , ibidemque rotundula , ab utroque latere planior , ut quae urgetur , hinc à Peroneo longo & brevi , illinc à Tibiali antico & Extensore pollicis proprio. Tendo <sup>f</sup> primum decurrit ab ea parte carnis , quae spectat tibiam <sup>g</sup> ; dein secundum carnis priora <sup>h</sup> , atque in cruris pedisque extremi confinio se condit sub ligamento <sup>i</sup> transverso ; quo ibi loci tendines à crure ad pedis dorsum procedentes obducti ; ac per singularem ejus canalem , ipsi tantum cum tendine Peronei tertii communem , decurrit : ex quo cum emerfurus est , in quatuor <sup>k</sup> tendines minores , quibus , ut dictum est , ad quatuor digitos parvos pertinet , dividitur ; & fere aequaliter. Quibusdam jam in ipso crure distincta est portio ,

E c c c 3

quae

f Eustach. Tab. xxxv. H-γ Bidloo Tab. LXXXI. F. & Tab. LXXXII. D.  
 Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXIII. 183.  
 g Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXIII. 183.  
 h Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXIII. 183. Bidloo Tab. LXXXI. F.

& Tab. LXXXII. D.  
 i Eustach. Tab. xxviii. 7. & Tab. xxx. a. Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 1. d.  
 k Eustach. Tab. xxxv. H-δ. 1. ζ. 4. Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 4. infra 12. Bidloo Tab. LXXXI. F.

l Bidloo

quae ab it tendinem minimi. Tendines, quamdiu per pedis dorsum incedunt, latiores & planiores, & primo quidem latescentes, modiceque extenuati; post rursus modice angustati: ubi pedis dorsum superarunt, id est, ad initia digitorum, tres primi conjungunt se cum tendinibus Extensoris brevis, primo leviter, deinde prorsus <sup>l</sup>: ita quisque cum eorum quoque latum tendinem <sup>l</sup> efficit, per digiti cujusque dorsum incedentem, qualem quartus solus efficit <sup>l</sup>. Circa articulum digitorum cum metatarso, ab interno latere accipiunt aponeurosem <sup>m</sup>, partim à capsula articuli illius, partim ab Interosseo, partim à Lumbricali, partim denique à latere ossis primi ordinis procedentem: eaque majorem partem scandit tendines, per dorsum eorum evanescens; & aliquando tantummodo parte sui ad eos pertinet, exteriore parte laxa eis superinjecta, similique ex altero latere venienti per dorsum eorum continuata. Ad digiti autem minimi tendinem, qui solus incedit, ab externo latere accedit aponeurosis <sup>n</sup> ab Abductore minimi. Communes porro tendines latescunt, dorsumque ossis primi integunt, ut in manu; similique modo ad cujusque digiti os secundi ordinis quisque definit: praeterea autem ab interno latere procedit longius, ut in manu tendines Interosseorum priorum cum Lumbricalium, adjectaque portione Extensoris communis; & cum simili propa-

<sup>l</sup> Bidloo Tab. LXXXI. F.

<sup>m</sup> Eustach. Tab. XXXV. K.-a. & sic

in reliquis.

<sup>n</sup> Eustach. Tab. XXXV. K.-β.

a Eu-

propagine Extensoris brevis conjunctus, communi cum ea extremo pertinet ad superiorem partem capitis primi ossis tertii. Ita finit Extensor longus, extendens secundum, tertiumque ordinem ossium, qui in digitis sunt; extendens & primum, eundemque postquam porrexit, sursum flectens. Digitos quoque quatuor minores ad se invicem adducit, & attollit oblique latus pedis internum versus. Ad haec & articulos pedis extremi cum talo flectit oblique in exteriorem simul & priorem partem, eo attollens pedem, crus inclinans; simulque dimovet commissuram cubiformis cum calcaneo, itemque connexum ejusdem cubiformis cum naviculari: & in priora attollit pedem extremum, crus autem inclinat, flectens articulum pedis extremi cum crure: si modo quantum ad haec efficienda requiritur, contrahere se valeat, & nihil impediat; quemadmodum in aliis consimilibus musculis jam saepe indicavimus.

Est *Decimusquartus pedis digitos moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 60. *Secundus musculus, anterioris pedis*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 30. *Longus digitorum tensor, sive Cnimodactyleus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 44. *Digitorum tertium internodium extendens*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 27. *Extensor digitorum pedis longus*, Cowper Myot. Cap. 36. *Extensor longus*, Dougl. Myogr. Cap. 43. *Le long Extenseur commun des orteils*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 618. & seq. & 1141. & seq.

## CAPUT CCXV.

*De Peroneo tertio <sup>a</sup>.*

**E**xtenforis, de quo superiori capite dictum, interdu[m] pars <sup>b</sup> est Peroneus tertius à nobis vocatus, cum inferiore parte principii ejus conjunctus. A cujus tum externo latere, tum inferiore parte, etiam cum distinctus ab eo, ab inferiore parte ejusdem planitiei fibulae <sup>c</sup>, pari modo, atque illud à superiore, procedit: partim etiam à propagine insigniore vaginae cruris, de qua in Peroneo longo actum. Planus est, tenuis, sensim ex lato initio angustior; ejusque fibrarum superiores jam dant primum tendini initium, ad quem, ut descendit, aliae atque aliae, oblique ad illam ejus partem, quae respicit latus externum cruris, descendentes, accedunt, usque ad ligamentum, quod subit. Crescit is ex eo, à priorie parte descendens, & ubi perfectus <sup>d</sup>, planior est; ac sub eodem cum Extensore, ligamento <sup>e</sup>, perque eundem canalem, transit; à quo Extensore deinde per dorsum pedis, modice latefcens, seseque extenuans, deflectit <sup>f</sup> in latus externum ad metatarsi initium. Et vel ad finem usque simplex <sup>g</sup> manet, extremoque insigniter dilatato se affigit superiori parti radicis.

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxv. I. & Tab. xxxii. 9. & Tab. xxix. 4. sin. & Tab. xxx. 22.

<sup>b</sup> Vesal. Epit. Fig. musc. 1. A. sin. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 1. 3. & Tab. IV. 2. Bidloo Tab. LXXXI. F. & Tab. LXXXII. L. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXIII. 183. m.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxv. I.-2.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxv. I.-3.

<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxviii. 7. & Tab. xxx. A. Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 1. 2.

<sup>f</sup> Eustach. Tab. xxxv. I. infra 3.

<sup>g</sup> Bidloo Tab. LXXXII. L.

<sup>h</sup> Eu-

radicis capitis primi ossis metatarsi quinti <sup>b</sup>, juxta commissuram cum quarto; indeque continuo superiori spinæ ejusdem illius quinti: vel tantum simplex donec non multum à metatarso absit, post in cornua se findit duo <sup>h</sup>, eorumque altero affigit superiori parti capitis primi ossis metatarsi quinti, juxta quartum; altero eidem parti capitis primi quarti, juxta quintum. Canalis autem, per quem cum Extensore longo digitorum sub ligamento supradiçto incedit, juxta externum pedis latus est; in eoque membranaceo nexu cum Extensoris illius tendine conjunctus laxè, unaque cum eo cum ipsius canalis fundo. Pedem extremum attollit in priorem partem, inque eandem crus inclinat. Articulos cubiformis cum calcaneo, navicularis cum talo, calcanei cum talo, oblique in exteriorem partem ac simul sursum in priora flectit, & ea re extremum pedem primum attollit in priora, eodemque tempore in latus externum; dein attollit recte in priora: eodem modo easdem in partes crus inclinat.

Est *Nonus pedem moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 59. *Musculus pedis qui tertius decimus annumeratur*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 30. *Pars Extensoris digitorum pedis longi*, Cowper Myot. Cap. 36. *Vesalius's ninth muscle of the foot*, Dougl. Myogr. Cap. 43. in Extensore longo. *Quintus tendo Extensoris longi digitorum pedis*, Morgagn. Adv. an. II. Anim.

F f f f

20.

<sup>h</sup> Eustach. Tab. xxxv. I-γ. Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 4. 13.

<sup>a</sup> Eu-



20. *Le petit Peronier*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 575. & seq. & 1124.

## C A P U T CCXVI.

*De Tibiali antico <sup>a</sup>.*

**T**ibialis anticus cursum suum mox infra genu inchoat, & ubi cruris longitudinem emensus est, per pedis extremi dorsum p̄ḡit, usque ad os euneiforme primum, primumque metatarsi. Extensorem digitorum longum à tibia oriri diximus, locumque, unde oriatur ab ea, definivimus in historia ejus: mox ante eum hic Tibialis affixus potiore primaque sui principii parte, occupans deinde ea totam planitiei externae tibiae, à capite ejus secundum spinam priorem fere usque ad medium longitudinis tibiae, latitudinem; & ex parte etiam affixus ligamento, cruris ossium intervallo interserto: indeque per cruris longitudinem ab eodem ligamento, qua parte id tibiae propius, & inprimis à tibia juxta ligamentum illud, oriri diu, & ad duas tertias longitudinis tibiae partes plus minus usque, pergit; illa parte sui deorsum versus sensim tenuior, & dum oritur, à spina tibiae oblique sensimque per latitudinem tibiae deflectens ad idem illud ligamentum; itemque per hujus

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxv. P. Vesal. Epit. Fig. muscl. 1. 7. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 1. 2. & Tab. 3. 7. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 39. Fig. 1. C. C. & Tab. 40.

Fig. 2. NNO. Bidloo Tab. LXXX. D. & Tab. LXXXI. E. & Tab. LXXXII. A. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXI. 170.

b Eu-

hujus latitudinem ad tibiam. Adde quod à priore etiam parte diu abscedat à vagina tendinea cruris, de qua in Peroneo longo; & qua adjacet Extensori longo digitorum; ab ejusdem vaginae propagine tenuiore. Ultra cruris medium procedit priusquam tendinem conspicuum efficiat, primo paullatim habitior, tum gracilior, à priore parte, qua nudus à musculis, rotundulus; ab altero latere, quo premit Extensorem digitorum longum, pollicisque; ab iisdem pariter pressus, eoque planior; itemque ab altero, qua duræ tibiæ adjacet. Tendo <sup>b</sup> à priore ejus parte incipit, planior, crassior; ad cuius, dum procedit, posteriorem partem, præter eam, quæ spinæ prioris tibiæ proxima, totam, se pars carnis inferior, quæ tenuior, suis fibris oblique demittit <sup>b</sup>: sitque tamdiu sensim crassior, post crassus, ovatus, planior. In cruris sine subit cornu superius ligamenti <sup>c</sup> transversæ, quo tendines in flexu ad pedem extremum coëscuntur; & transit per singularem ejus canalem, qui est juxta internum pedis latus: ad eum enim totus musculus hactenus procedit, tenens internum latus spinæ prioris tibiæ, infraque ante tibiam aliquantum introrsum deflectens, & post quoque per pedis dorsum oblique introrsum, id est, alterum pedem versus pergens <sup>d</sup>. In dorso autem pedis procedit sub altero cornu ligamenti supradicti, retineturque etiam ab eo: ligamentum e-

F f f f 2                      nim

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxv. P. a. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 39. Fig. 1. bb. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. Lxi. 170. L.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxviii. 7. Vesal. de H. C. F. Lib. ii. Tab. 1. 2.  
<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxv. P. aa.

<sup>e</sup> Vesal.

nim illud à principio simplex est, sed per dorsum pedis ad internum latus incedens, abit in cornua duo, quae divergunt. Tendo ubi à carne recessit, crassior est, ovatus, planior, & primum angustat se permordice, ubi ligamenti cornu inferius subiturus est, dilatat modice, posteaque magis & magis. Extremum autem ejus bicornae est, parteque crassiore definit ad rotundam illam laevemque superficiem, quae in ossis cuneiformis primi parte interiore eademque inferiore & finitima ossi metatarsi primo: angustiore tenuioreque, mox ante finem praecedentis, ad eminentiam, quae in capite primo ossis metatarsi primi\*, ab interno latere, atque ibi fere in medio. Et ante finem tendinis, ubi is ad dorsum pedis se atterit, subiecta tendini bursa tenuis, accretaque. Pedem extremum in priora attollit, quo crus inclinatur; quod si retrorsum inclinatum sit, erigit. Sed alia etiam fiunt, cum in inciso corpore attrahimus eum ad principium suum. Nempe articuli pedis extremi cum talo, & cubiformis cum calcaneo flectuntur, sed non semper eodem modo: siquidem ii, pede extremo in priora recte libereque pendulo, si incipis trahere, flectuntur in priora introrsum; magis autem, si pes prius flexus sit in exteriora: tum si pergis, restituitur articulus tali cum calcaneo, illi vero navicularis cum talo, ac cubiformis cum calcaneo, flectuntur extrorsum, donec pes extremus cum crure rectus sit; postea recte in priora: deinde si adhuc pergas, in

\* Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 15. K.

in priora flectitur articulus pedis extremi cum crure. Atque adeo primum pes extremus in priora introrsum attollitur, ac planta alterum pedem versus convertitur; dein pes rectius attollitur in priora, planta dirigitur recta deorsum; post haec pedis extremi prior pars attollitur. Paullum quoque dimovetur junctura cuneiformis primi cum naviculari, ejusdemque cum primo metatarfi.

Est *Sextus pedem moventium*, Vefal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 59. *Primus musculus anterioris pedis*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 30. *Tibieus anticus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 43. *Flectentium pedem primus*, *Tibiaeus anticus*, *catenae musculus*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 24. *Tibialis anticus*, Cowp. Myot. Cap. 34. Dougl. Myogr. Cap. 42. *Le Jambier antérieur*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 568. & seq. & 1121. & seq.

## CAPUT CCXVII.

*De Extensore proprio pollicis pedis* <sup>a</sup>.

**H**ic ultimus est eorum, qui à crure ad pedem extremum decurrunt, per cumque deinde excurrunt. In crure carnea pars ejus planior <sup>b</sup>, utrimque  
F i f f 3 pressa,

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiii. 12. Vefal. Epit. Fig. musc. 1. r. sin. & Fig. 111. 9. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 5. & Tab. 4. 14. Castler. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 47. Fig. 2. L. & Tab. 39. Fig. 1. NN.

Bidloo Tab. LXXXI. H. & Tab. LXXXII. G. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXIII. 177.

<sup>b</sup> Bidloo Tab. LXXXII. G. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXIII. 177. AA.

c Eu-

pressa, ab altera parte ab Extensore digitorum communi, & Peroneo tertio; ab altera à Tibiali antico: eadem latioris principii<sup>b</sup>, orientis à fibula<sup>c</sup>, nempe ab ejus planitie, quae tibiae à priore parte obversa; ab eaque secundum totam fere longitudinem spinae prioris: infra autem, ubi spina illa quasi retusa, à planitie inde nata; atque etiam per originis hujus longitudinem, à ligamento, quod ad tibiam pertinet, crurisque ossium intervallum, caetero patens, maximam partem occludit; itemque exigua interdum portione infra ab ipsa tibia, proxime ligamentum. Tenuis eadem, sensimque ab ortu tendinem versus crassior & angustior, tendinem<sup>d</sup> eo modo producit, quo Peroneus tertius, & ab eadem quoque parte; ubi eum producit, subito se extenuans: &<sup>e</sup> à summo acuta, inde sensim latior, ubi oriri desinit, angustior; acutoque mucrone ad tendinem desinens. Demittit se<sup>f</sup>, tendinemque suum<sup>g</sup>, ut Tibialis anticus, nisi quod, quoniam à fibula procedit, primum obliquius in priora se demittat, donec tendine suo circa inferiora cruris cum Tibialis illius tendine incedat. Tendinem quoque sub utroque cornu ligamenti<sup>h</sup> transversi, quod à priore parte cruris juxta pedis extremi principium est, per proprium sibi canalem transmittit; qui tendo ad ligamentum illud usque carnem

c Eustach. Tab. xxxiii. 12-aa.

d Eustach. Tab. xxxiii. 12-b. Bidloo Tab. lxxxii. G. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. lxiii. 177. B.

e Cowper Myot. ann. 1724. Tab.

lxiii. 177. AA.

f Eustach. Tab. xxxiii. 12.

g Eustach. Tab. xxviii. 7. Vesal. de H. C. F. Lib. ii. Tab. i. d.

h Bidloo

nem sibi insertam habet, lubricisque membranis, qua sub ligamenti cornubus incedit, adnexus est. Post tendinem per pedis dorsum ad pollicem porrigit<sup>f</sup>, ulteriusque per pollicis dorsum<sup>f</sup> ad superiorem partem capitis primi ossis ejus secundi<sup>h</sup>. Is autem planior, & ubi ligamentum transversum cruris superavit, latescit modice, post rursus se angustat, rursusque, ubi pollicem conscensurus, latescit permodice; ubi per eum incedit, rursus se primum angustat, dein vero dilatat aliquantum, magis autem ubi ad os tertium appropinquat: ubi se inserit, latior, & extenuatus. Qua praeterit articulum pollicis, accreta ei capsula articulum illum continens. Atque inde, ubi praeterit articulum pollicis cum metatarso, usque ad articulum ipsius pollicis, dat ab utroque latere aponeurosem latam & tenuem, quae ambiens articulos illos, mediumque inter eos os, immiscet se capsulis illorum articulorum. Extendit, ac deinde sursum flectit totum pollicem, hoc est, utrumque os ejus. Et, ut de Extensore digitorum longo dictum, si contrahere se, quantum requiritur, valeat, nihilque impediat, attollit quoque pedem extremum, crus super pedem in priora inclinat: articulos autem pedis extremi cum talo, eumque cubiformis cum calcaneo, eodem modo flectit ac Tibialis anticus, sed minus introrsum. Aliquoties tendinem ejus vidimus exiliorem raram dimittere, ab interno ejus latere ad eandem pollicis partem incedentem, eodemque modo finientem: aliquando

<sup>h</sup> Bidloo Tab. LXXXI. H.

<sup>a</sup> Eu-

quando similem vidimus, confluentem cum illo Extensoris brevis digitorum pedis tendine, qui pertinet ad pollicem.

Est *Decimusquintus pedis digitos moventium*, Vefal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 60. *Tertius musculus anterioris pedis*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 30. *Extensor pollicis*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 45. *Pollicis tensor*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 27. *Extensor pollicis longus*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 35. *Extensor longus*, Dougl. Myogr. Cap. 44. *Extensor pollicis longus*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 35. *Le grand Extenseur du pouce du pied*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 603. & seq. & 1137.

## REGIO XXIX. PEDIS EXTREMI DIGITORUMQUE EJUS DORSUM.

### C A P U T CCXVIII.

*De Extensore brevi digitorum pedis <sup>a</sup>.*

**S**implex à principio est Extensor brevis digitorum pedis, post quadripartitus, quatuor digitis inferiens, pollicis, tribusque primis parvorum. Ad quos

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxiii. 18. Vefal. Epit. Fig. musc. III. 2. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 5. 7. & Tab. 6. a. Casler. Tab. ap. Spigel. Lib. 24. Tab. 39. Fig. 1. L. Bidloo Tab.

LXXXI. G. & Tab. LXXXII. F. una cum portione ad pollicis principium pertinente. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. LXIII. 184. una cum 178.

<sup>b</sup> Bidloo





nec confluant cum propagine Extensoris longi, & cum ea se ossi tertio inserant, extremo communi. Pari autem modo, atque Extensoris longi tendines, circa articulum digitorum cum metatarso accipiunt aponeurosem, à partibus iisdem, praeterquam à Lumbricali, quippe cum nullus ad hoc latus pertineat. Prima portio, id est, quae pollicis est, saepe jam ab ipso initio tota distincta<sup>c</sup>, aliquando & quarta, aliquando fere omnes: & tunc portiones illae primum sensim insigniores, post decrescunt. Quartam in duas portiones abeuntem vidimus; emissà, ab ea parte, qua tertiam spectat, exiliore, versaue in exiliorem similiter tendinem, accedentem ad illum tertiae. Quin & semel, iterumque invenimus portionem gracillimam, inter primam & secundam, atque vel ex utraque, vel è sola secunda natam, exilique, in quem desinebat, tendine decurrentem ad digitum primi parvorum illud latus, quod obvertit pollicem. Pollicem, digitosque in rectum porrigit; extendit enim omnes ordines ossium eorum: primum etiam in superiora flectit, simulque modice extrorsum. Et aliquantum diducit digitos.

Est *Decimus sextus pedis digitus moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 60. *Postremus musculus pedis*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 31. *Brevis Digitumtenfor*, sive *Pediens*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 44. *Extendens*

<sup>c</sup> Bidloo Tab. LXXXII. portio ad pollicis principium pertinet. Cowp.

Myot. ann. 1724. Tab. LXIII. 178.

<sup>a</sup> Vesal.



mediam plantam procedit ad digitorum initia. Oritur<sup>c</sup> autem à tubere calcanei, quod calcem efficit. Lataque est ab ortu, inde primum paullo angustior, mox latefcens magis magisque, tum pollicem versus, tum minimum. Est & crassa, tenfaque, & tanquam in fasciculos distincta, qui per plantae longitudinem porrecti. Ubi ad capita priora metatarsi appropinquat, findit se in portiones quinque<sup>d</sup>, quot capita, ad quae pertinent. Insignior latiorque, quae ad pollicem: angustiores proximae duae: exiliores, quae superfunt: passimque cohaerent fibris transversis. Ipsa cohaeret ab una parte cum aponeurosi, quae tegit Abductorem pollicis; ab altera cum illa, quae minimi: & qua cohaeret, interferit portionem, hic Abductori minimi, & Flexori brevi digitorum, capitique Flexoris longi in planta sito; ibi Abductori pollicis & Flexori brevi digitorum. Eundem autem utilitatis fructum nobis in pede praebet, quem in manu aponeurosis respondens. Atque mox supra eam Flexor brevis digitorum pedis, qui primum quoque, ut Extensor, sed diutius, simplex, post quadripartitus; & ad digitos quoque pertinet, sed quatuor parvos. Ab ima parte calcanei oritur, juxta radicem tuberis, quo calx efficitur; & à principio aliquantum cohaeret cum Abductore tum pollicis, tum minimi: ante tuber autem calcis diu adhaeret aponeurosi plantae, aut ab ea oritur; quae post ortum etiam aliquantulum

c Cowp. Myotom. 1724. Tab. LXV.  
Fig. 2. 172-1. juxta A.

d Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV.  
Tab. 42. Fig. 1. a. a. a. a. a.

c Bidloo



dae extremae accipiunt à secundi ordinis parte ima, mox ante caput ejus primum : respondent vaginae , quibus quisque eorum obductus. Ita & flectit ossa secundi ordinis, primique; utraque deorsum. Praeterea videri potest posse in terram nonnihil curvare plantam.

Est *Primus pedis digitos moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 60. *Primus musculus pedis digitis inseriens*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 31. *Brevis Digitumflexor*, sive *Pediens internus*, vel *Pternodactyleus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 44. *Flexor secundi internodii digitorum*, *Perforatus*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 26. *Perforatus*, Cowper Myot. Cap. 36. *Perforatus seu Flexor sublimis*, Dougl. Myogr. Cap. 43. *Le court Flechisseur commun des orteils*, ou *le Perforé du pied*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 626. & seq. & 1143.

# C A P U T CCXX.

## De Abductore pollicis pedis <sup>a</sup>.

**P**ollicem à reliquis digitis abducit, ex quo nomen invenit, Abductor pollicis; qui tamen eodem tempore os primum pollicis, quod proprie abducit, etiam

<sup>a</sup> Eustach. Tab xxxv. Q. Vesal. F. pit. Fig. muscl. 1. r. dext. & de H. C. F. Lib. II. Tab. 2. 7. & Tab. 13. e. Casser. Pent. Tab. 1. org. tact Fig. 3. FE. & Casser. Tab.

ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 42. Fig. 2. EFF. Bidloo Tab. LXXXIII. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXIV. 182.

etiam deorsum flectit. Ne quis vero, qui suum nullo modo abducere pollicem potest, ut plerique non possunt, miretur Abductorem pollicis adscribi: diuturna enim calceorum compressio, impediens abductionem, efficit tandem, in eam partem pollicem moveri amplius non posse, ut certe potest ineunte aetate, ante calceorum usum. Nec aliam, quam quae dicta in principio, esse functionem huius musculi, in junioribus manifestum est, & satis declarat & locus unde oritur, & is cui inseritur, atque etiam decursus. Locus unde oritur, est imprimis <sup>b</sup> radix tuberis calcanei, quo is calcem efficit, ejusque ab interno latere pars inferior; dein & ligamentum, quod illi calcanei parti, qua sustinetur cervix tali, ab inferiore parte adnexum, continet tendinem Flexoris longi pollicis: aliquando locus ille ligamentum quoddam est, à ligamento, quod paullo ante diximus, deductum ad latus calcis. Is cui inseritur <sup>c</sup>, est interior & eadem inferior pars capituli, quo os primum pollicis incipit. Decurrit recta ab ortu ad finem, aponeurosi extrinsecus convestitus. Est vero biceps: pars enim quae à calcaneo oritur, distincta est ab illa, quae à ligamento Flexoris tendinem continente. Illa praecipua, primo tendinea, tenuior, angustior; sensim inde nonnihil crassior & latior; atque à superiore parte insigniter, diuque tendinosa: haec à principio bicornis, id est, incipiens duabus partibus, & iis tendineis, latis, tenuibus, mox

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxv. Q. 4.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxv. Q. 7.

<sup>d</sup> Eu-

mox carneis, conjunctisque. Post capitum conjunctionem venter primo modice intumescere pergit, deinde gracilescit insigniter. In itinere tendinem <sup>d</sup> à superiore parte sua, itemque ab ea, qua plantam spectat, producit; quem sensim auget caro ad eum à parte pedis alterius accedens, donec ventum sit circa caput secundum ossis metatarsi primi: planior is est, crassius, longus, & antequam se inferat, capsae articuli pollicis cum metatarso suo, quam praeterit, pertinaciter adnexus. Eique, maxime à superiore parte, tum & ab illa, quae spectat latus externum pedis, adjungit se caro Flexoris brevis pollicis. Functioni ejus adde, quod fortasse pedem extremum in interiora simul & inferiora curvare nonnihil queat.

Est *Decimus octavus pedis digitos moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 60. *Secundus pedis musculus digitis inserviens pollicem ab aliis digitis deducens*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 31. *Parvus musculus ad latus pollicis*, Fallopp. Obs. an. post pedem moventes. *Pollicem adducens*, Casser. Pentaeisth. Lib. I. Tab. 1. org. tact. Fig. 3. Declarat. E. *Abductor pollicis*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 45. *Pollicem adducens*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 28. *Abductor pollicis*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 35. *Abductor*, Dougl. Myogr. Cap. 44. *Abductor pollicis*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 35. Pars ejus, qui *le Theuar*, Winfl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 611. & seq. & 1139.

C A-

d Eustach. Tab. xxxv. Q.β. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXIV. 182. C.  
a Eu-

## CAPUT CCXXI.

*De Abductore digiti minimi pedis <sup>a</sup>.*

**H**ujus etiam functio ob eandem , quam superiore capite memoravimus , compressionem , in pro-  
 vectioribus raro apparet , tributus nobis ad digiti  
 minimi articulum cum metatarso sic flectendum , ut  
 abducatur digitus ille à reliquis , ac simul flectatur in  
 terram : videtur autem etiam in inferiora nonnihil  
 curvare plantam. Exteriori pedis parti , ut praece-  
 dens interiori , adjacens , ab eodem calcanei tubere  
 oritur <sup>b</sup> , ab exteriori parte tota radice ejus. Testus  
 autem & ab ima parte , & ab externo latere , aponeu-  
 rosi insigni , quae cum eo oritur , post sensum extenu-  
 ata. Ipse angustat se sensim , à primo latior : sensim-  
 que ex tenuiore crassior fit primo , dein rursus tenuior.  
 Sed mox portionem <sup>c</sup> ab exteriori parte sui dimittit ,  
 & ipsam sensim graciliorem , brevem , in fine tendi-  
 neam ; eamque inserit <sup>d</sup> posticae parti tuberis magni  
 & inaequabilis , quod è capite primo ossis metatarfi  
 quinti in externum pedis latus eminet. Haec tamen  
 portio saepe quasi tota tendinea est , plana , sensim  
 se extenuans , angustansque ; & maximam partem nil  
 H h h h nisi

<sup>a</sup> Eustach. Tab. xxxvi. A. Vesal. E-  
 pit. Fig. musc. 11. 7. dext. de H. C. F.  
 Lib. 11. Tab. 9. 2. & Tab. 13. 5. Cass.  
 Pent. Tab. 1. org. 12ct. Fig. 3. 1. &  
 Cass. Tab. 4p. Spigel. Lib. 1v. Tab.  
 42. Fig. 2. GGH. & Fig. 3. 11.  
 Bidloo Tab. Lxxxvi. Fig. 2. B.

Cowper Myot. ann. 1724. Tab.  
 LXIV. 188.

<sup>b</sup> Eustach. Tab. xxxvi. A-α.

<sup>c</sup> Eustach. Tab. xxxvi. A-β. Casser.  
 Tab. 4p. Spigel. Lib. 1v. Tab. 42.  
 Fig. 3. 11.

<sup>d</sup> Eustach. Tab. xxxvi. A-β.

<sup>e</sup> Eu-



nisi procurrans aponeurosis, qua tectum hunc musculum diximus; quae ibi etiam ad postremum & per carnem ejusdem musculi evanescere sensim solet, & ab interno latere portiones proximis dare musculis, ut Flexori brevi digiti minimi, Interosseo ejusdem, & Transverso pedis. Post hanc portionem Abductor procurrit <sup>e</sup>, porro gracilescens; proceditque primum sub capite primo ossis metatarsi quinti, ob hoc ipsum ea parte sinuato; dein secundum latus externum ossis ejusdem; pertingitque <sup>f</sup> ad externam partem radices capitis primi ossis primi digiti minimi, verum tendine <sup>g</sup>, quem cito efformat, quemque auget, carne sua ad exteriorem partem ejus ferre ad finem usque accedens. A cujus tendinis extremo aponeurosis tenuis abscedit, pertinens <sup>h</sup> ad Extensoris longi tendinem, qui digiti minimi est. Aliis jam cito, antequam ad metatarsum venerit, in totum tendo fit, planus, crassius, eodem modo decurrens, desinensque.

Est *Decimus septimus pedis digitos moventium*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 60. *Tertius musculus digitis pedis inserviens*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 31. *Parvus musculus ad latus minimi*, Fallopp. Obs. an. post pedem moventes. *Musculus minimo digito abducendo dictatus*, Casser. Pentasth. Lib. I. Tab. 1. org. tact. Fig. 3.

<sup>e</sup> Eustach. Tab. xxxvi. A-y.

<sup>f</sup> Bidloo Tab. lxxxvi. Fig. 2. B.

<sup>g</sup> Eustach. Tab. xxxv. A-J. Bidloo

Tab. lxxxvi. Fig. 2. B. Cowper

Myot ann. 1724. Tab. lxiv. 188. L.

<sup>h</sup> Eustach. Tab. xxxvi. A-J.

<sup>a</sup> Vesal.

3. Declar. I. *Abductor minimi digiti*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 45. *Minimum abducens*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 28. *Abductor minimi digiti*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 36. *Abductor*, Dougl. Myogr. Cap. 45. *Abductor minimi digiti*, Cowp. Myot. ann. 1724. Cap. 36. *Le Metatarsien*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 647. & 1147. una cum eo, qui *le grand Parathenar*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 648. & seq. & 1149. & seq.

## CAPUT CCXXII.

*De Lumbricalibus pedis* <sup>a</sup>.

**H**i respondent Lumbricalibus manus : & fere toti totis. Par est in universum origo <sup>b</sup> à tendinibus Flexoris longi digitorum pedis, similis figura, idem ad digitos decursus, gemina tendinis <sup>c</sup> productio, qui & de caetero maxime similes. Verum in ortu, sineque, differentia quaedam. Primus oritur partim ab initio illius tendinis Flexoris longi, qui ad primum digitorum minorum pertinet ; partim à tendine, qui à Flexore pollicis longo ad illum primi accedit : secundus & tertius ex angulo quidem tendinum, ille primi & secundi digitorum minorum,

Hh hh 2

hic

<sup>a</sup> Vesal. de H. C. F. Lib. II. Tab. 14. <sup>μ</sup>. & c. Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 42. Fig. 3. F. F. F. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXIII. 187. & Tab. LXV. Fig. 2. 10. 10. 10.

<sup>b</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXIII. 187.

<sup>c</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 43. Fig. 3. G. G. G. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXIII. 187. h. h. h. h.

<sup>d</sup> Casser.

hic secundi & tertii ; sed ille maxime à tendine primi , hic secundi : quartus ab externo latere folius tertii tendinis , ubi ab eo primum secedit tendo quartus ; aliquando autem gracilis tendo à Flexore longo digitorum abscedens , abiit in hunc quartum Lumbricalem : quartus & portionem accipere <sup>d</sup> ab e-  
iusdem Flexoris capite in planta sito solet ; sicuti & aliquando accipiunt reliqui <sup>d</sup> : & qua à tendinibus il-  
lis oriuntur , aliquantum in superficie tendinosi sunt. Tendo eorum juxta radices digitorum se affigit tüber-  
culo ossis primi ordinis , quod est in inferiore parte lateris capitis ejus primi ; tenuioremque aponeurosem ,  
eamque ex angusta latefcentem , adjungit tendini Ex-  
tensoris longi digitorum. Cacterum agendi ratione respondent illis manus.

Sunt 19 , 20 , 21 , 22 , *pedis digitos moventium* ,  
Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 60. *Quatuor muscoli  
pedis digitis inservientes* , Columb. de re an. Lib. V.  
Cap. 31. *Extremi quatuor muscoli , quos inter motores  
digitorum pedis descripsit Vesalius* , Fallopp. Obs. an. post  
pedem moventes. *Lumbricales* , Riolan. Anthr. Lib.  
V. Cap. 44. *Flexores quatuor primi internodii* , Lumbric-  
cales , Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 26. *Lum-  
bricales* , Cowper Myot. Cap. 36. Dougl. Myogr. Cap.  
43. Morgagn. Adv. an. II. Anim. 20. *Les Lumbricaux  
des orteils* , Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 637.  
& seq. & 1145.

C A-

d Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. rv.  
Tab. 43. Fig. 1. O. Cowper My-

or. ann. 1714. Tab. LXVI. Fig.  
1. 6.

a Casser.

*De Flexore brevi pollicis pedis <sup>a</sup>.*

**F**lexor pollicis brevis ad hunc se habet modum. Caput non valde longum, à primo tendineum, tenue, latum satis; post carneum, sed à superiore ramen parte aliquandiu tendinosum, sensim crassius & latius, cito autem abeuns in caudas duas, circa plantae longitudinis medium incipit, & ab ima quidem parte ossis cuneiformis tertii, qua illa non longe à naviculari protuberans est; accipitque partem tendineam insignem à tendine Tibialis postici, & nonnunquam etiam aliam ab illa propagine aponeurosis imae plantae, quae interferta Abductoris pollicis & Flexori brevi digitorum: idemque interdum etiam oritur à priore parte eminentiae, quae in cubiformis imo, qua illa non multum distat à cuneiformi tertio; aliquando & à ligamentis, à cuneiformi tertio ad cubiforme deductis; aliquando à ligamento insigni, quod à calcaneo pertinet ad cubiforme. Caudae sensim graciliores, paullatim, verum modice, divergentes, ad postremum ab inferiore parte primum tendinosae, dein ipso fine fere totae tendineae, extenuataeque. Totus recta procedit ad pollicis initium, caudasque praecipue inserit ossibus sesamoideis <sup>b</sup>, quae apposita ad articulum pollicis cum metatarso: alteram inter-

Hh hh 3 no,

<sup>a</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. 1v. Tab. 43. Fig. 1. D.E. Bidloo Tab. LXXXVI. Fig. 2. A.C.C. Cowper

Myot. ann. 1724. Tab. LXIV. 180.  
<sup>b</sup> Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. LXIV. 180-E.E. sed obscure.

<sup>c</sup> Casser.

no, (sic vocatur, quod respicit pedem alterum) inferiori eidemque alterum pedem spectanti parti ejus; atque etiam proximae parti capitis primi ossis primi pollicis: alteram sesamoidei alterius parti posteriori. Pertinacissime autem connexae sunt cum capla articulum pollicis cum metatarso continente, qua secundum eam incedunt: illaque quae spectat pedem alterum, se ante finem suum conjungit in unum cum Abductore pollicis <sup>c</sup>, carne sua accedens ad superiorem partem tendinis ejus; altera cum ejusdem Adductore, antequam cum eo se conjungat, ab illa parte, qua ei adjacet, tendinosa. Hujus actione proprie quidem retrorsum trahuntur ossa sesamoidea, sed cum haec ad primum pollicis os alligata sint, sequitur hoc illa, flectiturque deorsum. Modice quoque dimovere posse videtur commissuras, quae inter ortum ejus finemque mediae.

Vide *Musculos primos articulos flectentes, qui tertium musculum in numero succedunt*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 60. *Decem musculos singulis digitis pedis binos inservientes*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 31. *Parvos musculos, quorum quatuor collocantur in planta*, Fallopp. Obs. an. post pedem moventes. *An Adducens pollicem, ossi pedis maximo intus attensus*, Sylv. Isag. Lib. II. Cap. 7? *Musculus flexioni pollicis consecratus*, Casser. Pentasth. Lib. I. Tab. 1. org. tact. Fig. 3. *Declar. K. Interosseus*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap.

c Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 41. Fig. 2. ad FF.

a Casser.

Cap. 28. *Flexor pollicis brevis*, Cowp. Myot. Cap. 35. *Flexor brevis*, Dougl. Myogr. Cap. 44. Pars ejus, qui *le Thenar*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 611. & seq. & 1139. una cum parte ejus, qui *l'Anti-thenar*, ibid. §. 615. & seq. & 1140.

## CAPUT CCXXIV.

*De Adductore pollicis pedis* <sup>a</sup>.

**P**roximus praecedenti Adductor à multis partibus partito in portiones aliquot principio oritur, quo dicitur ordine: à tuberculo, quod in ima parte ossis metatarsi quarti, juxta radicem capitis ejus primi: parte inferiore fere tota capitis primi ossis metatarsi tertii, & interdum etiam proxima secundi: priore parte vaginae Peronei longi tendinem in planta continentis, (quae est pars ligamenti à calcaneo per plantam usque ad metatarsum pertinentis) pone ortum à partibus modo dictis: tendine quodam Peronei longi, sed non semper, ut supra retulimus. Subtendineus est qua ab ossibus oritur, praecipuaque portio, quae ab osse tertio metatarsi: tendinosus, qua à vagina Peronei: aliquandiu tendinosus, qua exit è tendine Peronei. Porrectus inde ad pollicis initium, sensim angustior fit, & primo crassior, post tenuior, ad postremum gracilis, in fine tendineus: primumque ab inferiore parte sua tendineam naturam non longe à

<sup>a</sup> Casser. Tab. 2p. Spigel. Lib. 1v. Tab. 43. Fig. 1. C. Bidloo Tab.

LXXXVI. Fig. 2. D. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. LXIV. 181.  
b Cowp.

à fine suo assumere incipit. Extremo se suo conjungit cum Flexore pollicis brevi, & cum Transverso pedis : inserit autem posteriori & eidem inferiori & digitum secundum spectanti parti ossis sesamoïdei <sup>b</sup> pollicis, quod è duobus ejus vicinius digito secundo ; ulteriusque per inferiora ejusdem sesamoïdei procurrit, ac post confluit in unum cum ligamento, quo sesamoïdeum illud ossi primo pollicis alligatum, cum eoque pergit ad inferiorem partem illius lateris capituli primi, quod modo diximus ossis, quo id digitum secundum respicit, non multum ultra primum illius capituli marginem : aliquando non sesamoïdeo, sed soli pollicis primo ; quod deorsum flectit, & oblique simul digitum secundum versus. Os quoque metatarsi pollicis deorsum simul & extrorsum flectere videtur, sed modo perparum.

Vide *Musculos primos articulos flectentes, qui tertium musculum in numero succedunt*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 60. *Decem musculos singulis digitis pedis binos inservientes*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 31. *Parvos musculos, quorum quatuor collocantur in planta*, Fallopp. Obs. an. post pedem moventes. An huc pertinent *Musculi in pedio ab ipsius ossibus orti*, Sylv. Ifag. Lib. II. Cap. 7 ? Est *Alius musculus transversus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 45. aut pars ejus. *Interosseus*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 28. *Interosseus ad indicem pertingens*, Bucret. Expl. Tab. Casser. ap.

<sup>b</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXIV. 181. C. sed obscurius.

<sup>a</sup> Casser.

ap. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Tab. XLIII. Fig. 1. C. *Adductor pollicis*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 35. *Adductor*, Dougl. Myogr. Cap. 44. *Adductor pollicis*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 35. Pars ejus, qui *P. Antithenar*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 615. & seq. & 1140.

## CAPUT CCXXV.

*De Transverso pedis.\**

Cum caeteri in planta siti omnes per ejus longitudinem incedant, hic solus fere per transversum, secundum condylos metatarsi. Alias nascentem vidit è capsis, quibus continetur articulus digiti quinti cum metatarso, illeque quarti, qua plantam hae capsae respiciunt: alias lata tendinea tenuitate partim orientem ab osse metatarsi quinto, mox pone caput ejus prius; partim exeuntem è propagine aponeurosis plantae, quae ibidem inserta ossi eidem: alias & portionem accipientem ab aponeurosi, qua contextus Abductor minimi. Inveni in fine conjunctum cum Adductore pollicis, atque eidem etiam, cui ille, ossi sesamoideo, eidemque parti ejus, cumque eo ipso Adductore affixum. In aliis conjunctum cum ligamento, quod à sesamoideo illo pertinet ad os primum pollicis, cum eoque insertum. Latius ei principium, & praetenue, ac tendinosum: sensim con-

I i i trahit

a Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 43. Fig. 1. I. K. L. Bidloo Tab.

LXXXVI. Fig. 2. E. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXIV. 189.

a Casser.



trahit se in angustum, primo sensim crassior, dein tenuior, tenuiorque: extremum est tendo gracilis, à cujus superiore parte vidi tenuem abscedentem aponeurosem, adjungentem se capsae articuli pollicis cum suo osse metatarsi. Priorem illam plantae partem, per quam incedit, facit ex transverso in terram concavam, pollicem ad digitos postremos, atque hos vicissim ad illum attrahens.

Est *Novus* musculus: *Julius Placentinus Patavinus Chir. & Anat. insignis primus de hoc ad nos scripsit*, Bauhin. Anat. corp. vir. & mul. hist. p. 205. *Decimus tertius digitorum pedis*, Bauhin. Theat. an. Lib. IV. Cap. 34. *Musculus transversus*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 45. *Transversalis Casserii*, Bucret. Expl. Casser. Tab. ap. Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Tab. XLII. Fig. 1. IKL. *Transversalis pedis*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 36. *Transversalis pedis Jul. Cass. Placent.* Dougl. Myogr. Cap. 46. *Transversalis*, Morgagn. Adv. an. II. Anim. 20. *Transversalis pedis*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 36. *Le Transversal des orteils*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 640. & seq. & 1146.

## C A P U T CCXXVI.

*De Flexore brevi digiti minimi pedis<sup>a</sup>.*

**F**lexorem brevem proprium digito minimo dedie natura, qualem negavit reliquis parvis. Flectit autem

<sup>a</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. IV. Tab. 42. Fig. 7. H. infer. Bidloo Tab. LXXXVI. Fig. 2. A. prima ab

externo latere pedis. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXIV. 193.

<sup>b</sup> Cowp.

autem primum ejus os, & quidem deorsum. Ad quod procedit à media inferiore parte radicis capitis primi ossis metatarsi quinti, & ab ejusdem ossis margine externo, spectante inferiora: pars quoque abscedit à vagina, quae tendinem Peronei longi in planta continet; à qua aliquando totus: aliquando non ab ea, sed ab illa aponeurosi, qua diximus vestitum Abductoris minimi. Nec eodem deinde se semper habet modo, nisi quod à principio fere tendineus sit qua ab osse oritur, caeterum plane tendineus; carneus inde, diu tamen tendinosus qua adjacet ossi metatarsi; sensim crassior. Plerumque autem findit se in partes duas, quarum altera insignior est, primumque paulatim increscit, post decrescit, abitque in extremum tendineum<sup>b</sup>; ab exteriori parte citius incipiens, quod capsulae articulum digiti minimi cum metatarso complectenti, juxta quam procedit, pertinaciter adnectit, posteaque inserit imae parti capitis primi ossis primi: altera minor, tenuior, latior quam crassior, vergit aliquantum extrorsum, & tenui se fine per latum digitum inserit exteriori margini amplitudinis inferioris ossis metatarsi quinti, mox pone caput ejus prius.

Vide *Musculos primos articulos flectentes, qui tertium musculum in numero succedunt*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 60. *Decem musculos singulis digitis pedis binos inservientes*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 31. Par-

I i i i 2

vos

<sup>b</sup> Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXIV. 150. juxta M.

<sup>a</sup> Gasser.

vos *músculos*, quorum quatuor collocantur in planta, Fallopp. Obs. an. post pedem moventes. Est *Músculus minimus digitum extrorsum inflectens*, Casser. Pentaesth. Lib. I. Tab. 1. org. tact. Fig. 3. Declar. G. *Interosseus*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 28. *Flexor primi ossis minimi digiti*, Cowp. Myot. ann. 1694. Cap. 36. post Transversalem pedis. *Flexor primi internodii minimi digiti*, Dougl. Myogr. Cap. 45. *Flexor primi internodii minimi digiti proprius*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 36. *Le petit Parathénar*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 650. & seq. & 1149. & seq.

## C A P U T CCXXVII.

*De Interosseis internis pedis.*

**E**x septem pedis Interosseis tres interni sunt, nisi quis appellare malit inferiores: quatuor externi, ex eo, quod extrinsecus etiam in pedis dorso appareant, appellati; qui superiores dici possent. De internis est hoc capite agendum, qui sunt primus, id est, à parte pollicis locatus, digiti tertii<sup>a</sup>, primusque quarti<sup>b</sup>, idemque quinti<sup>c</sup>. Eorum magna unitas, similis

a Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. 1v. Tab. 43. Fig. 2. C. tertii: & Fig. 2. F. tertii. Bidloo Tab. LXXXVI. Fig. 3. A. tertii in situ. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXVI. Fig. 2. 191: & Tab. LXIV. 191. *medii digiti alter*.

b Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. 1v. Tab. 43. Fig. 2. C. quarti: & Fig. 2. F. quarti. Bidloo Tab. LXXXVI. Fig. 3. A. quarti in situ. Cowper My-

ot. ann. 1724. Tab. LXVI. Fig. 2. 191: & Tab. LXIV. 191. *medii proximi alter*.

c Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. 1v. Tab. 43. Fig. 2. C. quinti: & Fig. 3. F. quinti. Bidloo Tab. LXXXVI. Fig. 3. A. quinti in situ. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXVI. Fig. 2. 191: & Tab. LXIV. 191. *minimi digiti alter*.

a Cas-

milis oriendi modus, similis venter, finis, decursus, actio. A primo autem initio tenues, angusti, tendinosi; post sensim crassiores & latiores, dein sensim graciliores: & jam cito ab eadem omnes parte tendinem inchoant, id est, ab ea, quam pollicis metatarso obvertunt. Tendo omnibus satis longus, planus. Omnes à metatarso in priora procedunt ad initia digitorum, ubi quisque ad sui digiti os primum desinit, ad illud latus capitis ejus primi, quo id pollicem spectat; & ad ejus quidem lateris partem inferiorem, proxime finem Lumbricalis: & dum tendine suo praetereunt capfas articulorum cum metatarso, cum iis cum connectunt quam pertinacissime. Dant etiam aponeurosem antequam finiant, quae se cum illa Lumbricalis conjungit, & adjungit Extensorum tendini. Oritur autem primus tertii à posteriore parte marginis inferioris illius lateris ossis metatarsi tertii, quo respicit pollicem: primus quarti ab eadem parte ossis quarti: ille quinti, ab eadem quinti. Primum praeterea duorum posteriorum initium est à vagina, per quam tendo Peronei longi in planta decurrit: illius etiam, qui est minimi, interdum praeterea ab aponeurosi, vestiente minimi illius Abductorem: & primus etiam quarti aliquando insuper accepit portionem à propagine aponeurosis, quae per ima plantae porrecta. Digtos flectunt pollicem versus simulque aliquantum in inferiora: flectunt autem articulum eorum cum metatarso.

Vide *Musculos primos articulos flectentes, qui tertium*  
*li ii 3 musculum*

*musculum in numero succedunt*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 60. *Decem musculos singulis digitis pedis binos insertientes*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 31. *Parvos musculos, quorum quatuor collocantur in planta*, Fallopp. Obsl. anat. post pedem moventes. Sunt *Interossei interni*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 44. *Interossei*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 28. *Interossei pedis*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 36. *Interossei*, Dougl. Myogr. Cap. 43. *Interossei pedis*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 36. *Les Interosseux inferieurs du pied*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 643. 646. & 1146.

## C A P U T CCXXXVIII.

*De Interosseis externis pedis.*

**E**xterni sunt primus secundi digiti <sup>a</sup>, secundus ejusdem <sup>b</sup>, secundus tertii <sup>c</sup>, secundus quarti <sup>d</sup>.  
Quorum

<sup>a</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 43. Fig. 2. D. super. digiti secundi: & Fig. 3. F. secundi: & Tab. 30. Fig. 3. I. prima à pollice. Bidloo Tab. LXXXII. primus à pollice. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. LXVI. Fig. 2. 191: & Tab. LXIV. 191. pollicis proximi alter.

<sup>b</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 43. Fig. 2. D. infer. secundi: & Fig. 3. G. secundi: & Tab. 30. Fig. 3. I. secunda à pollice. Bidloo Tab. LXXXII. secundus à pollice. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXVI. Fig. 2. 191: & Tab. LXIV. 191. pollicis proximi alter.

<sup>c</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv.

Tab. 43. Fig. 2. D. tertii: & Fig. 3. G. tertii: & Tab. 30. Fig. 3. I. tertia à pollice. Bidloo Tab. LXXXVI. Fig. 3. A. tertii extra situm: & Tab. LXXXII. tertius à pollice. Cowper Myot. ann. 1724. Tab. LXVI. Fig. 2. 191: & Tab. LXIV. 191. medii digiti alter.

<sup>d</sup> Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. iv. Tab. 43. Fig. 2. D. quarti: & Fig. 3. G. quarti: & Tab. 30. Fig. 3. I. quarta à pollice. Bidl. Tab. LXXXVI. Fig. 3. A. quarti extra situm: & Tab. LXXXII. quartus à pollice. Cowp. Myot. ann. 1724. Tab. LXVI. Fig. 2. 191: & Tab. LXIV. 191. medii proximi alter.

c Ut

Quorum tres posteriores inter se similes sunt, similefque externorum manus, bicipites, oriens quisque à duobus<sup>e</sup> metatarsi ossibus, capitum altero, & eo praecipuo, satis similes internis Interosseis, alterum habentes tenue planiusque, utrumque ab initio subtendineum, capitumque suorum fibras conjungentes ad angulos acutos<sup>e</sup>, procedentesque ad digitos, abeuntisque in tendinem. Tendines autem similes tendinum Interoscorum internorum pedis, sed crassiores & latiores, caeterum eodem modo digitis inserti, sed ab altero latere; hoc est, minimum spectante, in eoque parti eidem atque ab altero latere interni, pertinacissime quoque capsis articulos digitorum cum metatarso continentibus adnexi, dum juxta eas incedunt. Crassius caput secundi digiti secundi, oritur à plusquam dimidia posteriore parte medii lateris ossis metatarsi tertii, quo respicit secundum: tenuius, à posteriore parte lateris ossis metatarsi secundi, quo tertium respicit, & quidem ab inferiore margine eminentiae oblongae, quae per latus illud porrecta. Crassius secundi digiti tertii, ab inferiore parte radice capitis primi ossis metatarsi quarti, continuoque inferre à plusquam dimidia parte longitudinis lateris, quo os illud respicit tertium: tenuius à posteriore parte marginis inferioris lateris ossis metatarsi tertii, quarto obversi. Crassius secundi digiti quarti, à plusquam dimidia posteriore parte lateris ossis metatarsi quinti, quod est è regione quarti: tenuius à posteriore parte marginis inferioris ossis metatarsi quarti, quo respi-

<sup>e</sup> Ut Bidloo Tab. LXXXII. secundus à pollice.

respicit quintum. Ad haec fit, ut secundus digiti tertii accipiat portionem à propagine aponeurosis, quae in plantae imo: & ut secundus quarti primo initio à vagina Peronei longi abscedat; & accipiat portionem ab aponeurosi, quae investit Abductorem minimi. Primus digiti secundi à superioribus hoc differt, quod persimilis sit internorum pedis, & à solo metatarsi secundo osse oriatur, à posteriore plus quam dimidia parte illius lateris, quo primum spectat; ac praeterea à principio accipiat tenuem tendineam portionem à Peronei longi tendine; inque tendinem abeat, ut interni; eorumque ad exemplum, eidem etiam ossis primi digiti secundi parti, se juxta Lumbricalem inferat; & ante finem quoque det aponeurosem, qualem interni, eodem se modo adjuagentem Extensorum tendini. Atque hic digitum secundum flectit pollicem versus, simulque deorsum, ut interni pedis: tres autem reliqui suum quisque digitum pari quidem modo deorsum flectunt, sed simul à pollice abducunt.

Vide *Musculos primos articulos flectentes, qui tertium musculum in numero succedunt*, Vesal. de H. C. F. Lib. II. Cap. 60. *Decem musculos singulis digitis pedum binos inservientes*, Columb. de re an. Lib. V. Cap. 31. *Sunt Parvi muscoli, quorum quatuor collocantur inter media ossa pedii*, Fallopp. Obs. an. post pedem moventes. *Interossei externi*, Riolan. Anthr. Lib. V. Cap. 44. *Interossei*, Spigel. de H. C. F. Lib. IV. Cap. 28. *Interossei pedis*, Cowper Myot. ann. 1694. Cap. 36. *Interossei*,

*terosseï*, Dougl. Myogr. Cap. 43. *Interosseï pedis*, Cowper Myot. ann. 1724. Cap. 36. *Les Interosseux superieurs du pied*, Winsl. Exp. an. Trait. des muscl. §. 643. 644. 645. & 1146.

## CAPUT CCXXIX.

*De vaginis tendineis artuum.*

**H**aec postquam tractavimus, potest videri necessarium quaedam de vaginis tendineis artuum, quae musculos complectuntur, addere; quoniam ea, quae de iis memoravimus, per plura capita dispersa sunt, & quaedam etiam in transcurso tantum attigimus. Itaque dispersa colligemus, obiterque indicata exponemus paullo plenius, & cum cura quidem, sed tamen breviter & summatim: neque enim putamus necesse esse, ut haec diligentiore subtilitate examinamus.

Scapulae incumbentes musculos extrinsecus sub communibus corporis totius integumentis vestit aponeurosis tenuis, contegens Deltoïdem, nudamque partem Infraspinati, & Teretis minoris: & inter eos quoque propagines immittit, quibus reliqua eorum obducta. Similis ab interiore parte scapulae vestit Subscapularem, Teretem minorem, majorisque partem interiorem una cum tendine Latissimi dorsi: pariterque propagines inter eos immittit. Conjunctae autem circa brachium, vaginam efformant, quae brachium ad cubitum usque circumcirca complectitur, partemque accipit ab inferiore parte tendinis Latissimi

K k k k

dorsi,



dorsi, itemque à Pectoralis, & Serrati antici, qua secundum axillam decurrunt. Haec quoque propagines interferit musculis ossi humeri circumpositis. Procurritque ad cubitum, ubi rursus portiones accipit, à Bicipite brachii, Brachiali interno, tendine Tricipitis brachii, ut in illis annotavimus. Vestitque in cubito tum vaginam tendineam, quam producit commune caput tendineum, quod à condylo priore ossis humeri oritur; descriptam in Extensore communi digitorum manus: tum illam, quam simile caput, quod à condylo posteriore, una cum aponeurosi, quae à posteriore parte olecrani, spinaque ulnae oritur; de qua vagina in Ulnari interno dictum: tum musculos, qui inter fines duarum illarum vaginarum in interiore parte cubiti nudi ab iis; atque ibi etiam tenues propagines eis interferit, nempe Pronatori tereti & Supinatori longo, huic & Radiali externo longiori, huic & breviori; ac deinde etiam intus illis musculis, qui in exteriori parte cubiti siti sunt. Quin etiam infra à cubito per dorsum manus, digitorumque procurrit tenuis aponeurosis, quae quadam vaginalium facie complectitur tendines.

In pede primum vagina natis atque femoris, de qua in illo capite, quod de Gluteo magno scripsimus. Haec à femore ad crus decurrit, augeturque portionibus, à Bicipite cruris, Vasto interno, Sartorio, Gracili, Semitendinoso, ut in eorum historia legi potuit. Se autem partim adjungit exteriori parti vaginae crassae, quam externam cruris partem ambire diximus in Peroneo longo: de caetero ambit postero-

ra,

ra , atque interiora cruris , adhaerens tibiae lateri interno , juxta spinam ejus priorem. Quaedam praeter ea aponeurosis subjecta Soleo tendinique achillis , convellitque Flexorem pollicis longum , Tibialem posticum , Flexorem longum digitorum ; propaginesque inter eos immittit : atque ita aliquando se implicat eis , ut ex parte accedat ad Flexorem digitorum , & Tibialem posticum. Per dorsum quoque pedis extremi aponeurosis excurrit , qualis per dorsum manus.

## CAPUT CCXXX.

*Icones , earumque Explanationes.*

Auderemne musculorum icones quasdam novas hic adjicere , posteaquam iis tantummodo , quae exstent , usurum me scripsi , etiamnum dubitarem , nisi jam ad eas te , Lector , in hoc libro subinde relegassem , praestetque , cum alterutro modo peccandum mihi sit , adjiciendo peccare , quam omitendo. Indicaturus icones exstantes eorum musculorum , qui in manu siti sunt , tam multum in iis desiderari animadvertēbam , ut tunc putaverim , eas saltem , quas de illis musculis paratas habebam , esse addendas ; coque animo mentionem earum fecerim , ubicumque res poscebat. Neque poteram opportunius mei periculum in his facere. Ego quidem sic existimo , eos , qui icones proferre suscipiunt , debere primum omnia quam exquisitissime eruere , ac deinde nulla ex parte , neque in figura , neque in situ , neque in cohae-

Kk kk 2

sione

sione depravata exhibere ordine idoneo , iconibus certis & perspicuis : plus autem praestare , si simul addere iconibus possint artificium & elegantiam , tum quod attineat ad finientes lineas rerum , tum quod ad umbras , tum quod ad naturam , habitumque cujusque partis. Quod quidem hisce, quas do , videor esse consecutus. Si tibi quoque videbor , non poenitebit me curae , quam posui tum in eruendo , tum in disponendo , tum in ducenda manu artificis : tuque habe *Joanni Wandelaar* , artificis , cui in hoc genere nulla aetas parem tulit , quam meritus est , gratiam ; ejus quippe consecutus sum peritia , manu , attentione , patientia. Exhibeo autem manus icones quatuor , easque naturalis magnitudinis , ductas ex viro , cui partes non modo secundum naturam formatae erant , sed etiam pulchriores , quam quales esse solent : atque in iis eos tantum musculos , qui proprie in manu siti ; extremaque aliquot tendinum è cubito venientium , ac Lumbricalium. Earum tres primae sunt interioris manus partis , quarta exterioris. In prima demti tendines Sublimis , Profundi cum Lumbricalibus , Flexoris pollicis longi , Radialis interni , Extensorum pollicis , praeter extrema aliquot eorum : in secunda praeterea Abductor brevis pollicis , Flexor ejusdem brevis , Adductorque , Flexor parvus minimi , Abductor ejusdem , extremi tendines Extensorum pollicis , illeque Lumbricalis primi , ac ligamenta , quibus tendines Sublimis & Profundi in digito obducti : in tertia praeterea Opponens pollicis , Adductor metacarpi minimi , ligamentum carpi interius , ligamentum ab osse

se subrotundo ad metacarpi quartum deductum ; Abductor indicis , Interosseus posterior indicis , prior tertii cum tendine Lumbricalis , tendo Profundi per digitum tertium decurrens. In quarta demti tendines Extensorum pollicis , digitorum communis , proprii digiti minimi , Indicatoris , omnes truncati juxta pollicem digitoque. Neque minor cura fuit ossa , ubicunque appareant , quam musculos exprimere , efficeretque , ut nihil in totis iconibus sit obscuri , aut dubii. Cuique autem iconi linearem addidi , cui notas inscripsi ; quo cavere volui , ne ipsae icones notis illis necessariis oppressae , elegantiae suae multum amitterent ; simulque efficere , ut notae facilius inveniuntur , nullis obscuratae umbris ; & ipsae notabiliores partes , solis extremis lineis in linearibus iconibus definitae , apparerent manifestius. Sequuntur icones ipsae , earumque explanationes breves.

## EXPLANATIO ICONIS I.


- A Ligamentum carpi , quod cum sinu carpi canalem efficit , qui continet , & coercet tendines à cubito ad digitos , pollicemque procedentes , Sublimis , Profundi , Flexoris longi pollicis.  
 a hac parte ligamentum illud affixum ossi subrotundo :  
 b hac naviculari :  
 c hac multangulo majori.  
 B Canalis , per quem transit tendo Radialis interni.  
 C Abductor digiti minimi manus.  
 d origo ejus ab osse subrotundo :  
 e à ligamento carpi.  
 D Flexor parvus digiti minimi manus.  
 f origo ejus à ligamento carpi.  
 g tendo , qui ei communis cum Abductore digiti minimi.

Kk kk 3


EE Ad.

# 630 HISTORIAE MUSCULORUM

- EE** *Adductor ossis metacarpi digiti minimi, qui hic testus Flexore parvo D. & Abductore C. sequente icona nudus.*
- F** *Abductor brevis pollicis manus.*
- h** *ejus crigo à ligamento carpi.*
- i** *pars extremi tendinei, inserti ossi primo pollicis.*
- k** *tendinea temitas, qua descendit dorsum pollicis, & coit cum priore parte tendinum Extensorum pollicis, porroque se per exteriora eorundem tendinum continuat simili aponeurosi Flexoris brevis pollicis.*
- G** *Opponens pollicis manus, qui hic testus Abductore F. & Flexore K. sequenti icona nudus.*
- H** *Tendo Extensoris minoris pollicis manus, truncatus.*
- I** *Tendo communis Extensorum pollicis, ad ultimum pollicis os pertinens.*
- KL** *Flexor brevis pollicis manus.*
- Km** *ejus cauda prior, vel exterior.*
- Ln** *cauda posterior, vel interior.*
- l** *pars, quae oritur à ligamento carpi, ex parte testis Abductore F.*
- m** *caudae prioris extremum tendinosum, insertum ossi primo pollicis. Pars ejus, quae inserta ossi sesamoideo, subjacet extremo modo dicto.*
- no** *caudae posterioris extremum tendinosum.*
- n** *pars ejus, quae inserta ossi sesamoideo:*
- o** *pars, quae ossi primo pollicis.*
- M** *Adductor pollicis manus, cujus partem tegit Flexor brevis L. partem Interosseus posterior medii Q.*
- p** *pars principii, quo oritur à metacarpo medii.*
- N** *Interosseus prior digiti auricularis, hic magnam partem testus Adductore EE. nudus icona tertia.*
- O** *Interosseus posterior digiti annularis, & ipse testus eodem Adductore EE. maximam partem nudus icona tertia.*
- q** *tendo ejus, quo, conjuncto cum tendine Extensoris communis digitorum, pertinet ad os tertium.*
- P** *Interosseus prior digiti auricularis, hic ex parte testus Flexore D. nudus ab eo in icona secunda.*
- Q** *Interosseus posterior medii, hic testus Interosseo P. & Flexore L. nudus icona tertia.*
- r** *tendo ejus, quo conjungit se cum tendine Extensoris communis digitorum,*







LIBRARY  
OF THE  
MUSEUM OF  
COMPARATIVE ZOOLOGY  
HARVARD UNIVERSITY  
CAMBRIDGE, MASS.






gitorum, pertinetque ad tertium os.

- R Interossus prior medii, testus Adductore M. nudus icone tertia.  
 S Interossus posterior indicis, testus Adductore M. nudus icone secunda.  
 s ejus tendo, quo ad os tertium pertinet, postquam conjunxit eum cum tendine communi Extensorum indicis.  
 T Interossus prior indicis, testus Adductore M. & Abductore V. nudus icone tertia.  
 V Abductor indicis, testus Adductore M. majorem partem nudus icone secunda.  
 t extremum ejus tendineum, quo  
 u insertus ossi primo indicis.  
 W Lumbricalis primi tendo, truncatus, qui se conjungit cum communi tendine Extensorum indicis, & dein ad os tertium pertinet.  
 X Lumbricalis secundi tendo, truncatus, qui se conjungit cum tendine Interossei R. cum eoque efficit  
 Y communem tendinem, ad os tertium pertinentem, postquam se conjunxit cum tendine Extensoris communis.  
 Z Lumbricalis tertii tendo, truncatus, qui se adjungit tendini Interossei P. unde  
 Γ communis tendo, conjungens se cum tendine Extensoris communis, & dein ad os tertium pertinens.  
 Δ Lumbricalis quarti tendo, truncatus, qui adjungit se tendini Interossei N. ex quo  
 Θ tendo communis, conjungens se cum Extensoris proprii auricularis tendine, posteaque pertinet ad os tertium.  
 A Ligamentum, quo tendines flexorum, id est, Sublimis & Profundi, quae secundum os primi ordinis incedunt, obducti,  
 aaaa utrique margini ossis primi affixum.  
 zzzz Tendo Profundi, in principio digiti truncatus, ubi & subiectus tendini Sublimis Π.  
 rrr nota quaedam divisionis.  
 γ extremum tendinis, insertum ossi tertio.  
 Π Tendo Sublimis, truncatus, atque hic testus ligamento Λ. nudus ab eo in icone secunda.  
 Σφ caudae duae, in quas se findit Sublimis tendo, hic testae ligamenti Λ. & Υ. nuda ab iis in icone secunda.  
 υ Ligamentum, quo tendo Profundi, extremaeque caudae tendinis Subli-


*Sublimis, circa mediam longitudinem ossis secundi obducta:  
dd quod ligamentum affixum utrique ossis illius margini.*

## EXPLANATIO ICONIS II.

- A *Ligamentum carpi idem, quod icon. I. A:*  
 a *hac parte ossi subrotundo affixum:*  
 b *hac, processui incurvo cuneiformis:*  
 c *hac, naviculari:*  
 d *hac, multangulo majori.*  
 B *Canalis, per quem transit tendo Radialis interni.*  
 C *Ligamentum, quod ab osse subrotundo pertinet ad metacarpi manus quartum: idemque parva parte sui conspicuum icon. I:*  
 e *hac parte affixum ossi subrotundo.*  
 D *Adductor ossis metacarpi digiti minimi.*  
 f *origo ejus à processu incurvo ossis cuneiformis:*  
 g *à ligamento carpi.*  
 hh *hac parte insertus ossi metacarpi minimi.*  
 E *Opponens pollicis manus,*  
 ii *origo ejus à ligamento carpi:*  
 k *ab osse multangulo majore.*  
 l *pars, quae nuda ab Abductore brevi pollicis, icon. I. G.*  
 m *extremum insertum metacarpo pollicis.*  
 F *Abductor indicis, ex parte telus Opponente E.*  
 n *ejus extremum tendineum,*  
 o *insertum ossi primo indicis.*  
 G *Interosseus prior indicis, telus Abductore F. & Opponente E. nudus icon. tertia.*  
 H *Interosseus posterior indicis.*  
 p *origo ejus à metacarpo indicis.*  
 q *tendo, quo se conjungit cum tendine communi Extensorum indicis, ac deinde ad os tertium pertinet.*  
 I *Interosseus prior medii, telus Interosseo H. liber ab eo icon. tertia.*  
 rr *origo ejus à metacarpo medii.*  
 s *ejusdem extremum tendineum.*  
 K *Interosseus posterior medii, telus Interosseo L. nudus icon. tertia.*  
 tt *origo*









- et origo ejus à metacarpo medii.  
 u tenao, quo, posteaquam cum conjunxit cum tendine Extensoris communis, pertinet ad os tertium.  
 L Interossius prior digiti annularis, ex parte testus Adductore D.  
 w ejus origo ab osse metacarpi annularis.  
 x ejusdem extremum tendineum.  
 M Interossius posterior annularis, testus Adductore D. & Interosseo N. icone tertia nudus ab Adductore.  
 y tendo ejus, quem cum tendine Extensoris communis conjungit, postea pertinet eo ad os tertium.  
 N Interosseus prior digiti minimi, testus Adductore D. nudus icone tertia.  
 O Lumbricalis quarti tendo, truncatus, qui conjungit se cum tendine Interossei N. & cum eo efficit  
 P tendinem communem, qui se cum tendine Extensoris proprii auricularis conjungit, ac dein pertinet ad os tertium.  
 Q Lumbricalis tertii tendo, truncatus, qui cum tendine Interossei L. cui se adjungit, efficit  
 R tendinem communem, conjungentem se cum tendine Extensoris communis, & ad os tertium decurrentem.  
 S Lumbricalis secundi tendo, truncatus, qui se adjungit tendini Interossei I. efficitque cum eo  
 T tendinem communem, qui conjungit se cum tendine Extensoris communis, decurritque ad os tertium.  
 V Tendo Sublimis, truncatus.  
 z nota quaedam divisionis.  
 WX Caudae duae, in quas Sublimis tendo sese findit, hic ex parte testae tendine Profundi Y. nudae icone tertia;  
 ab hic autem insertae ossi secundo.  
 YY Tendo Profundi, in principio digiti truncatus, & subjectus tendini Sublimis.  
 yy divisionis quaedam nota.  
 d extremum tendinis, insertum ossi tertio.

## EXPLANATIO ICONIS III.

- A Interosseus prior digiti minimi.  
 ab origo ejus ab osse metacarpi minimi.

L III


c ejus-



- c *eiusdem extremum tendineum.*  
 B *Interosseus posterior digiti annularis, ex parte tectus Interosseo A.*  
 de *origo ejus à metacarpo annularis.*  
 f *tendo, quo se conjungit cum tendine Extensoris communis, decurritque ad os tertium.*  
 CD *Interosseus posterior medii.*  
 C *pars ejus, quae oritur ab osse metacarpi annularis:*  
 D *pars, quae à medii.*  
 gh *origo à medii metacarpo:*  
 i *tendo, quo se cum tendine Extensoris communis conjungit, decurritque ad os tertium.*  
 EF *Interosseus prior medii.*  
 E *pars ejus, quae oritur à metacarpo medii.*  
 kl *ipsa ejus origo.*  
 F *pars, quae à metacarpo indicis.*  
 m *extremum tendineum.*  
 G *Interosseus prior indicis.*  
 no *origo ejus ab osse metacarpi indicis.*  
 p *extremum tendineum,*  
 q *insertum ossi primo indicis.*  
 H *Lumbricalis secundi tendo, truncatus, qui adjunctus tendini Interossei EF efficit cum eo*  
 I *tendinem communem, conjungentem se cum tendine Extensoris communis, & decurrentem ad os tertium.*  
 K *Lumbricalis quarti tendo, truncatus: & adjungit se tendini Interossei A ac cum eo efficit*  
 L *tendinem communem, qui se cum Extensoris proprii anicularis tendine conjungit, decurritque ad os tertium.*  
 M *Tendo Sublimis truncatus.*  
 r *quaedam divisionis nota.*  
 NO *Caudae duce, in quas Sublimis tendo se findit.*  
 P *pars, quam emittunt, quaque cohaerent inter se.*  
 QR *extrema caudarum; ultra partem illam, qua cohaerent inter se:*  
 ss *pars illa, qua adjacentem tendinem Profundi contingunt.*  
 tu *ultima caudarum extrema, inserta ossi secundo.*


## RELIQUA EXPLANATIO ICONIS I. II. III.


- i *Os subrotundum.*





Icon III. *eye*





- 2 *Os triquetrum.*
- 3 *triquetri pars, quae cum cubito committitur, cartilagine laevi crustata.*
- 4 *eiusdem margo cartilagine eadem crustatus.*
- 5 *Os lunatum.*
- 6 *ejus margo cartilagine laevi crustatus.*
- 7 *eiusdem tuber, quo cum cubito committitur, laevi cartilagine crustatum.*
- 8 *Os naviculare.*
- 9 *margo ejus cartilagine laevi crustatus.*
- 10 *eiusdem tuber, quo committitur cum cubito, laevi cartilaginea crusta opertum.*
- 11 *eiusdem margo crustatus laevi cartilagine.*
- 12 *Os multangulum majus.*
- 13 *ejus margo cartilagine laevi crustatus.*
- 14 *eiusdem sinus, per quem incedit tendo Radialis interni.*
- 15 16 *eiusdem margines crustati cartilagine laevi.*
- 17 *Os multangulum minus.*
- 18 19 *margines ejus crustati cartilagine laevi.*
- 20 *Os capitatum.*
- 21 21 *caput ejus, crusta cartilaginea laevi intectum.*
- 22 *eiusdem margo, crustatus cartilagine laevi.*
- 23 *Os cuneiforme.*
- 24 *margo ejus, cartilagine laevi crustatus.*
- 25 *eiusdem processus incurvus.*
- 26 26 *eiusdem superficies, qua, laevi crustata cartilagine, committitur cum triquetra & lunata.*
- 27 *eiusdem margo, crustatus cartilagine laevi.*
- 28 *Os metacarpi digiti minimi.*
- 29 30 *margines ejus, cartilagine laevi crustati.*
- 31 *eiusdem caput inferius, laevi crusta cartilaginea opertum.*
- 32 *Ossiculum sesamoideum, quod in quibusdam invenitur.*
- 33 *Os metacarpi tertii digiti.*
- 34 35 36 *ejus margines, crustati cartilagine laevi.*
- 37 *eiusdem caput inferius, crusta cartilaginea laevi opertum.*
- 38 38 *Os metacarpi medii.*
- 39 40 41 *ejus margines, cartilagine laevi crustati.*
- 42 *eiusdem caput inferius, crusta opertum cartilagine laevi.*


## 642 HISTORIAE MUSCULORUM

- 43 *Os metacarpi indicis.*  
 44 45 *ejus margines, in crustati cartilagine laevi.*  
 46 46 *ejusdem caput inferius, crusta cartilaginea laevi interfectum.*  
 47 *Officulum sesamoideum, in aliquibus observatum.*  
 48 48 48 48 *Digitorum ossa secundi ordinis.*  
 49 49 49 49 *eorum margo, cartilagine laevi crustatus.*  
 50 50 *Ec. eorundem asperae eminentiae, quibus affixum ligamentum A. icon. I.*  
 51 *Ec. eorundem capita inferiora, qua parte committuntur cum ossibus secundi ordinis, laevi cartilagine crustata.*  
 52 52 52 52 *Digitorum ossa tertii ordinis.*  
 53 *Ec. eorum margo, crustatus cartilagine laevi.*  
 54 54 *Ec. eorundem eminentiae inaequabiles, quibus affixum ligamentum V. icon. I.*  
 55 *Ec. eorundem capita inferiora, qua cum ossibus tertii ordinis committuntur parte, laevi cartilaginea crusta aperta.*  
 56 56 56 56 *Digitorum ossa tertii ordinis.*  
 57 *Ec. eorum margo, laevi crustatus cartilagine.*  
 58 *Ec. eorundem eminentia inaequalis, cui insertus tendo Profundi.*  
 59 *eorundem extremum tuber, ex interiore parte inaequabile.*  
 60 *Os metacarpi pollicis.*  
 61 *margo ejus, qui laevi cartilagine crustatus.*  
 62 63 *ejusdem capitis inferioris pars laevi cartilagine crustata, & in duas distincta superficies, cum quibus committuntur ossicula sesamoidea.*  
 64 65 *Ossicula sesamoidea.*  
 66 *Os primum pollicis.*  
 67 *margo ejus, cartilagine laevi crustatus.*  
 68 *ejusdem ossis capitis inferioris pars, quae laevi cartilaginea crusta aperta, pertinet ad articulum cum osse ultimo.*  
 69 *Pollicis os ultimum.*  
 70 *margo ejus, crustatus laevi cartilagine.*  
 71 *extremum tuber, inaequabile.*  
 72 *Officulum sesamoideum, raro occurrens.*

### EXPLANATIO ICONIS IV.

Γ *Abductor indicis.*


a. *origo*







Icon IV.





- a origo ejus à metacarpo pollicis.  
 Δ Interosseus prior indicis, ex parte testus Abductore Γ.  
 βγ origo ejus à metacarpo indicis.  
 ΘΛ Interosseus prior medii.  
 Θ caput ejus, quod oritur à metacarpo indicis.  
 δι origo ejus à metacarpo indicis.  
 Λ caput, quod oritur à metacarpo medii.  
 ζη origo ejus à metacarpo medii.  
 θ caput conjunctio, fibris ad angulos acutos convenientibus.  
 ι commune extremum carneum.  
 κ tendo, in quem abit.  
 ΞΠ Interosseus posterior medii.  
 Ξ caput ejus, quod oritur à metacarpo medii.  
 λμ ejus origo à metacarpo medii.  
 Π caput, oriens à metacarpo annularis.  
 ς ejus origo ab illo metacarpi osse.  
 ο conjunctio caput, in qua fibrae conveniunt ad angulos acutos.  
 ω commune extremum carneum.  
 ς tendo, qui se cum tendine Extensoris communis conjungit, & ad os tertium procedit.  
 ΣΦ Interosseus posterior digiti annularis.  
 Σ caput ejus, quod oritur à metacarpo annularis.  
 σ ejus origo ab osse metacarpi annularis.  
 Φ caput, quod oritur à metacarpo auricularis.  
 τν origo ejus à metacarpo illo.  
 Φ conjunctio caput, quae fit fibris ad angulos acutos convenientibus.  
 χ extremum commune carneum.  
 ↓ tendo extremus.  
 Ψ Adductor ossis metacarpi quarti, insertus metacarpo illi, testus autem Abductore minimi Ω.  
 Ω Abductor digiti minimi manus.  
 υ extremum tendineum, quod conjungit cum tendine Extensoris proprii auricularis.  
 α Interosseus prior auricularis, testus Interosseo ΣΦ.  
 β tendo ejus, quem cum tendine Lumbricalis quarti conjungit.  
 c Interosseus prior annularis, testus Interosseo ΞΠ.

## 646 HISTORIAE MUSCULORUM

- d tendo ejus, quem cum tendine Lumbricalis tertii conjungit.  
 c Interosseus posterior indicis, testus Interosseo c. a.  
 f tendo ejus, qui se cum tendine communi Extensorum indicis conjungit, & ad os tertium decurrit.  
 g Aponeurosis Abductoris indicis, quae se adjungit communi tendini Extensorum indicis.  
 h Extensoris digitorum communis tendo ad indicem pertinens, truncatus.  
 i Indicatoris tendo, truncatus.  
 k Communis Indicatoris & Extensoris communis tendo.  
 ll Tendo Extensoris communis ad digitum medium pertinens, truncatus.  
 mno Tendo Extensoris communis ad digitum tertium pertinens, truncatus, & antequam ad digitum pervenerit, ex duobus constans, m. n.  
 pp Tendo Extensoris proprii anicularis, truncatus.  
 qqqqqq Aponeuroses, quas dant tendines Extensorum digitorum, ambientes capsas articulorum digitorum cum metacarpo, eisque se innectentes.  
 r Aponeurosis, quam Lumbricalis primus adjungit communi tendini Extensorum indicis.  
 sss Aponeuroses, quas emittunt tendines Interosseorum c. 21. 20. adjunctae tendinibus Extensorum, & per dorsum eorum suis fibris evanescentes; atque à superiore parte continuæ aponeurosis q. q. q.  
 ttt Aponeuroses similes, quas emittunt tendines Interosseorum c. 1. c. a. & Lumbricalium.  
 u Tendo Lumbricalis primi, qui se conjungit cum communi tendine Extensorum indicis, & fibras tenues per dorsum ejus dispergit.  
 vvv Tendines Interosseorum c. 21. 20. conjuncti cum tendinibus Extensorum k. l. o.  
 www Communes tendines Interosseorum & Lumbricalium conjuncti cum tendinibus Extensorum.  
 x Communis tendo Abductoris digiti minimi, & Flexoris ejusdem parvi, conjunctus cum tendine p.  
 yyyy Extrema tendinum Extensorum,  
 zzzz pertinentia ad ossa secunda.

A Tendo

- A *Tendo Lumbricalis primi, accepta à tendine communi Extensorum indicis k. portione antius, decurrens ad os tertium.*
- BBB *Tendines Interosseorum, c. ZII. ΣΦ. accepta portione ab Extensorum tendinibus k. l. o. aucti, decurrentes ad os tertium.*
- CCC *Tendines Interosseis ΘΛ. c. α. communes cum Lumbricalibus, accepta portione ab Extensorum tendinibus, l. o. p' aucti, decurrentes ad os tertium.*
- D *Tendo communis Abductoris digiti minimi atque Flexoris parvi ejusdem; accepta portione à tendine Extensoris proprii auricularis p. auctus, decurrens ad os tertium.*
- EEEE *Communia extrema, facta ex conjunctione tendinum A. B. indicis, C. B. medii, C. B. tertii, C. D. quarti, atque*
- FFFF *inserta tertii ordinis ossibus.*
- G *Tendo Extensoris minoris pollicis, truncatus.*
- H *Tendo Extensoris majoris pollicis, truncatus.*
- I *Communis tendo pollicis Extensoris majoris & minoris,*
- K *ad os ultimum pollicis pertinens.*
- L *Aponeurosis ambiens capsam articuli pollicis cum metacarpo, innexaque capsae illi, & adjuncta tendini communi Extensorum pollicis.*
- M *Aponeurosis, quam tendo communis Extensorum indicis accipit à Flexoris pollicis brevis cauda posteriore, continua aponeurosi supradiatae L.*
- N *Cauda posterior Flexoris pollicis brevis, testā Abductore Γ. & Adductore O.*
- OP *Extremum Adductoris pollicis, testum Abductore Γ.*
- P *Parce ejus extrema, quae tendinea, insertaque ossi primo pollicis.*
- 1 *Os naviculare.*
  - 2 *ejus tuber, quo committitur cum cubito, crusta cartilaginea laevi opertum.*
  - 3 *ejusdem tuber, quo committitur cum ossibus multangulis, laevi crusta cartilaginea opertum.*
  - 4 *& ejusdem margines, laevi cartilagine crustati.*
  - 6 *Os lunatum.*
  - 7 *tuber ejus, laevi cartilagine incrustatum, quo committitur cum cubito.*
  - 8 9 10 *ejusdem margines, laevi cartilagine crustati.*
  - 11 *Os triquetrum.*

- 12 *ejus superficies, qua cum cubito committitur, laevi cartilagine crustata.*  
 13. 14 *ejusdem margines, cartilagine laevi crustati.*  
 15 *ejusdem superficies, ad articulum cum cuneiformi pertinenens, laevi cartilagine operta.*  
 16 *Os subrotundum.*  
 17 *Os cuneiforme.*  
 18 *pars ejus, ad articulum cum triquetro & lunato pertinenens, cartilagine laevi crustata.*  
 19. 20 *ejusdem margines, laevi cartilagine crustati.*  
 21 *Os capitatum.*  
 22 *caput ejus, laevi cartilagine incrustatum, quo committitur cum naviculari & lunato.*  
 23. 24. 25 *ejusdem margines, laevi cartilagine crustati.*  
 26 *Os multangulum minus.*  
 27. 28. 29 *ejus margines, incrustati cartilagine laevi.*  
 30 *Os multangulum majus.*  
 31. 32 *margines ejus, laevi cartilagine crustati.*  
 33 *Os metacarpi pollicis.*  
 34 *margo ejus, laevi crustatus cartilagine.*  
 35 *Pollicis primum os.*  
 36 *ejus capitis inferioris superficies, cartilagine laevi crustata.*  
 37 *Os ultimum pollicis.*  
 38 *ejus margo, laevi cartilagine crustatus.*  
 39 *ejusdem ambitus extremus, eminens & inaequabilis.*  
 40. 40. 40. 40 *Ossa metacarpi manus.*  
 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49 *margines eorum, qui laevi cartilagine crustati.*  
 50 *Ec. Digitorum ossa primi ordinis.*  
 51 *Ec. eorum pars, laevi cartilagine crustata, pertinenens ad articulum cum ossibus secundi ordinis.*  
 52. 52. 52 *Ec. Digitorum ossa ordinis secundi.*  
 53. 53 *margo eorum, cartilagine laevi crustatus.*  
 54. 54 *eorundem pars laevi crustata cartilagine, pertinenens ad articulum cum ossibus tertii ordinis.*  
 55 *Ec. Digitorum ossa tertii ordinis.*  
 56. 56 *margo eorum, cartilagine laevi crustatus.*  
 57 *Ec. eorumdem ambitus extremus, eminens, inaequabilis.*

# HISTORIAE MUSCULORUM HOMINIS

## LIBER QUARTUS.

*In quo Musculi in Classes descripti.*

### PROOEMIUM.

**H**is quoque pro virili parte propositis, superest ex iis, quae promisi, ut musculos in classes describam. Ita & suae quemque, cuius est proprius, parti assignabo, & quot qualesque ad quamque pertineant docebo. Si qui autem ad plures una partes pertineant, aut pertinere videantur, aut dubium esse possit, ad quamnam earum pertineant, adscribam singulis earum. Addam & usus, quorum eos gratia proprie factos esse puto: & iisdem maxime verbis, quibus in libro superiore. Eoque tanquam ex tabula cognosci poterit, non modo qui & quot unamquamque partem proprie moveant, sed etiam quo moveant modo. Minuam & quaerendi molestiam, ac post singulos indicabo tertii libri caput, ex quo plenior descriptio peti, si videatur, possit. Geminorum autem tantummodo unum nominabo, ut in superiore libro: quinam enim gemini sint, primus docuit.

M m m m

SP I-



650 HISTORIAE MUSCULORUM

SPINAE DORSI; ID EST, LUMBORUM  
DORSIQUE ET CERVICIS.

*I. Multifidus spinæ.* Spinam in priora flexam retinet, erigit, flectit in posteriora, torquet modice.  
122.

LUMBORUM.

*I. Quadratus lumborum.* Lumbos curvat in latus : in latus autem oppositum flexos retinet, erigit. 85.

*II. Intertransversarii lumborum.* Lumbos in latus flectunt : in oppositum latus flexos retinent, erigunt.  
125.

*III. Interspinales lumborum.* Lumbos in priora curvatos erigunt, post flectunt retrorsum. 123.

*IV. Psoas parvus.* Lumbos in priora simul & in latus curvat, attollendo fundamentum trunci, quod subiectum lumbis. 83.

LUMBORUM ET DORSI.

*I. Longissimus dorsi, cum Sacrolumbali.* Lumbos & dorsum in priora curvata retinent, erigunt, flectunt retrorsum, & aliquantum simul in latus. 113.

DORSI.

*I. Spinalis dorsi.* Dorsum retinet, erigit, flectit in posteriora, eodemque tempore nonnihil in latus.  
114.

*II. Semispinalis dorsi.* Dorsum, finitimamque ei  
cervicis

cervicis partem , cum in priora curvata sunt , erigit , & curvat deinde oblique in latus. 115.

III. *Interspinales dorsi.* Dorsi inferiorem partem in priora curvatam erigunt , post flectunt retrorsum. 124.

IV. *Intertransversarii dorsi.* Dorsum in latus flectunt: in oppositum latus flexum retinent , erigunt. 126.

## COLLI.

I. *Splenius colli.* Cervicem in posteriora curvat , torquetque medium dorsum versus. 107.

II. *Spinalis cervicis.* Cervicem , cum in priora curvata est , erigit , & curvat deinde oblique in latus , flectitque retrorsum. 116.

III. *Interspinales cervicis.* Cervicem in priora flexam erigunt , curvant deinde in partem posteriorem. 117.

IV. *Longus colli.* Collum in posteriora curvatum erigit , curvat deinde in priora , eodemque tempore modice in latus. 137.

V. *Transversalis cervicis.* Cervicem in latus simulque in posteriora curvat oblique. 111.

VI. *Cervicalis descendens.* Cervicem curvat , fere ut Transversalis cervicis. 112.

VII. *Scalenus posterior.* Collum flectit in latus , in oppositum latus flexum retinet , erigit. 135.

VIII. *Scalenus medius.* Collum flectit in latus , idemque retinet , cum flexum in latus oppositum , erigitque. 134.

IX. *Scalenus lateralis.* Collum flectit , retinet , erigit , ut medius. 133.

M m m m 2

X.

X. *Scalenus minimus*. Collum flectit fere ut prior.  
132.

XI. *Scalenus prior*. Collum in latus flectit, simulque magis in priora, quam caeteri Scalenii: in oppositam partem flexum retinet, erigit. 131.

XII. *Intertransversarii priores colli*. Collum in latus flectunt, in oppositum latus flexum erigunt. 140.

XIII. *Intertransversarii posteriores colli*. Eorum actio, quae priorum. 141.

XIV. *Levator scapulae* huc quoque pertinere videtur. Cervicem in illud, in quo ipse collocatus, latus, ac simul aliquantum retrorsum inflectit: flexam in oppositum retinet, & erigit. 105.

### CAPITIS ET COLLI.

I. *Sternomastoideus*. Caput, si rectum sit, oblique in illud latus, in quo situs, simulque in priora deorsum agit, cervicem eo versus curvans, faciemque in oppositum latus aliquantum dirigens. 36.

II. *Cleidomastoideus*. Actio ejus ferè eadem ac praecedentis; rectius autem caput in latus trahit, collumque rectius quoque curvat. 37.

III. *Splenius capitis*. Capitis partem, ad quam pertinet, totumque adeo caput, retrorsum inclinat oblique spinam dorsi versus, eodemque curvat cervicem. Caput in priora pendulum retinet, & una cum cer-vice erigit. 106.

IV. *Briventer cervicis*. Caput à posteriore parte de-primat, cervicem in eandem partem curvat, sed simul nonnihil oblique in illud latus, ubi situs. Caput in priora

priora pendulum retinet, attollitque, erigens cervicem. 108.

*V. Complexus.* Caput & collum flectit, ut Biventer cervicis, attamen obliquius in latus. 109.

*VI. Trachelomastoideus.* Cervicem in posteriora & simul aliquantum oblique in latus curvat, trahens eo, inclinasque capitis, cui insertus est, partem: & retinet quoque, erigitque caput una cum cervice, cum flexa sunt in oppositum. 110.

*VII. Rectus capitis internus major.* Capitis priorem partem deprimit in priora, ac simul nonnihil in latus; eoque & collum flectit in partem eandem. Cum vero collum atque caput retrorsum flexa, retinet ea, & erigit. 136.

### CAPITIS.

*I. Rectus capitis posticus major.* Capitis posteriorem partem deprimit. 118.

*II. Rectus capitis posticus minor.* Capitis partem posteriorem deprimit. 119.

*III. Obliquus capitis superior.* Caput à posteriore parte deprimit. 121.

*IV. Rectus capitis internus minor.* Caput in priora simulque nonnihil in latus nutare facit. 138.

*V. Rectus lateralis capitis.* Caput in latus & simul nonnihil oblique in priora deprimit. 139.

*VI. Obliquus inferior capitis.* Caput cum atlante rotat, atlantis processum transversum ad spinam epistrophaei trahens: ac sic faciem in illud latus, in quo situs, convertit. 120.

M m m m }

COC-

## COCCYGIS.

*I. Coccygeus.* Coccygem retinet, & in priora flectit, ischii processum versus: retrorsus actum restituit. 95.

*II. Curvator coccygis.* Coccygem curvat in priora. 96.

## THORACIS.

*I. Intercostales externi.* Costas adducunt ad se mutuo, & quoniam superior costa stabiliior reliquis, attollunt. 129.

*II. Intercostales interni.* Actio, quae externorum. 130.

*III. Levatores costarum longiores.* Attollunt costas; & qui duarum inferiorum sunt, eas eodem tempore trahunt retrorsum. 128.

*IV. Levatores breviores costarum.* Costarum principium firmant, & moderantur. 127.

*V. Serratus posticus superior.* Costas, quibus insertus, attollit. 103.

*VI. Serratus posticus inferior.* Costas, quibus insertus, deprimit, trahitque retrorsum. 104.

*VII. Triangularis sterni.* Illam costarum, à quibus oritur, partem, ubi in cartilaginem vertuntur, deprimit, trahitque introrsum: maxime deprimit secundam, sequentes minus & minus, sed eas magis introrsum cogit. 82.

*VIII. Diaphragma.* Cavum thoracis augeat ab inferiore parte, ad admittendum aërem in inspiratione; maxime

maxime ab utroque latere , ubi positi pulmones. 81.

### MAXILLAE INFERIORIS.

*I. Masseter.* Maxillam inferiorem recte adducit ad superiorem , ad eamque apprimat. Cum pars ejus rectior sola agit , productam maxillam restituit. 20.

*II. Temporalis.* Maxillam attollit , & ad superiorem apprimat , eandemque simul trahit retrorsum. 21.

*III. Pterygoideus internus.* Maxillam inferiorem adducit ad superiorem , simul autem nonnihil oblique in latus sibi oppositum trahit. 69.

*IV. Pterygoideus externus.* Maxillam in priora trahit , & simul oblique in latus alterum cogit , caput ejus è sinu ossis temporis protrahens , subjiciensque tuberculo ejusdem ossis. 70.

*V. Briventer maxillae inferioris.* Maxillam à superiore oblique deducit. 42.

### HUMERI , EX SCAPULA ET CLAVICULA CONSTANTIS.

*I. Cucullaris.* Diversis partibus sui diversimode movet scapulam & claviculam ; easque vel ad caput retrorsum attollit , vel recta retrorsum trahit , vel deprimat : in universum tamen , cum se totus contrahit , agit retrorsus , dorsi spinam versus. 99.

### CLAVICULAE.

*I. Subclavius.* Claviculam attrahit ad os pectoris , impeditque , ne ab eodem in latus recedat : eandem  
cum

cum processu coracoideo, id est, totum humerum, ducit deorsum in priora. 73.

### SCAPULAE.

*I. Serratus anticus.* Scapulam in priora deorsum ad pectus trahit. 72.

*II. Serratus magnus.* Scapulam in priorem corporis partem trahit. 74.

*III. Rhomboideus major.* Scapulam oblique retrorsum simulque sursum trahit. 101.

*IV. Rhomboideus minor.* Non fere alia ejus quam majoris actio. 102.

*V. Levator scapulae* huc etiam fortasse pertinet. Scapulam suspensam tenet, attollitque in priora. 105.

### OSSIS HUMERI.

*I. Deltoïdes.* Os humeri recte attollit in exteriora; oblique autem in priora, si pars ejus prior praevalcat; in posteriora, si posterior. 142.

*II. Supraspinatus.* Os humeri attollit in priora, simulque oblique in exteriora. 143.

*III. Infraspinatus.* Brachium imprimis convertit, priorem partem ejus vertens in exteriora. 144.

*IV. Teres minor.* Eadem ejus actio, quae Infraspinati. 145.

*V. Teres major.* Os humeri attollit pone tergum; idemque extrorsum sua priore parte conversum, vertit modice in contrarium. 146.

*VI. Latissimus dorsi.* Os humeri trahit deorsum post tergum; idem cum sublatum, deprimit: humerum, scapu-

scapulam , claviculam trahit deorsum in posteriora ,  
inprimis parte sui inferiore. 100.

*VII. Pectoralis.* Cum brachium secundum latus cor-  
poris naturaliter pendet , attrahit id ad latus illud ,  
modiceque simul in priora : cum ab eo recta in latus  
sublatum , deprimit ad idem , pariterque simul in pri-  
ora : idem in priora sublatum , trahit ante pectus ;  
retrorsum actum , in priora. Pars ejus , quae descen-  
dit , cum sola agit , os humeri praeterea attollit :  
transversa agit recte in priora : quae adscendit , non  
solum os humeri , sed totum quoque humerum , id  
est , scapulam & claviculam , trahit deorsum , 71.

*VIII. Subscapularis.* Os humeri introrsum insigniter  
vertit , contrario modo atque Infraspinatus & Teres  
minor. 147.

*IX. Coracobrachialis.* Os humeri scapulamque attra-  
hit ad se mutuo : os humeri ad latus corporis admo-  
vet. 149.

### CUBITI.

*I. Brachialis internus.* Flectit cubitum. 150.

*II. Biceps brachii.* Cubitum flectit , cum radius vel  
juxta ulnam rectus est , vel circa eam conversus re-  
tinetur , ne convertatur. 148.

*III. Triceps brachii.* Extendit cubitum. 151.

*IV. Anconeus.* Cubitum extendit. 157.

### MANUS.

*I. Radialis externus longior.* Manum flectit extrorsum  
simulque oblique in priora. 153.

N n n n

II.



*II. Radialis externus-brevior.* Manum flectit magis in exteriora , quam longior ; in priora minus. 153.

*III. Ulnaris externus.* Manum in posteriorem simul & aliquantum in exteriorem partem flectit , attollit-que. 156.

*IV. Ulnaris internus.* Manum flectit , introrsumque ac simul oblique retrorsum attollit. 163.

*V. Radialis internus.* Manum flectit , attollens eam in interiora. 165.

*VI. Pronator teres.* Manum in pronum convertit , conversione radii circum ulnam. 166.

*VII. Pronator quadratus.* Manum convertit in pronum , radium convertens circum ulnam. 170.

*VIII. Supinator longus.* Radium circa ulnam in utramque partem convertit , eoque manum ex prona non modo facit supinam , sed etiam ex supina pronam. 152.

*IX. Supinator brevis.* Cum manus prona est , reddit eam supinam , quoniam radium circa ulnam conversum , in contrarium vertit. 158.

*X. Biceps brachii* huc quoque forsitan pertinet. Manum , quod dicunt , supinat , radium circa ulnam conversum vertens in contrarium. 148.

### MANUS DIGITORUM QUATUOR.

*I. Extensor communis digitorum manus.* Extendit digitos , & quidem ossa eorum prima , secunda , tertia : prima etiam in exteriora flectit. 154.

*II. Sublimis.* Digitorum ossa secundi ordinis , tum & illa primi , flectit in partem internam. 167.

*III,*

*III. Profundus.* In internam partem flectit ossa imprimis tertii ordinis; praeterea etiam secundi, & primi. 168.

*IV. Lumbricales manus.* Ossa primi ordinis in volam flectunt, ac simul oblique in priora. 171.

*V. Interossei manus anteriores.* Omnes digitum suum flectunt in priora pollicem versus, simulque modice in interiora: digitum in volam flexum, in eandem magis flectunt. 180. 181.

*VI. Interossei manus posteriores.* Suum quisque digitum flectit in posteriora, id est, à pollice, simulque modice in interiora: in volam flexum flectit in eam magis. 180. 181.

#### INDICIS MANUS.

*I. Indicator.* Extendit indicis os primum, secundum, tertium: primum in exteriora quoque flectit, & simul etiam modice retrorsum, medium digitum versus. 162.

*II. Abductor indicis manus.* A reliquis digitis indicem ad pollicem ducit, modiceque simul in volam flectit. 182.

#### DIGITI MINIMI MANUS.

*I. Extensor proprius auricularis.* Extendit minimi os primum, secundum, tertium: primum etiam in exteriora flectit. 155.

*II. Abductor digiti minimi manus.* Digitum minimum abducit ab annulari, post flectit in volam. 177.

*III. Flexor parvus digiti minimi manus.* Os minimi  
N n n 2 primi

primi ordinis , totumque adeo digitum illum , flectit in volam , pollicem versus. 178.

### POLLICIS MANUS.

*I. Abductor longus pollicis manus.* Pollicem , si metacarpus ejus in volam flexus fuerit , à manu in priora simul & interiora abducit : tum si pergat , metacarpum illum flectit rectius in priora , post in priora extrorsum. 159.

*II. Abductor brevis pollicis manus.* Totum pollicem à reliqua manu abducit in interiora simul & aliquantum in posteriora. 172.

*III. Opponens pollicis.* Pollicem introrsum simulque retrorsum abducit à manu , dein convertit , internamque ejus partem volae manus , digitisque opponit , fere directo. 173.

*IV. Adductor pollicis manus.* Pollicem ad mediam adducit volam. 175.

*V. Flexor brevis pollicis manus.* Pollicis principium , id est , ejus primum os in volam flectit. Ejusdem metacarpum in partem posteriorem , ac simul pro vario ejus situ , vel ad volam , vel secundum eam , vel ab ea modice introrsum. 174.

*VI. Flexor longus pollicis manus.* In volam flectit pollicis os ultimum : flectit & primum. 169.

*VII. Extensor minor pollicis manus.* Ubi extremo tendine suo cum illo Extensoris majoris conjunctus , utrumque os pollicis extendit , flectitque in priora : solummodo autem primum , ad id cum pertinet. 160.

*VIII. Extensor major pollicis manus.* Extendit , inque priora

priora flectit ultimum os pollicis : primum quoque.  
161.

### METACARPI MANUS.

*I. Adductor ossis metacarpi digiti minimi.* Os metacarpi auricularis attollit in internam manus partem, trahitque simul aliquantum pollicem versus, sequente etiam metacarpi tertio; quo volam facit ab ea parte magis concavam, dorsum manus rotundum. 179.

### VOLAE.

*I. Palmaris brevis.* Ejus actione principium volae, quod occupat, ex transverso contrahitur, eoque simul in interiora idem surgit. 176.

*II. Palmaris longus.* Cutem volae leniter contrahit, percutitque. 164.

### FEMORIS.

*I. Psoas magnus.* Attollit femur in priora, simulque per exteriorem partem retrorsum rotat. 84.

*II. Iliacus internus.* Eadem actio, quae Psoae magni. 86.

*III. Pectineus.* Femur alterum ad alterum adducit. 199.

*IV. Adductor longus femoris.* Adducit femur alterum ad alterum. 200.

*V. Adductor brevis femoris.* Adducit femur alterum ad alterum. 202.

*VI. Adductor magnus femoris.* Adducit femur alterum ad alterum. 204.

VII. *Obturator externus*. Adducit femur alterum ad alterum. 203.

VIII. *Gluteus magnus*. Attollit femur in posteriorem partem, spinam dorsi versus, ac simul etiam aliquantum per exteriorem partem retrorsum convertit. Flexum in priora femur abducit à femore altero. 183.

IX. *Gluteus medius*. Abducit femur alterum ab altero. Sublato in priora femore, id convertit, ita autem, ut partem ejus, quae tunc est superior, aliquantum dirigat ad alterum femur. 184.

X. *Gluteus minor*. Femur movet ut medius. 185.

XI. *Pyriformis*. Os femoris in priora conversum vertit per exteriora retrorsum. Cum autem flexum in priora, abducit ab altero. 186.

XII. *Obturator internus*. Eodem modo vertit femur, quo Pyriformis, sed rectius. Et abducit quoque flexum in priora femur. 188.

XIII. *Gemini*. Adjuvant Obturatorem internum. 187.

XIV. *Quadratus femoris*. Vertit femur, ut Obturator internus, & Gemini. Femur in latus sublatum deprimit, & ad alterum adducit. 189.

XV. *Tensor vaginae femoris*. Femur introrsum vertit, eo versus dirigens partem ejus priorem. 193.

#### VAGINAE TENDINEAE FEMORIS.

I. *Tensor vaginae femoris*. Tendit vaginam. 193.

#### CRURIS.

I. *Rectus cruris*. Genu, si flexum sit, extendit. 194.  
II.

*II. Vastus externus.* Extendit genu. 196.

*III. Vastus internus.* Extendit genu. 197.

*IV. Cruralis.* Extendit genu. 198.

*V. Biceps cruris.* Genu in posteriorem partem flectit. Flexo genu, crus, introrsum sua priore parte conversum, vertit extrorsum. 190.

*VI. Semitendinosus.* Genu flectit in partem posteriorem. Flexo genu, crus, extrorsum sua priore parte conversum, vertit introrsum. 191.

*VII. Semimembranosus.* Actio ejus respondet illi Semitendinosi. 192.

*VIII. Gracilis.* Genu flectit in partem posteriorem. Flexo genu, crus convertit, sic ut prior pars pedis extremi ad alterum pedem convertatur. 201.

*IX. Sartorius.* Genu curvat in posteriora, ac crus convertit, ut Gracilis. 195.

*X. Popliteus.* Crus, flexo genu, sic convertit, ut priorem pedis extremi partem dirigat ad pedem alterum. 208.

### PEDIS EXTREMI.

*I. Soleus.* Attollit calcem, plantamque in posteriora dirigit. 207.

*II. Gemellus.* Eadem ejus functio, quae Solci. 205.

*III. Plantaris.* Actio ejus similis est actionis Gemelli. 206.

*IV. Tibialis anticus.* Pedis extremi priorem partem attollit. 216.

*V. Peroneus tertius.* Pedis extremi priorem partem attollit. 215.

VI.

*VI. Tibialis posticus.* Pedem extremum oblique in internam partem retrorsum attollit, in interiora posterioraque convertens plantam. 211.

*VII. Peroneus longus.* Plantam vertit extrorsum modice in posteriora. 212.

*VIII. Peroneus brevis.* Eodem modo movet pedem extremum, quo longus. 213.

### POLLICIS PEDIS.

*I. Extensor proprius pollicis pedis.* Extendit, ac deinde sursum flectit pollicis os ultimum: sic & primum. 217.

*II. Flexor longus pollicis pedis.* Pollicis os ultimum flectit deorsum: ac sic quoque primum. 210.

*III. Flexor brevis pollicis pedis.* Deorsum flectit os primum pollicis. 223.

*IV. Adductor pollicis pedis.* Pollicis primum os deorsum flectit, & oblique simul digitum secundum versus. 224.

*V. Transversus pedis.* Pollicem ad digitos postremos attrahit. 225.

*VI. Abductor pollicis pedis.* Pollicem à reliquis digitis abducit. 220.

### POLLICIS ET DIGITORUM PROXIMORUM TRIUM.

*I. Extensor brevis digitorum pedis.* Pollicem, digitosque in rectum porrigit, extendens omnes ordines ossium digitorum minorum, pollicis primum: primum etiam

etiam tum pollicis , tum parvorum , flectit in superiora. 218.

### DIGITORUM PEDIS MINORUM.

*I. Extensor longus digitorum pedis.* Extendit secundum, tertiumque ordinem ossium, qui in digitis sunt: extendit & primum, eundemque postquam porrexit, sursum flectit. 214.

*II. Flexor longus digitorum pedis.* Tertii ordinis ossa digitorum minorum flectit in terram: in eandem partem & illa secundi, primique 209.

*III. Flexor brevis digitorum pedis.* Flectit ossa secundi ordinis, atque etiam illa primi; utraque deorsum. 219.

*IV. Lumbricales pedis.* Agendi ratione respondent illis manus. 222.

*V. Interossei primi digitorum pedis.* Digitorum principium flectunt pollicem versus, simulque aliquantum in inferiora. 227. 228.

*VI. Interossei secundi digitorum pedis.* Eorum principium flectunt à pollice, simulque aliquantum in inferiora. 228.

### DIGITI MINIMI PEDIS.

*I. Flexor brevis digiti minimi pedis.* Flectit primum ejus os; & quidem deorsum. 226.

*II. Abductor digiti minimi pedis.* Minimi digiti articulum cum metatarso sic flectit, ut abducatur digitus ille à reliquis, ac simul flectatur in terram. 221.

O o o o

CU-



*CUTIS CAPITIS, FRONTIS, SUPERCILIORUM, DORSI NASI.*

*I. Epieranius.* *Frontales* sursum & simul aliquantum in diversum trahunt, tenduntque, & explicant supercilia, quod infra supercilia usque ad palpebras est, angulos majores oculorum, glabellam; cutem quoque nasi sursum trahunt, & tendunt: simulque cutem reliquam capitis, quae retro frontem est, attrahunt ad eam; quo & corrugant frontem, rugis transversis. Cutem capitis retrahunt *Occipitales*. 1.

*SUPERCILII.*

*I. Corrugator supercilii.* Glabellam & supercilium deprimit, adducitque simul ad nasum; glabellam & caput supercilii corrugat, & in priora magis eminere facit, pilosque earum partium erigit in priora; caudam supercilii, & quod mox infra eam est, non corrugat, sed praetendit palpebrae superiori: ac cum Orbiculari palpebrarum contrahit ambitum oculi. 6.

*PALPEBRARUM ET AMBITUS OCULI.*

*I. Orbicularis palpebrarum.* Cum incipit agere, palpebras adducit ad se invicem: cum pergit fortius, easdem comprimit, corrugatque; supercilium praeterea, & angulum minorem, genamque, cum palpebris, & contrahit, & aliquantum adducit ad cantum majorem; premit denique globum oculi. 5.

*PALPEBRAE SUPERIORIS.*

*I. Levator palpebrae superioris.* Tarsum circum globum

bum oculi sursum in posteriora vertit, eodem interim ad globum interna parte sua aequaliter apto manente. Eoque aperit oculum, palpebram aequabiliter complicatam retrorsum trahens, simulque tarsum subjiciens ei parti ambitus oculi, quae infra supercilium est. 22.

### GLOBI OCULI.

*I. Rectus attollens.* Vertit globum oculi, sic ut pupillam sursum dirigat. 24.

*II. Rectus depressor.* Vertit globum oculi, sic ut dirigat pupillam deorsum. 24.

*III. Rectus adductor.* Vertit globum, sic ut in latum internum, id est, nasum versus, pupillam dirigat. 24.

*IV. Rectus abductor.* Vertit globum oculi, sic ut pupillam in latum externum dirigat. 24.

*V. Obliquus superior oculi.* Globum oculi vertit, sic ut pupillam deorsum ad prominentem sub oculo genam dirigat: totumque globum in priora protrahit, canthum majorem versus. 23.

*VI. Obliquus inferior oculi.* Globum oculi ita vertit, ut pupillam sursum ad caudam supercilii dirigat. Globum quoque protrahit nasum versus, simulque deorsum. 25.

### AURICULAE.

*I. Attollens auriculam.* Sursum trahit auriculam, tenditque illam ejus partem, cui insertus; maxime si eodem tempore agant Frontales & Occipitales. 2.

*II. Anterior auriculae.* Helicis eminentiam illam, quae

O o o o 2

con-

concham distinguit, trahit in priora sursum, ac tendit. 3.

*III. Retrabentes auriculae.* Concham tendunt, auriculam trahunt retrorsum. 4.

*IV. Tragicus.* Eam, cui incumbit, conchae partem deprimit, facitque planiorem: superiorem tragi marginem in priora extrorsum vertit. 26.

*V. Antitragicus.* Extremum anthelicem deprimit antitragum versus: hujus maxime eminentem marginem nonnihil extrorsum in posteriora vertit: marginem conchae, inter locum, unde ipse oritur, atque eum, cui insertus, medium, premit, incurvat, ut in concham assurgat, magisque tendatur. 27.

*VI. Major helcis.* Premit, deprimit, percutit partem eam helcis, cui incumbit: illam vero, cui insertus, modice deorsum trahit. 28.

*VII. Minor helcis.* Incisuram helcis, cui affixus, contrahit; partemque, quam occupat, premit, percutit. 29.

*VIII. Transversus auriculae.* Contrahit quod auriculae inter concham & anthelicem cum scapha intercedit: idem, una cum concha, & scapha, tendit. 30.

## MALLEI ET MEMBRANAE TYMPANI.

*I. Externus mallei.* Malleum in priora trahit, modiceque porum acusticum versus; ex quo malleum sequens membrana tympani planior fit, & modice laxior; sed inaequaliter, maxime laxata illa parte, quae à prior parte mallei est. 31.

*II. Laxator tympani.* Mallei manubrium trahit retrorsum

trorsum simul & sursum, & porum acusticum versus; eoque membranam tympani eodem versus trahit, laxat, facitque planiorem. 32.

III. *Tensor tympani.* Mallei manubrium à poro acustico retrahit ad oppositam tympani partem, & modice eodem tempore in priora; quo fit, ut cum malleum sequatur membrana tympani, eam intro trahere valeat, ac tendere, cavamque efficere à parte pori acustici. 33.

### STAPEDIS.

I. *Stapedius.* Capitulum stapedis ad os cavernulae, quo exit tendo suus, attrahit, eoque ita movet stapedem, ut pars posterior basis ejus in vestibulum auris introëat, prior ab eodem recedat. 34.

### NASI.

I. *Depressor alae nasi.* Marginem foraminis nasi, qua is cum labio cohaeret, alaeque radicem, deorsum trahit; eoque simul labium superius, quoniam id cum naso junctum, modice deprimit: quin & narem aliquantum comprimit, alam cogens septum versus. 18.

II. *Compressor naris.* Latus mobile nasi premit septum versus, eoque narem aliquantum comprimit, & cutem lateris modo dicti corrugat ex transverso: sed necesse est, ut alae radix eodem tempore retineatur à Depressore suo; caeteroquin enim eam attollit in priora, inprimis si dexter sinisterque conspirent. 7.

III. *Levator labii superioris alaeque nasi.* Alae nasi par-

O o o o 3

tem,

tem , quae finitima labio superiori , attollit canthum majorem versus. 8.

*ORIS ET LABIORUM , QUORUM ALII ETIAM AD GENAS PERTINENT , ALII AD BUCCAS , ALII AD LOCA , QUAE SUNT A MENTI LATERIBUS.*

*I. Levator labii superioris alaeque nasi.* Labii superioris partem , quae à latere alae nasi est , attollit canthum majorem versus : eoque simul cutem , quae est inter illam partem labii radicemque alae nasi ab una parte , atque canthum ab altera , laxat , & in priora aliquantum surgere facit ; augetque lacunam illam , qua gena ab ala nasi labioque superiore determinatur. 8.

*II. Levator labii superioris.* Labium trahit oculum versus , modiceque simul in latus : eoque in priora surgere facit , quod genae inter oculum labiumque est : insigniorem quoque efficit lacunam illam , qua gena ab ala nasi labioque superiore determinatur. 9.

*III. Zygomaticus minor.* Labium superius in latus oblique sursum trahit , & lacunam quoque illam , qua gena ab ala nasi labioque superiore determinatur , auget. 10.

*IV. Levator anguli oris.* Angulum illum , malaeque partem , quae à latere menti est , attollit : quo & gena , qua sub oculo prominet , collecta surgit in priora , ut in subridente : auget etiam lacunam , qua ab ala nasi labioque superiore gena determinatur. 11.

*V.*

*V. Zygomaticus major.* Angulum oris, cum subjecta ei malae parte attrahit eum locum versus, qui medius inter tempus & aurem: atque eo simul genam, ut Levator anguli oris, verum insignius, in tumorem sub oculo collectam surgere in priora facit, eandemque cogit tempus versus, ut in ridente: praeterea auget lacunam determinantem genam ab ala nasi & labio superiore. 12.

*VI. Buccinator.* Angulum oris cum utroque labio in latus retrorsum trahit, ac contrahit angulum; quo ea simul buccae pars, quae à latere oris est, contrahitur in rugas, & augetur lacuna, qua determinatur gena ab ala nasi & labio superiore. Buccam quoque firmat, & movet. 16.

*VII. Depressor anguli oris.* Angulum oris deprimit; contrarius praeterea est Zygomatico majori & Levatori anguli oris. 13.

*VIII. Depressor labii inferioris.* Labium inferius, & quod infra id à latere menti est, ipsumque mentum, oblique in latus, in quo situs, detrahit. 14.

*IX. Orbicularis oris.* Os contrahit, & corrugat labia. 17.

*X. Nasalis labii superioris.* Juvat Orbicularem oris, adducendo angulos oris ad se mutuo, & ex transverso contrahendo & corrugando labium superius. 15.

#### MENTI.

*I. Levator menti.* Mentum attollit; quod cum attollitur, simul labium inferius sursum cogitur. 19.

ORIS,

ORIS, LABII INFERIORIS, VICINAE  
MALAE, AURICULAE, CUTIS COLLI  
QUAE EST INFRA MALAM, USQUE  
IN PECTUS ET HUMERUM.

*I. Latissimus colli.* Angulum oris, labium inferius, quod malae à latere menti est, cutem colli, quae est infra malam, trahit deorsum & parum oblique in latus: eodemque tempore totam cutem, quae superiorem partem pectoris, vicinum humerum, vicinamque colli partem vestit, sursum in priora trahit, ac colli cutem premit, truditque extrorsum. Pars ex mala nascens, angulum oris trahit retrorsum simul & modice deorsum. Pars ad auriculam pertinens, detrahit eam, tenditque concham & principium introitus auris. 35.

#### HYOÏDIS.

*I. Sternohyoïdeus.* Os hyoïdes detrahit, inprimis priorem partem ejus. 39.

*II. Coracohyoïdeus.* Os hyoïdes detrahit, ac simul retrorsum cogit. 38.

*III. Stylohyoïdeus.* Os hyoïdes attollit in posteriora. 43.

*IV. Stylohyoïdeus alter.* Hyoïdes attollit in posteriora. 44.

*V. Mylohyoïdeus.* Hyoïdes depressum si sit, attollunt Mylohyoïdei, firmant deinde; partesque, quae statim supra eos sitae sunt, premunt, aguntque sursum. 47.

VI.

VI. *Geniobyoides*. Os hyoides ad mentum trahit.

48.

### LINGUAE:

I. *Ceratoglossus*. Linguam deorsum & introrsum trahit, & cum pare sui ex lateribus contrahit, angustatque. 49.

II. *Basioglossus*. Agit fere, quae *Ceratoglossus*. 50.

III. *Chondroglossus*. Actione respondet *Basioglossus*.

51.

IV. *Genioglossus*. Trahit linguam in priora. 52.

V. *Styloglossus*. Linguam retrorsum trahit, & si depressa sit, eodem simul tempore attollit; ac cum pare sui dilatat. 45.

VI. *Lingualis*. Linguam facit breviorē; contrahit, curvatque in inferiora, apicem ejus trahens in fundum oris. 53.

### LARYNGIS.

I. *Sternothyreoides*. Cartilaginē thyreoidēam, atque adeo laryngē, deprimit. 40.

II. *Hyothyreoides*. Laryngē attollit. 41.

III. *Stylopharyngeus*. Attollit laryngē. 46.

IV. *Cricothyreoides*. Ad se mutuo adducit thyreoidēam & cricoideam. 63.

### GLOTTIDIS.

I. *Cricoarytaenoides posticus*. Glottidem, quantum potest, patefacit cum pare sui, ejusque rimulam deducit. Glottidis quoque rimam internam quam maxime

P p p p

di-



diducit ; cujus pars posterior rotunda fit ex eo. 64.

*II. Cricoarytaenoides lateralis.* Utroque agente glottidis rimae internae pars anterior , quae est ante cartilagineas arytaenoidaeas , minuitur , & ad postremum plane comprimitur , contingentibus se lateribus ejus : pars autem posterior , quae ab iisdem cartilaginibus fit , angusta rima patet , eaque connivente à parte priorè , rotundiore à posteriore , multoque breviorè , quam ipsa caeterum rima interna. Et glottidis quoque rimula , cum ea angusta est , diducitur modice. 67.

*III. Thyreoarytaenoides.* Una cum pare sui comprimit priorem partem rimae glottidis internae , verum magis , fortiusque , quam Cricoarytaenoides laterales ; atque ita , ut à posteriore parte multo brevior rima maneat , eaque etiam angustior. 68.

*IV. Arytaenoides transversus.* Comprimit rimulam glottidis , internamque rimam arctat , & à posteriore parte comprimit. 66.

*V. Arytaenoides obliquus.* Contrahit & glottidem , & rimulam ejus , & rimam internam , quam & à posteriore parte in angulum comprimit. 65.

### PHARYNGIS.

*I. Constrictor pharyngis superior.* Pharyngis partem , quam ambit , premit , constringit , trahit in priora sursumque. 56.

*II. Constrictor pharyngis medius.* Pharyngem constringit , attollit , facit breviorè. 55.

*III.*

III. *Constrictor pharyngis inferior.* Pharyngem constringit. 54.

IV. *Salpingopharyngeus.* Pharyngem attollit, nonnihil in priora; & facit eum eodem tempore brevior. 57.

V. *Palatopharyngeus.* Pharyngem sursum trahit, redditque brevior, & laxior. 58.

VI. *Stylopharyngeus.* Pharyngem attollit, facit brevior, in latera diducit. 46.

### PALATI MOLLIS.

I. *Palatopharyngeus.* Cum utrique simul agunt, palatum molle detrahunt, praesertim latera ejus, maxime juxta uvulam: simul curvant illud, redduntque concavum in inferiora & priora, & ex lateribus contrahunt. 58.

II. *Constrictor isthmi faucium.* Palatum ad linguam trahunt hi Constrictores, contrahunt, concavum faciunt à partē linguae: sic contrahunt isthmum faucium. 59.

III. *Levator palati mollis.* Hi Levatores palatum molle attollunt retrorsum, & mutant etiam figuram ejus. 60.

IV. *Circumflexus palati.* Tendit, concutit, deorsum in latus simul & in priora nonnihil trahit palati mollis partem osseo vicinam. 61.

### UVULAE.

I. *Azygus uvulae.* Uvulam in priora attollit, & facit brevior. 62.

TUBAE EUSTACHIANAE.

*I. Circumflexus palati.* Fortasse pars ejus tubae illi adscribenda, ejusque latus externum deprimit internum, versus, ac sic angustat eam. 61.

ABDOMINIS.

*I. Obliquus externus abdominis.* Peritoneum coërcet, firmat, premit, comprimit: sic abdomen contrahit, & quae id continet, premit, atque exprimit exprimenda: premendo viscera abdominis Diaphragma agit sursum, ad angustandum thoracem, premendos pulmones, aëremque ex iis exprimendum. 75.

*II. Obliquus internus abdominis.* Actio eadem, quae Obliqui externi. 76.

*III. Transversus abdominis.* Actio, quae praecedentium. 77.

*IV. Rectus abdominis.* Actio ejus fere quae Obliqui externi. 78.

*V. Pyramidalis.* Rectum juvat. 79.

*VI. Diaphragma.* Peritoneum contrahit, agitque deorsum; ac sic constringit superiorem partem abdominis, ad abdominalium similitudinem, eodem effectu, agens eos extrorsum, depressione viscerum. 81.

EXTREMI INTESTINI RECTI ET ANI.

*I. Levator ani.* Dexter & sinister una agentes, posteriorem extremi recti partem trahunt in priora simulque modice sursum: constringunt simul, excrementaque per intestinum illud deorsum acta, exprimunt;

munt; eademque opera ipsum rectum retinent, idemque, expressis excrementis, attollunt, restitunt.  
94.

*II. Transversus perinaci.* Hi duo anum una cum finitimo perinaeo trahunt retrorsum; simulque anum, & extremum recti intestini aliquantum comprimunt, eoque juvant excrementorum, cum elapsura sunt, expressionem. 92.

*III. Transversus alter perinaci.* Hi duo premunt priorem intestini recti extremi partem, eamque simul retrorsum agunt, una cum urethrae parte proxima. 93.

*IV. Sphincter internus ani.* Contrahit anum, constringitque. 97.

*V. Sphincter externus ani.* Cutem, quae est circa anum, ipsumque anum, contrahit: perinaeum suo priore mucrone trahit retrorsum, eoque firmat Acceleratores; ac premit eisdem, eamque urethrae, quae per perinaeum incedit, partem; juvatque seminis per eam fluentis, itemque urinae ejectionem. 91.

### TESTIS.

*I. Cremaster.* Testem, qui caeterum à solo funiculo spermatico pendet, suspensum tenet; attollit praeterea, & fortasse quoque comprimit in complexu venereo. 80.

### PENIS.

*I. Erector penis.* Caput penis eodem tempore trahit & deorsum, & retrorsum, & modice in latius quo & idem facit brevius, premitque, ac corpus

P p p p 3

spon-

spongiosum majus , cum id sanguine turget , magis tendit , ad erigendum , rigidumque efficiendum penem. 88.

### URETHRAE VIRILIS ET BULBI EJUS.

*I. Accelerator.* Bulbum urethrae , id est , principium corporis spongiosi minoris , Acceleratores continent , comprimunt ; itaque tendunt totum illud corpus , in erectione penis : comprimunt pariter illam partem urethrae , ac per eam fluentem urinam , itemque , rigido maxime pene , semen ejiciunt ; inprimis cum contracto simul ani Sphinctere externo , pars eorum posterior firmatur. Et videntur non modo comprimere , sed etiam in priora agere. 87.

### URETHRAE VIRILIS ET PROSTATAE.

*I. Compressor prostatae.* Hi duo agunt in priora , ac comprimunt inferiorem prostatae partem una cum illa urethrae , cui pars ea prostatae adjecta. 98.

### CUNNI.

*I. Constrictor cunni.* Cunnum contrahit , ejusque corpus spongiosum premit , comprimit , & cum id stimulante venere turget , tendit. 89.

### CLITORIDIS.

*I. Erector clitoridis.* Clitoridi praestat , quod Erector penis peni. 90.

F I N I S.

EDI-

## EDITIONES AUCTORUM

quorum Icones laudatae.

*Bartholinus.* Caspari Bartholini Diaphragmatis Structura nova. Paris. 1676.  
8°.

*Bartholinus.* Thomae Bartholini Anatomia tertium reformat. Hagae Comit. 1655. 8°.

*Bidloo.* Godefridi Bidloo Anatomia humani corporis, centum & quinque Tabulis demonstrata. Amstelod. 1685. f°.

*Bucetius.* Danielis Bucetii supplementum xx Tabularum; additum Cas-  
serii Tabulis in Spigeli de humani corporis fabrica Libr. Venet. 1627. f°. Et  
in operibus omnibus ex recensione Joh. Antonidae vander Linden. Amsterd.  
1645. f°.

*Casseri.* Julii Casserii Placentini de Vocis Auditusque organis Historia  
Anatomica. Ferrar. 1600. f°.

*Casseri.* Julii Casserii Placentini Pentasthesion, hoc est, de quinque  
Sensibus Liber. Venet. 1609. P.

*Casseri.* Julii Casserii Placentini Tabulae Anatomicae LXXVIII. additae A-  
driani Spigeli de humani corporis fabrica Libr. Venet. 1627. f°. Et in operi-  
bus omnibus, ex recensione Joh. Antonidae vander Linden. Amsterd. 1645. f°.

*Cowper.* Myotomia Reformat: by William Cowper. London, 1694.  
8°.

*Cowper.* Myotomia reformat: by the late M<sup>r</sup>. William Cowper. Lond.  
1724. P.

*Cowper.* Glandularum quarundam ductuumque earum excretoriorum De-  
scriptio, à Gulielmo Cowper. Lond. 1702. 4°.

*De Graaf.* R. de Graaf de Virorum organis Generationi inservientibus.  
Lugd. Bat. & Roterod. 1668. 8°.

*De Graaf.* Regneri de Graaf de Mulierum organis Generationi inservienti-  
bus Tractatus novus. Lugd. Bat. 1672. 8°.

*Dupré.* An Abstract of an Account of Five pair of Muscles, which serve  
for different Motions of the Head, on the first and second Vertebra of the  
Neck, &c. By M. Dupré, &c. Philosophical Transactions, Vol. xx. For  
the Year 1698. N<sup>o</sup>. 251. vi. pag. 130. London, 1699. 4°. Et Descriptio quin-  
que parium musculorum, diversis capitis motibus super primam & secundam  
cervicis vertebrae inservientium, &c. à Dn Dupré edita, &c. Acta Erudi-  
torum ann. 1699. mensis Septembris.

*Du Verney.* Traité de l'organe de Pouie, par M. Du Verney. A Paris,  
1683. 8°.

*Eustachius.* Tabulae Anatomicae Bartholomaei Eustachii. Romae, 1714.  
f°. Adscripti autem notas ex exemplari, cui eas inscripti, & quod una cum  
Explanatione Tabularum edere suscepit. f°.

• Heister.

*Heister.* Laurentii Heisteri Compendium anatomicum. Editio tertia, Altorfi & Norimberg. 1727. 8°.

*Hunauld.* Observations sur la structure & l'action de quelques muscles des doigts, par M. Hunauld. Histoire de l'Acad. Roy. des Sciences, ann. 1729. a Paris, 1731. 4°.

*Lower.* Richardi Lower Tractatus de Corde. Amstelod. 1664. 8°. & Lugd. Bat. 1708. 8°. aliisque annis.

*Molinettus.* Antonii Molinetti Dissertaciones Anatomicae & Pathologicae de Sensibus & eorum Organis. Patav. 1669. 4°.

*Morgagnus.* Joannis Baptistae Morgagni Adversaria anatomica omnia. Patav. 1719. 4°.

*Santorini.* Observationes anatomicae Jo. Dominici Santorini. Venet. 1724. 4°.

*Senac.* Memoire sur le Diaphragme, par M. Senac. Histoire de l'Acad. Roy. des Sciences, ann. 1729. a Paris, 1731. 4°.

*Valsalva.* De Aure humana tractatus, auctore Antonio Maria Valsalva. Bonon. 1704. 4°.

*Valverde.* Anatomia del corpo humano composta per M. Giovan. Valverde: in Roma, 1560. f. Anatomie Corporis Humani, Auctore Joanne Valverde: à Michaele Columbo latine reddita. Venet. 1607. f.

*Verheyen.* Corporis humani Anatomia, auctore Philippo Verheyen. Brucell. 1710. 4°.

*Vesalins.* Andreae Vesalii suorum de Humani corporis fabrica librorum Epitome. Basil. 1543. f. Et in Operibus omnibus Anatomicis & Chirurgicis. Lugd. Batav. 1725. f.

*Vesalins.* Andreae Vesalii de Humani corporis fabrica Libri septem. Basil. 1543. 6s. & 1555. 6s. & in Operibus omnibus Anatomicis & Chirurgicis. Lugdun. Batav. 1725. f.

## EDITIONES AUCTORUM quorum scripta in tertio Libro indicata.

*Arantius.* Anatomicarum observationum liber. Exstat in Julii Caesaris Arantii de Humano foetu libro, tertio edito. Venet. 1595. 4°.

*Bartholinus.* Casp. Bartholini Anatomicae Institutiones. 1611. 8°.

*Bartholinus.* Casp. Bartholini Diaphragmatis structura nova. Paris, 1676. 8°.

*Bartholinus.* Thomae Bartholini Anatomia. Lugd. Bat. 1641. 8°. & 1645. 8°. Tertium reformata. 1651. 8°. Iterum renovata. 1673. 8°. Anatomie quartum renovata. Lugd. 1684. 8°.

*Eustachius.* Anatomica corporis virilis & muliebris historia Caspari Bauhini. 1597. 8°.

*Bau-*

*Baubinus.* Caspari Bauhini Theatrum Anatomicum. Francof. 1605. 8°. & 1621. 4°.

*Bidloo.* Godefridi Bidloo Anatomia humani corporis, centum & quinque Tabulis demonstrata. Amstelod. 1685. f°.

*Bucetius.* Danielis Bucetii Explicationes Tabularum Anatomicarum Julii Casserii Placentini. Exstant cum Spigelii de hum. corp. fabr. Libris.

*Cabrolus.* Αλφραδης αβαρολος. hoc est Anatomes elenchus accuratissimus: auctore Bartholomeo Cabrolio. Genev. 1604. 4°.

*Casserius.* Julii Casserii Placentini de Vocis Auditusque organis Historia Anatomica. Ferrar. 1600. f°.

*Casserius.* Julii Casserii Placentini Pentæsthesion, hoc est, de quinque Sensibus liber. Venet. 1609. f°.

*Coiter.* Observationum anatomicarum chirurgicarumque miscellanea varia. Exstant in Externarum & internarum principalium humani corporis partium tabulis, auctore Volchero Coiter Noriberg. 1573. f°.

*Columbus.* Realdi Columbi de re anatomica libri xv. Venet. 1559. f°.

*Cowper.* Myotomia Reformata: by William Cowper, London, 1694. 8°. Et Myotomia reformata: by the late M<sup>r</sup>. William Cowper. Lond. 1724. f°.

*Cowper.* An abstract of an Account of Five pair of Muscles, &c. By M. Dupré, &c. With Remarks by William Cowper. Philosophical Transactions, Vol. xx. For the Year 1698. N<sup>o</sup>. 251. vi. pag. 130. London, 1699. 4°. Et Descriptio quinque parium musculorum, &c. à Dn. Dupré edita, & in Transactis Philosophicis Anglicanis, à Guilielmo Cowper cum Episcopi recensita. Acta Eruditorum ann. 1699. Septemb.

*Cowper.* Glandularum quarundam, ductuumque earum excretoriorum Descriptio, à Guilielmo Cowper. Lond. 1702. 4°.

*De Diemerbroek.* Isbrandi de Diemerbroek Anatomie corporis humani. Ultraject. 1672. 4°. & in Operibus omnibus Anatomicis & medicis. Ultraj. 1685. f°.

*De Graaf.* R. de Graaf de Vidorum organis Generationi inservientibus. Lugd. Bat. & Roterod. 1668. 8°.

*De Graaf.* Regneri de Graaf de Mulierum organis Generationi inservientibus Tractatus novus. Lugd. Bat. 1672. 8°.

*Dionis.* L'Anatomic de l'Homme, par M<sup>r</sup>. Dionis. A Paris, 1706. 8°.

*Dodart.* Memoire sur les causes de la voix de l'Homme, & de ses differens tons. Par M<sup>r</sup>. Dodart. Hist. de l'Acad. Roy. des Sciences, ann. 1700. a Paris, 1703. 4°.

*Douglas.* Myographiæ comparatæ Specimen: or a comparative description of all the Muscles in a Man and in a Quadruped, by James Douglas. Lond. 1707. 8°.

*Drake.* Anthropologia nova, by James Drake. London, 1707. 8°.

*Dupré.* An Abstract of an Account of Five pair of Muscles, which  
Qq qq serve



serve for different Motions of the Head, on the first and second Vertebra of the Neck, &c. By M. Dupre, &c. Philosophical Transactions, Vol. xx. For the Year 1698. No. 251. vi. pag. 130. London, 1699. 4°. Et Descriptio quinque parium musculorum, diversis capitis motibus super primam & secundam cervicis vertebrae inservientium, &c. à Dn. Dupre edita, &c. Acta Eruditorum ann. 1699. Mensis Septembris.

*Du Verney.* Traité de l'organe de l'ouïe, par M. Du Verney. à Paris, 1683. 8°.

*Eustachius.* Bartholomaei Eustachii opuscula anatomica. Venet. 1563. 4°. Lugdun. Bat. 1707. 8°. Delphis, 1723. 8°.

*Fabricius.* Hieronymi Fabricii ab Aquapendente de Visione Voce Auditu. Venet. 1600. f°. Et in operibus omnibus Anatomicis & Physiologicis. Lipsf. 1687. f°.

*Fabricius.* Hieronymi Fabricii ab Aquapendente de Respiratione & ejus instrumentis libri duo. Pat. 1615. 4°. Et in Operibus omnibus Anatomicis & Physiologicis. Lipsf. 1687. f°.

*Fallopins.* Gabrielis Fallopii observationes anatomicae. Venet. 1561. 8°. Paris. 1562. 8°. & in Vesalii Operibus omnibus. Lugd. Bat. 1725. f°.

*Folius.* Caecilii Folii Epistola ad Th. Bartholinum. 1644. Exstat in Thomae Bartholini Epistolarum medicinalium Centuria I. & II. Hafn. 1663. 8°.

*Habicot.* Semaine Anatomique, &c. par Nicolas Habicot. De Anatomie wecke, getrokken uyt de boeken van M<sup>r</sup>. Nicolas Habicot, ende verduytsch door Casparum Nollens : in 's Gravenhage, 1629. 8°.

*Hister.* Laurentii Histeri Compendium Anatomicum, Altorf. & Norimb. 1719. 8°. & 1727. 8°.

*Highmorus.* Corporis humani Disquisitio anatomica, Nathanaelis Highmori. Hagae Com. 1651. f°.

*Hunauld.* Observations sur la structure & l'action de quelques muscles des doigts, par M<sup>r</sup>. Hunauld. Histoire de l'Acad. Roy. des Scienc. ann. 1729. à Paris, 1731. 4°.

*Laurentius.* Historia Anatomica humani corporis, & singularum ejus partium, multis controversiis & observationibus novis illustrata. Paris. 1600. f°. Et in operibus omnibus Anatomicis & Medicis. Francof. 1627. f°.

*Littre.* S'il y a du danger de donner par le Nes des Bouillons, de la Boisson, ou tout autre liquide ; par M<sup>r</sup>. Littre. Histoïr. de l'Acad. Roy. des Sciences, ann. 1718. à Paris, 1719. 4°.

*Littre.* Description de l'Urethre de l'homme, démontré à l'Academie le troisieme Juillet 1700. Par M. de Littre. Histoïr. de l'Acad. Roy. des Sciences, ann. 1700. à Paris, 1703. 4°.

*Lower.* Richardi Lower Tractatus de Corde. Amstelod. 1669. 8°. Et Lugd. Batav. 1708. 8°. aliisque annis.

*Marchetis.* Dominici de Marchetis Anatomia. Patav. 1652. 4°. Lugd. Bat. 1688. 12°.

*Massa.*

*Massa.* Nicolai Massae Anatomiae liber introductorius. Venet. 1559. 4°.  
*Molinettus.* Antonii Molinetti Disquisitiones Anatomicae & Pathologicae de Sensibus & eorum Organis. Patav. 1669. 4°.

*Monro.* Remarks on the Articulation, Muscles and Luxation of the Lower Jaw, by Alexander Monro. Medical Essays and Observations, revised and published by a Society in Edinburgh. Edinb. 1733. & seq. 8°.

*Morgagnus.* Joannis Baptistae Morgagni Adversaria anatomica omnia. Patav. 1719. 4°.

*Morgagnus.* Joannis Baptistae Morgagni Epistolae anatomicae duae Lugd. Batav. 1728. 4°.

*Pauli.* Praefatio in Johannis van Horne Opuscula anatomico-chirurgica, studio & opera Johannis Guilielmi Pauli. Lips. 1707. 8°.

*Pecquet.* Joannis Pecqueti Dissertatio anatomica. Exstat in Experimentis novis anatomicis. Hardervic. 1651. 12°. Paris. 1654. 4°. Amstelod. 1661. 12°.

*Riolanus.* Joannis Riolani Anthropographia. Paris. 1618. 8°. & 1626. 4°. & in Operibus anatomicis. Lutet. 1°r. 1649. f°.

*Riolanus.* Animadversiones in opus Anatomicum Andreae Laurentii. In Theatrum anatomicum Caspari Bauhini. In Caspari Bartholini Institutiones anatomicas. In Syntagma anatomicum Joannis Vellingii. Exstant in Operibus anatomicis. Lutet. Paris. 1649. f°.

*Santorini.* Observationes anatomicae Jo. Dominici Santorini. Venet. 1724. 4°.

*Schelhamerus.* Guntheri Christophori Schelhameri de Auditu liber unus. Lugd. Bat. 1684. 8°.

*Senac.* Memoire sur le Diaphragma, par M<sup>r</sup>. Senac. Histoire de l'Acad. Roy. des Sciences, ann. 1729. a Paris. 1731. 4°.

*Spigelius.* De humani corporis fabrica libri decem. Venet. 1627. f°. Et in Adriani Spigelii Operibus omnibus, ex recensione Joh. Antonidae vander Linden. Amsterd. 1635. f°.

*Stenonis.* Nicolai Stenonis de Musculis & Glandulis observationum specimen. Hafn. 1664. 4°.

*Stenonis.* Nicolai Stenonis Elementorum Myologiae Specimen : seu Musculi descriptio Geometrica. Amstelod. 1669. 8°.

*Stephanus.* De Dissectione partium corporis humani libri tres, à Carolo Stephano editi. Paris. 1545. f°.

*Sylvius.* In Hippocratis & Galeni physiologiae partem anatomicam Isagogæ, à Jacobo Sylvio conscripta. Exstat in Jacobi Sylvii Operibus medicis. Genev. 1635. f°.

*Valsalva.* De Aure humana tractatus, auctore Antonio Maria Valsalva. Bonon. 1704. 4°.

*Valverde.* Anatomia del corpo humano composta per M. Giovan. Valverde. In Roma, 1560. f°. Anatomie Corporis Humani, Auctore Joanne

Valverdo : à Michael Columbo latine reddita. Venet. 1607. f°.

*Verbeyen.* Corporis humani anatomia, autore Philippo Verheyen. Lovan. 1693. 4°. Et Bruxell. 1710. 4°.

*Vesalius.* Andreae Vesalii de Humani corporis fabrica Libri septem. Basil. 1543. f°. & 1555. f°. & in Operibus omnibus Anatomicis & Chirurgicis. Lugd. Bat. 1725. f°.

*Vesalius.* Andreae Vesalii anatomicarum Gabrielis Falloppii observationum examen. Venet. 1564. 4°. & in Operibus omnibus Anatomicis & Chirurgicis. Lugd. Bat. 1725. f°.

*Veslingius.* Joannis Veslingii Syntagma anatomicum. Patav. 1631. 8°. Auctum & emendatum. Patav. 1647. 4°. Amstelod. 1666. 4°. Traject. ad Rhén. 1696. 4°.

*Vieussens.* Traité nouveau de la structure de l'Oreille, par M. Raymond Vieussens. A Toulouse, 1714. 4°.

*Winslow.* Observations sur les muscles de l'omoplate, par M. Winslow. Hist. de l'Acad. Roy. des Sciences, ann. 1719. a Paris, 1721. 4°.

*Winslow.* De l'action des muscles en general, & de l'usage de plusieurs en particulier, par M. Winslow. Hist. de l'Acad. Roy. des Sciences, ann. 1710. a Paris, 1722. 4°.

*Winslow.* Observations sur la Mécanique des Muscles obliques de l'Oeil, sur l'Iris, & sur la porosité de la Cornée transparente, &c. par M. Winslow. Hist. de l'Acad. Roy. des Sciences, ann. 1721. a Paris, 1723. 4°.

*Winslow.* Exposition anatomique de la structure du Corps humain, par Jacques-Bénigne Winslow. à Paris, 1732. 4°.



## INDEX MUSCULORUM.

*Numerus major librum, minor paginam notat.*

Abductor brevis pollicis manus	II. 116 III. 496 IV. 660	Adductor pollicis pedis	II. 131 III. 615 IV. 664
Abductor digiti auricularis	II. 117. 119 III. 504 IV. 659	Anconeus	II. 111 III. 457 IV. 657
Abductor digiti minimi pedis	H. 129 III. 609 IV. 665	Anterior auricular	II. 77 III. 143 IV. 667
Abductor indicis	II. 119 III. 515 IV. 659	Antitragicus	II. 81 III. 184 IV. 668
Abductor longus pollicis manus	II. 111 III. 460 IV. 660	Arytaenoides obliquus	II. 89 III. 254 IV. 674
Abductor pollicis pedis	II. 128. 129 III. 606 IV. 664	Arytaenoides transversus	II. 89 III. 256 IV. 674
Accelerator	II. 95 III. 320 IV. 678	Attollens auriculam	II. 77 III. 142 IV. 667
Adductor brevis femoris	II. 122 III. 552 IV. 661	Azygus uvulae	II. 89 III. 248 IV. 675
Adductor longus femoris	II. 122 III. 549 IV. 661	Basioglossus	II. 86 III. 221 IV. 673
Adductor magnus femoris	II. 123 III. 554 IV. 661	Biceps brachii	II. 107 III. 432 IV. 657. 658
Adductor ossis metacarpi digiti auricularis	II. 117. 119 III. 507 IV. 661	Biceps cruris	II. 120 III. 530 IV. 663
Adductor pollicis manus	II. 117. 119 III. 502 IV. 660	Biventer cervicis	II. 99 III. 367 IV. 652

Biventer maxillae	II. 84 III. 207 IV. 655	Constrictor isthmi faucium	II. 88 III. 241 IV. 675
Brachialis internus	II. 108 III. 437 IV. 657	Constrictor medius pharyngis	II. 87 III. 230 IV. 674
Buccinator	II. 79 III. 162 IV. 671	Constrictor superior pharyngis	II. 87 III. 232 IV. 674
Ceratoglossus	II. 86 III. 219 IV. 673	Coracobrachialis	II. 108 III. 435 IV. 657
Cervicalis descendens	II. 99. 100 III. 367 IV. 651	Coracohyoideus	II. 83 III. 199 IV. 672
Chondroglossus	II. 86 III. 222 IV. 673	Corrugator supercilii	II. 78 III. 148 IV. 666
Circumflexus palati mollis	II. 88. 89 III. 245 IV. 675. 676	Creaster	II. 93 III. 294 IV. 677
Cleidomastoideus	II. 83 III. 197 IV. 652	Cricoarytaenoideus lateralis	II. 89 III. 257 IV. 674
Coccygeus	II. 96. 97 III. 335 IV. 654	Cricoarytaenoideus posticus	II. 89 III. 252 IV. 673
Complexus	II. 99 III. 360 IV. 653	Cricothyreoideus	II. 89 III. 249 IV. 673
Compressor naris	II. 78 III. 150 IV. 669	Cruralis	II. 122 III. 546 IV. 663
Compressor prostatae	II. 97 III. 337 IV. 678	Cucullaris	II. 97 III. 338 IV. 655
Constrictor cunni	II. 95 III. 324 IV. 678	Curvator coccygis	II. 97 III. 336 IV. 654
Constrictor inferior pharyngis	II. 87 III. 226 IV. 675	Deltoides	II. 106 III. 420 IV. 656 De-

Depressor alae nasi	II. 79 III. 166 IV. 669	Extensor proprius digiti auricularis	II. 110. 111 III. 454 IV. 659
Depressor anguli oris	II. 79 III. 158 IV. 671	Extensor proprius pollicis pedis	II. 126. 128 III. 597 IV. 664
Depressor labii inferioris	II. 79 III. 160 IV. 671	Externus mallei	II. 82 III. 187 IV. 668
Diaphragma	II. 93 III. 256 IV. 654. 676	Flexor brevis digiti minimi pedis	II. 129. 132 III. 618 IV. 665
Epicranium	II. 77 III. 138 IV. 666	Flexor brevis digitorum pedis	II. 129 III. 603 IV. 665
Erector clitoridis	II. 95 III. 325 IV. 678	Flexor brevis pollicis manus	II. 116. 119 III. 499 IV. 660
Erector penis	II. 95 III. 323 IV. 677	Flexor brevis pollicis pedis	II. 129. 131 III. 613 IV. 664
Extensor brevis digitorum pedis	II. 128 III. 600 IV. 664	Flexor longus digitorum pedis	II. 125. 129. 130 III. 566 IV. 665
Extensor communis digitorum manus	II. 110 III. 449 IV. 658	Flexor longus pollicis manus	II. 114. 116 III. 488 IV. 660
Extensor longus digitorum pedis	II. 126. 128 III. 588 IV. 665	Flexor longus pollicis pedis	II. 125. 130 III. 571 IV. 664
Extensor major pollicis manus	II. 112 III. 465 IV. 660	Flexor parvus digiti auricularis	II. 117 III. 526 IV. 659
Extensor minor pollicis manus	II. 111. 112 III. 463 IV. 660	Gemellus	II. 124 III. 557 IV. 663 Ge-

Gemini	II. 120 III. 526 IV. 662	Interossei externi digitorum manus III. 512 Interossei externi digitorum pedis III. 612
Genioglossus	II. 86 III. 222 IV. 673	Interossei interni digitorum manus III. 508 Interossei interni digitorum pedis III. 610
Geniohyoideus	II. 86 III. 218 IV. 673	Interossei posteriores digitorum manus IV. 659 Interossei primi digitorum pedis IV. 665
Gluteus magnus	II. 119 III. 517 IV. 662	Interossei priores digitorum manus IV. 659 Interossei secundi digitorum pedis IV. 665
Gluteus medius	II. 119 III. 521 IV. 662	Interspinales colli II. 101 III. 383 IV. 651
Gluteus minor	II. 119 III. 523 IV. 662	Interspinales dorsi II. 101 III. 395 IV. 651
Gracilis	II. 122 III. 550 IV. 663	Interspinales lumborum II. 101 III. 394 IV. 650
Hyothyroideus	II. 84 III. 205 IV. 673	Intertransversarii dorsi II. 102 III. 396 IV. 651
Iliacus internus	II. 94 III. 318 IV. 661	Intertransversarii lumborum II. 101 III. 395 IV. 650
Indicator	II. 112 III. 467 IV. 659	Intertransversarii posteriores colli II. 105 III. 418 IV. 652
Infra spinatus	II. 106 III. 425 IV. 656	Intertransversarii priores colli II. 105 III. 416 IV. 652
Intercostales externi	II. 102 III. 399 IV. 654	Latissimus colli II. 82 III. 192 IV. 672
Intercostales interni	II. 102 III. 401 IV. 654	
Interossei digitorum manus	II. 117. 119	
Interossei digitorum pedis	II. 129. 132	

Latissimus dorsi	II. 97 III. 341 IV. 656	Lingualis	II. 87 III. 225 IV. 673
Laxator tympani	II. 82 III. 188 IV. 668	Longissimus dorsi	II. 100 III. 369 IV. 650
Levator anguli oris	II. 78 III. 155 IV. 670	Longus colli	II. 105 III. 411 IV. 651
Levator ani	II. 96 III. 131 IV. 676	Lumbricales manus	II. 116 III. 493 IV. 659
Levatores breviores costarum	II. 102 III. 396 IV. 654	Lumbricales pedis	II. 130 III. 611 IV. 655
Levatores longiores costarum	II. 102 III. 398 IV. 654	Major heliciis	II. 82 III. 184 IV. 668
Levator labii superioris	II. 78 III. 153 IV. 670	Masseter	II. 80 III. 169 IV. 658
Levator labii superioris alaeque nasi	II. 78 III. 151 IV. 669, 670	Minor heliciis	II. 82 III. 185 IV. 668
Levator menti	II. 80 III. 168 IV. 671	Multifidus spinæ	II. 101 III. 389 IV. 650
Levator palati mollis	II. 88, 89 III. 242 IV. 675	Mylohyoideus	II. 85 III. 216 IV. 672
Levator palpebrae superioris	II. 80 III. 173 IV. 666	Nasalis labii superioris	II. 79 III. 161 IV. 671
Levator scapulae	II. 98 III. 352 IV. 652, 655	Obliquus externus abdominis	II. 91 III. 275 IV. 676
		Obliquus inferior capitis	II. 101 III. 387 IV. 653
		Obliquus inferior oculi	II. 81 III. 181 IV. 667
			Obli



Obliquus internus abdominis	II. 92 III. 280 IV. 676	Peroneus brevis	II. 126. 128 III. 585 IV. 664
Obliquus superior capitis	II. 101 III. 388 IV. 653	Peroneus longus	II. 126. 128. 133 III. 579 IV. 664
Obliquus superior oculi	II. 81 III. 175 IV. 667	Peroneus tertius	II. 126. 128 III. 592 IV. 663
Obturator externus	II. 123 III. 553 IV. 662	Plantaris	II. 124 III. 559 IV. 663
Obturator internus	II. 120 III. 527 IV. 662	Popliteus	II. 125 III. 564 IV. 663
Opponens pollicis manus	II. 116 III. 497 IV. 660	Profundus	II. 114 III. 483 IV. 659
Orbicularis oris	II. 79 III. 163 IV. 671	Pronator quadratus	II. 115 III. 491 IV. 658
Orbicularis palpebrarum	II. 77 III. 145 IV. 666	Pronator teres	II. 113 III. 477 IV. 658
Palatopharyngeus	II. 87. 88. 89 III. 236 IV. 675. bis	Psoas magnus	II. 94. 95 III. 314 IV. 661
Palmaris brevis	II. 117 III. 503 IV. 661	Psoas parvus	II. 94 III. 312 IV. 650
Palmaris longus	II. 113 III. 472 IV. 661	Pterygoideus externus	II. 90 III. 263 IV. 655
Pectineus	II. 122 III. 547 IV. 661	Pterygoideus internus	II. 90 III. 261 IV. 655
Pectoralis	II. 90 III. 264 IV. 657	Pyramidalis	II. 93 III. 292 IV. 676
		Pyramiformis	II. 120 III. 524 IV. 662

Qua-

Quadratus femoris	II. 125 III. 529 IV. 662	Rhomboideus major	II. 97 III. 345 IV. 656
Quadratus lumborum	II. 95 III. 316 IV. 650	Rhomboideus minor	II. 97 III. 346 IV. 656
Radialis externus brevior	II. 110 III. 446 IV. 658	Sacrolumbalis	II. 100 III. 369 IV. 650
Radialis externus longior	II. 110 III. 446 IV. 657	Salpingopharyngeus	II. 87. 88 III. 235 IV. 655
Radialis internus	II. 113 III. 475 IV. 658	Sartorius	II. 121 III. 541 IV. 663
Recti oculi	II. 81 III. 177 IV. 667	Scalenus lateralis	II. 103. 104 III. 404 IV. 651
Rectus abdominis	II. 93 III. 289 IV. 676	Scalenus medius	II. 103. 104 III. 405 IV. 651
Rectus cruris	II. 121 III. 538 IV. 662	Scalenus minimus	II. 103 III. 404 IV. 652
Rectus internus major capitis	II. 104 III. 408 IV. 653	Scalenus posticus	II. 103. 104 III. 407 IV. 651
Rectus internus minor capitis	II. 105 III. 414 IV. 653	Scalenus prior	II. 103 III. 403 IV. 652
Rectus lateralis capitis	II. 105 III. 415 IV. 653	Semimembranosus	II. 121 III. 535 IV. 663
Rectus posticus major capitis	II. 101 III. 385 IV. 653	Semispinalis dorsi	II. 100 III. 379 IV. 650
Rectus posticus minor capitis	II. 101 III. 386 IV. 653	Semitendinosus	II. 120 III. 533 IV. 663
Retrahentes auriculæ	II. 77 III. 144 IV. 668	Serratus anticus	II. 90 III. 268 IV. 656
			Serratus

Serratus magnus	II. 91 III. 271 IV. 656	Styloglossus	II. 85 III. 213 IV. 673
Serratus posticus inferior	II. 98 III. 349 IV. 654	Stylohyoideus	II. 84 III. 210 IV. 672
Serratus posticus superior	II. 98 III. 348 IV. 654	Stylohyoideus alter	II. 85 III. 212 IV. 672
Soleus	II. 124 III. 561 IV. 663	Stylopharyngus	II. 85. 88 III. 215 IV. 673. 675
Sphincter ani externus	II. 96 III. 326 IV. 677	Subclavius	II. 90 III. 270 IV. 655
Sphincter ani internus.	II. 97 III. 336 IV. 677	Sublimis	II. 114 III. 479 IV. 658
Spinalis cervicis	II. 100 III. 381 IV. 651	Subscapularis	II. 107 III. 430 IV. 657
Spinalis dorsi	II. 100 III. 377 IV. 650	Supinator brevis	II. 111 III. 458 IV. 658
Splenius capitis.	II. 98 III. 354 IV. 651	Supinator longus	II. 109 III. 444 IV. 658
Splenius colli	II. 98. 99 III. 356 IV. 651	Supraspinatus	II. 106 III. 423 IV. 656
Stapedius	II. 82 III. 191 IV. 669	Temporalis	II. 80 III. 171 IV. 655
Sternohyoideus	II. 83 III. 201 IV. 672	Tensor tympani	II. 82 III. 189 IV. 669
Sternomastoideus	II. 83 III. 196 IV. 652	Tensor vaginæ femoris	II. 121 III. 537 IV. 662. bis
Sternothyroideus	II. 84 III. 203 IV. 673	Teres major	II. 106 III. 428 IV. 656 Te-

Teres minor	II. 106 III. 426 IV. 656	Transversus perinaei	II. 96 III. 329 IV. 677
Thyroarytaenoideus	II. 89 III. 259 IV. 674	Transversus perinaei alter	II. 96 III. 330 IV. 677
Tibialis anticus	II. 126. 127 III. 594 IV. 663	Triangularis sterni	II. 94 III. 309 IV. 654
Tibialis posticus	II. 125. 127 III. 575 IV. 664	Triceps brachii	II. 108 III. 439 IV. 617
Trachelomastoideus	II. 99 III. 362 IV. 653	Vastus externus	II. 121 III. 542 IV. 663
Tragicus	II. 81 III. 183 IV. 668	Vastus internus	II. 121 III. 544 IV. 663
Transversalis cervicis	II. 99 III. 364 IV. 651	Ulnaris externus	II. 111 III. 455 IV. 658
Transversus abdominis	II. 92 III. 284 IV. 676	Ulnaris internus	II. 113 III. 469 IV. 658
Transversus auriculae	II. 82 III. 186 IV. 668	Zygomaticus major	II. 78 III. 157 IV. 671
Transversus pedis	II. 131 III. 617 IV. 664	Zygomaticus minor	II. 78 III. 155 IV. 670



*Retrahens auriculae imperfectior*; in *Retrahentibus auriculae*. 145.  
*Pergracilis portio*, *secedens ab Orbiculari palpebrarum*; in *Orbiculari*. 147.  
*Anomalus*, in *facie*; in *Depressore alae nasi*. 167.  
*Gracillimus oculi*; in *Obliquo superiore oculi*. 176.  
*Pars ad Latissimum colli pertinens in mala*; in *Latissimo colli*. 194.  
*Pars ad Latissimum colli pertinens*, *auriculae inserta*; in *Latissimo colli*. 194.  
*Pars à Sternohyoideo aberrans*; in *Sternohyoideo*. 202.  
*Pars accessoria ad Sternothyreoideum*; in *Sternothyreoideo*. 204.  
*Ligamentum*, quo os *hyoides* alligatum *Styliformi*, in *carinem abeunt*; in *Genioglossio*. 223.

Riii 3.

Fasces

- Fasciculus ad epiglottidem pertinens*, in Genioglossio. 224.  
*Cricothyreoideus alter*, in Cricothyreoideo. 250.  
*Fasciculus tenuis ad Thyreoarytaenoidium accedens*, in Thyreoarytaenoidio. 260.  
*Recti per pectus continuatio quaedam*, in Recto abdominis. 291.  
*Portio ab Iliaco interno aberrans*, in Iliaco interno. 319.  
*Interspinales cervicis supernumerarii*, in Interspinalibus cervicis. 384.  
*Rectus capitis posterior major alter*, in Recto capitis posterioris majoris. 385.  
*Portiones, quae Multifido spinæ accensitæ*, in Multifido spinæ. 392.  
*Musculus singularis in collo*, in Recto capitis interno majoris. 409.  
*Rectus lateralis capitis alter*, in Recto laterali. 415.  
*Portio ad Deltoideum accedens*, in Deltoide. 422.

## BURSAE SUBJECTAE MUSCULIS,


maxime tendinibus eorum, ad faciliorem mobilitatem.

In Iliaco interno	319	In Geminis	527
Latissimo dorsi	343	Bicipite cruris	532
Deltoide	422	Seminembranoso	536
Terete majore	429	Crurali	547
Bicipite brachii	434	Gracili	551
Gluteo magno	520	Gemello	559
Gluteo medio	522	Soleo	563
Gluteo minore	524	Tibiali antico	596

## INDEX PARTIUM AD QUAS MUSCULI PERTINENT.

Spina dorsi, id est, lumbi dorsum- que & cervix	pag. 650	Caput	653
Lumbi	650	Coccyx	654
Lumbi & dorsum	650	Thorax	654
Dorsum	650	Maxilla inferior	655
Collum	651	Humerus, ex scapula & clavicula constans	655
Caput & collum	652	Clavicula	655
			564

Scapula	656	Stapes	669
Os humeri	656	Natus	669
Cubitus	657	Os & labia, itemque genae, buccae, loca quae sunt à menti lateribus	670
Manus	657	Mentum	671
Manus digiti quatuor	658	Os, labium inferius, vicina mala, auricula, cutis colli quae est infra malam, usque in pectus & humerum	672
Index manus	659	Lingua	673
Digitus minimus manus	659	Larynx	673
Pollex manus	660	Glottis	673
Metacarpus manus	661	Pharynx	673
Vola	661	Palatum molle	674
Femur	661	Uvula	675
Vagina tendinea femoris	662	Tuba Eustachiana	675
Crus	662	Abdomen	676
Pes extremus	663	Extremum intestinum rectum & anus	676
Pollex pedis	664	Testis	677
Pollex pedis & digiti proximi tres	664	Penis	677
Digitus pedis minores	665	Urethra virilis & bulbus ejus	678
Digitus minimus pedis	665	Urethra virilis & prostata	678
Cutis capitis, frons, supercilia, dorsum nasi	666	Cunus	678
Supercilium	666	Clitoris	678
Palpebrae & ambitus oculi	666		
Palpebra superior	666		
Globus oculi	667		
Auricula	667		
Malleus & membrana tympani	668		



## MEMORABILIA PRAETER MUSCULOS.

*Deglutitio*; in Palatopharyngeo. 218.

& in Levatore palati molliis. 243.

*Modi, quibus via, quae ex ore & faucibus in nasum est, clauditur*; in Levatore palati molliis. 243.

*Glottis, Glottidis rimula, Glottidis rima interna*; in Cricoarytaenoideo postico. 152.

*Aponeurosis plantae*; in Flexore brevi digitorum pedis. 603.

*Vaginae tendinae artuum*. 625.

F I N I S.



## Emendanda.

Pag. 16. lin. 3. pro quoad l. quod ad	In indice iconum,
16. 12. <i>Abduclores l. Adductores</i>	Pag. 79. col. 1. lin. 6. pro Tab 1 t. l. Tab. 1.
119. 10. <i>Abducloris metacarpi l. Ad-</i>	171. 2. 2. ante Caffer. <i>adde</i> , Bu-
<i>ductoris metacarpi</i>	cret. Tab. inter
217. 2. <i>inferiores l. interiores</i>	452. 2. 1. pro gr. l. u.
281. 18. <i>quae l. qui</i>	506. 2. 2. <i>dela l.</i>
459. 7. <i>ducto l. ductu</i>	507. 1. 3 <i>et 6</i> <i>post</i> LXXXIV.
505. 3. <i>interioris l. interioris c</i>	<i>dela l.</i>
515. 15. <i>1714 l. 1720.</i>	In explanatione iconum,
602. 10. <i>post</i> eorum <i>adde</i> , praeter pol-	Pag. 642 lin. 5. pro <i>secundi l. primi</i>
licis ultimum	11. <i>tertii l. secundi</i>

## Bibliopecto.

Locos, quibus icones inferendae, indicant numeri ipsi inscripti, designantes paginam: itaque icones lineares ex adverso suae quaeque iconis collocanda.

## Aan den Bockbinder.

De plaats van ieder figuur werd aangewezen door het getal op deselve gesteld, beduydende de pagie, die met die van den letterdruk vervolgen: en komt dus ieder omtrek-figuur, op welke de letters geplaatst syn, te staan tegenover de figuur tot haar behoorende.

## Au Relieur.

*Les nombres, dont les planches sont marquées, forment avec ceux des pages la suite naturelle: il faut ranger les planches dans les lieux, que leur nombres demandent. Alors les deux planches, qui contiennent les memes figures, se trouveront toujours l'une vis à vis de l'autre.*

EXCUDERAT

JOANNES WILHELMUS DE GROOT.







